

# АРСЕНАЛЬ

## ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ.

---

**КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ**  
КЪ ГОМЕОПАТИЧЕСКОМУ ЛѢЧЕНІЮ  
ВАЖНѢЙШИХЪ  
НАРУЖНЫХЪ ПОВРЕЖДЕНІЙ.

---

*Доктора медицины*

**Л. БРАЗОЛЯ.**

*Бразоль*

---

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

Паровая Скоропечатня П. О. Яблоноваго. Лештуковъ пер., 13.

1904.

Дозволено цензурою. СПб., 20 Юля 1904 г.

12516 E.B.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Это „*Краткое Наставленіе*“ должно служить руководствомъ, съ помощью котораго многія важнѣйшія наружныя поврежденія могутъ быть пользованы домашними средствами, наружными и внутренними, по правиламъ гомеопатическаго лѣченія. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется знаніе анатоміи человѣческаго тѣла и специальное техническое умѣніе, какъ для вправленія костей, наложенія повязокъ, остановки кровотеченій и производства извѣстныхъ неотложныхъ операцій, тамъ необходимъ хирургъ. Но во многихъ простыхъ случаяхъ, особливо при отдаленности медицинской помощи или въ ожиданіи прибытія врача, это „*Краткое Наставленіе*“ дастъ возможность и не-врачу оказать больному скорую и дѣйствительную помощь. Придерживаясь въ точности данныхъ указаній, каждый легко убѣдится на опытѣ въ необыкновенной успѣшности совмѣстнаго при-мѣненія наружныхъ и внутреннихъ средствъ

употребляемыхъ въ гомеопатіи. Къ этому „Краткому Наставленію“ имѣется и „Арсеналь хирургической Гомеопатіи“, т. е., полная домашняя аптечка, заключающая въ себѣ всѣ наружныя, внутреннія и перевязочныя средства, требуемыя для лѣченія важнѣйшихъ наружныхъ поврежденій, по нижеслѣдующей описи.

Л. Б.

# АРСЕНАЛЪ

## Хирургической Гомеопатіи.

### 1. Наружныя лѣкарственныя средства.

- 1) Arnica, Арника,  $\Theta$  (знакъ  $\Theta$  означаетъ *тинктуру*).
- 2) Bellis perennis, Беллисъ переннисъ,  $\Theta$ .
- 3) Calendula, Календула,  $\Theta$
- 4) Cantharis, Кантарисъ, X.I (1-го десятичнаго разведенія).
- 5) Hamamelis, Гамамелисъ,  $\Theta$ .
- 6) Hypericum, Гиперикумъ,  $\Theta$ .
- 7) Ledum, Ледумъ,  $\Theta$ .
- 8) Rhus, Русъ,  $\Theta$ .
- 9) Ruta, Рута,  $\Theta$ .
- 10) Symphytum, Симфитумъ,  $\Theta$ .
- 11) Oleum Apis, Аписное масло.
- 12) Oleum Arnicae, Арниковое масло.
- 13) Oleum Bryoniae, Масло Брионіи.
- 14) Oleum Camphoratum, Камфорное масло.
- 15) Oleum Rhus, Русное масло.
- 16) Collodium Calendulae, Календуловый коллодій.
- 17) Collodium Cantharidatum, Кантаридный коллодій.

- 18) Aqua Silicata, Силикатная вода.
- 19) Opodeldoc Arnica, Оподелъдокъ Арника.
- 20) Opodeldoc Bryonia, Оподелъдокъ Бріонія.
- 21) Opodeldoc Ledum, Оподелъдокъ Ледумъ.
- 22) Opodeldoc Rhus, Оподелъдокъ Русъ.

## 2. Внутреннія лѣкарственныя средства.

- 1) Aconitum, Аконитъ, 3.
- 2) Apis, Аписъ, 3.
- 3) Arnica, Арника, 3.
- 4) Arsenicum, Арсеникумъ, 3.
- 5) Belladonna, Белладонна, 3.
- 6) Bryonia, Бріонія, 3.
- 7) Calcareea phosphorica, Калькареа фосфорика, 6.
- 8) Calendula, Календула, 3.
- 9) China, Хина, 3.
- 10) Crocus, Крокусъ, 3.
- 11) Hamamelis, Гамамелисъ, 3.
- 12) Nepar sulfuris, Гепаръ сульфурисъ, 6.
- 13) Hydrophobinum, Гидрофобинумъ, 30.
- 14) Hyoscyamus, Гіосціамусъ, 3.
- 15) Hypericum, Гиперикумъ, 3.
- 16) Ignatia, Игнація, 3.
- 17) Ipecacuanha, Ипекакуана, 3.
- 18) Lachesis, Ляхезисъ, 6.
- 19) Ledum, Ледумъ, 3.
- 20) Opium, Опіумъ, 3.
- 21) Rhus, Русъ, 3.
- 22) Ruta, Рута, 3.
- 23) Sabina, Сабина, 3.
- 24) Secale, Сѣкале, 3.
- 25) Silicea, Силицеа, 6.

- 26) Sulfur, Сульфуръ, з.
  - 27) Symphytum, Симфитумъ, з.
  - 28) Veratrum, Вератрумъ, з.
- 

### 3. Перевязочныя средства.

- 1) Вата гигроскопическая.
  - 2) Марли.
  - 3) Ветошка.
  - 4) Клеенка.
  - 5) Вощанка.
  - 6) Фланель.
  - 7) Бинты марлевые.
  - 8) Бинты фланелевые.
  - 9) Бинтъ резиновый.
  - 10) Пластырь липкій.
  - 11) Пластырь арниковый.
  - 12) Пластырь календуловый.
  - 13) Ножницы.
  - 14) Пинцетъ.
  - 15) Иглы.
  - 16) Шелкъ стерилизованный.
  - 17) Кетгутъ.
  - 18) Термометръ.
-

## КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

наружныхъ лѣкарственныхъ средствъ,  
употребляемыхъ при гомеопатиче-  
скомъ лѣченіи.

---

### 1. Arnica, Арника, Ѳ.

*Arnica montana*. Баранья трава. Fallkraut. Leo-  
pard's bane. Тинктура изъ свѣжепросушеннаго  
корня.

Можетъ быть названо *анти-травматиче-  
скимъ* средствомъ гомеопатіи, т. е., важнѣйшимъ  
средствомъ для большинства наружныхъ по-  
врежденій и ихъ послѣдствій, свѣжихъ, не-  
давнихъ или отдаленныхъ, особливо при про-  
стыхъ ушибахъ съ подкожнымъ кровоизлія-  
ніемъ. Унимаетъ боль, способствуетъ всасы-  
ванію кровоизліяній, ускоряетъ исчезновеніе  
синяковъ и излѣчиваетъ воспалительныя опу-  
холи во всѣхъ частяхъ тѣла, появившіяся  
вслѣдствіе механическаго поврежденія.

Для наружнаго употребленія: 1 часть тинк-  
туры на 10 частей воды. Нужно знать, что  
нѣкоторыя лица обладаютъ большою чувстви-  
тельностью кожи къ арникеѣ, которая можетъ  
раздражать кожу и даже вызвать у нихъ ро-  
жистое воспаленіе. Поэтому лучше не употреб-  
лять Арники при существованіи кожной раны,

язвы или ссадины, а въ такихъ случаяхъ примѣнять Календулу (см. ниже). Для мазей можно брать 1 драхму тинктуры на 2 унціи жиру. Очень полезно арниковое масло и *арниковый оподельдокъ* для втираній.

## 2. *Bellis perennis*, Беллисъ переннисъ, Θ.

**Маргаритка. Tausendschön. Paquerette vivace. Common Daisy.** Тинктура изъ цѣлаго свѣжаго цвѣтущаго растенія.

Дѣйствіе его сходно съ дѣйствіемъ арники и календулы. Полезно при воспалительныхъ опухоляхъ и эксудатахъ послѣ ушибовъ и поврежденій, особливо женскихъ грудей, а также при варикозномъ расширеніи венъ на нижнихъ конечностяхъ у чернорабочихъ, а также у ведущихъ сидячій образъ жизни и страдающихъ чувствомъ усталости въ ногахъ.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 5—10 частей воды.

## 3. *Calendula*, Календула, Θ.

***Calendula officinalis*.** Аптечный ноготокъ. Ringelblumenkraut. Souci ordinaire. Marigold. Тинктура изъ цвѣтовъ.

Можетъ быть названо *антисептическимъ* или *противогнилостнымъ* средствомъ гомеопатіи. Возстановляетъ жизненность поврежденныхъ частей, предотвращаетъ нагноеніе и гнилостное броженіе въ ранахъ и язвахъ и, не имѣя никакого раздражающаго дѣйствія на кожу, какъ арника, особенно пригодно для всѣхъ поврежденій, сопряженныхъ съ разрушеніемъ цѣлости кожи, и особливо для рваныхъ, гноящихся и огнестрѣльныхъ ранъ. При карбун-

кудахъ, чирьяхъ и нарывахъ очень успокаиваютъ боль и уменьшаютъ воспаление примочки изъ гигроскопической ваты, пропитываемой горячимъ растворомъ календулы.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 4 части воды. Для мазей 1 драхма тинктуры на 1 унцію жира.

#### 4. *Cantharis*, Кантарисъ, X. 1.

*Cantharis vesicatoria*. Шпанскія мушки. Spanische Fliegen. Cantharide. Настойка изъ свѣжихъ мушекъ.

Употребляется, какъ наружное средство, при ожогахъ въ слабomъ разведеніи, 100 капель 1-го десятичнаго разведенія на стаканъ теплой воды, для промыванія раны. Требуется осторожности при обращеніи, потому что ошибочное употребленіе внутрь можетъ вызвать жестокое воспаленіе почекъ и мочевыхъ путей.

#### 5. *Hamamelis*, Гамамелисъ, Θ.

*Hamamelis virginica*. Виргинскій орѣхъ. Virginischer Zauberstrauch. Тинктура изъ свѣжей коры.

Очень полезное наружное средство при кровотеченияхъ, въ видѣ примочекъ, тампоновъ и впрыскиваній, 1 часть тинктуры на 2—4 части воды.

#### 6. *Hypericum*, Гиперикумъ, Θ.

*Hypericum perforatum*. Звѣробой. Johanniskraut. Herbe St. Jean. Millerpertuis. Тинктура изъ цѣлаго цвѣтущаго свѣжаго растенія:

Полезное средство для ранъ въ такихъ частяхъ тѣла, которыя особенно богаты нервами,

какъ мозгъ, позвоночный столбъ, копчикъ, окончности пальцевъ, и преимущественно для колотыхъ ранъ или вообще для ранъ, очень чувствительныхъ и болѣзненныхъ къ прикосновенію (когда же онѣ не болѣзненны—*Ледумъ*, см. ниже), также послѣ операціи чревосѣченія, и если имѣются явленія угнетенія нервной системы, какъ послѣ шока, испуга и т. д.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 3—4 части воды.

### 7. *Ledum*, Ледумъ, Ѳ.

*Ledum palustre*. Багуль болотный. Wilder Rosmarin. Romarin sauvage. Marsh Tea. Тинктура изъ цѣлаго свѣжаго растенія передъ цвѣтеніемъ.

Полезное средство при укусахъ москитовъ, комаровъ, пчель, осъ и шершней, при укушеніи крысъ, при уколахъ иглою или булавкою, а также при колотыхъ ранахъ, не проявляющихъ особенной болѣзненности, но сопровождаемыхъ характернымъ чувствомъ холода и зябкости.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 2 — 4 части воды. При подагрическихъ и ревматическихъ боляхъ въ малыхъ суставахъ рукъ и ногъ облегчаетъ втираніе *оподельдока Ледумъ*.

### 8. *Rhus*, Русъ, Ѳ.

*Rhus toxicodendron*. Ядовитый желтникъ. Giftsumach. Sumas Vénéneux. Poison oak. Тинктура изъ свѣжихъ листьевъ, собираемыхъ послѣ захода солнца.

Полезно при вывихахъ, растяженіи сухожилій, при дурныхъ послѣдствіяхъ отъ под-

ниманія тяжестей, чрезмѣрномъ или неправильномъ напряженіи группы мускуловъ или какого-либо отдѣльнаго мускула, напр., при вытягиваніи рукъ вверхъ для доставанія высоко-лежащихъ предметовъ.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 4—10 частей воды или втираніе Руснаго масла. При ревматическихъ боляхъ въ мышцахъ и связкахъ, особливо послѣ промоченія или лежанія на сырой землѣ, втираніе *оподельдока Русь*.

### 9. Ruta, Рута, Θ.

**Ruta graveolens.** Душистая рута. **Gartenraute.** Rue de Jardins. Common Rue. Тинктура изъ цѣлаго свѣжаго растенія, собираемаго передъ цвѣтеніемъ.

Полезно при ушибахъ костей.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 4 части воды. Для мазей 1 часть тинктуры на 1 унцію жира.

### 10. Symphytum, Симфитумъ, Θ.

**Symphytum officinale.** Аптечная живокость. **Beinwell.** Grande Consoude. Bone-set. Тинктура изъ свѣжаго растенія съ корнемъ, собраннаго передъ цвѣтеніемъ.

Можетъ быть названо *ортопедическимъ* средствомъ гомеопатіи. Оно ускоряетъ срастаніе переломленныхъ костей, облегчаетъ боли въ кости и надкостницѣ при ушибахъ и поврежденіи костей и уменьшаетъ боли при ушибахъ глазного яблока.

Для наружнаго употребленія: примочки изъ 1 части тинктуры на 4 части воды.

### 11. *Oleum Apis*, Аписное масло.

Употребляется для втиранія при воспалительныхъ и отечныхъ опухоляхъ кожи, при простыхъ и злокачественныхъ жабахъ и при рожѣ.

### 12. *Oleum Arnicae*, Арниковое масло.

Употребляется для втиранія при разныхъ механическихъ поврежденіяхъ, особливо ушибахъ съ подкожнымъ кровоизліяніемъ.

### 13. *Oleum Bryoniae*, Масло Врюніи.

Употребляется для втиранія при ревматическихъ и другихъ боляхъ, облегчающихся въ покоѣ и ухудшающихся отъ движенія.

### 14. *Oleum Camphoratum*, Камфорное масло.

Употребляется для растиранія отмороженныхъ членовъ.

### 15. *Oleum Rhus*, Русное масло.

Употребляется для втиранія при растяженіи связокъ и при ревматическихъ и другихъ боляхъ, ухудшающихся въ покоѣ и облегчающихся отъ движенія.

### 16. *Collodium Calendulae*, Календуловый коллодій.

Отличное средство для смазыванія ушибныхъ ранъ и рожистыхъ воспаленій.

**17. Colledium Cantharidatum, Кантаридный коллодій.**

Употребляется для смазыванія поверхностныхъ ожоговъ кожи.

**18. Aqua Silicata, Силикатная вода.**

Употребляется, какъ перевязочное средство, при гноящихся ранахъ, язвахъ, нарывахъ, ногтоѣдѣ и фистулахъ, въ видѣ примочекъ изъ ветошки или гигроскопической ваты, смачиваемой въ этой жидкости.

---

*Показаніе для внутреннихъ средствъ дается при каждомъ отдѣльномъ родѣ поврежденія въ текстъ нижеслѣдующаго „Краткаго наставленія“.*



# КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

къ гомеопатическому лѣченію важнѣй-  
шихъ наружныхъ поврежденій

---

## Сотрясеніе.

Сотрясеніе, или дѣйствіе сильнаго толчка, удара или паденія, опаснѣе всего, если поражаетъ мозгъ.

*Сотрясеніе мозга* обнаруживается различными симптомами, смотря по степени поврежденія. Если поврежденіе очень сильно, то вслѣдъ за внезапною потерею сознанія и двигательной способности можетъ наступить смерть. Въ тяжелыхъ, но не смертельныхъ случаяхъ наблюдается безчувственное состояніе, неспособность къ движенію, похолодѣніе членовъ, замедленный, слабый или перемежающійся пульсъ, тяжелое и храпящее дыханіе; это первый періодъ сотрясенія. Во второмъ періодѣ пульсъ и дыханіе исправляются, конечности начинаютъ согрѣваться, возвращается чувствительность къ прикосновенію и появляется рвота, но больной все еще находится въ состояніи одурѣнія и почти полной безсознательности къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ. По мѣрѣ постепеннаго исчезновенія первыхъ послѣдствій сотрясенія наступаетъ третій пе-

ріодъ, въ которомъ больной получаетъ способность отвѣчать на громко предлагаемые ему вопросы и пріобрѣтаетъ возможность двигать своими членами и затѣмъ начинаетъ мало-помалу поправляться. Но, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по исчезновеніи этихъ непосредственныхъ симптомовъ сотрясенія, можетъ обнаружиться активный приливъ къ мозгу, который можетъ перейти и въ настоящее воспаление мозга. Въ болѣе легкихъ случаяхъ сотрясенія мозга дѣло иногда ограничивается лишь временными явленіями помутнѣнія сознанія и ослабленія памяти, головною болью, головокруженіемъ, звономъ въ ушахъ и чувствомъ общей слабости.

Для устранения непосредственныхъ послѣдствій сотрясенія мозга, первое средство есть *Arnica* (Арника), снаружи и внутрь. Для наружнаго употребленія, холодные компрессы къ головѣ, смачиваемые въ растворѣ 1 десертной ложки тинктуры Арники на стаканъ холодной воды (ледъ не нуженъ) и часто мѣняемые, по мѣрѣ согрѣванія или высыханія. Внутри дается Арника 3-го дѣленія, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Для обыкновенныхъ случаевъ больше ничего и не требуется. Въ случаѣ же появленія воспалительныхъ явленій со стороны мозга, жара, прилива къ головѣ, бреда, безсознательнаго состоянія, судорогъ и пр., необходимо давать внутрь *Aconitum* (Аконить) 3 и *Belladonna* (Белладонну) 3, каждый часъ попеременно по 2 капли или 5 крупинокъ. Эти средства не только уменьшаютъ приливъ къ мозгу, но и дѣйствуютъ специфически на воспаление мозга. Въ случаѣ же безчувственнаго состоянія съ краснымъ лицомъ и храпящимъ дыханіемъ, давать

*Ориум* (Опиумъ) 3-го дѣленія, каждый часть по 2 капли или 5 крупинокъ.

*Сотрясеніе другихъ частей тѣла* вызываетъ разнообразныя симптомы и боли, смотря по мѣсту поврежденія, но основное лѣченіе остается то же, т. е., наружное и внутреннее употребленіе Арники, а при первомъ появленіи воспалительныхъ симптомовъ—Аконитъ и Белладонна, внутрь, попеременно.

Во всѣхъ случаяхъ сотрясенія, особливо же у женщинъ во время беременности, для предупрежденія выкидыша, необходимо спокойное, по возможности горизонтальное положеніе въ постели въ теченіе нѣсколькихъ часовъ или дней и избѣганіе затѣмъ всякихъ физическихъ напряженій и душевныхъ волненій.—Діета должна быть легкая и по преимуществу растительная. Запрещается водка, вино, пиво, кофе, чай и мясо.

## У Ш И Б Ы.

При простыхъ ушибахъ безъ наружнаго поврежденія кожи нѣтъ ничего лучшаго, какъ прикладываніе къ больному мѣсту компрессовъ изъ холста, полотна или гигроскопической ваты, намачиваемыхъ въ растворѣ 1 части тинктуры *Арники* на 10 частей холодной воды (ледъ не нуженъ), и внутреннее употребленіе *Арники* 3, нѣсколько разъ въ день по 2 капли или 5 крупинокъ. Кромѣ того чрезвычайно полезно втираніе въ больное мѣсто два раза въ день *Арниковаго масла*. Если же ушибъ пришелся какъ разъ на кость, напр., на берцовую кость (голень), то послѣ двухдневнаго употребленія Арники внутрь и снаружи, если боль глубоко въ кости все еще продолжается, и появляется краснота кожи съ

болѣзненностью при дотрогиваніи, то вмѣсто Арники употреблять снаружи и внутрь *Ruta* (Рута). Для наружнаго употребленія 1 часть тинктуры на 10 частей воды въ видѣ примочки, а для внутренняго—*Ruta* 3-го дѣленія, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Если же краснота кожи становится темнѣе и приобретаетъ синій отливъ и если припухлость и боль усиливаются, такъ что можно опасаться угрожающаго омертвѣнія, то необходимо давать внутрь *Lachesis* (Лакезисъ) 6, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Въ случаѣ образованія гноя (нарыва), давать внутрь *Hepar sulfuris* (Гепаръ сульфурисъ) 6, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ, а снаружи прикладывать примочки, смачиваемыя въ *Силликатной водѣ*.

При ушибахъ глаза нужно прикладывать къ закрытому глазу компрессъ изъ гигроскопической ваты, смачиваемый въ вышеуказанномъ растворѣ тинктуры Арники, покрыть его тоненькою вошанкою, сверху положить комокъ сухой ваты и забинтовать глазъ, чѣмъ достигается совмѣстное дѣйствіе легкаго давленія на глазъ, благопріятствующаго всасыванію, и устраненіе раздражающаго вліянія свѣта. Если боль въ глазномъ яблокѣ продолжается, то на 2-й или 3-й день можно замѣнить примочки изъ Арники примочкою изъ тинктуры *Symphyti* (Симфитумъ), 1 часть на 4 части воды, а также давать внутрь, вмѣсто Арники, *Symphytum* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

### Растяженіе связокъ и сухожилій.

Если „подвернется“ или оступится нога и появится сильная боль, чаще всего въ голенно-

стопномъ сочлененіи (щиколкѣ), съ краснотою и припухlostью, то прежде всего полезны холодныя примочки изъ тинктуры *Арники* (1 ч. на 10 ч. воды) и нѣсколько приемовъ *Арники* 3-го дѣленія внутрь, по 2 капли или 5 крупинокъ. Но послѣ ослабленія острыхъ симптомовъ, вмѣсто *Арники* нужно давать внутрь *Rhus* (Русъ) 3-го дѣленія, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Если появляется подкожное кровоизліяніе, то наружное употребленіе *Арники* можно продолжать еще нѣсколько дней; если же кровоизліянія нѣтъ, то для укрѣпленія связокъ и уменьшенія боли можно перейти къ втиранію *Olei Rhus* (Руснаго масла). Во всѣхъ случаяхъ растяженій особенно полезенъ методическій массажъ больного сустава, и чѣмъ раньше и послѣдовательнѣе онъ будетъ примѣненъ, тѣмъ скорѣе исчезнутъ послѣдствія растяженія, которыя иначе даютъ о себѣ знать надолго. За неимѣніемъ опытнаго массажиста, можно прибѣгать къ простому втиранію сначала *Арниковаго*, а потомъ *Руснаго* масла или оподельдока. Абсолютной неподвижности для больной части и лежанія въ постели при растяженіяхъ не требуется; и послѣ исчезновенія острой боли, чѣмъ раньше больной начнетъ упражнять больную конечность, тѣмъ лучше.

Если случится почувствовать сильную боль при подниманіи или ношеніи тяжестей или при всякомъ внезапномъ напряженіи силы, то лучше всего принять сначала нѣсколько приемовъ *Rhus* 3. Но если чувствуются сильныя рѣжущія или колющія боли (въ тазовой области, спинѣ, поясницѣ, животѣ, груди или др.), ухудшающіяся отъ каждаго движенія, то давать *Bryonia* (Бріонія) 3-го дѣленія, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ, и для наружнаго употребленія—втираніе *Масла Бріоніи*. Если

не наступитъ полнаго улучшенія, то давать внутрь *Sulfur* (Сульфуръ) 3, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

При растяженіи связокъ живота, какъ, напр., при борбѣ, фехтованіи, перелѣзаніи черезъ заборъ и т. д., сначала взять нѣсколько приемовъ *Арники* 3; но если появится тошнота или боль въ опредѣленномъ мѣстѣ внутри живота или ощущение, точно все въ животѣ тянетъ внизъ, съ чувствомъ безпокойства, тоски или съ выраженіемъ страданія на лицѣ, то необходимо *Veratrum* (Вератрумъ) 3-го дѣленія, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

Во всѣхъ случаяхъ растяженій, послѣ первоначальнаго употребленія холодныхъ примочекъ (ледъ вообще не нуженъ), если остается боль, то на слѣдующій день и дальше гораздо полезнѣе примѣненіе *согрѣвающихъ компрессовъ*. Компрессъ смачиваютъ въ холодной водѣ, къ которой прибавляютъ на 1 стаканъ не больше 20 капель сначала тинктуры *Арники*, а потомъ тинктуры *Русь*, накладываютъ его на больную часть, покрываютъ тоненькою клеенкою, которая препятствуетъ компрессу испаряться и высыхать, затѣмъ обкладываютъ тоненькимъ слоемъ ваты и забинтовываютъ фланелевымъ бинтомъ, подъ которымъ компрессъ скорѣ согрѣвается. Хорошо положенный компрессъ можетъ лежать 12 часовъ и больше и остается горячимъ, но влажнымъ. Обыкновенно его держать до тѣхъ поръ, пока онъ приятенъ больному, большею частью 5—6 часовъ; послѣ чего его снимаютъ, даютъ больному 1 часъ или больше отдыха и затѣмъ накладываютъ такимъ же образомъ новый компрессъ.

## В ы в и х и.

Вывихомъ называется выходженіе головки кости изъ ея сочленовой впадины. Характернымъ признакомъ вывиха является измѣненіе длины, направленія и формы члена: конечность дѣлается длиннѣе и по сосѣдству поврежденнаго сустава замѣчается неестественное вдавленіе или выпячиваніе; при этомъ больной ощущаетъ сильную боль и не въ состояніи двигать своею конечностью, которая представляетъ своеобразную неподвижность въ извѣстномъ направленіи.

При вывихахъ необходимо прежде всего *вправить* кость, для чего требуется опытный врачъ. Въ ожиданіи его прибытія, больному нужно давать внутрь *Arnica* (Арника) 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ; а если боль очень сильна и появилась воспалительная краснота поврежденнаго мѣста, то можно чередовать Арнику съ *Аконитомъ* 3, каждый часъ попеременно. Для наружнаго употребленія, какъ до, такъ и послѣ вправленія, можно примѣнять слабый растворъ тинктуры *Арники* (1 чайную ложку на стаканъ холодной воды), въ видѣ примочекъ.

## П е р е л о м ы.

Характернымъ признакомъ перелома является крепитация, т. е., ощущеніе хрустѣнія при треніи переломленныхъ концовъ кости другъ объ друга. При этомъ наблюдается неестественная пассивная подвижность члена въ мѣстѣ перелома, какъ разъ обратно неподвижности при вывихѣ; затѣмъ измѣненіе прямого направленія конечности и невозможность ак-

тивно ею двигать, но длина ея обыкновенно кажется укороченною. Переломъ называется простымъ, если только сломана кость безъ наружнаго поврежденія кожи и мягкихъ частей. Если же произошло прободеніе кожи сломаннымъ отросткомъ кости изнутри кнаружи и имѣется, значить, открытая рана кожи, то переломъ называется сложнымъ.

При переломахъ особенно важно какъ можно болѣе раннее вправленіе костей и наложеніе неподвижной повязки по всѣмъ правиламъ искусства, потому что отъ этого зависитъ весь успѣхъ наискорѣйшаго и правильнаго срастанія костей. Поэтому необходимо безотлагательно пригласить опытнаго хирурга. А въ ожиданіи его прибытія, осторожно положить больного въ постель или на любыя импровизированныя носилки или на простую доску, разрѣзать, а не снимать съ него платье и бѣлье, уложить сломанную конечность въ спокойное для больного положеніе, какъ можно меньше подвергая ее движенію и раздраженію, и прикладывать къ мѣсту перелома холодныя примочки изъ тинктуры *Арники* (1 ч. на 10 ч. холодной воды) при цѣлости кожи, или изъ тинктуры *Календулы* (1 ч. на 4 ч. воды) при существованіи кожной раны; а внутрь давать сначала нѣсколько приѣмовъ *Аконита* 3, каждые  $\frac{1}{4}$  часа по 2 капли или 5 крупинокъ, а спустя нѣсколько часовъ *Арнику* 3. Послѣ вправленія и наложенія повязки, для ускоренія срастанія нужно давать больному *Symphytum* (Симфитумъ) 3-го дѣленія, три раза въ день по 2 капли или по 5 крупинокъ. Также очень полезно наружное употребленіе примочекъ изъ тинктуры *Symphyti* (1 ч. на 4 ч. воды), для чего въ повязкѣ оставляется открытое окно. Очень цѣлесообразны съемныя повязки, позволяющія ежедневный методическій массажъ боль-

ной конечности, который возвращает больному гораздо болѣе раннее употребленіе его конечности, чѣмъ при продолжительной неподвижности. Въ случаѣ очень сильныхъ болей отъ раздраженія осколками кости, нужно давать больному *Hypericum* (Гиперикумъ) 3-го дѣленія, каждый часъ по 2 капли или 5 крупинокъ. При неудовлетворительномъ срастаніи костей, особливо у стариковъ, давать *Calcarea phosphorica* (Калькарея фосфорика) 6-го дѣленія, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

## Р а н ы .

Имѣя дѣло со свѣжими ранами, нужно различать три отдѣльныхъ момента: 1) остановку кровотеченія изъ раны, 2) промываніе раны и 3) перевязку раны.

1) При незначительныхъ ранахъ съ незначительнымъ кровотеченіемъ первые 2 момента совпадаютъ вмѣстѣ, потому что холодная вода съ прибавленіемъ тинктуры *Календулы* (1 ч. на 10 ч. воды) служитъ и для остановки кровотеченія и для промыванія раны. Но при болѣе глубокихъ ранахъ съ пораненіемъ крупныхъ сосудовъ, если кровь прямо бьетъ фонтаномъ, необходимо тотчасъ остановить кровотеченіе, иначе больной можетъ истечь кровью.

Кровотеченіе можетъ происходить либо изъ пораненнаго артеріальнаго, либо венознаго сосуда. Артеріальное кровотеченіе узнается по ярко-красному цвѣту крови, которая брызжетъ или пульсируетъ толчками одновременно съ біеніемъ сердца или пульса; венозное же—по темно-красному цвѣту крови, которая вытекаетъ изъ раны не пульсирующею, а ровною и непрерывно струею.

Если кровь льетъ изъ артеріи, то нужно туго перевязать или перетянуть больную ко-

нечность *выше* раны по направленію *отъ* раны *къ сердцу*, т. е., между ранюю и сердцемъ. Для такой перевязки можно употребить платокъ, бинтъ, веревку или любой шнуръ. При тугомъ стягиваніи конечности кровотеченіе остановится, но давленіе будетъ болѣзненно; тогда нужно прощупать артерію, которая теперь легко обнаруживается на глазъ и на осязаніе *выше* мѣста перевязки подъ видомъ утолщенной пульсирующей трубочки, и положить на это мѣсто вдоль артеріального ствола средней величины пробку, пуговицу или монету, прижать ее къ сосуду, положить на нее компрессъ изъ ветошки или ваточный комокъ около 2—3 дюймовъ длины и ширины и толщиною въ палець и крѣпко его забинтовать. Теперь можно попробовать ослабить или отпустить первую перевязку, и если кровотеченіе не возобновляется, то и совсѣмъ ее снять; если же оно возобновляется, то нужно опять притянуть первый бандажъ, пока кровь не перестанетъ течь.

Если же кровь льетъ изъ вены, то нужно перетянуть больную конечность *ниже* раны по направленію *отъ сердца*, т. е., между ранюю и оконечностью члена. Если же рана помѣщается такимъ образомъ, что вся поврежденная часть не можетъ быть защевлена перевязкою, то можно положить холодный компрессъ на самую рану, туго его забинтовать и сверху прикладывать ледъ. Внутрь давать *Арнику* 3-го дѣленія, каждыя  $\frac{1}{4}$  часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

2) Послѣ остановки сильнаго кровотеченія, нужно приступить къ промыванію раны для очищенія ея отъ всякаго внѣшняго загрязненія, какъ земля, песокъ, занозы, осколки стекла, дробинки, тряпки и пр. Всѣ постороннія тѣла, если возможно, должны быть удалены щипцами

или пинцетомъ и обильнымъ промываніемъ холодною водою съ прибавленіемъ тинктуры *Календулы* (1 ч. на 10 ч. воды). Какъ бы ни была тщательна послѣдующая перевязка, но пока рана не очищена, не промыта и не освобождена отъ постороннихъ тѣлъ, на скорое ея заживленіе рассчитывать нельзя. Когда же она промыта, то остается сдѣлать ея перевязку.

3) Самое важное условіе для заживленія раны это наивозможно плотное сближеніе ея краевъ и защищеніе ея отъ воздуха. Маленькія поверхностныя раны, послѣ промыванія ихъ и осушенія, быстро заживаютъ подъ *Календуловымъ пластыремъ*. Но болѣе длинныя и глубокія раны, проникающія черезъ кожу въ мягкія части, требуютъ сшиванія краевъ по правиламъ искусства, для чего требуется врачъ. Но, въ ожиданіи его прибытія, нужно соединить края раны посредствомъ *липкого пластыря*. Нарѣзываются полоски липкого пластыря въ нѣсколько дюймовъ длины, болѣе узкія по срединѣ, чѣмъ у краевъ. Согрѣвши слегка пластырь собственнымъ дыханіемъ, плотно сближаютъ большимъ и указательнымъ пальцами края раны и накладываютъ на нее рядами пластырныя полоски, такъ чтобы средняя суженная часть приходилась на рану. Полоски должны быть достаточно длинны, чтобы заходить на нѣсколько дюймовъ отъ раны по обѣ стороны, иначе пластырь не будетъ крѣпко держать. Волоса на кожѣ должны быть сбиты и всякая влажность кожи осушена. Между каждымъ рядомъ полосокъ должны оставаться большіе или меньшіе промежутки, особливо гдѣ рана болѣе глубока, для того чтобы, въ случаѣ нагноенія, свободно могла выдѣляться матерія и для предотвращенія образованія нарыва. Поэтому узкія, глубокія, колотыя раны, нанесенныя длин-

нымъ остриемъ, кинжаломъ и пр., не должны быть закрываемы такимъ способомъ, такъ какъ онѣ могутъ въ такомъ случаѣ затянуться съ поверхности, но подвергнуться нагноенію изнутри. Послѣ сшиванія или слипанія краевъ раны липкимъ пластыремъ, на нее нужно положить кусокъ гигроскопической ваты, смоченной въ растворѣ тинктуры *Календулы* (1 ч. на 4 ч. воды), покрыть ее тоненькою вощанкою, сверху положить еще одинъ слой сухой ваты и плотно забинтовать для предотвращенія доступа воздуха въ рану.

Если первая повязка по необходимости была положена слишкомъ туго и трудно переносится больнымъ, то ее можно ослабить; если же она не туга и рана не гноится, то первую повязку можно не снимать нѣсколько дней и даже, если возможно, впредь до полного заживленія. Въ лѣтнее же время и если рана гноится, ее нужно перевязывать ежедневно. Шолковыя и кѣтгутовыя нити, употребляемыя для сшиванія раны, остаются до тѣхъ поръ, пока сами не отпадутъ. Полоски же липкаго пластыря, въ случаѣ необходимости, могутъ быть удаляемы. Пластырь нужно всегда снимать за оба конца, отъ концовъ къ серединѣ, начиная съ какого нибудь одного края раны; и, снявши одну полоску, тотчасъ замѣняютъ ее другою и такимъ образомъ продолжаютъ до конца, для того чтобы края не разошлись и чтобы рана не открылась снова.

Различаютъ 6 разновидностей ранъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ свои особенности и требуетъ различнаго лѣченія.

1) *Ръзаныя* раны, какъ, напр., отъ ножа или сабли, не сопровождаемыя ушибомъ или разрывомъ тканей, по вышеуказанному способу заживаютъ обыкновенно первымъ натяженіемъ. Для нихъ достаточно наружнаго употребле-

нія *Календулы* (1 ч. тинктуры на 4 ч. воды), а внутрь *Staphysagria* (Стафизагрия) 3-го дѣленія, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ. Въ случаѣ лихорадочнаго состоянія, *Аконитъ* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

2) *Рваныя* раны, въ которыхъ мягкія части не разсѣкаются, какъ ножомъ, а раздираются и представляютъ неровные, зазубренные разорванные края, рѣдко заживаютъ безъ нагноенія и часто сопровождается воспаленіемъ. Для нихъ требуется наружное и внутреннее употребленіе *Календулы*; для перевязки 1 ч. тинктуры на 4 ч. воды, а внутрь *Calendula* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. При сильномъ нагноеніи раны *Hepar sulfuris* (Гепаръ сульфурисъ) 6, а въ случаѣ недостаточности его дѣйствія потомъ *Silicea* (Силицеа) 6, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

3) *Ушибныя* раны, въ которыхъ вмѣстѣ съ пораненіемъ кожи есть значительное раздавленіе кожи, мягкихъ частей и костей. Ушибныя раны кожи надъ суставомъ или надъ поверхностно лежащею костью, напр., голенью, отлично заживаютъ при употребленіи *Календуловаго Коллодія*, который намазываютъ кисточкою или наливаютъ тонкимъ слоемъ поверхъ раны, предварительно ее обмывши и осушивши. По испареніи эфира на ранѣ остается плотно пристающая и не смываемая водою прозрачная пленка, составляющая превосходную покрывку для ранъ. Для внутренняго же употребленія, при подкожныхъ кровоизліяніяхъ — *Arnica* (Арника) 3; при поврежденіи кости — *Ruta* (Рута) 3; при поврежденіи суставовъ, связокъ и сухожилій — *Rhus* (Русъ) 3; при угрожающей гангренѣ — *Lachesis* (Ляхезисъ) 6, — каждые 2—3 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

4) *Колотыя* раны обыкновенно требуют сначала *Aconit* (Аконита) 3 и *Belladonna* (Белладонны) 3, каждый часъ попеременно по 2 капли или 5 крупинокъ, для предотвращенія или лѣченія уже наступившаго воспаленія, особливо при ранахъ живота, сопровождаемыхъ воспаленіемъ брюшины. Заживленіе первымъ натяженіемъ посредствомъ сшиванія краевъ или наложенія липкаго пластыря тутъ большею частью неумѣстно и вредно. Достаточно одного промыванія растворомъ *Календулы* (1 ч. тинктуры на 4 ч. воды) и защищающей перевязки изъ гигроскопической ваты, первый слой которой смачивается въ этомъ растворѣ и покрывается тоненькою вощанкою, а сверху кладется еще одинъ слой сухой ваты и забинтовывается. При сильномъ нагноеніи—*Hepar sulfuris* (Гепаръ сульфурисъ) 6, а при большой нервности больного—*Ignatia* (Игнація) 3. Если рана очень болѣзненна и чувствительна или въ случаѣ появленія спазмовъ или судорогъ послѣ пораненія, нужно давать внутрь *Hypericum* (Гиперикумъ) 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ, и замѣнить наружное употребленіе *Календулы* тинктурою *Hyperici* (1 ч. на 4 ч. воды).

5) *Огнестрѣльные* раны лѣчатся, какъ и рваныя и ушибныя. Если пуля или осколки раздробленной кости или вѣддрившіяся постороннія тѣла находятся близко отъ поверхности раны, то ихъ слѣдуетъ удалить, особливо если они давятъ на чувствительный нервъ или важную внутренность. Если же они помѣщаются глубоко или не могутъ быть обнаружены, то лучше ихъ оставить, пока они не начнутъ сами выдѣляться вмѣстѣ съ нагноеніемъ. Для наружнаго употребленія—*Календула* (1 ч. тинктуры на 4 ч. воды); внутрь—*Арника* 3, а при лихорадочныхъ и воспалительныхъ явленіяхъ—

*Аконитъ* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. При нагноеніи сначала *Hepar sulfuris* (Гепаръ сульфурисъ) 6, а въ случаѣ недостаточности его дѣйствія черезъ нѣсколько дней потомъ *Silicea* (Силицеа) 6, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

6) *Отравленные* раны, производимыя укушеніемъ ядовитыхъ насѣкомыхъ, змѣй, бѣшеныхъ животныхъ и пр.

Укушенія *пауковъ, стоножекъ, скорпионовъ, ядовитыхъ мухъ, комаровъ, москитовъ* и пр. большею частью не опасны и не требуютъ особаго лѣченія. Если же укусы очень болѣзненны, то можно ихъ промывать лимоннымъ сокомъ, нашатырнымъ спиртомъ или растворомъ тинктуры *Ledum* (Ледумъ), 1 ч. на 4 ч. воды.

Укушенія *пчелъ, осъ и шершней* могутъ быть болѣе опасны, особливо если они многочисленны, какъ, напр., въ случаѣ нападенія роя пчелъ, или если укушенію подвергаются полость рта и горло. Если имѣется подъ руками пинцетъ, то можно имъ извлечь остающееся въ кожѣ жало пчелъ; при попыткахъ же вытащить жало пальцами обыкновенно въ тѣло выдавливается лишь еще больше яда. Поэтому лучше ограничиться тѣмъ, чтобы срѣзать жало поближе къ кожѣ острымъ ножомъ или ножницами. Укушенные мѣста обмывать соленою водою (1 чайную ложку соли на стаканъ воды), а пока ея нѣтъ, прикладывать мокрую землю, глину или илъ. Соленая вода также очень полезна для полосканія рта и горла при укушеніяхъ въ ротъ. Въ случаѣ сильныхъ воспалительныхъ явленій на кожѣ, ее можно смазывать *Аписнымъ масломъ* и давать внутрь *Aconitum* 3, а при большой отечности кожи— *Apis* (Аписъ) 3; при укушеніи же въ ротъ— *Belladonna* 3; если же въ заднюю часть горла—

*Lachesis* 6,—каждый часъ по 2 капли или 5 крупинокъ.

Укушеніе *змѣй* не опасно, если змѣя не ядовита. Обыкновенно достаточно промыть рану соленою водою или растворомъ тинктуры *Ledum* (1 ч. на 4 ч. воды), причемъ можно давать и внутрь *Ledum* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Укушенія же ядовитыхъ змѣй гораздо болѣе серьезны и могутъ быть опасны и даже смертельны, смотря по роду и степени ядовитости змѣинаго яда. Полезно умѣть отличать ядовитую змѣю отъ неядовитой. Всѣ змѣи, имѣющія какъ въ верхней, такъ и въ нижней челюсти по одному ряду зубовъ, неядовиты; всѣ же ядовитыя змѣи имѣютъ въ верхней челюсти два большихъ и длинныхъ зуба. Тотчасъ послѣ укушенія ядовитою змѣею, нужно туго перевязать укушенную конечность веревкою, шнуркомъ, лентою, платкомъ; чѣмъ попало, на 2—3 дюйма *выше* раны по направленію отъ раны къ сердцу, для того чтобы воспрепятствовать крови течь отъ раны къ сердцу, и оставить такимъ образомъ перевязанный членъ до тѣхъ поръ, пока можетъ вытерпѣть больной. А тѣмъ временемъ нужно стараться какъ можно скорѣе извлечь ядъ изъ раны, и для этой цѣли лучше всего прикладывать сухія банки и часто ихъ мѣнять, пока рана не перестанетъ сочиться. Сухія банки можно замѣнить любымъ небольшимъ стаканомъ, рюмкою или стеклянкою, и употребленіе ихъ слѣдующее: кусочекъ бумаги или ваты намачиваютъ въ спиртѣ, водкѣ, одеколонѣ или просто безъ смачиванія въ спиртной жидкости зажигаютъ сухимъ, бросаютъ въ импровизированную банку и тотчасъ прикладываютъ ее открытымъ горломъ сосуда къ ранѣ, плотно прижимая его къ кожѣ, такъ чтобы воздухъ не могъ проникать внутрь;

тогда согрѣтый и разрѣженный внутри сосуда воздухъ дѣйствуетъ присасывающимъ образомъ. Если же подъ рукою не имѣется требуемыхъ предметовъ, или если рана помѣщается такъ, что не допускаетъ сжимающей перевязки и прикладыванія банокъ, то рану нужно высосать ртомъ, что совершенно безвредно, лишь бы высасывающій не имѣлъ ранки, трещины или ссадины на губахъ или во рту. Полезно при высасываніи брать въ ротъ немного соли. Сосаніе должно быть сильно и непрерывно, и рана должна быть предварительно широко раскрыта пальцами; но при сосаніи нужно крѣпко нажимать пальцами отъ сосѣднихъ частей къ ранѣ, особливо со стороны ближайшей отъ сердца. Послѣ того какъ рана высосана, лучшее наружное средство это *лучистая теплота*. Любой кусокъ желѣза, гвоздь, ключъ, что скорѣе попадется подъ руку, накаливается до красна, или, за отсутствіемъ желѣза, раскаленный уголь или зажженная сигара, приближается къ ранѣ на столько близко, насколько въ состояніи выдержать больной безъ жестокой боли и безъ ожога кожи. Прижиганіе въ тѣсномъ смыслѣ, т. е., прикосновеніе раскаленнаго желѣза непосредственно къ самой ранѣ, бесполезно и даже вредно, потому что оно лишь обугливаетъ кожу и разрушаетъ маленькіе сосуды. Какъ только желѣзо или уголь охлаждается, его нужно тотчасъ замѣнить другимъ; поэтому нужно сразу положить въ огонь нѣсколько кусковъ желѣза и имѣть достаточный запасъ раскаленныхъ угольевъ. Жаръ долженъ дѣйствовать только на рану и на ближайшія окружающія ее части, но не на слишкомъ большомъ протяженіи. Если имѣется подъ рукою жиръ или масло, то нужно смазать имъ дюйма на 3 или 4 вокругъ раны; а за неимѣніемъ жира можно брать мыло или

слюну. Все, что просачивается изъ раны, должно быть тщательно удаляемо. Приложение жара продолжается до тѣхъ поръ, пока у больного не появится ознобъ или потягиваніе, а если эти симптомы появятся очень скоро, то нагрѣваніе можно вообще примѣнять въ теченіе одного часа, если больной можетъ его выдержать. Вслѣдъ за этимъ лучше всего посыпать или втереть въ рану мелкой соли или пепель отъ сигары или древесную золу.

Для внутренняго употребленія, если усиливается боль въ ранѣ или по направленію къ сердцу, если мѣсто укуса становится синимъ или пятнистымъ, или если появляется рвота, головокруженіе или обморочное состояніе, то нужно давать *Arsenicum* (Арсеникумъ) 3 дѣленія, каждыя 5—10 минутъ по 2 капли или 5 крупинокъ, а по мѣрѣ улучшенія рѣже. Если же отъ нѣсколькихъ приѣмовъ не наступитъ улучшенія, то давать *Belladonna* (Белладонну) 3, а если и это не поможетъ, то *Lachesis* (Лячезисъ) 6, сначала въ частыхъ приѣмахъ, каждыя  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа, а по мѣрѣ улучшенія рѣже. Чрезвычайно полезное средство это ежедневное потѣніе въ русской паровой банѣ въ теченіе одного часа.

Укушеніе бѣшеною собакою или другимъ бѣшенымъ животнымъ сначала требуетъ примѣненія вышеописанныхъ мѣръ, какъ и при укушеніи ядовитыми змѣями, а именно: сухихъ банокъ и лучистой теплоты (раскаленнаго желѣза), которая можетъ быть употребляема три или четыре раза въ теченіе дня, каждый разъ по одному часу. Вслѣдъ за принятіемъ этихъ мѣръ, самая рана заживляется по вышеуказаннымъ правиламъ лѣченія ранъ и, въ частности, рваныхъ ранъ. Ежедневное потѣніе въ паровой банѣ или въ паровомъ ящикѣ, имѣющемся въ

каждой водолѣчебницѣ, каждый разъ въ теченіе одного часа, и здѣсь чрезвычайно полезно: чѣмъ раньше приступить къ пользованію банею, тѣмъ вѣрнѣе предохрана больного противъ дальнѣйшаго развитія болѣзни.

Изъ внутреннихъ средствъ для предупрежденія развитія болѣзни нужно принимать ежедневно *Hydrophobinum* (Гидрофобинумъ) 30 дѣленія, утромъ и вечеромъ по 2 капли или 5 крупинокъ, и зорко слѣдить за слѣдующимъ симптомомъ: спустя нѣсколько дней, обыкновенно около 7, иногда раньше, иногда позже, подъ языкомъ у укушеннаго появляется маленькій пузырекъ; его нужно вскрыть ланцетомъ, перочиннымъ ножомъ или ножницами, прополоскать ротъ соленою водою и прижечь такимъ образомъ вскрытый пузырекъ обыкновеннымъ ляписомъ. Въ случаѣ же появленія подозрительныхъ симптомовъ, какъ внезапная и неестественная жажда, сопровождаемая ознобомъ во время питья, невыносимость къ блестящимъ предметамъ и къ вѣтру, непривычная печаль, грусть и угнетенное настроеніе духа, судорожныя подергиванія, нужно давать *Belladonna* (Белладонну) 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ; а если не наступитъ улучшенія и особливо если усиливаются судороги, то перейти къ *Hyoscyamus* (Гіосціамусъ) 3.

При всякомъ *гнойномъ зараженіи* раны, кромѣ необходимаго ея промыванія растворомъ *Календулы* (1 ч. тинктуры на 4 ч. воды), нужно давать больному внутрь *Arsenicum* (Арсеникумъ) 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

## Кровотеченія.

Кровотеченіе изъ ранъ было разсмотрѣно выше и должно быть останавливаемо по указаннымъ правиламъ. Лѣченіе же кровотеченій изъ внутреннихъ органовъ не можетъ служить предметомъ разсмотрѣнія въ этомъ краткомъ наставленіи. Здѣсь можно дать лишь нѣсколько общихъ указаній.

Кровотеченіе отъ ушиба, толчка, удара, паденія, вообще послѣ наружнаго поврежденія, требуетъ *Арники* 3; а кровотеченіе отъ прилива крови, вслѣдствіе жары, разгоряченія, употребленія спиртныхъ напитковъ, и у полнокровныхъ—*Аконита* 3.

При кровотеченіи изъ легкихъ, желудка и геморроидальныхъ шишекъ—сначала *Иресасианна* (Ипекакуана) 3, а если скоро не поможетъ—*Гамамелис* (Гамамелись) 3.

Для маточныхъ кровотеченій—*Иресасианна* (Ипекакуана) 3, при ярко красной крови; *Гамамелис* (Гамамелись) 3, при темной жидкой крови; *Срокис* (Крокусъ) 3, при темной крови сгустками; *Сабина* (Сабина) 3, при кровотеченіи съ болью, точно отъ родовыхъ потугъ.

При большой слабости и малокровіи тотчасъ или спустя нѣсколько времени послѣ кровотеченія—*Хина* (Хина) 3.

Всѣ эти средства при сильномъ и остромъ кровотеченіи давать въ частыхъ приѣмахъ, даже каждыя 5 минутъ, въ менѣе острыхъ случаяхъ каждый часъ или два, при незначительныхъ и хроническихъ кровотеченіяхъ, три раза въ день, по 2 капли или 5 крупинокъ.

Хорошее наружное средство при кровотеченіяхъ—*Гамамелис* (Гамамелись), 1 ч. тинктуры на 2—4 части воды, особливо при но-

совыхъ и геморроидальныхъ кровотеченіяхъ. При носовомъ кровотеченіи, намочить въ этомъ растворѣ тампонъ (комокъ) изъ гигроскопической ваты и закупорить имъ кровоточащую ноздрю. При геморроидальномъ кровотеченіи, впрыснуть въ прямую кишку маленькую дѣтскую клизму, около 1 рюмки раствора, для удержанія.

### О Ж О Г И.

Худшій способъ лѣченія ожоговъ состоитъ въ опущеніи обожженнаго члена въ холодную воду или въ прикладываніи къ больному мѣсту льда, холодной воды, свинцовой примочки или другихъ первыхъ попавшихся охлаждающихъ предметовъ, какъ сырой картофель, морковь, рѣпа и пр. При такомъ способѣ лѣченія, даже вслѣдъ за поверхностными и не сильными ожогами образуются пузыри и язвы, а болѣе глубокіе ожоги подвергаются длительному нагноенію и изъязвленію и оставляютъ послѣ себя обезображивающіе рубцы.

Самый простой и легкій способъ лѣченія ожоговъ, ведущій къ наискорѣйшему заживленію съ наименьшимъ страданіемъ для больного, заключается въ слѣдующемъ. Если на обожженной кожѣ имѣются пузыри, ихъ нужно проколоть чистою, прокаленною на огнѣ иглою, перочиннымъ ножомъ или ножницами, не сдирая съ нихъ кожицы. Если же кожица уже отстала и образуетъ разорванныя лохмотья, ихъ нужно срѣзать и всю обожженную поверхность промыть слабымъ растворомъ 1-го десятичнаго разведенія *Cantharis* (Кантариса), 100 капель на стаканъ теплой воды, или, за неимѣніемъ подъ рукою этого средства, насыщеннымъ растворомъ обыкновенной соды (въ сосудъ съ

теплою водою сыпать соду, размѣшивая ложкою, въ количествѣ сколько можетъ раствориться), а за неимѣніемъ соды—чистою теплою водою температуры около 26—28° R. Осушивши рану, посыпать ее толстымъ слоемъ соды и сверху класть компрессы изъ чистой ветошки, сложенной въ нѣсколько разъ и смоченной въ теплой водѣ; эти компрессы нужно часто мѣнять по мѣрѣ высыхания. Сода быстро унимаетъ боль и, если ожогъ не слишкомъ глубокъ, сама по себѣ производитъ заживленіе кожи. За неимѣніемъ же соды, обыкновенное бѣлое *мыло*, лучше всего марсельское, есть одно изъ лучшихъ средствъ, какъ для поверхностныхъ, такъ и для глубокихъ ожоговъ. Нужно его соскоблить въ порошокъ и, помощью обыкновенной щеточки или кисточки, употребляемой для бритья, или безъ нея, посредствомъ простаго взмывиванія съ теплою водою, приготовить густую мыльную пѣну и намазать ее, какъ пластырь, толстымъ слоемъ на чистую ветошку, кисею или марли; этимъ мыльнымъ пластыремъ тщательно, безъ складокъ, покрыть всю обожженную поверхность, не оставляя нигдѣ открытыхъ краевъ, и наложить легкую повязку, лучше всего посредствомъ марлеваго бинта. Повязку можно мѣнять 1 разъ въ сутки, осторожно снимая старый пластырь и тотчасъ замѣняя его новымъ, не промывая раны, если нѣтъ обильнаго нагноенія, и не пытаясь снимать пластырь тамъ, гдѣ онъ присталъ къ ранѣ. Нужно стараться какъ можно больше изолировать рану отъ соприкосновенія съ воздухомъ, поэтому не слишкомъ часто ее перевязывать и не оставлять ее долго открытою; образующіеся водяные пузыри вскрывать, а отдѣлившуюся уже и сморщенную кожицу срѣзывать. Въ случаѣ же очень сильнаго нагноенія, можно, снявши мыльный пластырь, промыть

рану *Силикатовою водою* (Aqua Silicata), осушить ее и снова приложить новый пластырь. Мыло иногда временно усиливаетъ боль; но это обыкновенно бываетъ лишь сначала, и вскорѣ наступаетъ уменьшеніе боли. Это лѣченіе можно продолжать впредь до полного заживленія раны, которое наступаетъ гораздо раньше, чѣмъ при другихъ способахъ; оно значительно уменьшаетъ нагноеніе даже при очень глубокихъ ожогахъ, проникающихъ до кости, и не оставляетъ обезображивающихъ рубцовъ. Легкіе ожоги заживаютъ такимъ образомъ въ 2—3 дня, глубокіе въ 8—10 дней.

Въ тяжелыхъ ожогахъ, особливо отъ фосфора, а также отъ горящихъ жидкостей, какъ спиртъ, бензинъ, скипидаръ и пр., если мыло слишкомъ раздражаетъ рану, можно употреблять *известковую воду* пополамъ съ *льнянымъ*, *прованскимъ* или другимъ масломъ.

Для неглубокихъ ожоговъ, особливо на рукахъ у чернорабочихъ, не имѣющихъ времени и возможности для ежедневнаго тщательнаго ухода за ранюю, лучше всего смазывать ихъ *Кантариднымъ Коллодіемъ* (Collodium Cantharidatum), причемъ эфиръ улетучивается и оставляетъ тонкую прозрачную кожицу, не растворимую въ водѣ и составляющую отличную покрывку для ранъ, устраняя отъ нихъ доступъ воздуха.

Для внутренняго употребленія при ожогахъ кожи, а также при обжиганіи рта, горла или желудка слишкомъ горячею пищею или жидкостью, нужно принимать *Cantharis* (Кантарисъ) ʒ, каждые 2 часа, или рѣже, по 2 капли или 5 крупинокъ, а въ случаѣ необходимости послѣ—*Arsenicum* (Арсеникумъ) ʒ. Поносъ, который иногда появляется послѣ обширныхъ ожоговъ, имѣетъ благопріятное значеніе и не

долженъ быть останавливаемъ вяжущими и нареотическими средствами, какъ таннинъ, бисмутъ, азотнокислое серебро, опій и пр.; если же онъ продолжается спустя нѣсколько дней послѣ заживленія ожога, то нужно давать *Arsenicum* (Арсеникумъ) 3, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

### Ознобленія и отмороженія.

Замерзшаго человѣка не нужно вводить сразу въ теплое помѣщеніе и отмороженные члены отнюдь не согрѣвать горячими или теплыми жидкостями, но *осторожно* растирать снѣгомъ или холодною водою и лучше не сразу, а лишь послѣ того какъ они начнутъ оттаивать. Воспалительная краснота, наступающая вслѣдъ за согрѣваніемъ отмороженныхъ частей, требуетъ втиранія *Камфорнаго масла* (Ol. Camphoratum).

При лихорадочныхъ и воспалительныхъ симптомахъ вслѣдъ за отмороженіемъ, нужно давать *Аконитъ* 3, каждый часъ по 2 капли или 5 крупинокъ, въ теченіе первыхъ сутокъ, а затѣмъ *Bryonia* (Бріонія) 3. При жгучихъ боляхъ въ костяхъ—*Ruta* (Рута) 3. При жгучихъ боляхъ въ мягкихъ частяхъ, если боль отъ теплоты облегчается,—*Arsenicum* (Арсеникумъ) 3, если же ухудшается—*Secale* (Секале) 3. Если отмороженные части дѣлаются синими и опухшими—*Lachesis* (Ляхезисъ) 6. Противъ дурныхъ послѣдствій отмороженія—*Rhus* (Русъ) 3, три раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.

# ЦѢНЫ АПТЕЧКАМЪ

и

## ОТДѢЛЬНЫМЪ ПРЕДМЕТАМЪ

по „Краткому Наставленію“ къ гомеопатическому лѣченію важнѣйшихъ наружныхъ поврежденій.

---

### „АРСЕНАЛЪ

#### ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТІИ“,

полная хирургическая аптечка, составленная по указанію доктора медицины **Л. Бразоля** и содержащая 22 наружныхъ средства въ стеклянкахъ по 4 унціи, 28 внутреннихъ средствъ въ стеклянкахъ по 1 унціи и перевязочныя средства, по описи на стр. 5, 6 и 7 этого руководства.

#### ЦѢНА АПТЕЧКИ:

- 1) въ изящномъ кожаномъ ящикѣ прочной отдѣлки . . . . . 75 руб.
- 2) въ простомъ ящикѣ, покрытомъ коленкоромъ . . . . . 55 „
- 3) безъ ящика, въ обыкновенной аптечной укупоркѣ . . . . . 45 „

---

При требованіи аптечекъ просятъ указывать, желательно ли имѣть внутреннія средства въ капляхъ или въ крупинкахъ. При неуказаніи этого аптечки высылаются въ капляхъ.

## ЦѢНА ОТДѢЛЬНЫМЪ ЛѢКАРСТВАМЪ.

### Внутреннія средства.

Въ капляхъ за сткл. въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> драхмы . —	р.	25	к.
» » 1 унцію —	»	55	»
Въ крупинкахъ за мал. сткл. . . . —	»	20	»
» » сткл. въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> др. —	»	40	»
» » » » 1 унцію . 1	»	20	»

### Наружныя средства.

Тинктура Арника за 1 унцію . . . —	р.	20	к.
» Беллисъ перен. за 1 унцію —	»	50	»
» Гамамелисъ » —	»	25	»
» Гиперикумъ » —	»	20	»
» Календула » —	»	25	»
» Кантарисъ 1 десятичнаго —	»	25	»
» Ледумъ за 1 унцію . . . —	»	50	»
» Русъ » . . . —	»	25	»
» Рута » . . . —	»	50	»
» Симфитумъ » . . . —	»	20	»
Масло Аписное » . . . —	»	50	»
» Арниковое » . . . —	»	30	»
» Бріоніи » . . . —	»	30	»
» Камфорное » . . . —	»	15	»
» Русное » . . . —	»	30	»
Коллодій Календуловый за 1 унцію —	»	40	»
» Кантаридный » —	»	40	»
Опodelьдокъ Арника 3 унціи . . . —	»	50	»
» Бріонія » . . . —	»	50	»
» Ледумъ » . . . —	»	50	»
» Русъ » . . . —	»	50	»
Вода силикатная 1 фунтъ . . . . . —	»	60	»
Пакетъ съ перевязочнымъ матері- аломъ . . . . . 2	»	50	»

*Съ требованіями обращаться въ аптеку  
Общества Врачей Гомеопатовъ, С.-Петер-  
бургъ, Невскій, 82.*