

КЛИНИЧЕСКІЯ НАСТАВЛЕНІЯ

въ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОМЪ ЛЕЧЕНІИ БОЛѢЗНЕЙ

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПІИ
ДЛЯ
ВРАЧЕЙ И НЕ-ВРАЧЕЙ

СОСТАВИЛЪ
ДОКТОРЪ Г. ЯРЪ

Съ приложеніемъ краткихъ указаній для практики, характеристикъ главнѣйшихъ лекарствъ и систематическаго обзора содержанія книги.

ПЕРВОЕ СЪ ПОСЛѢДНЯГО НѢМЦКАГО ИЗДАНІЯ

ИЗДАНІЕ
Ф. ФЛЕММИНГА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФИИ И ЛИТОГРАФИИ ГОТТФРЕДЪЯНИИ И СЪ
(Вас. Остр., 3 л., л. № 44)
1876

*Cliniticheskiia Nastavleniia
v homoeopathicheskom lechenii
holernoi*

*Clinical Instructions
to the Homoeopathic Treatment
of Disease*

by Dr. Jahr

*Translated from German:
"Klinische Anweisungen zur
homöopathischen Behandlung
der Krankheiten."*

ра, од-
мителей
съ сочи-
ажю на
которое
бочными
етворить
особен-
дциною,
ia наста-
o требо-
рева слу-
удобный
зводство,
ига удо-
режнему

полномъ руководствѣ клиническимъ замечаніямъ одическому, или, впрочемъ въ сжатую форму, еще пополнены изъ записокъ, которыя авторъ составлялъ въ продолженіе десяти лѣтъ, читая лекціи и преподавая наставленія молодымъ врачамъ и другимъ любителямъ науки. За совершенную удовлетворительность книги указанному назначенію могло бы поручиться уже одно имя автора, но окончательнымъ подтвержденіемъ и лучшею похвалою ей слу-

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Всѣмъ, занимающимся гомеопатією, знакомо имя Яра, одного изъ самыхъ дѣятельныхъ и заслуженныхъ распространителей Гельманнова ученія, автора весьма многихъ замѣчательныхъ сочиненій по этому предмету и въ особенности переведеннаго также на русскій языкъ „Руководства гомеопатической медицины“, которое до-сихъ-поръ занимаетъ первое мѣсто между настольными справочными книгами у всякаго гомеопата. Желая сколько возможно удовлетворить всѣмъ многообразнымъ требованіямъ своихъ читателей и въ особенности облегчить трудъ начинающимъ заниматься новою медициною, Яръ издастъ предлагаемая здѣсь въ переводѣ „Клиническія наставленія“, въ видѣ краткаго руководства, удовлетворяющаго требованіямъ начинающихъ и не-медиковъ, и могущаго въ то же время служить врачу для справокъ. Не-медикамъ прежде всего нуженъ удобный домашній лечебникъ, начинающимъ — краткое и легкое руководство, а врачамъ — книга для подспорья памяти. Предлагаемая книга удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ; заключающіеся въ прежнемъ полномъ руководствѣ клиническія замѣчанія здѣсь, несмотря на сжатую форму, еще пополнены изъ записокъ, которыя авторъ составлялъ въ продолженіе десяти лѣтъ, читая лекціи и преподавая наставленія молодымъ врачамъ и другимъ любителямъ науки. За совершенную удовлетворительность книги указанному назначенію могло бы поручиться уже одно имя автора, но окончательнымъ подтвержденіемъ и лучшею похвалою ей слу-

жить блестящій успѣхъ ея во всей Европѣ, такъ что мы можемъ надѣяться изданіемъ этого перевода, въ свою очередь, оказать услугу той части русской публики, которая интересуется дѣломъ гомеопатіи.

Порядокъ статей главнаго состава книги алфавитный, какъ самый удобный для пріисканія лекарствъ. Къ этому присоединены указанія для практики, систематическое обзорнѣе содержаніе книги и характеристическіе очерки важнѣйшихъ гомеопатическихъ средствъ.

Такъ какъ основной законъ дѣйствія гомеопатическихъ средствъ заключается въ томъ, что *всякое лекарственное вещество исцѣляетъ отъ такихъ именно болѣзненныхъ явленій, какія оно само можетъ произвести въ здоровомъ организмѣ*, то врачующему по этому способу прежде всего нужно ознакомиться со свойствами лекарствъ, которыя онъ прописываетъ или употребляетъ. Онъ долженъ прежде всего знать, какія болѣзни такое-то лекарство можетъ причинить, чтобъ съ успѣхомъ употребить его противъ такихъ же точно или *близко подобныхъ* болѣзней, которыя должно вылечить. Отсюда и происходитъ названіе „*гомеопатія*“, а не отъ малыхъ пріемовъ, какъ многіе до-сихъ-поръ ложно полагаютъ. Дѣло не въ малыхъ пріемахъ, а въ подобіи, въ сходствѣ дѣйствія лекарства съ явленіями болѣзненного вида. При выборѣ лекарства на данный случай, нужно всегда самымъ подробнымъ, самымъ точнымъ образомъ сличать всѣ малѣйшіе припадки и страданія больного съ тѣми явленіями, какія можетъ произвести лекарство въ здоровомъ тѣлѣ; и чѣмъ ближе будетъ сходство обѣихъ картинъ, чѣмъ *подобнѣе* онѣ будутъ, тѣмъ вѣрнѣе успѣхъ. Изъ трехъ-сотъ средствъ, донинѣ болѣе или менѣе изслѣдованныхъ гомеопатами, многія имѣютъ до тысячи пятисотъ и до двухъ тысячъ признаковъ или болѣзненныхъ явленій, какія могутъ быть произведены ими въ здоровомъ организмѣ. Помнить всѣ эти признаки имѣть человѣческой возможности; но тѣмъ не менѣе практикѣ необходимо составлять себѣ ясное и точное понятіе о важнѣйшихъ характеристиче-

снихъ отличіяхъ тѣхъ средствъ, которыя онъ употребляетъ. Безъ этого даже самая лучшая справочная книга, облегчающая трудъ наняти знающему, не только не поможетъ незнающему, но всегда запутаетъ его въ огромной массѣ указаній. Чтобы предупредить это неудобство и облегчить первоначальное знакомство съ свойствами лекарствъ, авторъ представляетъ здѣсь около сотни самыхъ употребительныхъ и наиболее извѣстныхъ средствъ въ краткихъ очеркахъ самыхъ существенныхъ признаковъ каждаго. Изучивъ эти очерки, уже легко будетъ поопылять ихъ подробностями изъ болѣе обширныхъ руководствъ, а для желающихъ пользоваться этою книгою не болѣе, какъ домашнимъ лечебникомъ, и этого слѣшкомъ достаточно. Для болѣе наглядности, самыя рѣзкія черты каждаго лекарства въ этихъ, и безъ того краткихъ описаніяхъ еще отличены курсивомъ.

Начинающимъ считаемъ великимъ напомнить общее, коренное правило гомеопатической терапіи: *въ приписаніи лекарствъ никогда не должно руководствоваться однимъ названіемъ болѣзни*, потому что въ названіи можно ошибиться, принявъ одну болѣзнь за другую, и потому что всякая, самая опредѣленная болѣзнь, всконѣ возпящая общезвѣстное названіе, въ каждомъ отдѣльномъ пораженномъ ею организмѣ принимаетъ особенный характеръ, выражающійся не столько въ главныхъ, сколько въ второстепенныхъ признакахъ, и зависящій отъ особенныхъ обстоятельствъ, въ какихъ до этой болѣзни находится страдающій организмъ. Раздѣлить болѣзни по категориямъ и давать имъ названія можетъ и должна наука, которая для облегченія знанія приводитъ свои понятія въ систему. Въ дѣйствительности же нѣтъ двухъ больныхъ, которые страдали бы совершенно одинаково, хотя бы въ клиникѣ ихъ и слѣдовало положить рядомъ, подъ одну надпись, вмѣстѣ съ сотнями другихъ. Вслѣдствіе этого одна и та же болѣзнь въ разныхъ больныхъ можетъ требовать совершенно различныхъ ле-

карствъ, и наоборотъ, одно и то же гомеопатическое лекарство можетъ быть достаточнымъ для излеченія многихъ, совершенно различныхъ болѣзней. Вотъ почему и въ этомъ лечебникѣ на всякую статью приходится по нѣскольку указаній. Иногда указанныя лекарства раздѣлены на два и на три разряда. Такъ напримѣръ: противъ воспаления горла вообще показаны: 1) Acon., Bell., Cham., Lach., Merc., Nux-vom., Puls.; 2) Baryt., Bry., Caps., Chin., Cic., Coccul., Coff., Dulc., Ignat., Rhus, Sabad., Sep., Sulf., Veratr.; 3) Alum., Ammon., Ars., Calc., Canth., Carb.-veg.; Lyc., Magn., Nitr.-acid., N.-mosch., Seneg., Staph., Thuj.. Въ первомъ разрядѣ здѣсь помѣщены преимущественно тѣ средства, которыя чаще были употреблены и болѣе другихъ испытаны на практикѣ; во второмъ — близкія по своимъ свойствамъ и также испытанныя; въ третьемъ наконецъ — еще мало испытанныя.

Но изъ всего вышесказаннаго и въ особенности изъ приведеннаго правила слѣдуетъ, что, выбирающій никогда не долженъ довольствоваться этими разрядами и брать, напримѣръ, средство исключительно изъ перваго. Это было бы неудобно уже потому, что и въ первомъ разрядѣ онъ всегда найдетъ нѣсколько лекарствъ, изъ которыхъ выборъ слѣдуетъ сдѣлать не на удачу и, конечно, не по алфавиту. Чтобъ найти лекарство, приличное данному случаю, необходимо тщательно сравнить указанныя средства съ характеристическими чертами каждаго и убѣдиться, дѣйствительно ли признаки лекарствъ близко похожи на признаки подлежащаго болѣзненнаго случая. При этомъ всегда должно имѣть въ виду не только главное страданіе, главную болѣзнь какого-нибудь органа со всеми ея принадлежками, но и состояніе всего организма. Такъ напр., при болѣзни головы должно замѣтить не только тѣ явленія, которыя относятся собственно къ головѣ, но тщательно обследовать состояніе всего организма и принять въ соображеніе его сложение и исторію, т. е. всё предшествовавшія страданія и обстоятельства.

Тогда только получится полный сводъ признаковъ, полная картина болѣзни, и эту картину уже должно сличить съ признаками лекарства. Поступая такимъ образомъ, часто можно найти, что ни одно изъ средствъ перваго разряда не соотвѣтствуетъ болѣзни вполнѣ, тогда какъ взятое изъ втораго или третьяго можетъ оказать вѣрное и скорое дѣйствіе.

Касательно разведеній, должно замѣтить, что въ острыхъ, скоротечныхъ болѣзняхъ большею частію употребляютъ низшія разведенія, отъ перваго до двѣнадцатаго, а въ хроническихъ—высшія, отъ двѣнадцатаго или пятнадцатаго до тридцатаго.

Обыкновенная величина приѣма въ жидкомъ видѣ—одна капля, въ сухомъ—отъ одной до пяти крупинокъ. Въ хроническихъ болѣзняхъ, касательно повторенія приѣмовъ, главное Ганеманново правило: давать второй приѣмъ, выждавъ окончаніе дѣйствія перваго приѣма. Если данное лекарство въ точности соотвѣтствуетъ случаю, то дѣйствіе его можетъ продолжаться отъ нѣсколькихъ дней до пяти, шести недѣль и болѣе. Тутъ вся задача во внимательномъ наблюденіи. Въ острыхъ болѣзняхъ, приѣмы одного и того же средства могутъ повторяться ежедневно, по нѣскольку разъ въ день и даже черезъ нѣсколько минутъ, смотря по быстротечности болѣзни и по угрожающей опасности, или же послѣ каждаго припадка, если болѣзнь выражается какими-нибудь скоропроходящими явленіями.

Предварительныя общія замѣчанія касательно практики.

§ 1. Гомеопатію часто называютъ настоящимъ *специфическимъ* способомъ леченія; дѣйствительно, если специфическими средствами считать не только тѣ, которыя прямо и безъ дальнѣйшихъ соображеній можно примѣнять во всякомъ случаѣ противъ извѣстной болѣзни, для быстрого и полного излеченія всѣхъ ея формъ, то гомеопатію нельзя отказать въ этомъ названіи, потому что она хоть не даетъ ни для одной болѣзни безусловно и неизмѣнно помогающаго специфическаго средства, за то учитъ находить, по опредѣленнымъ и неизмѣненнымъ правиламъ, истинное специфическое средство для каждаго даннаго случая порознь.

§ 2. Правила, посредствомъ которыхъ находятъ это средство, основаны на извѣстномъ соответствіи, сходствѣ симптомовъ, вызываемыхъ избираемымъ лекарствомъ, съ признаками даннаго болѣзненнаго случая. Эта соответственность должна простираться не только на общіе, на такъ называемые *патогномическіе* и *мѣстные* симптомы, касающіеся самаго страждущаго органа, но также и на особенныя признаки, *индивидуально* присущіе данному случаю.

§ 3. Для удачнаго выбора лекарства, нужно принимать въ соображеніе не только патогномическіе признаки страждущаго органа и *отдаленныя* (внѣшнія) болѣзненныя причины, но также и *тѣлесное* состояніе больнаго, особенно если намъ представляется выборъ изъ многихъ лекарствъ, проявляющихъ свои патогенетическія свой-

ства преимущественно подъ влияніемъ известнѣхъ *опытныхъ* причинъ (ушибъ, завореніе желудка, разгоряченіе, изнуреніе тѣла, душевныя волненія, простуда), или при известнѣхъ *условіяхъ* организма (возрастъ, полъ, образъ жизни, особенности тѣлосложенія).

§ 4. При изслѣдованіи всякаго больного необходимо имѣть въ виду слѣдующіе 4 пункта:

a) Страждущій органъ и характеръ совершающагося въ немъ болѣзненнаго процесса съ присущими послѣднему *патологическими* симптомами.

b) *Побочные патологическіе* признаки, присущіе данному случаю *съ особенностями*.

c) *Внѣшнія* причины, дѣйствіе которыхъ проявилось въ развитіи данной болѣзни.

d) *Тѣлосложеніе* и *личныя особенности* больного, обусловленныя его возрастомъ, поломъ, образомъ жизни, занятіями, и проч.

§ 5. Порядокъ, въ какомъ разсматриваются эти четыре пункта изслѣдованія, не важенъ; необходимо только имѣть ихъ всѣ въ виду. Начиная, наир., изслѣдованіе съ пораженнаго органа и развивающагося въ немъ болѣзненнаго процесса (воспаленіе, судороги, параличъ и пр. зѣва, языка, легкихъ, и др.), мы находимъ въ указаніяхъ предлагаемой книги очень многія и часто весьма различныя средства, соответствующія данному случаю; но число ихъ тотчасъ уменьшится, если мы исключимъ изъ него средства, не имѣющія отношенія къ *патологическимъ* побочнымъ, такъ называемымъ *случайнымъ* признакамъ данного случая. Изъ этого уменьшеннаго числа, безъ труда выбираются средства, соответствующія *внѣшнимъ* болѣзнетворнымъ причинамъ и особенностямъ тѣлосложенія больного, такъ что наконецъ остается всего 2 или 3, иногда даже только одно средство, на которомъ окончательно долженъ остановиться выборъ.

§ 6. Очень часто однакожъ встрѣчаются случаи, гдѣ нельзя

найти одного средства, которое соответствовало бы всемъ упомянутымъ четыремъ категоріямъ, но одно соответствуетъ въ особенности патогномическимъ признакамъ, другое—болѣе особеннымъ, личнымъ характеристическимъ, третье—по преимуществу эмпирическимъ болѣзнетворнымъ причинамъ. Въ подобныхъ случаяхъ, соответствіе средства личному (индивидуальному) характеристическому симптому должно считать особенно важнымъ и этому средству врачъ обязанъ отдать преимущество предъ всеми прочими; затѣмъ слѣдуетъ соответствіе средства эмпирической болѣзнетворной причины, если ея дѣйствіе ясно выражено; послѣ того слѣдуетъ средство, соответствующее общимъ патогномическимъ признакамъ, и наконецъ уже то, которое пригодно тѣлосложенію больного.

§ 7. Важность побочных, или патогномическаго круга лежащихъ симптомовъ особенно значительна въ острыхъ болѣзняхъ; здѣсь очень часто случается, что средство, повидимому, мало соответствующее собственно патологическому случаю, излечиваетъ его какъ бы чудомъ, при надлежащемъ соответствіи лекарства особенному, сопутствующему симптому болѣзни. Изъ двухъ же или многихъ средствъ, соответствующихъ этому побочному симптому, конечно, должно отдать предпочтеніе тому, которое всего лучше соответствуетъ патологическимъ признакамъ даннаго случая. Но въ острыхъ болѣзняхъ еще важнѣе индивидуально характеристическимъ признакамъ значеніе эмпирической болѣзнетворной причины, каковы: разгориченіе, простуда, расстройство желудка ядами, трудноваримую или вредною пищей, механическія вліянія, печаль, досада, гнѣвъ, испугъ и др. душевныя потрясенія. Если одно изъ подобныхъ условій очевидно послужило производящею причиною болѣзни, то врачъ прежде всего долженъ выбрать средства, соответствующія этой причинѣ и изъ нихъ уже тѣ, которыя соответствуютъ индивидуальнымъ особенностямъ даннаго случая.

§ 8. При всѣхъ длительныхъ, *хроническихъ* заболѣваніяхъ, значеніе виѣшней производящей причины отходить на второй планъ, хотя ее также необходимо имѣть въ виду при выборѣ лекарства. Точно также при этихъ хроническихъ случаяхъ рѣдко представляются ясно выраженные побочные симптомы въ области главнымъ образомъ пораженнаго органа, на основаніи которыхъ можно было бы найти истинное специфическое лекарство. Въ подобныхъ случаяхъ, единственный и притомъ самый рациональный способъ леченія состоитъ въ опредѣленіи не только *индивидуальнаго тѣлосложенія* больного, но въ то же время, что собственно одно и то же, въ подробномъ изслѣдованіи всей исторіи его болѣзни отъ самаго ея начала, которое можетъ быть скрывается въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, и затѣмъ уже въ приисканіи средства, которое лучше всего соотвѣтствовало бы всему найденному. При этомъ всеобщемъ изслѣдованіи болѣзни тѣлосложенія, необходимо принимать въ расчетъ всякія обстоятельства, будутъ ли они находиться въ видимой связи съ предстоящею намъ болѣзью, или нѣтъ. Такъ напр., если больной страдаетъ хроническимъ расстройствомъ желудка, геморроемъ или *другою какою-либо* хроническою болѣзью, противъ которой было употреблено уже много превосходныхъ средствъ безуспѣшно, то врачъ долженъ предпринять общее изслѣдованіе больного, отъ головы до большого пальца ноги, и принять въ соображеніе все ненормальное въ изслѣдуемыхъ органахъ и ихъ отправленияхъ. Выпаденіе волосъ, страданія глазъ и ушей, состояніе кожи, проходимость дыхательныхъ путей и органовъ, половныя отправления и пр.,—все это необходимо соображать при выборѣ новаго средства. Особенно важны при этомъ прежде перенесенныя болѣзни съ употребленными противъ нихъ лекарствами, преимущественно же такъ называемыя болѣзненныя расположенія больного, напр. склонность къ насморку, потливость ногъ или подмышечныхъ впадинъ, привычные запоры на низъ или по-

ность, темпераментъ, характеръ, душевное расположеніе, склонность къ ознобленіямъ, къ появленію сыпей и др. особенности организма.

§ 9. Сказанное о *хроническихъ* болѣзняхъ касательно всесторонняго изслѣдованія патологическихъ состояній, перевесенныхъ болыми втеченіе его жизни, вполне применимо и къ *возальнымъ* (*эпидемическимъ*) болѣзнямъ. Какъ первыиъ даетъ форму время, впродолженіе котораго онѣ развиваются, такъ развитіе послѣднихъ обусловлено *обширностью* ихъ распространенія, причемъ каждый отдѣльный заболѣвающій очень рѣдко, почти даже нѣкогда не представляетъ всѣхъ явленій, свойственныхъ господствующей эпидеміи, но въ одноиъ наблюдается тотъ, въ другомъ—другой рядъ этихъ явленій. Въ подобныхъ эпидеміяхъ, даже противъ отдѣльныхъ болѣзненныхъ явленій, оказываются вполне цѣлебными только тѣ средства, которыя всего лучше соответствуютъ совокупности симптомовъ полной картины болѣзни; поэтому врачъ, въ подобныхъ случаяхъ, прежде всего долженъ собрать возможно полную картину болѣзненныхъ przypadковъ путемъ наблюденія многихъ, также или легко заболѣвающихъ этою эпидеміею, и затѣмъ уже подбирать средство, которое всего полнѣе и вѣрнѣе соответствовало бы найденной массѣ явленій. Отысканныя такимъ образомъ средства, въ большинствѣ случаевъ, будутъ пригодны и для отдѣльныхъ признаковъ эпидеміи, т. е. для такихъ заболѣваній, гдѣ существующая эпидемическая болѣзнь выразилась неясно, не вполне.

§ 10. Нецѣликомъ считаемъ здѣсь опредѣлять нѣсколько точнѣе, въ какоиъ ряду явленій вообще слѣдуетъ искать по преимуществу признаки *особенные, свойственные* каждому данному случаю, для опредѣленія по нимъ истиннаго специфическаго средства леченія. Понятно само собою, что эта *особенность* болѣзненнаго случая опредѣляется известными характеромъ боли (колючая, рѣжущая, давящая, раздражающая), или известными ее истощаю-

взвѣствъ. Но, съ одной стороны, во многихъ случаяхъ, самъ больной не въ состояніи опредѣлять ни характера, ни мѣста ощущаемой имъ боли, а съ другой, почти всѣ наши лекарства, за исключеніемъ немногихъ (напр. *aconitum*, который постоянно вызываетъ *жгучую боль* во внутреннихъ частяхъ), способны вызывать разнообразнѣйшія ощущенія. Вотъ почему гораздо важнѣе *обстоятельства и условія*, при которыхъ наступаетъ извѣстная боль или симптомъ, такъ, напр., ночью, утромъ, послѣ обѣда, при томъ или другомъ положеніи тѣла, среди какихъ либо извѣстныхъ занятій, и пр. То же должно сказать о такъ называемыхъ *сопутствующихъ* или *побочныхъ* симптомахъ, одновременно появляющихся въ видѣ боли, лихорадочнаго состоянія, пота, рвоты, испражнений на языкъ, тошноты, обморока, судорогъ и пр.: Если какъ эти, такъ и вышеприведенныя условія состоятъ въ сферѣ дѣйствія избраннаго средства и въ картинѣ лежащаго болѣзненнаго случая, то мы вправѣ рассчитывать на возможно высшую цѣлебность найденнаго лекарства.

§ 11. Не всегда однакожь въ практикѣ встрѣчаются случаи, гдѣ въ концѣ концовъ нашъ выборъ остававляется на одномъ средствѣ; случается нерѣдко, даже при старательнѣйшемъ наблюденіи всѣхъ симптомовъ, остановиться на двухъ или трехъ средствахъ, изъ которыхъ каждое соотвѣтствуетъ только извѣстной части важнѣйшихъ показаній, но не цѣлой картинѣ болѣзни; иногда же два три средства, по видимому, одинаково соотвѣтствуютъ болѣзненному состоянію, такъ что трудно рѣшить, которое изъ нихъ лучше. Въ этомъ случаѣ врачъ долженъ отдать предпочтеніе тому средству, которое оказывается наиболѣе пригоднымъ къ разнообразнымъ обстоятельствамъ даннаго случая. Оно непремѣнно окажется полезнымъ непосредственно, или же такъ видоизмѣнитъ состояніе болѣзненнаго, что по прекращеніи его дѣйствія, даже въ продолженіе послѣдняго, обнаружатся болѣе точное показаніе къ употребленію другаго средства, которыхъ уже извѣрно довершится излеченіе.

§ 12. Въ каждомъ болѣзненномъ случаѣ, послѣ назначенія избраннаго средства, врачъ обязанъ выждать лекарственное дѣйствіе послѣдняго, не замѣняя его новымъ, въ продолженіе известнаго срока, различнаго смотря по напряженности и остротѣ теченія болѣзни. Въ очень тяжкихъ, остропротекающихъ болѣзняхъ, напр. въ ясно выраженной азіатской холерѣ и т. п. случаяхъ, назначенное средство, если оно дѣйствительно пригодно, должно вызвать нѣкоторое облегченіе болѣзни уже черезъ 1, 2 часа и даже ранѣе. Въ горячкахъ это начало облегченія появляется, смотря по силѣ ихъ, черезъ 6 — 12 часовъ; въ немногихъ острыхъ болѣзняхъ, этого благоприятнаго дѣйствія нужно ждать отъ 12 — 24 часовъ, въ хроническихъ же, медленно протекающихъ страданіяхъ, оно обнаруживается черезъ 4, 8, 10 дней. Въ продолженіе этихъ сроковъ, врачъ обязанъ выждать дѣйствія назначеннаго лекарства и тогда только переходить къ назначенію другаго, когда въ означенные періоды времени первоначальное средство не вызвало замѣтимаго улучшенія болѣзни; если даже болѣзнь остаетя въ это время безъ измѣненія, не ухудшается, то и тогда врачъ не долженъ переимѣнить назначенное лекарство, но выждать его дѣйствіе въ продолженіе двойнаго срока. Если же болѣзнь, въ теченіе упомянутаго періода или вскорѣ по его окончаніи, ожесточается, осложняется новыми болѣе или менѣе опасными припадками, то ни уже несправѣ ждать пользы отъ назначеннаго лекарства и должны замѣнить его другимъ, болѣе точно приспособленнымъ къ данному случаю.

§ 13. Иногда однакожь случается, что вначалѣ даже наилучшимъ образомъ выбранное лекарство, вмѣсто облегченія, производитъ видимое ожесточеніе болѣзни, вызывая новыя припадки въ состояніи больнаго, по прекращеніи которыхъ тѣмъ быстрѣе и очевиднѣе наступаетъ облегченіе. Въ подобныхъ случаяхъ, конечно, было бы крайне неблагоприятно приступать преждевременно къ замѣнѣ назначеннаго средства новымъ; поэтому здѣсь является въ выс-

ной степени важный вопрос: какими образомъ отличить это кратковременное, искусственное ухудшеніе отъ дѣйствительнаго ожесточенія болѣзни? Подобное искусственное ухудшеніе обнаруживается обыкновенно у особъ очень чувствительныхъ, или представляющихъ особое идиосинкразическое расположеніе къ назначенному лекарству, во многихъ же случаяхъ оно составляетъ естественный результатъ слишкомъ сильнаго приѣма лекарства. Тѣмъ не менѣе, если употребленное средство дѣйствительно пригодно, то эти новые припадки проходятъ по истеченіи известнаго, болѣе или менѣе продолжительнаго срока, смотря по характеру болѣзни; кромѣ того, во многихъ случаяхъ они принадлежатъ болѣе области несущественныхъ, побочныхъ припадковъ и, даже при сильномъ своемъ развитіи, отличаются обыкновенно измѣчивостью и скоротечностью; наконецъ, при самомъ развитіи ихъ очень часто можно уже наблюдать улучшеніе основнаго болѣзненнаго состоянія. Такъ идетъ дѣло, когда употребленное средство дѣйствительно пригодно. Въ противномъ случаѣ, ухудшеніе и новые припадки наступаютъ позже, именно по истеченіи срока, указаннаго въ предъидущемъ параграфѣ; они остойчивѣе и ожесточаются въ своемъ теченіи, вызывая ухудшеніе въ общемъ состояніи больнаго. Въ подобныхъ случаяхъ, не теряя времени въ ожиданіи, мы должны переимѣнить употребленное средство.

§ 14. Какъ ни труднаго кажется для начинающаго выборъ надлежащаго лекарства, тѣмъ не менѣе вопросъ о величинѣ и повтореніи приѣмовъ едва ли не труднѣе, такъ какъ онъ еще не рѣшенъ окончательно даже первыми практиками нашей школы. Одни врачи лечатъ только *кряжкими тинктурами* и *первыми разведеніями*, назначая тѣ и другія по каплѣ или грану каждыя 2, 3 часа; другіе употребляютъ, *смотря по обстоятельствамъ*, разнообразнѣйшія разведенія, въ видѣ капель, крупинокъ или водныхъ растворовъ, въ единичномъ приѣмѣ, или въ повтореніи

черезъ 1, 2, 3, 24 часа; наконецъ третьи идутъ далеко выше 30-го разведенія, до 60, 100, 500, даже до 2000, 8000,—причемъ многіе точно также достигаютъ дѣйствительнаго, быстро и прочнаго излеченія. Здѣсь не мѣсто разбирать въ подробности эти различныя теоріи и взгляды, тѣмъ болѣе, что на практикѣ, вопреки мнѣнію многихъ, степень разжиженія средства представляетъ очень второстепенную важность, и надлежащимъ образомъ выбранное средство можетъ излечивать въ любомъ разведеніи, отъ 1 до 8000, съ условіемъ повторенія приемовъ чаще, или рѣже, смотря по обстоятельствамъ.

§ 15. Замѣтимъ однакожъ, что встрѣчаются случаи, гдѣ степень разведенія лекарства необходимо имѣть въ виду, какъ напр. при панкреатѣ, гдѣ разведенія выше 3-го остаются совершенно безуспѣшными, тогда какъ 1, 2, 3 разведеніе или растираніе *Merc.*, утромъ и вечеромъ по $\frac{1}{2}$ грану, по большей части, въ десять дней излечиваетъ язву совершенно. Но число подобныхъ случаевъ слишкомъ ограничено, чтобы можно было на нихъ основать прочную теорію; *Cam.* при триперѣ, *Veratr.* въ холерѣ, *Spong.* въ крупѣ и другія въ тысячѣ иныхъ случаевъ, какъ я вполне убѣдился собственнымъ опытомъ, дѣйствуютъ совершенно одинаково какъ въ 30, такъ и въ 3, 6, 9, 12 разведеніяхъ.


§ 16. Какъ ни старались понинѣ установить какое-либо различіе между высокими и низкими разведеніями лекарства, однакожъ ово отнюдь не доказано еще путемъ опыта, и никто не вправе утверждать, которыя изъ этихъ разведеній сильнѣе или слабѣе. Развитіе силы и проникаемости въ лекарства вълѣдствіе частыхъ его сотрясеній — тоже далеко нерѣшенный вопросъ; на основаніи собственной омытности, я могу утверждать, что отношеніе многосотрясаемыхъ лекарствъ къ больному организму точно такое же, какъ и малосотрясаемыхъ, а именно, что тѣ и другія въ однихъ случаяхъ оказываются сильно проникающими, въ

другихъ же ихъ дѣйствіе весьма слабо и даже едва замѣтно. Доказано и несомнѣнно только то, что *понижъ еще не найдено границы, за которою наши разведенія перестаютъ быть дѣйствительными и что разведенія 8000 оказываются вообще столь же цѣлебнымъ средствомъ, какъ и 1-го или 3-го, за исключеніемъ немногихъ случаевъ (см. § 15), гдѣ по преимуществу пригнѣны низкія дѣленія.*

§ 17. Но если не найдено еще различія въ абсолютной дѣйствительности между высокими и низкими дѣленіями лекарства, то различіе въ образъ дѣйствія ихъ тѣмъ не менѣе должно, по видимому, существовать несомнѣнно. Уже д-ръ Hering неоднократно указывалъ на эти различія, состоящія преимущественно въ томъ, что высокія дѣленія производятъ *последовательность дѣйствія или явленія, которыя низкими дѣленіями вызываются перемѣнно*; такъ напр., *Opium* въ большихъ приемахъ производитъ *усыпленіе*, а въ малыхъ, т. е. въ высокихъ дѣленіяхъ, — *бессоницу*, или какъ *Natr.-mur.* въ низкихъ дѣленіяхъ вызываетъ *жажду*, а въ высокихъ — *отсутствіе жажды*. Если фактъ вѣренъ (онъ впрочемъ подтверждается и моими опытами), то это свойство необходимо признать и за всѣми прочими средствами, которыя богаты обратными дѣйствіями. Поэтому *Plumb.*, *N.-vom.*, *Op.*, въ низкихъ разведеніяхъ должны гомеопатически дѣйствовать противъ *запора на низъ*, а въ *высокихъ* — противъ *поноса*. Впрочемъ это правило представляетъ до-сихъ-поръ такое множество исключеній (такъ напр., всѣмъ извѣстное превосходное дѣйствіе *Op.* и *Plumb.*, даже въ 30 разведеніи и въ *малыишкхъ* приемахъ, противъ упорныхъ запоровъ на низъ), что его нельзя допустить въ науку и необходимо подвергнуть дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ.

§ 18. Но между дѣйствіемъ лекарствъ существуетъ другое и, какъ мнѣ кажется, болѣе существенное различіе, на которое я указывалъ уже въ 1851 г., на гомеопатическомъ съѣздѣ въ Парижѣ.

Оно заключается не въ *большей* или *меньшей* дѣйствительности разведеній, т. е. не въ степени ихъ крѣпости, но въ *развитіи* изъ *лекарственнаго свойства*, усиливаясь можетъ быть путемъ сотрясенія, такъ что, чѣмъ выше дѣленіе лекарства, тѣмъ сильнѣе выдается *особенный, присущій* послѣднему характеръ. Представимъ себѣ нѣсколько концентричныхъ круговъ (см. приложенный рисунокъ), радіусами которыхъ обозначены средства въ различныхъ дѣленіяхъ, напр. отъ 1 до 120. Въ *первомъ* дѣленіи, въ самомъ *внутреннемъ* кругѣ, гдѣ *радіусы* *сближены* очень сильно, многія такъ называемыя *подобныя* или *замѣнимыя* средства, какъ напр. Merc., Bell., Lach., представля-



ють много общихъ симптомовъ; но чѣмъ далѣе мы будемъ подвигаться отъ центра, тѣмъ болѣе различаются всѣ эти средства въ своихъ дѣйствіяхъ, пріобрѣтая каждое болѣе присущую себѣ совокупность признаковъ, такъ что, если напр. въ извѣстныхъ, неясно выраженныхъ болѣзненныхъ формахъ выборъ можетъ колебаться между двумя или тремя сходными между собою средствами *низшаго*

дѣленія, то эта заѣва средствъ одного другия въ *высшихъ* и *самыхъ высокихъ* дѣленіяхъ уже недопустима и выборъ необходимо долженъ пасть на *одно* изъ этихъ средствъ.

§ 19. Качественное различіе гомеопатическихъ дѣленій подтверждается также общезвѣстнымъ дѣйствіемъ лекарствъ или ядовъ въ грубыхъ, массивныхъ дозахъ, причемъ проявляется ихъ генерическое вредное вліяніе. Въ этихъ пріемахъ дѣйствуютъ равно одуряющія образомъ всѣ *наркотическія* средства, — *Belladonna*, *Stramonium*, *Opium*, вызывая смерть вслѣдствіе паралича или апоплексіи; всѣ *проносныя*, производя рвоту или поносъ; всѣ такъ называемые *острые яды*, вызывая воспаленіе желудка и проч.. Это дѣйствіе лекарствъ соотвѣтствуетъ *центру* концентрическихъ круговъ, гдѣ сходятся всѣ радіусы и гдѣ лекарства, собственно говоря, не представляютъ специфическаго различія дѣйствій, кромѣ развѣ того только, что въ одномъ случаѣ это ядовитое генерическое дѣйствіе проявляется отъ пріема одного грана, а въ другомъ отъ нѣсколькихъ.

§ 20. Такимъ образомъ наши лекарства, проявляя *слабѣе* или *сильнѣе* абсолютную силу своихъ дѣйствій, приобретаютъ путемъ разжиженій и взбалтываній усиленную *проницательность* и *особленность* (*индивидуальность*) *дѣйствія*. Вотъ почему во всѣхъ случаяхъ, гдѣ выборъ колеблется между 2—3 сходными средствами, я всегда назначаю одно изъ нихъ, которое кажется мнѣ лучшимъ, въ *низкомъ* дѣленіи (3 — 15); если же болѣзнь выражена настолько ясно, что требуетъ примѣненія *одного только* средства, характеристическій симптомъ котораго въ точности соотвѣтствуетъ *наиболѣе* востоящему симптому подлежащаго случая, то я смѣло назначаю *высокое*, даже *высшее* дѣленіе, какъ обладающее при данныхъ условіяхъ болѣе полнымъ и болѣе цѣлебнымъ дѣйствіемъ. Уже отъ одного пріема лекарства въ этихъ случаяхъ часто обнаруживается поразительно быстрый успѣхъ.

§ 21. По этому касательно *величины и частоты* приёмовъ, я могу замѣтить слѣдующее: 1) во *всѣхъ тяжкихъ, острыхъ, михорадочныхъ, или безмихорадочныхъ* формахъ, такъ напр., въ острыхъ воспаленіяхъ, сильныхъ судорогахъ, при часто повторяющихся рвотѣ или поносѣ, при остромъ ревматизмѣ, жестокихъ коликахъ и т. под., я растворяю 3—6 крупинокъ, по вышеупомянутымъ правиламъ избраннаго дѣленія, въ чайной чашкѣ воды и даю больному, смотря по жестокости случая или быстротѣ его теченія, каждый часъ, два, три часа (въ холерѣ каждые полчаса, или даже четверть часа) по чайной (не по столовой) ложкѣ этого раствора. 2) Въ *не очень сильныхъ страданіяхъ* (привычный насморкъ, полустрый ревматизмъ, послѣдствія простуды, расстройство пищеваренія и т. под.), я даю каждые 24 часа больному на языкъ 2 — 3 крупинки избраннаго средства въ сухомъ видѣ, или по чайной ложкѣ утромъ и вечеромъ раствора этихъ крупинокъ въ чашкѣ воды. 3) Въ *чисто хроническихъ, длительныхъ болѣзняхъ*, я даю обыкновенно нѣсколько (по большей части 2, 3) приёмовъ, въ промежуткѣ отъ 1 до 4 дней, по 3 крупинки въ сухомъ видѣ на языкъ, или же растворяю ихъ въ водѣ и даю ежедневно на тощакъ, въ продолженіе 4 — 8 дней, по чайной ложкѣ этого раствора, и затѣмъ выжидаю дѣйствія лекарства, смотря по обстоятельствамъ, до 8 — 14 дней, а при явномъ улучшеніи — до 3—4—5 недѣль.

§ 22. Крупинокъ я предпочитаю каплямъ спиртной настойки, такъ какъ винный спиртъ часто оказываетъ слишкомъ сильное вліяніе на нервы. По той же причинѣ я никогда не подбавляю виннаго спирта въ водные растворы крупинокъ съ цѣлью сохраненія лекарства, а чтобы послѣднее не портилось, я даю его или въ сухомъ видѣ, или возобновляю растворъ ежедневно.

§ 23. Равнымъ образомъ я всегда даю растворъ лекарствъ *чайными, но не столовыми* ложками; если лекарство выбрано вѣрно

то и малѣйшій приёмъ его долженъ подѣйствовать благотворно, въ противномъ же случаѣ усиленный приёмъ лекарства можетъ повредить.

§ 24. Многіе практики видятъ большой успѣхъ отъ *попере-
мннаго употребленія* двухъ средствъ, одинаково подходящихъ къ подлежащему случаю, напр. Merc. и Bell. въ воспаленіяхъ гѣла, Вгу. и Rhuz въ тифозныхъ горячкахъ и пр.. Если второе изъ употребляемыхъ такимъ образомъ средствъ давать не прежде окончанія дѣйствія перваго, въ которому переходить также тогда только, какъ второе уже не приноситъ замѣтнаго облегченія, то подобное перемежное употребленіе лекарствъ вполне рационально. Не существуетъ другой способъ попеременнаго употребленія двухъ лекарствъ, гдѣ врачъ, не выжидая надлежащихъ образомъ дѣйствія каждаго изъ этихъ средствъ, назначаетъ ихъ одно за другимъ въ очень короткихъ промежуткахъ, напр. посуточно, или, въ тяжкихъ случаяхъ, отъ 1 до 3-хъ часовъ, а въ хроническихъ промежуткѣ 4—8 дней. Хотя и этотъ способъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, *можетъ* принести пользу, однакожъ мы отнюдь не рѣшався *советовать* его начинающему.

§ 25. Тоже должно сказать и объ *одновременномъ употребленіи* двухъ средствъ, изъ которыхъ каждое обнижаетъ только часть симптомовъ, принадлежащихъ данному случаю. Всякій практикъ, для собственнаго поученія, конечно, можетъ производить подобныя опыты; но дѣлать изъ нихъ правила, какъ желали нѣкоторые авторитеты нашей школы, значитъ идти наперекоръ наукѣ, по законамъ которой нецѣлостность соединенія напр. Bell. и Merc. вполне очевидна и едва ли нуждается въ доказательствахъ. Чистая наука предписываетъ, что во всѣхъ случаяхъ должно приимать *только одно* средство, возможно болѣе соответствующее случаю, и дѣйствіе этого средства должно быть прервано другимъ не прежде того, какъ сдѣлается яснымъ, что отъ дальнѣйшаго дѣйствія перваго нельзя уже болѣе ожидать цѣлебной силы. Только опытный практикъ, во

отнюдь не начинающій, может иногда нарушать основныя правила науки.

§ 26. Правило для начинающихъ касательно *простоты, единичности* выбора лекарства *примѣнимо* вполне и относительно *величины* и *повторенія* его *пріемовъ*. Во избѣжаніе запутанности, начинающій во всѣхъ случаяхъ долженъ держаться *малѣйшихъ* *пріемовъ* (1—2 сухія крупинки на языкъ, 3—6 въ водѣ, по чайной ложкѣ) и *среднихъ* (12—15—30) дѣленій, повторять же *пріемы* не прежде прекращенія дѣйствія перваго, причѣмъ обязанъ постоянно помнить, что *всякое излеченіе обусловлено не прямымъ дѣйствіемъ лекарства, но только вызываемымъ имъ противо-дѣйствіемъ со стороны цѣлебной силы природы*. Вотъ нѣсколько заключительныхъ выводовъ изъ этого закона:

1) Во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ, лучше назначать малый *пріемъ* среднего разведенія, чѣмъ сильный *пріемъ* цѣльной настойки или самаго высокаго дѣленія.

2) Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ не представляется ясновыраженнаго показанія къ замѣнѣ употребленнаго средства другимъ, или къ повторенію назначеннаго, это обстоятельство уже само по себѣ служитъ вѣрнѣйшимъ указаніемъ для врача, что ему всего рациональнѣе оставаться въ бездѣйствіи и спокойно ожидать, пока обнаружится показаніе для употребленія того или другаго средства.

3) Когда, послѣ примѣненія какого-либо средства, болѣзнь не ожесточается, врачъ точно также, до появленія новыхъ показаній, долженъ ограничиться выжиданіемъ.

4) Пока цѣлебная сила природы, во примѣненіи какого-либо средства, благоприятно противо-дѣйствуетъ болѣзни, врачъ ничего не долженъ предпринимать, такъ какъ все, что онъ предпринялъ бы въ подобныхъ случаяхъ, будетъ болѣе или менѣе препятствовать этому цѣлебному дѣйствію природы и, слѣдовательно, ухудшать, а не улучшать дѣло.

5) Всего опаснѣе нетерпѣніе врача и слишкомъ частая перемѣна лекарствъ. Въ хроническихъ болѣзняхъ, спокойный и наблюдательный врачъ успѣетъ съ 2-мя или 3-мя средствами, употребивъ каждое въ одноѣмъ приемѣ и въ значительномъ промежуткѣ времени, несравненно болѣе другаго, готоваго мѣнять средства ежечасно или посуточно.

6) Ясновыраженное и продолжительное улудшеніе всегда предпочтительнѣе невѣрной надежды на сомнительное ускореніе леченія путемъ преждевременнаго повторенія приема употребленнаго средства, или выбора новаго.

7) Наконецъ встрѣчаются даже случаи, гдѣ выгоднѣе предоставить болѣзнь силамъ природы и собственному теченію, чѣмъ безпрерывно подвергать больного дѣйствію слишкомъ большихъ или часто повторяемыхъ приемовъ неподходящаго средства.

8) Вообще начинающій долженъ помнить первое и главное правило: *чѣмъ съ меньшими средствами и болѣе рѣдкими приемами онъ достигнетъ своей цѣли, тѣмъ лучше, потому что въ такомъ случаѣ излеченіе достигается не лекарствомъ, но силами природы.*



Асон.—**Aconitum napellus, Воронецъ** *).—Истинное противувоспалительное средство нашей школы. Заслуживаетъ особеннаго вниманія, когда въ острыхъ или хроническихъ, воспалительныхъ или безляхорадочныхъ болѣзняхъ являются: *колючая или постоянная боль, ограничивающаяся самымъ малымъ пространствомъ; болѣзненная чувствительность тѣла, особенно пораженной части, при дотрогиваніи; невыносимая страданія, доводящая больного до неистовства и отчаянія; сильное возбужденіе нервной и кровяной системъ, или большая слабость и припадки обморока; сухой, жгучій жаръ въ кожѣ и опухшихъ частяхъ; жгучая, довольно красная воспалительная сыпь; общій сухой жаръ, съ жаждою, короткимъ дыханіемъ, полнымъ, твердымъ и скорымъ пульсомъ, краснотой въ лицѣ и шеехъ, когда больной желаетъ раскрыться, но при малѣйшемъ раскрытіи чувствуетъ дрожь, или когда онъ чувствуетъ жаръ и дрожь попеременно; большая тоска, упадокъ духа и плаксивость; ожиданіе и страхъ смерти; чуткое, углубленное настроеніе духа; животномагнитическое предчувствіе; ночной бредъ частые припадки головокруженія съ обморокомъ при вставаніи или съ потемнѣніемъ въ глазахъ; чувство какъ бы подниманія и опусканія мозга; приливъ крови къ голове, съ внутреннимъ жаромъ и краснотой лица; тошнота и тяжесть въ мозгу; бьющая головная боль, или давленіе въ мозгу, лишаящее больного самосознанія; чувство боли въ теменн, какъ-будто рвутъ за волосы; воспаление глазъ съ болью; твердая, красная припухлость вѣкъ, и свѣтобоязнь; расширеніе зрачка; сильная воспримчивость слуха и обонанія; кровотеченіе изъ носу; одутое, очень красное лице, или блѣдное при вставаніи; сухія, растрескавшіяся губы; потъ на той части лица, на которой больной лежитъ; сухость рта; воспаление*

*) Волѣе подробное изложеніе припадковъ этого и всѣхъ другихъ лекарствъ см. «Гомеопатическая Фармакологія», сост. Дерикоръ, изд. Флемминга. Спб. 1868.

рта и зѣва, съ покальваніемъ, жженіемъ и темною краснотой; отвращеніе отъ пищи, или *жстучая, неутолимая жажда*; *жоркій вкусъ* во рту, сообщающійся всякому кушанью и напѣтку, даже водѣ; рвота слязью, кровью, глѣстами; чувство давленія подъ ложечкою, какъ бы отъ камня также въ подреберьяхъ и въ сторонѣ печени; *вздутый*, какъ бы вѣтрами наполненный *жмотъ*; *большая чувствительность жмота при допириваніи*; *недостаточное и жидкое испражненіе на нмъ съ натугою*; *моча красная, пунцовая, оменная, рѣдкая*, или совершенное задержаніе ея; *обильная режум*; *короткое, скорое и тоскливое дыханіе*, особенно при стоячемъ положеніи и во время сна; *припадки задущенія и трудное дыханіе*, какъ отъ одышки; *короткій и сухой кашель*, съ изверженіемъ кровавой слязи, или чистой крови; *колоте въ груди*, особенно въ боковой части, при дыханіи, кашлѣ и движеніи; *сердцебиеніе и тоскливое чувство въ груди*.

Агаг. — *Agaricus muscarius*, **Мухоморъ.** — Съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ употребляется: при конвульсіяхъ и дрожаніи членовъ, припадкахъ падучей болѣзни, слабости и усталости послѣ сонтія, просовидной снѣи, холодныхъ нарывахъ, боли въ нижней части бедра, также при боляхъ лица и зубовъ. Впрочемъ, относительно опредѣленія образа дѣйствія этого средства, до-сихъ-поръ ничего нельзя сказать утвердительно.

Агн. — *Agnus castus*, **Прутнякъ.** — Средство малозслѣдованное. До-сихъ-поръ его съ пользою употребляли: при *половомъ безилии*; *застарѣлой юморрети*, особенно когда при этомъ бываетъ незначительная половая похоть; также при безилидіи; *задержанномъ млѣсичномъ очищеніи*; недостаткѣ молока у роженицы; нарывахъ въ полости рта и деснахъ; при опуханіи и *отвердѣніи селезенки*, при водянкѣ живота, поврежденіяхъ и ссадинахъ въ заднемъ проходѣ; опуханіи и *отвердѣніи семяныхъ железъ*; при бѣляхъ; вывихахъ; артритическихъ отложеніяхъ въ суставахъ; остромъ ревматизмѣ въ сочлененіяхъ, съ припуханіемъ ихъ.

Алоѣ, Сабуръ. — Оказывается очень полезнымъ въ случаяхъ, гдѣ существуютъ: *желтуха*; *застарѣлая, инлиостная, даже воспаленная язва*; *костоѣда*; *отеки*; *ожом.* — Приливъ крови къ головѣ, особенно вслѣдствіе застою въ воротной венѣ; бьющая головная боль. Гноетеченіе изъ глазъ; патна и др. страданія рого-

вним. Нарывы губъ и десенъ; цинготное пораженіе и кровоточивость рта. Судороги желудка; трудность пищеваренія у флегматическихъ особъ; рвота при запорѣ на низъ; кровавая рвота. Опухоль и отвердѣніе селезенки; боли въ печени; желчные камни; опухоль и отвердѣніе брыжеечныхъ железъ; (брюшная водянка); кишечная бугорчатка. Повось съ рвзью; бѣловатосѣрмя испражненія; запоръ вслѣдствіе атоніи кишекъ; недостаточное отдѣленіе желчи; кровавый поносъ; скрившійся геморрой; скопленіе слизи въ кишкахъ; глисты. Болѣзненность въ заднемъ проходѣ и половыхъ частяхъ. Боли матки; превращеніе регулъ; бѣли; безплодіе. Приливъ крови къ груди; стѣсненіе въ груди. Зобъ.

Alum. — **Alumina**, Глиновомъ. — Средство, довольно сходное съ *calc.*, *merc.* и *sil.*, а также съ *sham.* и *ign.* Можетъ быть съ пользою употреблено, если въ данномъ случаѣ встрѣчаемъ слѣдующіе признаки: чувство *сжатія въ различныхъ органахъ*; чувство увеличенія различныхъ частей; чувство *нарыванія въ слизистыхъ оболочкахъ*; возобновленіе и ожесточеніе страданій послѣ обѣда; большая слабость при хожденіи и разговорѣ; признаки судорожнаго смѣха; сыпь и зудъ въ кожѣ по вечерамъ; *мокрые лишай и струпа на головѣ*; возобновленіе *накожныхъ болѣзней* при новолуніи и полнолуніи; трещины въ кожѣ; тоскливыя и страшныя сновидѣнія; ознобъ и дрожь, особенно по вечерамъ; *печальное расположеніе духа, съ плачемъ, стонами и мрачнымъ видомъ лица*; тупость и неспособность къ умственнымъ занятіямъ; колючая, бьющая или *сжимающая боль въ затылкѣ*, съ позывами на рвоту; сильный зудъ при слушиваніи кожицы на волосистой части головы; *обильное отдѣленіе слизи со слезами изъ глазъ во время дня и накопленіе гноя ночью*, при двойномъ косоглазїи; красныя и горячія уши по вечерамъ; гнойное истеченіе изъ ушей; *обильное отдѣленіе слизи изъ носу, съ изъязвленными, источивыми ноздрями* и краснота носа; отдѣленіе желтозеленой, густой, гноевидной массы изъ носу; слабое, недостаточное обонаніе; *большая склонность къ сморканію*; чувство тяжести и напряженіе кожи въ лицѣ, какъ бы отъ высыхавія на ней личнаго бѣлка; *свербящая сыпь, кровавые нарывы и мокрые лишай на лицѣ*; *зубная боль, особенно при жеванїи, съ чувствомъ шаткости или удлиненія зубовъ*; припуханіе, кровотеченіе и нагноеніе въ

деснахъ; увеличенное количество слюны, съ постояннымъ отдѣленіемъ слюны во рту и въ горль; затрудненное глотаніе, какъ бы отъ паралича глотки, или какъ бы отъ судорожнаго сжатія мышцепріемнаго канала; неправильный аппетитъ, то сильный голодъ, то совершенное отсутствіе аппетита; вредныя послѣдствія отъ употребленія картофеля; большое расположеніе къ кислой отрыжкѣ и изгагѣ; колики въ животѣ съ рвзью, уменьшающіяся отъ приложенія теплой фланели къ животу; сильное давленіе и пульсація въ брюшномъ кольцѣ; трудное испражненіе на низъ, какъ бы отъ недѣятельности кишечнаго канала; слизистый поносъ; зудъ въ заднемъ проходѣ и кровотеченіе изъ геморроидальныхъ шишекъ; боль въ почкахъ; обильная, блѣдная моча; увеличенное половое побужденіе, съ частыми полюціями и любострастными сновидѣніями; малоколичественное, блѣдное мѣсячное очищеніе; слявистыя, ѣдкія язвы, производящія бѣли; короткий, сухой кашель съ затрудненіемъ дыханія, частая осиплость, особенно по вечерамъ; одышка и удушье, какъ бы отъ стягиванія груди; сердцебиеніе съ неправильными ударами.

Амб.—Ambrga grisea, Сѣрый янтарь, сѣрая амбра.—
Характеристическое дѣйствіе этого средства еще мало извѣстно. Оно особенно оказывается полезнымъ при слѣдующихъ явленіяхъ: сжимающая боль въ мышцахъ и разрывающая въ сочлененіяхъ; боль при вывихахъ, легко появляющееся онѣмѣніе ногъ, когда одна лежитъ на другой; большая усталость, особенно по утрамъ въ постели, и слабость при разговорѣ; нечувствительность и онѣмѣніе въ кожѣ туловища; свербезъ и жженіе какъ бы въ чесоткѣ; жгучіе лишай; появленіе скрывшейся чесотки и лишаяевъ; сухость кожи; безпокойные сны, съ видѣніями и грезами; ознобъ въ нѣкоторыхъ частяхъ, за которыми слѣдуетъ жаръ въ лицѣ, обильный ночной потъ; сильное безпокойство и нервная раздражительность; непріятная тоска съ отчаяніемъ и отвращеніемъ къ жизни; нерасположеніе къ смѣху и къ разговору; ненаходчивость въ обществѣ; большая слабость головы и неспособность къ мышленію, съ ошнбомъ въ головѣ и головокруженіемъ; сильные припадки головокруженія; давящій напоръ крови къ головѣ, особенно при слушаніи музыки; подергиванія въ головѣ и теменѣ, съ блѣдностію лица и холодными руками; выпаденіе волосъ и боль при дотрогиваніи къ нимъ; чувство давленія въ глазахъ, какъ бы

отъ сильнаго сматія нхъ; шумъ, звонъ и свистъ въ ушахъ, съ глухотою на одно ухо; залеганіе носа и чиханіе; *асимметрично-болѣзненный цвѣтъ лица*, или частый летучій жаръ и красныя пятна на щекахъ; судороги и подергиванія ноздрей и губъ; боль въ пустыхъ зубахъ съ кровотеченіемъ изъ нихъ; зловоніе изо рта; болѣзненность подъязычныхъ железъ; ссадины и свербежъ въ горлѣ, съ усиленнымъ отдѣленіемъ слизи; изгара и отрыжка чистая, безъ запаха, или кислая; чувство какъ бы сматія въ животѣ, съ тяжестью въ позвоночномъ столбѣ, какъ отъ вывиха; чувство холода по всему тѣлу или въ одной какой-либо части; не регулярное испраженіе нивомъ; мутная моча съ темноватымъ осадкомъ и красноватымъ облачкомъ; вловонная кислая моча; жженіе въ сѣменныхъ пузырькахъ; сильное сладострастіе во внутреннихъ половыхъ органахъ; частыя эрекціи; обонрѣлость, боль, припуханіе и зудъ на дѣтородныхъ губахъ; густыя бѣли, съ отдѣленіемъ синевато-бѣлой слизи; охриплость и осиплость въ горлѣ, съ накопленіемъ густой вязкой слизи; судорожный кашель, съ отрыжкою и осиплостью; ночной кашель отъ щекотанія въ горлѣ; очень соленая мокрота при кашлѣ; сердцебіеніе, съ чувствомъ давленія въ груди, отрывистое дыханіе и блѣдность лица.

Аmm. — *Ammonium carbonicum*, **Углекислый амміакъ.** — Средство очень сходное съ *bell.* и *lach.*, умѣстно въ болѣзняхъ женщинъ, молодыхъ людей и дѣтей, и особенно оказывается успѣшнымъ, если представляются: *лвесенная* или колюція и раздрающія боли, уменьшающіяся въ постельной теплотѣ; *боль въ сочлененіяхъ, какъ бы отъ вывиха*, или чувство растягиванія, какъ бы отъ сокращенія мышцъ; страданія болѣе правой, нежели лѣвой стороны тѣла, особенно вечеромъ и на открытомъ воздухѣ; *большая чувствительность къ холодному и сырому воздуху*, съ значительнымъ отъ того страданіемъ; слабость въ членахъ, усталость и изнеможеніе, особенно послѣ разговора; жгучая сыпь; красная, гнойная опухоль, *просоидная сыпь и скарлатинная краснота* кожи; веснушки, наросты на костяхъ, обонрѣлость нѣкоторыхъ частей; сонливость во время дня, причемъ больной не скоро засыпаетъ; сонъ безпокоющъ, съ страшными видѣніями смерти и труновъ; *оснобы* по вечерамъ; печальное, мрачное и плаксивое расположеніе духа и тоска, какъ бы послѣ совершенія преступленія; *взволнованный*

духъ и тягость жизни; большая забывчивость, разсѣянность, причежъ у больного часто встрѣчаются описки, ошибки въ счетахъ и словахъ; головокруженіе по утрамъ, особенно при чтеніи; боль головы съ тошнотою; *чувство полноты и сильнаго давленія во лбу, причежъ черепъ какъ-будто лопается*; стужъ, колюще въ головѣ, чувство рыхлости мозга; ощущеніе холода или жженія въ глазахъ и свѣтобоязнь; сильное теченіе слезъ и накопленіе ночью гноя въ глазахъ; тупость слуха съ зудомъ и нагноеніемъ въ ушахъ, кровотеченіе изъ носу, насморкъ и истеченіе жгучей водянистой жидкости; *блѣдность и страдальческій видъ лица*; гнойныя сны, кровяныя нарывы; сыпь на лицѣ, сопровождаемая зудомъ и опухолью шейныхъ железъ; лишайная сыпь около рта; трещины на губахъ и гноеточивыя язвы у угловъ рта; *язвенная боль въ кормлѣ зубовъ, или чувство колюща, растягиванія и дерганія въ зубахъ, съ особенностями при жеваніи*; боли эти чаще встрѣчаются у женщинъ во время регулъ; рыхлость и выпаденіе зубовъ; пузырьки, язвенная боль и нарывы во рту и на языкѣ; обильное отдѣленіе слюны и водянистой жидкости изъ рта; больной жалуется, что у него чешется и саднить въ горлѣ, или какъ бы колъ стоитъ; сильная жажда, не дающая больному ѣсть, пока не напьется; слабое пищевареніе и большой позывъ на сахаръ; изгага и кислая отрыжка; чувство давленія въ желудкѣ съ тошнотою, особенно послѣ принятія пищи; чувство холода или жженія въ желудкѣ; судорожное стягиваніе въ животѣ, съ тошнотою и истеченіемъ водянистой жидкости изъ рта; склонность къ запорамъ; запоръ съ твердымъ испраженіемъ на низъ; зудъ и кровоточивыя геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; непроизвольное испусканіе мочи въ постели; осадокъ песку въ мочѣ; постоянныя эрекціи; частыя полющія и чувство давленія въ яичкахъ; опухоль, зудъ и жженіе въ женскихъ дѣтородныхъ частяхъ; острая, темная, черная кровь мѣсячныхъ очищеній; слишкомъ раннія, или слишкомъ обильныя мѣсячныя очищенія, сопровождаемыя зубною болью, зудомъ въ крестцѣ и животѣ; сильная охриплость и потеря голоса; *сухой ночной кашель, какъ бы отъ вливи или щекотанія перомъ въ горлѣ*; тяжесть въ груди, какъ бы отъ прилива крови; одышка съ сердцебіеніемъ и большою трудностію при восхожденіи на лѣстницу; весьма затрудненное дыханіе. — Кромѣ сказанныхъ случаевъ, *атт.*, употребляютъ еще при слѣдующихъ явленіяхъ: ломота въ костяхъ черепа; боли отъ

прилива къ головѣ; продолжительный насморкъ; ячмень на вѣкахъ; близорукость; воспаление околоушныхъ железъ; лишай на лицѣ; гноеточивость слизистой оболочки носа; цыготное состояніе десенъ; хроническая слабость пищеваренія; спазмы живота; кровавая рвота; боли печени, геморроидальные припадки; боли въ яичкахъ; болязненные мѣсячныя очищенія; безплодіе; *принадки* *удушья*; грудная водянка; венозные узлы; подагра; боли при вывихахъ; конвульсіи; воспаление горла или другія мѣстныя воспаления; страданія волокушныя и рахитическія; краснуха; *скарлатина*; лишай; нервическая горячка и т. д.

Амм.-т.—**Ammonium muriaticum**, Солянокислый амміакъ. — Дѣйствіе этого средства еще мало опредѣлено, но во всякомъ случаѣ оно можетъ быть полезнымъ при слѣдующихъ явленіяхъ: *язвенная боль*; чувство натяженія какъ бы отъ сокращенія сухихъ жилъ; *дерманіе въ членахъ, особенно въ пальцахъ руки и ноги съ бьющею болью, какъ при нарываніи*; волненіе крови и тоска; сыпь, похожая на красуху; узловатые пузыри, возбуждающіе чувство жженія и зуда, и переходящіе послѣ въ струпья; меланхолія и тоска, съ склонностію къ плачу; чувство полноты въ головѣ; жженіе въ глазахъ, особенно въ сумерки, исчезающее при свѣтѣ; летающія пятна и искры передъ глазами; насморкъ, съ зловоніемъ и отдѣленіемъ густой, желтой слизи; сильно блѣдное лице; свербящая сыпь и лишай на лицѣ; трещины и гнойные пузыри на губахъ; нарывы въ углахъ рта; чувство біенія въ миндалевидныхъ железахъ; сильная жажда, жестокая икота; чувство жженія, поднимающееся отъ желудка къ горлу; колюще въ сторонѣ селезенки, особенно утромъ, съ затрудненнымъ дыханіемъ; *припухлость лобковой части, гдѣ при дотрогиваніи ощущается нарвная боль*; запоръ съ испраженіемъ твердаго, на видъ бараньяго кала; боль какъ отъ нарыва въ заднемъ проходѣ и кровотеченія изъ него; слишкомъ раннія регулы съ болью въ животѣ и крестцѣ; бѣлыя слизистыя, кофейнаго или бѣловатаго цвѣта; сильный сухой кашель; одышка, особенно при сильномъ движеніи рукъ, при нагибаніи туловища и т. п.

Апас. — **Anacardium orientale**, Анакардъ, слоновая вошь. — Явленія, требующія особенно употребленія этого средства, суть: давленіе въ горлѣ, какъ-будто стоитъ кусокъ;

землящее дерганіе, появленіе страданій во время обѣда; усталость, чрезвычайная слабость; трясеніе членовъ, особенно послѣ небольшихъ прогулокъ пѣшкомъ; параличи; большая чувствительность къ холодному и сквозному вѣтру и большая склонность къ простудѣ; нечувствительность кожи къ внѣшнимъ возбуждающимъ влияніямъ; несприятныя сновидѣнія, — огонь, отвратительныя болѣзни и мертвыя тѣла; *тлостное, истондрическое расположеніе духа, трусливость* и страхъ несчастія или опасности; недостатокъ моральныхъ чувствъ, жестокость и безчеловѣчность; смѣхъ при серьезномъ, а серьезность при смѣшномъ; обманчивая фантазія и большая склонность къ глубокимъ изслѣдованіямъ; слабость памяти и разсудка съ чувствомъ, какъ бы разбивается голова при малѣйшемъ размышленіи; глухота и недостатокъ обонанія; очень блѣдный цвѣтъ лица; воспаленіе и синевою окруженные глаза; жесткая, какъ бы лишаими покрытая кожа около рта; зловоніе изо-рта и вонючій вкусъ; трудное пищевареніе и слабость желудка, жаръ въ лицѣ, истондрическое расположеніе и сонливость послѣ обѣда; сильно возбужденная половая похоть, съ обильнымъ отдѣленіемъ простатическаго сока; припадки сильного кашля, какъ бы при коклюшѣ, особенно ночью, съ приливами крови къ головѣ.

Ang. — **Angustura, Ангустура,** — заслуживаетъ особеннаго вниманія въ *больныхъ судорожныхъ*; въ столбнякѣ, происшедшемъ отъ ранъ; столбнякѣ, сопровождаемомъ синевою щекъ и губъ и т. п. Также въ *костоподѣ* и болящихъ надкостныхъ нарывахъ.

Ant. — **Antimonium crudum, Сурьма.** — Припадки, требующіе употребленія этого средства, суть: страданія, усиливающіяся преимущественно въ теплотѣ, также отъ солнечнаго жару и послѣ обѣда; значительная тучность или исхуданіе водяныя опухоли; *мнойныя пузырьки, какъ въ ложной ости; желваки и пузыри, какъ отъ укушенія настьками;* кофейнаго цвѣта пятна и точки на кожѣ; роговидныя наросты красныя, горячія опухоли; большая сонливость и спячка; ночной и утренній потъ, перемежающійся черезъ день; любовныя, меланхолическія, печальныя мечты, съ возвышенною чувствительностію и желаніемъ застрѣлиться; боль головы послѣ купанья, съ болью въ членахъ; воспалительная краснота глазъ и вѣкъ; изъязвленныя трещины на носдрахъ и у угловъ рта; гнойная смѣль, съ желтыми струями на

ищахъ и на подбородкѣ; веснушки на лицѣ; боль въ дуплистыхъ зубахъ и кровотеченіе изъ нихъ; обильное отдѣленіе слюны; соленая слюна; сильная жажда; потеря аппетита и опрыжка прилитою пищею, отвращеніе отъ пищи, тошнота и рвота слизью и желчью; чувство давленія въ животѣ отъ переполненія; продолжительные спазмы въ желудкѣ; жеваніе подъ ложечкою, доводящее больного до отчаянія и заставляющее его искать смерти; сильное пученіе живота, особенно послѣ обѣда; твердое испраженіе низомъ, съ напругою; истеченіе бѣло-желтоватой слизи изъ задняго прохода; частая, обильная моча, съ большимъ слизистымъ осадкомъ; красные мочевые кристаллы; возбужденная половая похоть съ частыми эрекціями и поллюціями; охриплость и потеря голоса, особенно въ теплотѣ, признаки сильнаго удушья; кашель съ жженіемъ въ груди, какъ бы отъ огня.

Арс. — *Apis mellifera*, Пчелиный ядъ. — Превосходное средство во многихъ болѣзняхъ *дѣтей и женщинъ*, именно при скрывшихся сыняхъ (скарлатинѣ, кори и въ особенности крапивницѣ); затѣмъ при *рожѣ* почти всѣхъ видовъ, особенно развивающейся вокругъ ранъ и пр. Кроме того, средство это часто оказывается полезнымъ при слѣдующихъ болѣзненныхъ состояніяхъ:

Раненія, особенно колющими инструментами; отеки; лишай, ломотныя отложенія. Истерическія судороги. Манія различнаго рода, особенно у пожилыхъ женщинъ. *Головная водянка у дѣтей* (почти специфическое средство); апopleсія у стариковъ; нервныя головныя боли желчнаго или желудочнаго происхожденія; мигрень вслѣдствіе пораженія узловатыхъ нервовъ. *Воспаленіе* отъ, особенно ревматическаго и ломотнаго свойства; воспаленіе радужной оболочки и роговины; *потускненія, пятна и рубцы на роговицѣ*; *стабильная* (почти специфическое); отекъ глазнаго яблока; *слезные сумки*; ячмень. *Рвота*, особенно одной стороны лица, съ блѣдною краснотой; невралгіи губъ, языка и десневъ. Опуханіе, воспаленіе, гноеніе и ракъ языка; воспаленіе въ полости рта и зѣва; рожевидное пораженіе глотки; *моксиперепончатая жаба* (*Diphtheritis*). Судороги желудка; воспаленіе грудной перегородки, селезенки, кишекъ, *брюшная водянка*. Хроническій поносъ, преимущественно у желчныхъ особъ, или расположенныхъ къ рожистымъ воспаленіямъ; *эморроидальная страданія*. *Страданія мочевого ор-*

занозь, въ особенности задержаніе мочи, воспаленіе мочевого пузыря, отложеніе бѣлѣз и сахара въ мочѣ; хроническій переломъ. *Болезни яичниковъ*, въ особенности *воспаленіе*, боля, гипертрофія, завалы и *водянка*; гипертрофія и водянка матки; *болезненная речумь*; опухоль и невралгія наружныхъ женскихъ половыхъ частей; *опасность выкидыша*; *маточныя кровотеченія*; *истерическія страданія*; ракъ груди (по крайней мѣрѣ уменьшаетъ боли). Воспаленіе грудной плевы; грудная водянка; воспаленіе и водянка сердца. *Ноттогда. Подозра. Ломота въ колынь* (также вслѣдствіе перелома).

Arg.-n. — Argentum nitricum, Азотнокислое серебро, Адокій камень. — Значительная слабость съ дрожаніемъ членовъ; приступы падучей болѣзни; параличи половинны тѣла; *ртутныя страданія*; сифилисъ; чесоточновидная сыпь; *бородавки*. Собачье бѣшенство. *Боли въ правой сторонѣ головы*. Прищи, пятна и нарывы роговинны; хроническое воспаленіе глазъ; ночная слѣпота. Страданія слизистой оболочки носа. Нервное раздраженіе лица. Лишай губъ и прыщатаго свойства короста лица. Зубная боль при жеваніи и отъ холоднаго; молочница; воспаленіе зѣва съ колючими болями и значительнымъ скопленіемъ слизи. Слабость пищеваженія, сопровождаемая пустою отрыжкой; ночныя судороги желудка; свинцовая колыка; суженіе мочеиспускательнаго канала? Кровавое мочеиспусканіе. Шанкровидная язва на половыхъ частяхъ. Горловая чахотка; судорожное сжатіе горла и удушье. Ломота въ бедрахъ.

Arg. — Argis, Баранинъ. — Показанъ при слѣдующихъ принадлегахъ: подергиванія, колючій зудъ или боль какъ бы отъ ушиба въ страждущихъ частяхъ, съ чувствомъ какъ бы части эти лопаются; ожесточеніе боли при разговорѣ, сморканіи, движеніи, даже при издаваніи какихъ-либо звуковъ; *безпокойство отъ боли, заставляющее больного безпрестанно перемѣнять мѣсто, кричать всякое положеніе кажется ему неудобнымъ*; возвышенная болѣзненная чувствительность всего тѣла, особенно кожи и суставовъ при движеніи; летучія боли въ суставахъ; безпокойство, съ дрожаніемъ тѣла, волненіемъ крови и біеніемъ въ артеріяхъ; слабость и усталость, заставляющая больного оставаться въ постели; незначительные нарывы въ большомъ количествѣ; *красная, лоснящаяся,*

журчячя опухами; спячка; страшныя сновидѣнія, крикъ и вскакиваніе отъ испуга; *голодь или чувство прожлады въ нижнихъ конечностяхъ одновременно съ жаромъ въ верхнихъ*; ознобъ большею частію по вечерамъ и послѣ сна; ночной лихорадочный жаръ, съ жаждою; инхондрическая тоска и слишкомъ чувствительное настроеніе духа, сварливость, упорство; головокруженіе при ходженіи и стояніи; *сжиманіе въ передней части головы и чувство, какъ-будто мотъ сжался въ комокъ, или подергиванія, съ колотьемъ и зудомъ въ головѣ*; плотное прикрѣпленіе и неподвижность кожи на головѣ; боль краенъ вѣкъ, какъ бы отъ нарыванія, съ чувствомъ сухости и боли при движеніи ихъ, кровотеченіе изъ носу, вналое блѣдно-землистаго цвѣта лице; твердая, красная, блестящая опухоль на одной щекѣ; зудъ въ лицѣ, носѣ, кожѣ головы, зубахъ и деснахъ; жженіе и трещины на губахъ, язвочки у угловъ рта; боль и шатанье зубовъ; гнилой запахъ изъ рта; языкъ обложенъ слизью; горькій или гнилой вкусъ во рту, отвращеніе отъ пищи, особенно отъ мясной; позывъ на укусъ; частая, пустая, горькая или гнилая отрыжка; частая тошнота и тщетный позывъ на рвоту; рвота свернувшейся кровью; чувство давленія и полноты въ желудкѣ, причемъ сердце какъ-будто сдавливается; колотье въ селезенкѣ, препятствующее дыханію при ходженіи; вѣтры съ коликою; вѣтры съ запахомъ гнилыхъ яицъ; частое, но незначительное испражненіе на низъ слизью; невольное испражненіе во время сна; тщетный позывъ на выведеніе мочи; кофейнаго цвѣта моча, съ коричневатимъ осадкомъ; воспалительная опухоль яичекъ и семянаго канатика; сильное половое возбужденіе съ частыми эрекціями и поллюціями; кашель ночью во время сна или послѣ плача; трудное отхаркиванье мокроты; кашель, съ изверженіемъ ярко-красной, или въ видѣ черныхъ кусковъ крови; колотье въ груди, особенно при кашлѣ и движеніи; зловонное, короткое и прерывистое дыханіе и одышка, съ чувствомъ стягиванія въ груди; колотье въ боку, груди и сторонѣ сердца, съ припадками обморока; рвущее біеніе сердца.

Arg.—Arsenicum album, Мышьякъ.— Полезенъ въ слѣдующихъ припадкахъ: чувство *раздиранія и растягиванія въ членахъ, невозможность лежать на больной сторонѣ*, причемъ боли уменьшаются при движеніи страдающей части; боли, пробуждающія больного предъ полуночью и такія сильныя, что доводятъ

его до отчаянія и бѣшенства; *жгучія боли*; періодическое появленіе припадковъ болѣзни; *уменьшеніе боли* при хожденіи и съ тепломъ; появленіе побочныхъ страданій; *чрезвычайный, быстрый упадокъ силъ, доводящій болымо до изнеможенія*; истощеніе и изнуреніе; *трясаніе членовъ отъ слабости*; *холодная, сухая, похожая на перьяментъ, или синяя кожа*; *жгучія сыпи и плоскія язвы, источающія сукровицу*; *лѣнь, сонливость, неохота къ движенію и постоянное желаніе оставаться въ постели*; *постоянное вскакиваніе и чувство подериванія при засыпаніи и во время сна*; *тягостныя, страшныя сновидѣнія*; *общій холодъ наружныхъ частей, съ холоднымъ клейкимъ потомъ*; *ночной жаръ съ жженіемъ въ жилахъ, какъ-будто по нимъ пробѣгаетъ горячая вода*; *перемежающаяся пульсація*; *потъ при концѣ михорадки, или въ началѣ сна*; *религіозная печаль и меланхолія*; *необыкновенная сердечная тоска и томленіе, особенно ночью*; *страхъ смерти*; *желаніе говорить о недостаткахъ другихъ и дѣлать упреки*; *бьющая боль въ головѣ, особенно надъ корнемъ носа*; *опухоль головы*; *гнойныя струпи на волосистой части головы*; *тусклыя матовыя или отеки глаза*; *сильный насморкъ съ теченіемъ ѣдкой, водянистой жидкости*; *желтизна непрозрачной роговой оболочки глаза*; *лицо блѣдное, опалое, мертвое, землистаго цвѣта*; *глаза опалые съ синими вокругъ полосами и заостренный носъ*; *опухоль въ лицѣ, особенно надъ глазами*; *цвѣтъ лица, какъ въ желтухѣ*; *припухшія, черноватыя губы съ трещинами и язвами*; *судорожное скрежетаніе зубовъ*; *синеватый, черноватый, дрожащій языкъ, покрытый трещинами*; *повывъ на воду, постоянная сильная жажда, которая утоляется нѣсколькими каплями*; *тошнота, заставляющая ложиться*; *сильная рвота кровавыми или черными веществами*; *рвота примятою пицею или сейчасъ послѣ питья*; *ожженіе въ желудкѣ*; *большая тоска и болезненная чувствительность подъ лоскочкою*; *давящія судороги желудка, какъ бы отдавливающія сердце въ сторону*; *жестокая колика судорожнаго или рѣжущаго свойства, съ тоскою, жалобами, безнокойствомъ и отчаяніемъ*; *сильныя воднистыя поносы съ натуюю и рѣзью въ животѣ*; *жгучія геморроидальныя пишки*; *преждевременныя и обильныя мѣсячныя очищенія*; *ѣдкия бѣлы, производящія ссадины и изъявленія*; *кашель послѣ питья, или во время прогулки на открытомъ воздухѣ*; *сильная одышка и затрудненіе дыханія*; *ночныя припадки удушья.*

Аза. — *Aza foetida*, **Вонючая намедь.** — Средство это еще мало испытано. Оно оказалось полезнымъ при *брюшныхъ боляхъ*, *простирающихся изнутри кнаружи*; также при *комочкахъ и разрывающихся боляхъ*, *изменяющихся при дотроиваніи* и сопровождаемыхъ ощущеніемъ тупости; при появленіи припадковъ въ сидячемъ положеніи и исчезаніи ихъ при движеніи на воздухъ; при темно-красныхъ горячихъ опухоляхъ, язвахъ, простирающихся до костей и отдѣляющихъ сукровичный, вонючій, жидкій гной.

Азаг. — *Azagum europsium*, **Европейскій копытень.** — До сихъ поръ съ пользою его употребляли противъ: ломоты въ головѣ, воспаления глазъ, желчныхъ и *гастрическихъ припадковъ*, глистной болѣзни, поноса несваренною пищею.

Ауг. — *Augum foliatum*, **Листовое золото.** — Назначеніе этого средства показано при слѣдующихъ явленіяхъ: болѣзненное чувство разлома, большею частію въ суставахъ, особенно при покойномъ положеніи, и усиливающееся утромъ, въ постели; боли какъ отъ разлома; частое волненіе крови; возвышенная раздражительность всѣхъ внѣшнихъ чувствъ и большая чувствительность къ боли; ползаніе мурашекъ въ различныхъ частяхъ тѣла; безпокойный сонъ съ тягостными, страшными видѣніями и бредомъ; зябкость и большая чувствительность къ холодному воздуху, *плаксивость, ремниазная меланхолія, сильная сердечная тоска, желаніе смерти и покушеніе на самоубійство*; особенное желаніе ссориться; злоба, причемъ малѣйшее противорѣчіе возбуждаетъ сильный гнѣвъ и безпокойство; *примесь крови къ слювамъ, стукъ и шумъ въ слювахъ*; болѣзненное чувство разлома въ головѣ, которое при малѣйшемъ умственномъ занятіи доводитъ больного до умопомраченія; способность видѣть половины предметовъ; черныя пятна, искры и пламя предъ глазами; шумъ въ ушахъ; *темныя красно-коричневые пятна на носу, ноздри, покрытыя язвами, трещинами и струпами съ опухолью носа*; опуханіе щекъ и губъ съ чувствомъ натягиванія и разрыванія въ самихъ костяхъ; нарвы десенъ, съ опухолью щекъ; зловонный гнилой запахъ изо рта; страданіе и колики отъ вѣтровъ; наклонность существующихъ грыжъ въ новому выходженію; мутная моча; сильно возбужденная половая похоть съ обильными ночными поллюціями и эрекціями; опухоль яичекъ и чувство боли въ нихъ, какъ бы отъ ушиба; силь-

ная ночная одышка и удушье какъ бы отъ стягиванія груди; тягостное сердцебіеніе и приливъ крови къ груди; дрожаніе сердца при хожденіи, съ чувствомъ, какъ-будто оно отдѣлилось.

Var.—*Varuta carbonica*, **Углекислый баритъ.** — Преимущественно полезенъ при большемъ или меньшемъ стеченіи слѣдующихъ симптомовъ: чувство натяженія и разрыванія въ членахъ, напряженіе, какъ-будто они сдѣлались короче; большая чувствительность къ холоду и склонность къ простудѣ; значительная слабость и невозможность поддерживать тяжесть собственного тѣла; постоянное желаніе сидѣть или лежать; *общая слабость тѣла, нервовъ, чувствъ и умственныхъ способностей*; возвышенная воспріимчивость всѣхъ чувствъ; болѣзненная кожа, легко покрывающаяся нарывами; опухоль и затвердѣніе железъ; большая сонливость днемъ и спячка; *болѣзнь, нервозность и людобоязнь*; большая забывчивость и разсѣянность; *боль влодомъ, надъ глазами или въ задней части, ближе къ затылку*; напряженіе кожи черепа и выпаденіе волосъ; сыпь на ушахъ и позади ихъ; опухоль и чувство опуханія въ лицѣ; чувство, какъ-будто кожа лица обтянута паянкою; нижняя губа покрыта ссадинами или трещинами; *опухоль верхней губы и подчелюстныхъ железъ*; дерганіе въ зубахъ, отрывающееся въ ушахъ и вискахъ; блѣдно-красноватая опухоль десенъ; воспаленіе горла и миндалевидныхъ железъ, съ переходомъ въ нагноеніе; колюще и давленіе въ горлѣ, какъ бы отъ присутствія посторонняго тѣла или опухоли; жгучіе пузыри и трещины на языкѣ; постоянная жажда; боль въ желудкѣ и подъ ложечкою и чувство, какъ бы проглоченная пища проходитъ по изъязвленнымъ мѣстамъ; жидкія испраженія съ чувствомъ давящей боли въ поясницѣ; незначительное половое побужденіе и слабость половой способности; малоколичественныя и кратковременныя мѣсячныя очищенія; охрилость и потеря голоса; чувство стука и біенія въ спинѣ.

Bell.—*Belladonna*, **Сонная одурь.** — Соответствующіе этому средству припадки слѣдующіе: колюція и жгучія боли съ опухолью страдающихъ частей; жестокія судороги, возобновляющіяся иногда отъ досады, или отъ прикосновенія къ страдающей части; частые обмороки; возвышенная чувствительность всей нервной системы; *примѣтъ крови къ страдающей части, съ чувствомъ*

помоты въ ней; ожесточенія страданій при движеніи и дотрогиваніи до больной части; красная, блестящая опухоль пораженной части; *глубокій, истерическій сонъ*, или бессонница съ сильнымъ, но тщетнымъ желаніемъ заснуть; *жгучій жаръ*, перемежающійся ознобомъ; мѣстный холодъ съ жаромъ въ головѣ; *большая тоска и безпокойство*, или возвышенная воспримчивость всѣхъ чувствъ; упрямство, плачь и рыданіе; *неистовый бредъ*; потеря самосознанія, причежь больной узнаеть своихъ только по слуху; *сильныя боли во лбу*, или жгучее колотье подъ глазами; боль головы съ сильною пульсаціею сонныхъ артерій, головокруженіемъ и шумомъ въ ухахъ; выпученные, красные, блестящіе глаза, или выалые, тусклые, матовые; очень *расширенныя* или суженныя зрачки; стеклянный, дикій взоръ; воспалительная краснота глазъ съ чувствомъ давленія въ орбитахъ, жаромъ, свѣтобоязнію, истеченіемъ острыхъ жгучихъ слезъ; куриная слѣвота; *вздутое, красное и юрлчее лице*, или же выалое и блѣдное; шумъ въ ухахъ; кровотеченіе изъ рта и носа; подергиванія мышцъ лица; язвы на углахъ рта; *судороги и стягиваніе въ горлѣ*, съ труднымъ глотаніемъ; *сильная жажда*, часто съ *отвращеніемъ отъ жидкостей*; сухость и краснота во рту и зѣвѣ, иногда же обложеніе этихъ полостей; страданіе отъ вѣтровъ, причежь ободочная кишка сильно выдвѣтся наружу, въ видѣ опухоли; боли живота съ чувствомъ судорожнаго стягиванія, запоръ или поносъ слизью; непроизвольное испраженіе; чувство давленія въ женскихъ дѣтородныхъ частяхъ, какъ-будто все вываливается наружу; чувствительность живота при дотрогиваніи, какъ-будто онъ покрытъ язвами; болѣзненная чувствительность глотки съ опасностію задушенія при ошупываніи; короткий судорожный кашель, съ колотьемъ въ животѣ и груди; боль въ затылкѣ и шеѣ при поворачиваніи головы.

Вепъ. — *Вепкоіа acidum*, **Росоноладанная кислота.** — Средство еще малоизслѣдованное, но заслуживающее вниманія при слѣдующихъ симптомахъ: Страданія пожилыхъ женщинъ и дѣтей. Зудящіе лишай на спинѣ и рукахъ. Ревматическія опухоли суставовъ, съ чувствомъ холода и параличными болями; болѣзненные язвы. Пятна роговины, кровоизліяніе въ глазу; воспалительная припухлость вѣкъ. Ракъ лица. *Воспаленіе языка*; опухоль на языкѣ, производящая жествость, красноту, раздраженіе

и сухость въ этомъ органѣ; нарывъ во рту, въ послѣднихъ коренныхъ зубохъ; *симеватость языка*. *Кислоты желудка*, кислая рвота и отрыжка; сильная жажда. *Воспаленіе мочевого пузыря*; *сильно пахучая, темная моча*, съ увеличеннымъ специфическимъ вѣсомъ, жгучая и разъѣдающая; *перелой*, если припадки моче-выхъ органовъ соотвѣтствуютъ лекарству. Лишай на половыхъ частяхъ; воспаленіе матки. Зобъ; ревматизмъ суставовъ. Мочевые камни. Ночное недержание мочи у дѣтей. Ревматическія страданія сердца.

Воракъ. — *Vorax veneta*, Бура. — До-сихъ-поръ съ успѣхомъ употреблялась въ воспаленіи полости рта и въ дѣтской молочницѣ; она также оказывается полевною тамъ, гдѣ *Слат.*, *merc.*, *ign.*, *bell.* и *puls.* остались безъ успѣха; не менѣе того она оказываетъ пользу въ слѣдующихъ припадкахъ: *расположеніе къ простудѣ и заболѣванію* отъ ѣзды или отъ употребленія плодовъ; болѣзненная чувствительность кожи, причемъ всякое поврежденіе ея трудно излечивается; рожистыя воспаленія, лишай; *млюстанный сомъ со вскрикиваніемъ*; опасеніе и страхъ заразиться; пугливость и капризность, особенно у дѣтей; боль головы съ тошнотою, доводящею до рвоты, съ дрожаніемъ членовъ; скленваніе и спутываніе волосъ, какъ при колтунѣ; воспаленіе краевъ вѣкъ; слезотеченіе днемъ и скленваніе вѣкъ ночью; опухоль и воспаленіе ушей, съ истеченіемъ гноя; болящія, покрытыя стру-пьями и нарывами носдри, съ припухlostію кончика носа; обильное отдѣленіе зеленой, густой слизи изъ носу; рожа лица; опухоль щекъ съ жаромъ и жестокими болями при смѣхѣ; парша и лишайныя пятна на верхней губѣ; чувство дерганія въ пустыхъ зубахъ и ломкость ихъ; припухшія кровоточивыя десны; молочница и нарывы во рту и на языкѣ; большое количество слизи въ горлѣ; слабое пищевареніе и поносъ послѣ принятія пищи; рвота слизью; чувство давленія въ сторонѣ селезенки, особенно при ѣздѣ или движеніи; *обильное отдѣленіе смлзы изъ задняго прахода во время испражненія или посылъ*, съ болями въ поясницѣ; поносы желтою слизью; зеленое испражненіе у грудныхъ дѣтей; *вомячая съ острымъ запахомъ моча*; большая воспримчивость къ зачатію; чувство сильного натяженія въ подреберныхъ мышцахъ; сильныя боли въ вѣрстѣ.

Вромш. — Вромшш, Вромъ. — Показанъ при слѣдующихъ явленіяхъ: Значительная слабость послѣ болѣй; желтизна кожи; гнилостныя, зеленыя, падалю пахнуція язвы; сонъ съ открытымъ ртомъ; легко появляющійся потъ при малѣйшемъ напряженіи; отвращеніе отъ своихъ занятій; бьющая головная боль послѣ питья молока; колющее воспаленіе глазъ; сухость соединительной оболочки; опухоль ушныхъ железъ; изъязвленіе ноздрей; перепончатое воспаление зѣва; боль глотки съ опухолью миндалинъ; страданія отъ кислотъ; опухоль селезенки (послѣ триппера); опухоль брызжечныхъ железъ; поносъ кашневидными, грязными веществами съ запахомъ падали; опухоль шунгъ послѣ триппера; прекращеніе регулъ; *воспаленіе кадыка и зортани съ вытотыіемъ*; хриплый кашель, какъ при крушѣ, съ чувствомъ задушенія, какъ бы отъ вдыханія сѣрныхъ испареній; чувство стѣсненія груди съ значительною слабостью (также послѣ кори); *трудность дыханія* съ катарральными страданіями; трепетаніе сердца съ тоскливымъ ощущеніемъ въ груди и зѣваніемъ; продолжительная хирагра съ смѣщеніемъ суставовъ; мозоли.

Вру. — Вруоніа alba, Переступень. — Назначеніе этого средства имѣеть мѣсто при слѣдующихъ явленіяхъ: чувство натяженія, напряженія и разрыванія въ страдающей части, причѣмъ *движеніе ея затрудняется*; во время покоя на ней выступает потъ, а по уменьшеніи боли начинается трясеніе; *чувство разлома въ частяхъ, или какъ будто мягкія части отрываются отъ костей*; большая нервная слабость, заставляющая больного оставаться въ постели; желтый цвѣтъ лица; *ослабленіе страданій при движеніи и дотроиваніи*, также *по утрамъ при пробужденіи* отъ сна, равно по вечерамъ и ночью; сыпь, похожія на красуху, напряженныя опухоли, горячія; красныя или блѣдныя; твердыя узловатыя опухоли на кожѣ; рожистое воспаленіе на сочлененіяхъ; бессонница, или тягостная спячка; ночныя волненія крови, съ жаромъ, мучительными сновидѣніями и бредомъ; *ознобъ и холодъ въ тѣлѣ*, часто сопровождаемые жаромъ и краснотой лица; *постоянный потъ днемъ и ночью*, иногда жирный, или же сухой жаръ съ сильною жаждою; тоска и безпокойство, излишняя забота о своемъ здоровьѣ и потеря надежды на выздоровленіе; *большая склонность къ оторченію, оснальчивости и инлеу*; возвышенная воспримчивость

всѣхъ внѣшнихъ чувствъ, особенно зрѣнія и слуха; приливъ крови къ головѣ, съ чувствомъ жара въ ней и сильною болью во лбу; боль головы съ тошнотою, рвотою, ожесточающаяся при малѣйшемъ движеніи, даже при поворотѣ глазъ; очень жирный волосъ на головѣ; красное, вздутое лице, или желтое, землистое, иногда съ кругообразной краснотою щекъ; сухія губы, покрытыя трещинами; сухость рта и языка; зловоніе изо-рта; неприятный или гнилой вкусъ во рту, или горькій вкусъ принимаемой пищи; позывъ на вино, кислое, или кофе; *рвота нищемою*, или желчью; болѣзненное чувство давленія въ желудкѣ и подъ ложечкою; болѣзненная чувствительность печени; *упорный запоръ на мизъ*, или поносъ по ночамъ и утрамъ, съ испраженіемъ веществъ желтаго цвѣта; гнилые поносы; малоколичественная, кофейнаго цвѣта моча; насморкъ съ сухостию и залеганіемъ въ носу; *сухой кашель* съ судорожнымъ потрясеніемъ тѣла, или рвотою; кашель съ изверженіемъ спекшейся крови; боль головы при кашлѣ, какъ-будто черепъ лопается; *колотье въ груди, особенно въ боковыхъ ея частяхъ, усиливающееся при кашлѣ, дыханіи и движеніи*; *глубокое дыханіе со вздохами*, или же короткое и трудное.

Calo.—*Calcaea carbonica*, Углекислая известь. —

Составляетъ одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ при страданіяхъ кожи, железъ и костей, особенно когда эти страданія сопровождаются измѣненіемъ вещества костей; оказалась также полезною при слѣдующихъ симптомахъ: слабость и атрофія частей; увеличенный объемъ головы удѣтей и замедленіе способности ходить; чувство *потыжванія некоторыхъ частей*, особенно въ пальцахъ руки или ноги; раздрающее чувство и колотье въ членахъ, особенно по ночамъ, также лѣтомъ и при переиѣнѣ погоды; *онемнѣніе и омертвѣніе некоторыхъ частей*; *повтореніе и ожесточеніе припадковъ послѣ мытья или работъ на водѣ*, а также всеромъ, ночью, утромъ или черезъ день; большая нервная слабость и желаніе подвергнуться дѣйствию магнитическаго сна; сильное расположеніе къ простудѣ и чувствительность къ холодному, свѣжему воздуху; сильное исхуданіе, или чрезмѣрная тучность; скорая усталость послѣ хожденія или тѣлеснаго напряженія; блѣдная, жесткая кожа, множество бородавокъ; мокрая струпистая; сыпь и лишай; трещины въ кожѣ, обожрѣлости и вонючія язвы; бессонница вслѣдствіе напора мыслей и фантастическихъ видѣній; летучій жаръ;

обильное отдѣленіе пота при хожденіи, движеніи или же ночью; частый ознобъ; меланхолическая угрюмость и плавсивость; *тоска и страхъ*, особенно въ сумерки; сильныя приливы крови къ головѣ; сыпь на головѣ, парша и выпаденіе волосъ; значительное расширеніе зрачка; кровавистое выпотѣніе изъ глазъ; воспаленіе носа, съ опухолью и краснотой на концѣ; *блѣдное, худощавое, старческое лице*; мокрая сыпь на лицѣ; опухоль подчелюстныхъ и шейныхъ железъ; постоянная жажда, съ потерей аппетита; увеличенный объемъ живота, съ опухолью брыжеечныхъ железъ; часто повторяющееся чувство голода; продолжительное отвращеніе отъ мяса; сильный похвѣвъ на вино и сласти; продолжительный запоръ или поносъ; сильное изнеможеніе и усталость отъ неумѣреннаго удовольствія полового побужденія; рановременныя и обильныя регулы; кашель съ изверженіемъ желтой, вонючей, гнойной матеріи; продолжительная осиплость.

Camph. — **Camphora, Камфора.** — До-сихъ-поръ ее съ успѣхомъ употребляли противъ: азіатской *холеры*, гриппа, эпилептическихъ припадковъ; тифовныхъ лихорадокъ, водянныхъ болѣзней, слѣдствій солнечнаго жара и т. п. Оказалась также полезною при слѣдующихъ припадкахъ: появленіе страданій при движеніи и ночью; равно въ болѣзняхъ у людей, невнимательныхъ къ своему недугу; ожесточеніе страданій на холодъ и свѣжемъ воздухѣ; чувство сухости въ гортани; упадокъ силъ до чрезвычайной слабости; *столбнякъ и коноульсим* со рвотою и потерей самосознанія; блѣдная, поблекшая, морщинистая кожа; глубокая спячка съ храпѣніемъ; *общій холодъ въ тѣлѣ, съ мертвою блѣдностію лица*, синеватою кожей и холоднымъ потомъ; сильная тоска и слабая дѣятельность всѣхъ внѣшнихъ чувствъ; жженіе во рту, глоткѣ и желудкѣ; *сильный ступоренный жаръ*, при холодѣ наружныхъ частей; недостатокъ полового побужденія и вялость дѣтородныхъ частей; тяжелое, медленное дыханіе, съ припадками удушья; сильное накопленіе слизи въ дыхательныхъ путяхъ, затрудняющее дыханіе.

Caup. — **Cauparia, Конопля.** — Средство еще мало испытанное; его употребляли съ успѣхомъ противъ: истерическихъ припадковъ; страданій отъ усталости и тѣлеснаго напряженія, сьумашествія и другихъ душевныхъ болѣзней; золотушнаго воспаления глазъ; *страха блѣма*; *потемнившій и пятна роговой оболочки*; гастрическихъ и желчныхъ припадковъ; спазмъ въ желудкѣ; ва-

твердой печени; судорожной колики; мѣшчатой брюшной водянки; продолжительных запоровъ; воспаленій почекъ и мочевого пузыря; кровавой мочи и другихъ болезней мочевыхъ органовъ; камней мочевого пузыря; острой перелом; бѣлей; безплодія; выкидыша; катарральныхъ страданій; воспаления плевры; астматическихъ припадковъ; болезней сердца и т. п.

Canth.—**Cantharis**, Шпанская мушка.— Назначается при слѣдующихъ припадкахъ: сильное колотье и раздраженіе, протирающееся снаружи и внутри, жгучія, язвенная боли съ слизистыхъ оболочкахъ; преобладающее страданіе правой стороны тѣла; исхуданіе и слабость, заставляющія больного постоянно лежать; уменьшеніе страданій въ лежачемъ положеніи; конвульсивное мотаніе членовъ, съ отчаяннымъ крикомъ; столбнякъ; оцѣвшеніе спинныхъ мышцъ и сжатіе челюстей; сухая, жгучая кожа; сильный холодъ и ознобъ, или же жгучая лихорадка съ жаромъ; большое безпокойство и сильная тоска, заставляющія больного безпрестанно перемѣнять свое мѣсто; припадки съумасшествія и бѣшенства, съ конвульсіями; возобновленіе этихъ припадковъ при видѣ воды, или при прикосновеніи къ ней; болезненный, страдальческій видъ больного; мертвое, впалое, гипсовратическое лице; сильная блѣдность, желтый землистый цвѣтъ лица; истеченіе пѣнистой слюны; пузырьки на деснахъ и языкѣ; затрудненное мотаніе, особенно жидкостей; жгучая жажда, съ отвращеніемъ отъ пищи; рвота нищею или кровью, сопровождаемая припадками задушенія; вапоръ, твердое испраженіе, или обильные поносы кровавистою слизью; сильная боли съ шипѣн мочевого пузыря; прекращенное отдѣленіе мочи, съ отсутствіемъ всякаго позыва на мочеиспусканіе; или сильный позывъ къ мочеиспусканію, но моча при этомъ отдѣляется по каплямъ; сильное половое побужденіе, доходящее до бѣшенства; воспаленіе и омертвленіе дѣтородныхъ частей; сильный катарръ, съ отдѣленіемъ клейкой слизи изъ носу; чувство слабости въ груди и слабая, боязливая рѣчь.

Sars.—**Sarsisum apium**, Стручковый перецъ.— Опыты доказали пользу этого средства въ слѣдующихъ симптомахъ: боль, какъ при вывихѣ, и негибкость какъ бы парализованной разбитыхъ частей, особенно при началѣ движенія; сильная лень, тяжесть и какое-то отвращеніе къ движенію; преобладающая зѣбкость и холодъ тѣла; большая чувствительность къ холодному воздуху

и сквозному вѣтру; дрожь и холодъ всякій разъ послѣ питья; раздражительность характера, причѣмъ больной все принимаетъ въ дурную сторону и ницѣтъ случая кого-либо оклеветать; слабость умственныхъ способностей, пораженныхъ какъ бы параличемъ съ чувствомъ пустоты въ головѣ; попеременная блѣдность и краснота щекъ; сливистыя испраженія низомъ съ натугою.

Carb. an. — **Carbo animalis**, **Животный уголь.** — Средство это было употребляемо противъ снаемъ желудка, затвердѣній железъ, кровотеченій изъ матки, артритическихъ желваковъ, и т. п. — Трудно указать на рѣзкое характеристическое различіе этого средства отъ *carb.-v.* По крайней мѣрѣ и не нашелъ еще между этими двумя средствами надлежащаго различія, почему предоставляю читателямъ составить себѣ идею объ нихъ, сравнивъ ихъ между собою въ первой части моего «Руководства къ фармакологіи».

Carb. veg. — **Carbo vegetabilis**, **Уголь растительный.** — Средство это назначается тамъ, гдѣ болѣзненное состояніе выражается нѣкоторыми изъ слѣдующихъ явленій: *Боли, сопряженныя съ жаромъ, тоскою и безнадежностію; чувство растягиванія и раздиранія ревматическаго свойства, съ коликою отъ присутствія вѣтровъ и затрудненіемъ дыханія; жучія боли, особенно въ членахъ и костяхъ; припадки внезапной слабости, доводящей до обморока и паралича; слабость съ трясеніемъ членовъ и изнуреніе, какъ послѣ тяжелыхъ болѣзней; мелкозернистая, پوشжія на просовидную, сыни; легко кровоточивые нарывы, вонючіе, жгучіе, отдѣляющіе сукровичный гной; большая сонливость днемъ; ночной сонъ, прерываемый тоскою и безпокойствомъ; зябкость и холодъ, съ приступами летучаго жара; исчезающій пульсъ; большая наклонность къ поту; отчаяніе, доводящее больного до плача и желанія застрѣлится; безпокойство, наводящее дрожь и тоска со страхомъ привидѣній; раздражительная вспыльчивость и пугливость; чувство пустоты въ головѣ и затрудненное мышленіе; сильный приливъ крови къ головѣ, со стукомъ; болѣзненная чувствительность кожи на холодъ, даже при дотроиваніи къ волосамъ; чувство раздиранія въ костяхъ и покровахъ головы; красный, покрытый паршею конецъ носа; блѣдный, стро-желтый цвѣтъ лица; угри на лицѣ; шатаніе зубовъ; потрескавшіяся, кровоточивыя*

Десны; соленый вкус принимаемой пищи и вообще соленый вкус во рту; *чрезмѣрная слабость пищеваженія* и тяжесть послѣ обѣда; отвращеніе отъ мяса и жира, и дурныя послѣдствія при употребленіи послѣдняго; спазмы желудка, какъ-будто отдавливающія сердце въ сторону; очень чувствительныя къ сжиманію платьемъ подреберныя части; *сильное страданіе отъ размыкающихся отворотъ*; запоръ, зависящій какъ бы отъ недѣятельности кишекъ; *обильное отдѣленіе слизи во время и послѣ испраженія на низъ*; красная, темная моча; *мною сладострастными мыслями и частыми поллюціями*; слишкомъ рановременныя и сильныя регулы, или же очень слабыя и блѣдныя; частая осиплость; особенно по утрамъ и вечерамъ; кашель при малѣйшей простудѣ; *кашель съ обильнымъ изверженіемъ* обыкновенной, или зеленой гноевидной слизи; язвенная боль, какъ бы отъ трещинъ, и жженіе въ груди.

Caust. — **Causticum**, **Каустикумъ**. — Назначенія этого средства требуютъ преимущественно слѣдующіе признаки: чувство дерганія, колотья и растягиванія въ суставахъ и костяхъ, уменьшающееся въ теплѣ; чувство оттягиванія нѣкоторыхъ частей въ сторону, или онѣмѣніе и омертвѣніе ихъ; стагиваніе сгибающихся мышцъ; ожесточеніе страданій послѣ употребленія кофе, а также по вечерамъ и на вольномъ воздухѣ; большая чувствительность къ холоду, свѣжему воздуху и сквозному вѣтру; невѣрная походка у дѣтей, легко подвергающая ихъ паденію; сильное волненіе крови и безпокойство въ теплѣ; параличная слабость, съ трясеніемъ членовъ, доходящая до обморока; *параличъ*, особенно органовъ рѣчи и глотанія; *сыти, похожія на чесотку*; колючій зудъ съ жженіемъ и краснота послѣ чесанія; жженіе во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только дотрогиваются; множество *бородавокъ* и варикозныхъ узловъ; большая сонливость, подходящая къ спячѣ; большая *зябкость* и *обильный потъ*, особенно по ночамъ, или при движеніи на открытомъ воздухѣ; уныніе и печальныя мысли; большая тоска и боязливость; сварливость, обидчивость и вспыльчивость; большія бородавки на лицѣ, носу и вѣкахъ, наошленіе гноя въ глазахъ по ночамъ, темныя тлани и искры предъ глазами; теченіе изъ ушей; залеганіе носа и постоянный насморкъ; *желтое, страдальческое лице* съ желтоватыми висками и блѣдносивеватыми губами; цынготное состояніе десенъ и шатаніе зубовъ; затруднительное

глотаніе, отъ чувства стягиванія въ горлѣ; отвращеніе отъ сладкаго, давленіе въ желудкѣ, даже отъ употребленія хлѣба; склонность въ пустой открыжѣ и тягость, если она не появляется; раздутый животъ у дѣтей; продолжительный валоръ; тщетный позывъ на испраженіе, съ судорожнымъ стягиваніемъ задняго прохода, причемъ испражняемый калъ бываетъ очень тонокъ; *непроизвольное мочеиспусканіе*, особенно при кашлѣ, чиханіи и хожденіи; страданія во время мѣсячныхъ очищеній; судороги матки; бѣли; продолжительная осиплость и слабый голосъ, зависящій какъ бы отъ расслабленія мышцъ гортани; чувство садненія въ груди и гортани, особенно при кашлѣ; судорожное удушье, какъ-будто шея и грудь сдавливаются платьемъ; колотье въ сторонѣ сердца; опухоли шейныхъ железъ, похожія на зобъ.

Сер., — Allium сера, Лукъ рѣпчатый. — Показанъ въ особенности при слѣдующихъ состояніяхъ и симптомахъ: *ревматическія боли; ухудшеніе болями отъ теплоты комнаты. Вредная послѣдствія влажнаго холода* (при западномъ и сѣверозападномъ вѣтрахъ); расстройство желудка отъ сырыхъ овощей; страданія отъ промоканія ногъ; страданія у дѣтей, въ особенности катаррального, гастрическаго свойства, или отъ глистовъ. Ревматизмъ суставовъ; обморожа; сонливость; непріятныя послѣдствія опьяненія. Угри и пятна на кожѣ; корь, крапивница, бородавки, моволи; наривы, опухоль железъ, карбункулъ; *ушибы, осы, укушенія ядовитыми животными.* Перемежающаяся и эндемическая лихорадка. Катарральная боль головы; слезотеченіе изъ глазъ; катарральное воспаленіе глазъ; подтеки, пятна и язвы роговины. Катарральное страданіе ушей, съ тугостью слуха и шумомъ въ ушахъ. *Текущій насморкъ водянистою, ѣдкою слизью, сопровождаемый слезотеченіемъ, головною болью и ухудшающійся въ теплой комнатѣ.* Скорбутное пораженіе десенъ. Катарральное страданіе глотки; опухоль миндалянь; язвы въ глоткѣ. *Страданія желудка и кишокъ, особенно у дѣтей, а также и у пьяницъ; страданія отъ глиствъ; брюшная водянка. Утренній и ночной поносы; геморрой; трещины въ заднемъ проходѣ. Катарръ мочеваго пузыря; почечная колика; мочевые камни; слабость и судорожное сокращеніе шейки мочеваго пузыря; чрезмѣрное отдѣленіе мочи. Слишкомъ продолжительныя потуги; бѣлая опухоль роженецъ. Окрилость; катарръ бронховъ; одышка.*

Cham.—*Chamomilla*, Ромашка. — Слѣдующіе припадки требуютъ преимущественно назначенія этого средства: параличное состояніе и онѣмѣніе страдающихъ частей, съ постояннымъ желаніемъ привести ихъ въ движеніе и облегченіе такого состоянія въ теплѣ; бьющія боли, какъ при опухоли, *возвышенная восприимчивость всякъ чувствуетъ, причежъ всякая боль дѣлается непереносимой*; большая чувствительность къ воздуху и сквозному вѣтру; обморочная слабость; слабость, наступающая въ началѣ припадковъ боли и столь сильная, что больной падаетъ; судорожное подергиваніе губъ, мышцъ лица, глазъ и вѣкъ; подергиванія при засыпаніи; *бользненная кожа*; сны, похожіа на красуху; болящія нарывы съ жженіемъ и зудомъ по ночамъ; желтый цвѣтъ кожи; безпокойный ночной сонъ; больной вскакиваетъ, визжать и мечется; бессонница вслѣдствіе тоски и фантастическихъ видѣній; дремота съ грезами въ видѣ отуманенія; сильная *дрожь* съ внутреннимъ жаромъ; *лихорадочный жаръ съ краснотою щеки, торчкомъ потомъ на лбу, знобитъ и даже между волосами*; сильная *сердечная тоска до такой степени, что больной выходитъ изъ себя, стонетъ и мечется*; эпохондрическая раздражительность, чувствительность и сварливость; своевольное рыданіе дѣтей, когда имъ въ чемъ-либо отказываютъ; разсѣянность, невнимательность, задумчивость; приливъ крови къ головѣ, съ чувствомъ стука въ ней; *краснота и жаръ въ лицѣ, особенно въ одной щекѣ*; изморщенная кожа надъ носомъ; частое измѣненіе цвѣта лица; гнилой запахъ изъ рта, особенно послѣ ѣды; невозможность глотать твердую пищу; красный, покрытый трещинами языкъ; гнилой вкусъ во рту, рвота желчью или кислымъ; *сильное давленіе въ желудкѣ, какъ-будто сердце смѣщается*; вздутость подреберій, задерживающая дыханіе; поносы зелеными испраженіями, похожими на рубленныя яйца.

Chel.—*Chelidonium majus*, Чистотѣль. — Еще мало извѣстенъ въ практикѣ, однакожъ его съ пользою употребляли противъ: *недостатка теплоты, парши на голову, потемнѣній роговой оболочки глаза, миазма въ лицѣ, вредныхъ послѣдствій употребленія молока.*

Chin.—*China, Cinchona officinalis*, Китайская кора. — Назначается при слѣдующихъ припадкахъ: чувство подергиванія

и разрыванія, ожесточающееся при дотроиваніи и сопряженное съ параличною слабостью страдающихъ частей; боли съ чувствомъ влеченія, особенно при началѣ ходьбы, перемежающіяся съ болями во внутреннихъ частяхъ; безпокойство въ страдающей части, заставляющее больнаго постоянно ее двигать или перемѣнять положеніе; нечувствительность и легкое онѣмѣніе въ членахъ; болѣзненное чувство разлома въ суставахъ, особенно при лежаніи въ положеніи, облегчающееся во время ходьбы; ожесточеніе бани, особенно при дотроиваніи, также послѣ обѣда и по ночамъ; возмущенная раздражимость всѣхъ внѣшнихъ чувствъ, съ болѣзненнымъ чувствомъ слабости; болѣзненная усталость въ суставахъ, съ чувствомъ давленія, какъ бы отъ какой-то тяжести; большая тяжесть въ членахъ и неохота къ занятіямъ; параличная слабость и бессміе, сопряженное съ трясеніемъ членовъ; чрезмѣрное извуреніе и искуданіе; желтизна кожи; опухоль идропическія, или твердая, красная, воспалительная; необыкновенная сонливость днемъ и безпокойный сонъ ночью, вслѣдствіе настроеннаго воображенія и напора мыслей; безпокойный, необлегчающій ночной сонъ, съ тягостными, мучительными видѣніями и бессознательнымъ пробужденіемъ; холодъ, ознобъ и дрожь; лихорадка съ жаждою, появляющаяся во время пота, а также до и послѣ озноба; ипохондрическое равнодушіе съ нерасположеніемъ къ разговору; презрѣніе ко всему, сварливость и особенное расположеніе клеветать на другихъ; напоръ множества идей и трудность привести ихъ въ надлежащій порядокъ; чувство давленія въ головѣ, появляющееся по ночамъ; болѣзненное чувство въ мозгу при умственныхъ занятіяхъ, мозгъ какъ - будто разбитъ; напоръ крови къ головѣ съ чувствомъ столь сильной боли, что больному кажется, будто черепъ у него лопается; болѣзненная чувствительность волосистой части головы при дотроиваніи; желтизна глазъ; звонъ въ ушахъ очень слабое зрѣніе; больной видитъ предметы какъ бы въ туманѣ; желтый, поблекшій, землистый или необыкновенно блѣдный цвѣтъ лица; истощенное лице съ впалыми глазами, окруженными синеватою, и заостренный носъ; гнилостный запахъ изо рта; особенно по утрамъ; накопленіе слюны или слюны во рту; травадной, или горькій вкусъ всякой пищи; слабость желудка и чувствительность послѣ обѣда; необыкновенный позывъ на сласти и вѣденье, что даг... желудкѣ и вздутость живота, особенно

послѣ ѣды; твердость и опухоль въ сторонѣ печени; частое отхожденіе вонючихъ вѣтровъ; поносы водянистою слизью или переваренными веществами; раздраженное половое побужденіе съ похотливостію; частые припадки удушья, особенно по ночамъ; большое накопленіе слизи въ горлѣ и груди; давленіе между лопатками, какъ отъ камня.

Cic.—*Cicuta virosa*, Омегъ. — Назначается, когда есть: сильное развитіе венозной системы; извѣнная боль, или чувство какъ бы послѣ толчка или удара; каталептические припадки столбняка; конвульси и корча членовъ; дрожаніе при всякомъ движеніи; гнойныя слывающіяся сыпи съ желтыми струпуями; зябкость, колющ и особенное желаніе грѣться у печки; страхъ будущности, необыкновенное изнеможеніе при печальныхъ разсказахъ; смѣшныя поступки, какъ бы отъ сьумасшества; потеря самосознанія и замороченія, причѣмъ глаза ста дають, взоръ пристально устремляется на одинъ предметъ; двоеніе и ошущеніе, какъ будто все передъ глазами чернѣетъ; гнойныя лишай на лицѣ, скатіе челюстей и скрежетаніе зубовъ; теченіе цѣны изо рта; затрудненная рѣчь и глотаніе; жгучіе наривы на краяхъ языка; необыкновенный напль на древесный уломъ; частая икота; рвота кровью; боли живота, какъ отъ глистовъ, съ конвульсіями; невольное моченспусканіе, какъ бы вслѣдствіе паралича мочевого пузыря; затрудненіе дыханія, какъ отъ раздавливанія груди.

Cin.—*Cina*, Цытварное сѣмя. — Трудно опредѣлить существенныя симптомы, служащіе показаніемъ къ употребленію его; но до-сихъ-поръ оно съ уснѣхомъ было употребляемо противъ: страданій вслѣдствіе потери соковъ, дѣтской сухотки; золотушнаго страданія, конвульсій, падучей болѣзни, эклампси и другихъ судорожныхъ припадковъ; перемежающихся мигоравокъ; воспаленій мозга; острой черепной водянки у дѣтей и другихъ болѣзней мозга; начинающейся темной воды и пятенъ роговой оболочки; гастрическихъ припадковъ; мстной болѣзни; непроизвольнаго моченспусканія съ постамъ; коклюша; расположенія къ онализму.

Cia.—*Ciatia*, Ладанникъ. — Средство это еще мало испытано; впрочемъ, съ пользою можетъ быть употребляемо противъ: опухлей железъ, переходящихъ въ нагноеніе, наривовъ и другихъ

золотушиныхъ страданій; цыщотнаго состава десама; чахотки днхательныхъ вѣтвей.

Clem.— *Clematis erecta*, Ломоносъ. — До сихъ поръ еще мало извѣстны характеристичекіе симптомы этого средства. Оно назначается противъ: страданій отъ злоупотребленія ртути; острою ревматизма суставовъ, причиненною переносомъ переломъ; грибовидныхъ наростовъ; парши на головѣ? хроническаго воспаления глазъ; опухоли и отверднній личекъ и жезель; артритическихъ отложеній въ видѣ желваковъ; рака груди, и т. п.

Soss.— *Sosculus*, Кожульванъ. — Назначается, когда существуютъ слѣдующія явленія: боль и разбитость членовъ при движеніи; болѣзненная негибкость суставовъ, съ трескомъ и скрипомъ въ нихъ; боли и страданія въ одной только половинѣ тѣла; ожесточеніе страданій отъ мытья, мыщ, куренія табуку, употребленія кофе, дотрогиванія, ѣды и разговора; большая чувствительность къ открытому, холодному и свѣжему воздуху; судороги и конвульсія при дотрогиваніи къ болящимъ мѣстамъ; эпилептическія судороги; дрожаніе членовъ; недостатокъ жизненныхъ силъ; необыкновенная слабость, доходящая до обморока или паралича; красныя пятна на кожѣ; холодныя опухоли жезель съ болѣзненнымъ колющемъ; блѣдная кожа; частая, сильная вѣвота; дремота; вздрагиваніе; ознобъ, часто съ жаромъ въ кожѣ; печальная задумчивость, тоска съ плачемъ и чувствительностію, причемъ пациентъ принимаетъ все въ дурную сторону; боль въ головѣ, происходящая какъ-будто отъ сжиманія ея, или какъ-будто глаза вырываютъ; чувство пустоты въ головѣ; краснота и жаръ въ лицѣ, особенно въ щекахъ, съ жженіемъ; большая сухость во рту; боль и жженіе въ пищепріемномъ каналѣ; затрудненное глотаніе, происходящее какъ бы отъ паралича пищепріемнаго канала; сильное отвращеніе отъ пищи и питья; тошнота, доходящая до обморока, особенно во время ѣды; спазмодическія боли въ желудкѣ, тотчасъ послѣ ѣды; вздутость живота и страданіе отъ вѣтровъ; большая склонность грыжъ къ новому выхожденію; остановка регуль, влекущая за собою многія страданія; затруднительное дыханіе, происходящее какъ бы отъ суженія и стягиванія груди и горла; болѣзненное овѣжвнне въ крестцѣ и спинѣ.

Coff.—*Coffea cruda*, Кофе. — Назначается, когда между прочими припадками встрѣчаются: возвышенная раздражительность всѣхъ внѣшнихъ чувствъ и всей нервной системы, съ возвышенною чувствительностію даже къ малѣйшей боли; усиленная дѣятельность пищева́риельныхъ и отдѣлительныхъ органовъ; необыкновенная подвижность мышечной системы; большая чувствительность и отвращеніе къ открытому воздуху; бессонница вслѣдствіе сильнаго возбужденія и живости душевной; сильная тоска, соединенная съ трясеніемъ членовъ; сильный приливъ крови къ головѣ; чувство разрыва́нiя мозга или боль, какъ отъ вколачиванія гвоздя; тонкій слухъ; живыя глаза съ вощреннымъ зрѣніемъ; непріятное чувство около подреберій отъ узкаго платья; раздраженное половое побужденіе.

Colch.—*Colchicum autumnale*, Осеникъ. — Назначается если оказываются: *рышца или камушца подериванія, проникающія до костей, съ онемѣніемъ или параличемъ страдающихъ частей*; ожесточеніе припадковъ особенно при напряженіи ума, по ночамъ и вечерамъ, причемъ они дѣлаются такъ невыносимы, что доводятъ больного до неистовства и отчаянія; разрывающая боль въ членахъ при теплой погодѣ и колотье при холодной; *большая чувствительность тѣла къ прикосновенію и движенію*; параличное безсиліе во всемъ тѣлѣ, особенно въ колѣнномъ суставѣ, въ которомъ ноги часто сами собою сгибаются; *зудъ какъ при ознобленіи*, особенно при переменахъ погоды; отекъ и гидрическія опухоли; ночной жаръ съ сильною жаждою; боль головы отъ умственныхъ занятій; сильное выпаданіе волосъ; течь изъ ушей съ чувствомъ разрыва́нiя въ нихъ; болѣзненно возвышенное обонаніе; лице покрыто желтыми пятнами; печальными, страдальческія черты лица; увеличенное отдѣленіе слюны; тошнота, даже при ощущеніи одного запаха жирнаго мяснаго супа; постоянное жженіе и чувство ледянаго холода въ желудкѣ; поносы съ испражненіемъ бѣлой слизи или перепончатыхъ веществъ, съ сильною натугою; запоръ съ тѣтениемъ, болѣзненнымъ позывомъ на низъ; коричневатая темная моча.

Coloc.—*Colocynthis*, Колоцинтъ. — Назначается, когда замѣчаются: *сводлициа боли во внутреннихъ и наружныхъ частяхъ, или тоническія судороги съ щемленіемъ и давленіемъ*; облегченіе страданій при движеніи, куреніи табаку и употребленіи кофе; судороги,

доходящія до сведенія всѣхъ членовъ; обморокъ, сопровождаемый холодомъ въ членахъ; слущиваніе кожицы; опухоль железъ, переходящія въ нагноеніе; мочевоі запахъ ночнаго пота; непріятный запахъ изо рта; боли головы съ тошнотой; блѣдное, вялое лице съ ввалившимися глазами; горькій вкусъ во рту и отъ пищи; *судорожныя, стѣсывающія боли въ животѣ*, какъ-будто кишки ущемлены камнями; *сопровождаемая поморозъ* тимпаническая вздутость живота; *поморозъ желчными испраженіями, появляющійся тотчасъ послѣ употребленія даже малаго количества пищи и питья*; жидкія испраженія слизью и кровью; вонючая моча, которая въ покоѣ дѣлается густою и студенистою; судорожная одышка, происходящая какъ-будто отъ сдавленія груди.

Соп.—*Conium maculatum*, Волжголовъ.—Слѣдующія явленія требуютъ его употребленія: щемленіе и судорожныя боли въ различныхъ частяхъ; появленіе боли въ покоѣ и во снахъ; слабость и усталость, обнаруживающіяся на свѣжестъ воздухѣ; частое волненіе крови съ безпокойствомъ въ тѣлѣ; нервныя припадки; боли, какъ послѣ толчка или удара; голубыя, желто-зеленыя пятна, какъ при кровяныхъ подтекахъ; опухоль и отвердѣніе железистыхъ органовъ; зудъ въ язвахъ и пораженныхъ мѣстахъ; вонючія язвы, отдѣляющія сукровицу; ипохондрическое настроеніе духа съ расположеніемъ къ плачу; боязнь людей и удивленія; скорое опьяненіе при употребленіи малѣйшаго количества спиртныхъ напитковъ; блѣдное или синева-то-вздутое лице; сильная свѣтобоязнь; язвы на губахъ; лишая на лицѣ; постоянное желаніе глотать, особенно во время хожденія при нѣтрѣ; сильный позывъ на кофе, кислое и соленое; судороги въ глоткѣ; большая слабость желудка, съ накопленіемъ въ немъ кислоты; тщетный позывъ на мочу и задержанное отдѣленіе ея; слабость половой способности; чрезмѣрныя поллюціи; болѣзненные регулы; судороги матки съ болями; остановившіяся регулы; бѣлыя, съ истеченіемъ острой слизи; судорожный кашель; припадки задушенія, какъ-будто что стоитъ въ горлѣ.

Сгос.—*Stocua sativus*, Шафранъ. — Употребленія его требуютъ слѣдующія явленія: чувство прыганья живаго существа въ страдающей части; скорое онемѣніе частей, особенно во снахъ, если больной лежитъ на нихъ; волненіе крови; *изверженіе слюной*,

черной крови; быстрые, противоположные переходы принадлежъ душевныхъ и тѣлесныхъ болѣзней; облегченіе страданій на воздухѣ; ожесточеніе ихъ по утрамъ; усталость съ склонностію къ обмороку; мѣста на кожѣ, покрытыя скарлатинною краснотой; большая сонливость днемъ и спячка; быстрые переходы отъ плача къ смѣху, отъ гнѣва къ смиренію, причемъ однакожъ кротость преобладаетъ; большое расположеніе къ шуткамъ и смѣху; ночныя судороги въѣкъ; неясное зрѣніе, причемъ больной часто моргаетъ; землистый, поблеклый цвѣтъ лица и жгучія, красныя пятна на лицѣ.

Сург. — *Суррум metallicum, Мѣдь.* — Слѣдующія явленія указываютъ на употребленіе этого средства: судороги, конвульсіи съ пронзительнымъ крикомъ, особенно начинающіяся съ пальцевъ ноги или руки; эпилептическіе припадки; группами появляющіеся болѣзненные припадки; необыкновенная тонкость и воспримчивость чувствъ; боли въ костяхъ, которыя кажутся какъ будто переломанными; спячка и глубокой сонъ съ подергиваніями; сыни, похожія на чесотку и проказу; тоска и страхъ смерти; робость и боязнь; припадки съумасшествія, выказывающіе гордость, страхъ или бѣшенство, сопровождаемые краснотой, воспалительнымъ состояніемъ глазъ и оканчивающіеся отдѣленіемъ пота; синій цвѣтъ лица и губъ; вахетическая блѣдность съ глубокими чертами на лицѣ, впавшими глазами, окруженными синевою; холодъ въ оконечности языка; сильная жажда съ сухостию въ горлѣ; припадки задушенія при рвотѣ и рвота, сопровождаемая спазмами и конвульсіями живота; жестокое давленіе подъ ложечкою и въ сторонѣ желудка; сильныя судороги въ животѣ; сильная оснплость, одышка и судорожныя припадки задушенія.

Daph. — *Daphne indica, Волчникъ.* — Средство это еще малоизвѣстно; его употребляли противъ артритическихъ и ревматическихъ страданій съ колотьемъ; болей въ костяхъ и наростовъ на нихъ; противъ ожесточенія припадковъ на свободномъ воздухѣ и при ущербѣ луны; противъ болей головы, съ чувствомъ полноты въ ней, причемъ черепъ какъ бы лопается, особенно при вставаніи съ постели; при слабости зрѣнія, причемъ глаза какъ будто пленкою закрыты; двоезрѣніе; запорѣ и твердомъ испражненіи низомъ; кашлѣ со рвотою и изверженіемъ нечистой слюны, смѣшанной съ кровавыми жлѣками.

Dig.—*Digitalis purpurea*, Напероточная трава.—Характеристическіе симптомы, требующіе употребленія этого средства, еще мало извѣстны; до-сихъ-поръ его съ успѣхомъ употребляли противъ: артритическихъ припадковъ? онухолой и отвердѣній железистыхъ органовъ; желтухи; синей немочи; водяныхъ страданій; гастрической, желчной и слизистой лихорадокъ; медленной нервной лихорадки? глистной лихорадки? меланхолиі, происходящей отъ органическихъ пороковъ сердца? кроваваго удара? артритическаго, катарральнаго и золотушнаго воспаленія глазъ? начинающейся темной воды? сѣраго бѣльма? брюшной водянки, водяной грыжи, кровохарканія? органическихъ пороковъ сердца.

Dros.—*Drosera rotundifolia*, Росшикъ.—Заслуживаетъ вниманія при слѣдующихъ явленіяхъ: лихорадка, съ позывомъ на рвоту и гастрическими недугами, или же съ болью въ горлѣ; тоскливость и страхъ ночныхъ привидѣній; чрезвычайная раздражительность; частое кровотеченіе изъ носу; черные угри на лицѣ и носу; кровотеченіе изъ рта; трудное глотаніе, какъ-бы отъ суженія глотки; горькій вкусъ во рту и принимаемой пищи; рвота желчью, слюзью и пищею; боль въ подреберьяхъ, оказывающаяся при кашлѣ, или при дотрогиваніи; боль живота послѣ употребленія кислой пищи; частое мочеиспусканіе ночью; задержанія или затрудненія регулы; бѣли, сопровождаемыя потужными болями; зудъ въ горлѣ, происходящій какъ-бы отъ присутствія мягкаго тѣла въ немъ; осиплость, съ чувствомъ сухости, жесткости и шероховатости въ горлѣ, накопленіе слизи въ дыхательныхъ вѣтвяхъ; боль въ гортани при разговорѣ; сухой судорожный кашель по вечерамъ и ночамъ, съ удушьявою рвотою, кровотеченіемъ изъ рта и носа, синевою лица и припадками задушенія; кашель съ изверженіемъ ярко-красной или черной крови; гнойная мокрота изъ легкихъ.

Dulo. — *Dulcamara*, Пасленъ сладкогорькій. — Не смотря на частое употребленіе, трудно еще представить надлежащія общія показанія къ назначенію этого средства. До-сихъ-поръ съ отличною пользою его назначали противъ: послѣдствій отъ злоупотребленія ртути; страданій, происшедшихъ отъ простуды, особенно отъ влажнаго холода; страданій слизистыхъ оболочекъ; золотушныхъ страданій, съ онухолою и затвердѣніемъ же-

лезь; холодныхъ опухолей; гидроническихъ страданій; параличей; различную рода лишавь; пузырстой и крапивной сыпи, размягченія костей; бородавокъ; скарлатины, смѣшанной съ пурпуровою просовидною сыпью; слизистой лихорадки; болей головы послѣ простуды; начинающейся темной воды; молочныхъ струньевъ; золотушнаго воспаленія глазъ; паралича языка; катаральной боли въ горлѣ; спорадической холеры; поносовъ отъ простуды; камарра мочевою пузыря; суженій мочеваго канала у золотушныхъ; лишавь надѣтородныхъ частяхъ; продолжительныхъ катарровъ и осиплости; слизистаго удушья; грудной водняки.

Euphorb.—**Euphorbium, Молочайникъ.**—До-сихъ-поръ употреблялся только противъ: крошенія зубовъ; слюнотеченія; страданій мочеотдѣленія; часто можетъ также оказывать пользу въ послѣдствіяхъ отъ злоупотребленія ртути; въ болѣзняхъ костей и слизистыхъ оболочекъ; застарѣлыхъ небольшихъ язвахъ; скарлатинной лихорадкѣ; также противъ бородавокъ, воспаленія плевры съ наращеніями на ней, и т. п.

Euphr.—**Euphrasia officinalis, Очанка.**—Общій характеръ этого средства мало извѣстенъ. Его съ пользою употребляли противъ послѣдствій отъ ушиба, удара или паденія; идиопатическаго или травматическаго *воспаленія мазъ; продолжительныхъ слезотеченій изъ мазъ; воспаленія, потемнѣнія, пятенъ, язвъ и другихъ болѣзней роговой оболочки глаза; начинающейся темной воды; мокраго вашия послѣ гриппа; смоковидныхъ бородавокъ.*

Ferr.—**Ferrum metallicum, Желѣзо.**—Назначается, когда есть: *волненіе крови, приливы и кровотеченія съ сильнымъ раздраженіемъ сосудистой системы; чувство разрыванія и колотья въ страдающей части, особенно по ночамъ, съ желаніемъ двигать ее; кровотеченія, при которыхъ кровь бываетъ или жадкад, ярко-красная, или въ видѣ темныхъ сгустковъ; страданія, появляющіяся по ночамъ, ожесточеніе ихъ въ сидячемъ положеніи и облегченіе при умѣренномъ движеніи; необыкновенная слабость съ трясеніемъ и тяжестью въ членахъ и особенная охота лежать; сильная усталость отъ непродолжительнаго хожденія на свободномъ воздухѣ; чрезвычайное исхуданіе; параличная слабость; судороги и чувство какъ бы искривленія членовъ; нечистый, землястый цвѣтъ кожи; опухоли отъ водняки; жженіе и боли отъ обожренности въ разныхъ мѣстахъ; недостатокъ жизненной теплоты; обильное отдѣ-*

леніе пота днемъ, во время хожденія; обильный потъ по утрамъ, послѣ предшествовавшей головной боли; отдѣленіе вонючаго пота по ночамъ; чувство тоски и біеніе подъ ложечкою; вспыльчивость, сварливость и страсть спорить; головокруженіе при взглядѣ на текучую воду; приливъ крови къ головѣ, съ чувствомъ стучанія въ ней, какъ-будто молотами; извѣнная боль волосистой части головы и даже самыхъ волосъ при дотрогиваніи; краснота въ глазахъ съ чувствомъ жженія; тусклость и мутность глазъ съ чувствомъ орошенія ихъ водою; постоянное накопленіе кровянистыхъ корокъ въ носу; *блѣдное, исхудалое лицо* и впалые глаза, окруженные синими кругами; *землистая цѣтца лица* съ синими пятнами, или *огненная краснота лица* со вздутыми венами; желтыя пятна на лицѣ; одутливость лица, особенно вокругъ глазъ; чувство давленія въ желудкѣ или рвота всякій разъ послѣ пріятія пищи; скопленіе кислотъ въ желудкѣ; неспособность сваривать пиво и кислыя вещества; судорожно стискивающія боли въ животѣ и спинѣ; водянистые поносы и испраженіе невареною пищею; *испраженіе съ обильною количествомъ дендритныхъ массъ*; расположеніе къ выкиданію; маточное кровотеченіе, съ потужными болями въ крестцѣ и спинѣ; судорожный кашель и рвота слизью, или пріятою пищею; кровохарканіе и изверженіе гнойной матеріи ртомъ; одышка, происходящая какъ бы отъ стискиванія груди.

Fluor-ac.—Fluoris acidum, Кремневая кислота. — Усталость отъ хожденія; сварливость у стариковъ; выпаденіе волосъ; ломкость костей; слезной свищъ, съ образованіемъ корокъ, влажностью и зудомъ; болѣзненное изъязвленіе правой лодыжки; воспалительная краснота корня носа; лицевая боль, по направленію отъ глаза до верхней челюсти; лишай на лицѣ у дѣтей, Молочная кора съ сынью на головѣ; давленіе въ сторонѣ селезенки; поносъ во время сна; продолжительное маточное кровотеченіе съ удущемъ; потливость ладоней; жесткость, морщинистость кожи рукъ; язвы на лодыжкахъ.

Glon.—Glonoinum & Nitroglycerinum, Глононинъ. — Средство мало изслѣдованное, однакожъ хорошо дѣйствующее въ слѣдующихъ случаяхъ: *Применя* крови къ *мозгу, сердцу и спинному мозгу*, особенно во время регулъ, беременности или послѣ родовъ, равно какъ въ климактерическіе годы и по прекращеніи привычныхъ кровотеченій, въ особенности при *неправильномъ, уско-*

режимо, или измѣнчивою нудно. Вредныя послѣдствія испуга, гнѣва, или механическихъ потрясеній. Страданія отъ простуды разгоряченнаго тѣла; неприятныя послѣдствія непривычныхъ тѣлодвиженій; страданія отъ сильнаго холода. Обмороки съ потерей, или сохраненіемъ сознанія; судороги, особенно на лѣвой сторонѣ; падучая и акампсія. Конгестивныя и тифозныя горячки; мозговой тифъ. Душевные болѣзни, сопровождаемыя молчаливостью. Воспаленіе мозга, *вредныя послѣдствія солнечнаго удара*; водянка мозга. Жестокія головныя боли и мигрени отъ усиленной работы, солнечнаго жара, прекращенія пота, или отъ сидячей жизни. Морская болѣзнь. Глисты. *Примесь крови къ лемкамъ и сороку*; воспаленіе сердца и его сорочки. *Примесь крови къ спинному мозгу*.

Graph.—Graphites, Графитъ.—Назначается, когда существуютъ: *сводщія боли*, съ красноватою, твердою и чувствительною опухолью страдающихъ частей; чувство натяженія и разрыванія, особенно въ частяхъ, пораженныхъ язвами; быстрое, подобно молніи, насквозь пробѣгающее колотье; легкое ошѣмѣніе членовъ; негибкость суставовъ; *слабая склонность къ простудѣ* и большая чувствительность къ наружному воздуху и сквозному вѣтру; волненіе крови и чувство сильной пульсачи въ тѣлѣ при движеніи; общая слабость, съ трисеніемъ членовъ и стеваніями; необыкновенное исхуданіе; ожесточенія страданій при началѣ холода; необыкновенная сухость кожи и недостаточъ испареніи; рожистое воспаленіе; мѣшечкатыя опухоли; распуханіе железъ; артритическіе желваки; влажные лишай и сыпи; *изъязвленныя мѣста* и болѣзненность кожи; толстыя, безобразныя ногти; вонючія, постоянно размножающіяся язвы и *многія другія болѣзни* кожи; необлегчающій ночной сонъ, наполненный грезами, съ безсонницею по причинѣ напора мыслей; появленіе пота при малѣйшемъ движеніи; *большая склонность къ печали, доходящей до отчаянія*; тоска, грозящая больному какимъ-то несчастіемъ; мокрая сыпь и парша на волосистой части головы; волосы скоро сдѣются и выпадаютъ, особенно на боковыхъ частяхъ головы; сильная свѣтобоязнь и ослѣпленіе отъ дневнаго свѣта; сыпь и обварѣлость позади ушей; дурной запахъ и истеченіе вонючей жидкости изъ носу; блѣдный или желтый цвѣтъ лица, съ синими кругами подъ глазами; параличъ и искаженіе одной части лица; покрытые язвами углы рта; *струпилистыя сыпи* вокругъ рта и на подбородкѣ; обиль-

конвульсія и негибкость членовъ съ трясеніемъ головы; облегченіе припадковъ на открытомъ воздухѣ; блѣдный цвѣтъ кожи; слушаніе кожицы; *онгулами* отъ водянки; выпаденіе волосъ и ногтей; большая сонливость днемъ; ознобъ и холодъ тѣла, съ жаромъ въ головѣ; печальная, тихая меланхолія со вздохами; притупленіе чувствительности и неспособность къ мышленію; состояніе бессмысленное, часто повторяющееся, причемъ больной пристально смотритъ на одинъ предметъ; чувство болѣзненного разлома въ головѣ и ея покроватъ съ полупомраченіемъ ума; жгучій жаръ въ головѣ съ блѣдностью лица; блѣдный, желтоватый цвѣтъ лица; отеки лица; морщинистый лобъ; слюнотеченіе съ изъязвленіемъ угловъ рта, пузырьки и молочница во рту и на языкѣ; отвращеніе отъ жира и зелени; сильный голодъ съ отвращеніемъ отъ пищи; язвенная боль въ желудкѣ всякій разъ послѣ обѣда и боль подъ ложечкою при кашлѣ и малѣйшемъ движеніи; жженіе въ желудкѣ, восходящее до глотки; чувство холода и тяжести въ животѣ; поносы бѣлой, студенистой слизью; вялость половыхъ органовъ съ отсутствіемъ полового побужденія; затруднительное дыханіе, происходящее какъ бы отъ стлгиванія груди, съ особенною склонностію глубоко вздыхать.

Нер. — *Hepar sulfuris calcareum*, Сѣрная печень. —

Назначается въ слѣдующихъ случаяхъ: дерганіе, разрываніе и колотье въ членахъ и суставахъ, особенно по утрамъ, при пробужденіи отъ сна; ожесточеніе припадковъ по ночамъ, сопровождаемое лихорадочнымъ ознобомъ; возвышенная нервная раздражительность съ болью при дотрогиваніи и возвышенною чувствительностію въ открытому воздуху, который причиняетъ много страданій; *продолжительный или медленный намокніи*; распуханіе железъ съ исходомъ въ нагноеніе; *рожистое воспаленіе*; трещины на кожѣ; *болѣзненная, легко покрывающаяся язвами кожа*; гнилостныя, вонючія язвы и вообще *многообразныя болѣзни кожи*; раковидныя язвы; горячія, красныя опухоли съ болью, какъ при вывихѣ; болѣзненное чувство разлома и язвенная боль частей при дотрогиваніи; частая, а иногда и конвульсивная зѣвота; *ночная бессонница*, или сонъ *безпокойный вслѣдствіе напора мыслей, быстро сменяющійся одна другою*; ночной ознобъ съ усиленною болью; сухой ночной жаръ съ болью головы, жаждою и бредомъ; *большая склонность*

къ ному *днемъ и ночью*; сильная грусть и тоска, доводящая до покушенія на самоубійство; сильная вспыльчивость до буйства; уволатая сыпь на волосистой части головы, съ извненною болью при дотрогиваніи; сильное выпаденіе волосъ и плѣшивость во многихъ мѣстахъ; рожевидное воспаленіе глазъ; судороги вѣкъ по ночамъ; парша на ухахъ и позади нхъ; гнойная, зловонная течь изъ ушей; необыкновенная блѣдность лица во время работы, разгорячающей тѣло; *железистый цвѣтъ лица съ синими крупами подъ глазами*; омерзительная красота щекъ съ *железиста*, при лихорадкѣ и нарывахъ угловъ рта; обильное истеченіе слюны; болѣзненное чувство, какъ отъ присутствія посторонняго тѣла въ горлѣ; или колотье въ немъ, происходящее какъ-бы отъ острыхъ осколковъ; слабость желудка, съ чувствомъ давленія всякій разъ послѣ принятія пищи; необыкновенный позывъ на вино, кислое, и ощущение вздутости желудка; прекращеніе кровообращенія въ подреберьяхъ и чувствительность въ нихъ до такой степени, что больной не переноситъ тѣснаго платья; *трудное испражненіе на низъ, происходящее какъ-будто отъ медлительности кишокъ*; поносы испражненіями кислаго запаха, бѣловатыми или слизистыми, смѣшанными съ кровью; вялость мочевого пузыря съ медленнымъ испусканіемъ мочи; блестящая, жирная пленка, покрывающая верхній слой мочи; недостаточное половое побужденіе съ неполными эрекціями; оупѣлость на половыхъ частяхъ и между ляжками; слабость голосовыхъ органовъ; обильное накопленіе слизи въ груди; *сухой камень съ судорожнымъ удушьемъ и рвотою, или же мокрый съ слизистымъ хрипомъ въ груди*; тоскливое, свистящее дыханіе, съ опасностію задушенія въ лежачемъ положеніи.

Нуос.—*Нуоссуашиз пигер, Вѣлена.*—Назначается, гдѣ между прочими принадлежками встрѣчаются также слѣдующіе: судороги и конвульсія съ поносомъ, испусканіемъ мочи, холодомъ въ тѣлѣ, крикомъ, тоскою, затруднительнымъ дыханіемъ и возобновленіемъ этихъ принадлежковъ при малѣйшей попыткѣ проглотить какую-нибудь жидкость; состояніе, при которомъ больной внезапно падаетъ, съ крикомъ, причемъ у него появляются конвульсія; параличи одной половины тѣла; слабость до такой степени, что больной не въ силахъ удержать тяжесть собственнаго тѣла и падаетъ при всякой попыткѣ стать на ноги; сухая, жесткая

кожа; гнойные пузырьки, похожие на осну; кровавые нарывы, темная патна и гангренозные пузыри. Необыкновенная сызча и глубокий сонъ, какъ при одуреніи, съ конвульсіями, или же бессонница отъ тоски или нервного раздраженія; жаръ съ чувствомъ, какъ-будто кровь горитъ въ жилахъ; частый и обильный потъ; необыкновенная боязливость и тоска до такой степени, что больной пугается людей; *местовое бышество*, сварливость; особенная склонность къ упрекамъ, ругательствамъ и ревности; безстыдство и возвышенная похотливость; *совершенная потеря самосознанія съ безчувствіемъ* ко всякой естественной потребности; неумѣстный смѣхъ и болтливость; помѣшательство ума, какъ-будто больной одержимъ нечистымъ духомъ; глухые, шутовскіе поступки; сильный приливъ крови къ головѣ; *красные, блестящіе глаза и кристаллы* въ зорѣ; куриная слѣпота; неправильность зрѣнія, при которой предметы кажутся красными, или увеличенными; судороги вѣкъ; тупость слуха, происходящая какъ бы отъ оглушенія; *очень расширенныя зрачки; блѣдно-синеватое, холодное*, или кроваво-красное и коричневаго цвѣта лицо; зубы, покрытые слизью и кажущіеся какъ-бы слишкомъ длинными; истеченіе пѣны изо рта; языкъ красный, сухой; нѣмота, происходящая отъ паралича языка; *невозможность мотать по причинѣ опухоли, или судорожнаго стлмиванія гортани; состояніе, при которомъ больной боится питья*; рвота пищей или даже кровью; боли въ нижней части живота со рвотою и болью головы; vaporъ вслѣдствіе вялости кишекъ, или непроизвольное испражненіе; водянистые, слизистые поносы; приостановленное, или непроизвольное испражненіе мочи; *ночной, сухой, судорожный кашель съ щекотаніемъ*, особенно въ лежачемъ положеніи; судороги груди.

Ign. — *Ignatia amara*, Игнація, горькій грудощникъ. — Преимущественно назначается при слѣдующихъ припадкахъ: боли, усильивающіяся отъ прикосновенія; чувство разжиманія или стлмиванія въ полостяхъ тѣла; боли въ сочлененіяхъ, какъ отъ вывиха; *болышенное чувство разлома и ушиба, особенно въ надкостной пластѣ трубчатыхъ костей, увеличивающееся при лежаніи на боку и исчезающее при положеніи на спягъ*; онемѣніе и зудъ въ членахъ и возобновленіе и ожесточеніе припадковъ отъ куренія табаку, отъ кофе, водки, шума, а также послѣ стола, по вечерамъ въ постели и по утрамъ при вставаніи; *облеченіе при переломѣхъ положенія*

особенно при лежаніи на спиць, или на больной части; чувство давленія какъ-бы отъ твердаго тѣла, или колючаа рѣзы, какъ-бы отъ нажиманія; большая чувствительность въ сквозному вѣтру и расположеніе въ простудѣ; припадки обморочной слабости; судорожныя припадки, при которыхъ голова загибается назадъ и лицо принимаетъ багровый цвѣтъ; судороги глотки; припадки задуженія, потеря самосознанія, съ истеченіемъ пѣны изо рта; изъязвленная мѣста на кожѣ; частая судорожная зѣвота, съ чувствомъ будто отъ вывиха нижней челюсти; зудящая крапивная сыпь; глубокій, но необлегчающій сонъ, какъ отъ одурѣнія; ночной сонъ, въ которомъ больной рыдаетъ, стонетъ, жалуется, болтается, и поаляются подергиванія членовъ и другія болѣзненные явленія; сновидѣнія, приводящія умъ въ напряженное состояніе, и грезы, продолжающіяся еще послѣ пробужденія; вялость съ усиленными болями, жаръ и краснота въ наружныхъ частяхъ, причемъ больной не выноситъ вѣшней теплоты; тѣлесное умнѣе съ плачемъ и внутренняя скорбь, сопровождаемая вздохами; пережѣтливое расположеніе духа; нѣжность и мягкость чувства; своенравная раздражительность и нетерпѣніе противорѣчій; чувство сжатія въ вискахъ, какъ-будто черепъ лопается; сильная свѣтобоязнь; тушость слуха; попережѣтливая блѣдность и краснота лица, или лицо впалое, землястаго цвѣта, съ синими кругами подъ глазами; краснота и жгучій жаръ на одной только щецкѣ; углы рта, покрытыя язвами; больной при жеваніи и разговорѣ легко прикусываетъ себя языкъ; увеличенное отдѣленіе слюны и постоянное присутствіе слюны во рту; колотье и чувство присутствія посторонняго тѣла въ горлѣ, во время глотанія, и чувство облегченія при глотаніи; особенное, необыкновенное отвращеніе отъ ѣды, преимущественно отъ мяса и теплой пищи; большая тяжесть послѣ обѣда и куренія табаку; икота послѣ принятія пищи и питья; судорожныя боли живота съ страданіемъ отъ вѣтровъ; страданія отъ присутствія глистовъ; запоръ съ тѣсетными называемъ на испраженіе и склонностію прямой кишки къ выпаденію; слѣзистыя поносы, смѣшанныя съ кровью; возбужденная половая похоть и сладострастная фантазія; вялость половыхъ органовъ; судороги матки съ рѣвущими, колющими и потужными болями; чувство стягиванія въ груди и горлѣ, съ сухимъ кашлемъ.

Jod.—**Jodium, Iodъ.**—Общій характеръ его мало извѣстенъ.

и потому нѣтъ вѣрныхъ общихъ показаній для употребленія его; впрочемъ, онъ до сихъ поръ съ пользою употреблялся противъ: послѣдствій отъ злоупотребленія ртути; распуханія железъ съ затвердѣнiемъ; волотушныхъ рахитическихъ и ревматическихъ страданій; лишаевъ, волотушныхъ воспаленій глазъ и ушныхъ страданій; воспаления вѣкъ; слюнотеченія и нарывовъ во рту послѣ злоупотребленія ртути; сухотки кишекъ въ нижней части живота; артритическихъ и волотушныхъ бубоновъ; слабости желудка; бѣлей; обильнаго истеченія молока; чахотки дыхательныхъ вѣтвей; хроническихъ катарральныхъ страданій, гриппа, коклюша и воспалительной опухоли колѣна; застарѣлыхъ большого объема вобовъ; бѣлыхъ опухолей суставовъ и членовъ; водянки сочлененій.

Ирео.—Ireoscapna, Рвотный корень.—Назначается, гдѣ есть: болѣзненное чувство разлома или натяженія въ членахъ; скрипъ и трескъ въ сочлененіяхъ; большая чувствительность къ холоду и теплотѣ; облегченіе припадковъ на открытомъ воздухѣ; большая слабость; лицо блѣдное съ синими кругами подъ глазами, какъ послѣ тяжкой болѣзни; приступы внезапной слабости съ отвращеніемъ отъ пищи и тошнотою; судороги, съ загибаніемъ головы назадъ, искаженіемъ лица, которое краснѣетъ и пухнетъ, и съ подергиваніями мышцъ лица, губъ и вѣкъ; тетаническія спазмы во всемъ тѣлѣ; необыкновенное исхуданіе; кровотеченія свѣтло-красною кровью; просовидная сыпь; сонъ съ полуоткрытыми глазами, сопровождаемый стономъ; недостатокъ жизненной теплоты, зябкость и чувство холода; внезапные приступы жара и пота; угрюмость; чувство досады съ особеннымъ расположеніемъ презирать и сердиться на все; болѣзненное чувство разлома въ черепѣ и тошнота; воспаленные глаза; холодъ и знобъ въ ушахъ; желтое землистаго цвѣта, или же одутлое, блѣдное лицо, съ синими полосами вокругъ глазъ; краснота кожи вокругъ рта; языкъ, обложенный желтоватою или бѣлою слизью; сладкий вкусъ во рту, какъ отъ крови; отвращеніе отъ всякой пищи; незначительная тошнота; рвота слизью, примятою пищею и желчью; рвота кровью; боль жесточайшая въ желудкѣ и подъ ложечкою, чувство пустоты и давления желудка; чувство щипанія и рѣзанія въ животѣ; частыя испраженія низомъ; слизистыя, желтатыя или зеленоватыя испраженія, похожія на слюну; удушливый судорожный кашель,

во время коего лице снѣдетъ и тѣло теряетъ гибкость; одышка и припадки судорожнаго удушья; *дыханіе со вздохами*, слизистый крикъ въ груди.

Kal. — *Kali carbonicum*, **Углекислый поташъ.** —

Назначается, гдѣ есть: большая чувствительность тѣла; боль въ членахъ, и особенно въ тѣхъ частяхъ ихъ, на которыхъ больно лежить; чувство болѣзненнаго натяженія, съ блѣдностію и холодомъ послѣ всякаго припадка болѣзни; *кломъ*, особенно *въ сочлененіяхъ, сухожильяхъ жилахъ и мышцахъ*; боль извѣстная при давленіи какой-либо части; легкое нѣмѣніе членовъ; особенное расположеніе кадрываться при поднятій тяжестей; появленіе многихъ страданій въ утреннее время; ожесточеніе ихъ на открытомъ воздухѣ; недостатокъ испарини и неспособность кожи къ отдѣленію пота; большое расположеніе къ простудѣ и многія страданія отъ нея *частіи волненія крови и сильная пульсація по всему тѣлу*; большая склонность къ обморокамъ; нервныя припадки; внезапное ощущеніе дурноты; слабость съ трясеніемъ членовъ; распуханіе и затвердѣніе железъ; водяныя и *отечныя опухоли*; сине-красноватые желваки отъ озлобленія; кровоточивость явъ, особенно по мочамъ; застарѣлыя бородавки; *сильная сонливость днемъ и спѣчка*, безпокойный, *дремотный ночной сонъ съ тлостными, фантастическими виденіями*, подергиваніемъ членовъ и другими припадками; большая *злбкость и склонность къ дрожи*; кожа легко покрывается потомъ, какъ во время дня, такъ и ночью, во снѣ; сильная тоска и боязливость; грустная заботливость о будущемъ; чувство досады и гнѣва, съ раздражительностію и сильною пугливостію; частое головокруженіе, *происходящее какъ-бы отъ желудка*; большое предрасположеніе головы къ простудѣ, сухость волосъ и выпаденіе ихъ; *мѣшеччатая опухоль между бровями и вѣками*; *слезотеченіе и сконченіе явъ въ мочахъ ночью*, чувство холода въ вѣкахъ; *жагодъ въ ушахъ*; воспаленіе и опухоль околоушнихъ железъ; *ноздри изъязвленныя, покрытыя наривами, вонючее и гнойное отдѣленіе изъ носу*; желтое или *блѣдное лицо съ тусклыми, глубоко впавшими глазами и блѣдными губами*, и застарѣлыя бородавки на лицѣ; зловоніе изо рта, похожее на запахъ стараго сыру; страсть къ сладкому; недѣятельность и чувство холода въ животѣ; частое, болѣзненное испусканіе вѣтровъ; частый позывъ

на мочеиспускание и увеличенное отделение мочи; очень усиленное, или же совсем отсутствующее половое побуждение; чувство остроты, зуда, разъедания и опрѣлость на женскихъ половыхъ органахъ; кашель съ обильнымъ изверженіемъ слизи или моча; затрудненное извержение выкашливаемой слизи; припадки судорожнаго удущья.

Kali bichr.—**Kali bichromicum**, Двухроменистое кали.— Назначается при слѣдующихъ симптомахъ: Боли, быстро переходящія съ одной стороны на другую; смѣна ревматическихъ страданій гастрическими; ухудшеніе боляща при жаркой погодѣ; прыщи, какъ-бы отъ осам, и нервы съ воспаленнымъ струпомъ и пятнами; сифилитическая сыпь; обмороки, заставляющія падать, или сопровождаемы тошнотою и рвотою; боль въ половинѣ головы надъ однимъ глазомъ; воспаление глазъ съ краснотой, жжениемъ, опухолью вѣкъ и слезотеченіемъ; кровавыя пятна и прыщи, или же бѣлыя пятна на роговицѣ; слабость зрѣнія, какъ при началѣ темной воды; Заманіе носа съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи; поминим носа; разрушающая язва носовой перегородки; опухоль носа; сифилитическія пятна на лицѣ; скорбутная сыпь на лицѣ; нагноеніе десенъ; толстое обложеніе языка; при глотаніи, нища какъ-бы останавливается въ гортѣ; воспаление глотки и зѣва; сифилитическая язва въ глоткѣ; сладкій, металлическій вкусъ во рту; постоянная жажда; значительная слабость пищеваренія; пустая отрыжка; боль въ желудкѣ, запоръ на низъ съ болью въ животѣ; кровавый поносъ; нагноеніе въ мочкахъ; прыщи и зудъ въ волосахъ половыхъ частей; опухоль и саднящая боль въ локотномъ рукавѣ; желтыя, густыя бѣлы съ болью въ поясницѣ; нарывная боль въ кадыкѣ; продолжительный кашель послѣ дѣйствіемъ паровъ мышьяка; кашель рано утромъ, съ изверженіемъ вязкой слизи; продолжительный слизистый кашель; трудность дыханія и стѣсненіе въ груди; образованіе пузырей на ногахъ отъ незначительной ходьбы.

Kalm.—**Kalmia latifolia**, Кальмія широколистная.— Средство еще мало изслѣдованное, однакожь примѣнимо съ большою пользою при слѣдующихъ страданіяхъ: ревматическія, блуждающія боли, съ опасностью переноса на сердце; перемежающаяся, послабляющая, гастрическая и нервная лихорадка; пятна; сифилитическая сыпь; болѣзни сердца вслѣдствіе ревматическихъ или лр-

мошныахъ страданій; иммертрофія сердца; утолщеніе заслонокъ сердца; чрезмѣрное ускореніе пульса и сердечнаго толчка.

Kaol.—**Kaolin, Каолинъ.** — Средство еще очень мало изслѣдованное, однакожь оказавшееся полезнымъ въ опаснѣйшихъ случаяхъ крупа.

Креос. — **Kreosotum, Креозоть.** — Назначается тамъ, гдѣ есть: *боль язвенная, нарывная, какъ при ушибѣ и разломѣ; чувство раздиранія и натяженія членовъ; колюще въ сочлененіяхъ; ночныя боли; сильное возбужденіе тѣла въ спокойномъ положеніи съ чувствомъ, какъ-будто все тѣло движется; слыш, похожая на ослепные прыщи; жирныя чесоточныя пузырьки; сухіе и влажныя лишай; большая сонливость съ зѣвотой; тягостныя сны; сильная зябкость; скорбная тоскливость и потеря надежды на выздоровленіе; большая слабость памяти; приливъ крови къ головѣ съ стучаніемъ въ ней и чувствомъ, какъ-будто все вываливается изъ черепа; чувствительность волосистой части головы и выпаденіе волосъ; опухоль краевъ вѣкъ; нагноеніе глазъ и обильное истеченіе острыхъ, ѣдкихъ слезъ; воспаленіе наружнаго уха съ сильною краснотой, опухолью и болѣзненнымъ чувствомъ жженія; влажныя лишай на ушахъ; землястый цвѣтъ лица; угри на лицѣ; слыш жѣднаго цвѣта на лицѣ и лишай на вѣкахъ, щекахъ и вокругъ рта; чувство боли въ зубахъ, простирающееся до висковъ; тошнота, рвота и трудное выхаркиваніе; боль и твердость у входа желудка; судорожныя потужныя боли; язвенная боль и чувство холода въ животѣ; неправильное испраженіе нозомъ и сухое, съ натугами; частый позывъ на мочеиспусканіе съ обильнымъ отдѣленіемъ мочи, особенно ночью; зловонная, кофейнаго цвѣта моча съ краснымъ осадкомъ; частое выпаденіе прямой кишки; слишкомъ ранвременныя регулы, съ обильнымъ отдѣленіемъ темной крови; отдѣленіе ѣдкой, кровянистой, остраго запаха сукровицы послѣ мѣсячнаго очищенія; *бальземная жѣлчьная очищенія; бѣлая болѣзненная и ѣдкая, гнилостнаго запаха; чувство свербенія и шероховатости въ горлѣ; сухой, свистящій кашель; удушательная рвота; одышка и тяжесть въ груди; колюще въ сторонѣ сердца.**

Lach.—**Lachesis, Зубной ядъ гремучаго змѣя.** — Показанъ, гдѣ примѣчаются: флегматическій, вялый темпераментъ и тучное тѣлосложеніе съ темными глазами; *необыкновенное ис-*

худаніе, чувство раздиранія и искривленія съ негибкостію страдающей части; боли въ костяхъ, появляющіяся большею частію по вечерамъ и исчезающія во время сна; параличи; невѣрная, неуклюжая походка отъ негибкости сочлененій; *больной особенно расположенъ лежать и затрудняется въ хожденіи*; необыкновенная, также внезапная, слабость и частые обмороки; конвульси, судороги и эпилептичскіе припадки, *вторичное появленіе и усиленіе припадковъ при влажной погоды, при очень тепломъ, или очень холодномъ воздухѣ, послѣ сна, днемъ или ночью, а также отъ испуга, непріянности, кислотъ, пива, вина и преимущественно при спокойномъ положеніи, а при движеніи происходитъ обмеченіе*; сыпь бугорчатая, красуха, лишай и бородавки, *язвирозная оспа, розжа багрянаго цвѣта*; кровяныя пятна, *болызненный, желтый цвѣтъ кожи*; нечистыя, плоскія, источающія сукровицу язвы; *глубокія нагноенія*; изъязвленіе встарѣлыхъ рубцовъ и пузыри вокругъ язвъ; артритическія опухоли; *сильная сонливость днемъ и спячка*; сильная злбкость и чувство холода, или жара съ волненіемъ крови; большая склонность кожи къ отдѣленію пота, или же совершенная недѣятельность ея; *большое расположеніе къ зурюмости, которая представляетъ все въ мрачномъ видѣ; мучительныя опасенія и потеря надежды на выздоровленіе*; припадки страха, появляющіеся ночью; *недовѣрчивость, подозрительность и нерѣшительность, сварливость, особенная охота клеветать на другихъ и оправдывать свои поступки*; большая слабость памяти и забывчивость особенно къ правиламъ правосанія; *бѣшеная ревность*; необыкновенное расположеніе шутить и острить; *необыкновенно возвышенная дѣятельность воображенія съ напоромъ мыслей, трудно приводимыхъ въ порядокъ*; сильный приливъ крови къ головѣ съ чувствомъ, какъ-будто черепъ лопается; сухость ушей съ бѣлою ушною сѣрою; *обильное кровотеченіе изъ носу и сморканье кровью*; *особенное расположеніе къ насморкамъ*; блѣдное, свинцоваго цвѣта лицо съ синими кружками подъ глазами; желтосѣрый, землястый цвѣтъ, или рожевидная опухоль лица; боль въ горлѣ на ограниченныхъ мѣстахъ, или же простирающаяся до ушей, съ чувствомъ задушенія; *чувство присутствія какъ бы шипки въ горлѣ, изъ которой, кажется, происходятъ все страданія*; сильный позывъ на вино и молоко, хотя эти вещества не переносятся; большая слабость желудка съ сильнымъ обременѣніемъ послѣ стола; *отсут-*

стие всякаго позыва на ѣду, вино и куреніе табаку; частая, пустая отрыжка, очень облезлающая больного, и страданія при недостаткѣ ея; возвышенная чувствительность при дотрогиваніи большой части и давленіи платьемъ; упорный запоръ; обильное моченспусканіе съ частымъ позывомъ; усиленное половое побужденіе и множество любопытныхъ мыслей, при неполныхъ эрекціяхъ, и неспособность къ совокупленію; малоколичественная, неправильная, пріостановленная реумъ, сопровождаемая большими страданіями, особенно въ періодъ увяданія; возвышенная чувствительность гортани къ прикосновенію, доходящая до опасности задушенія; постоянная охриплость, происходящая какъ бы отъ вѣико приставашаго къ гортани тѣла; затрудненное дыханіе, особенно послѣ стола и ночью, во время сна; сильное біеніе сердца, совмѣстное съ другими страданіями; ноющее чувство въ сторонѣ сердца.

Laug.—**Laugosegajus**, Лавровая вишня.—До-сихъ-поръ была употребляема противъ: *синей немочи, скоротечной лезочной чаготки и холеры.*

Led.—**Ledum palustre**. Дикій розмаринъ.—До-сихъ-поръ его съ отличною пользою употребляли противъ ревматическихъ и артритическихъ страданій, артритическихъ желваковъ и гидроническихъ страданій, лишаевъ и хроническихъ синей, кровавыхъ парывовъ, общей подкожной водянки, тупости слуха послѣ простуды головы, лишаевъ на лицѣ.

Luc.—**Lucorodium**, Плаунъ.—Назначается въ случаяхъ, гдѣ между прочимъ встрѣчаются: сильное разстройство отъ досады; болѣзненная чувствительность и разбитость въ членахъ, причемъ всякое мѣсто для лежанія кажется жесткимъ; чувство дерганія и разрыванія въ страждущихъ частяхъ, особенно являющееся черезъ день, или при вѣтренной морской погодѣ, и уменьшающееся отъ вѣшней теплоты; ожесточеніе страданій особенно послѣ обѣда и облегченіе къ вечеру; чувство *облегченія на открытомъ воздухѣ*, равно какъ и *большая чувствительность къ открытому воздуху*, особенно къ холодному; сильное расположеніе къ простудѣ; параличная слабость и негибкость членовъ въ сочлененіяхъ; сильное волненіе крови и безпокойство въ тѣлѣ; частая, до того мучительная зябкость, что больному кажется, *будто кровь стынетъ или останавливается въ жилахъ*; судорожное растяженіе и сведеніе отдѣльныхъ членовъ и мышцъ; чувство искрив-

ленія и щемленіе въ членахъ; эпилептическія конвульсія; скоросонныя членовъ; *усталость съ трясеніемъ тѣла*; частыя припадки обморока; *сильное мслуданіе*; сухость кожи съ трещинами въ ней; зудящія, желчныя пятна; лишай, отдѣляющіе влагу; большіе, періодически появляющіеся кровяные нарывы; *артритическіе желваки*; распуханіе железъ; гидроническія опухоли; размягченіе, искривленіе и нагноеніе въ костяхъ; *ночныя боли костей*; сонливость днемъ съ зѣвотомъ, причежъ однакожъ больной не скоро засыпаетъ и не чувствуетъ оживленія силъ при пробужденіи; его сонъ *безнокоенъ отъ фантастическихъ видѣній*; сильная вябкость и недостатокъ жизненной теплоты; лихорадочный жгучій жаръ по вечерамъ; *днемъ обильное отдѣленіе пота*, кислаго или остропахучаго; *меланхолическая печаль, скорбь, плаксивость* и потеря надежды на спасеніе души; сильная *тоска по вечерамъ*; *недовѣрчивость, опасеніе людей и страхъ, особенно съ удивленіи*; раздражительная воспріимчивость, свосравіе и злость; неистовое бѣшенство съ проявленіями гордости и властолюбіи; необыкновенная забывчивость, вследствие которой больной ошибается въ словахъ и слогахъ и перемѣняетъ буквы при чтеніи; дурныя послѣдствія и боль головы отъ усиленныхъ занятій; приливъ крови къ головѣ съ чувствомъ тяжести и разрыванія внутри и снаружн черепа, съ болью въ костяхъ; скорое сѣдѣніе волосъ и *лышиность*; неправильность зрѣнія, при которой больной видитъ половину предмета въ перпендикулярномъ направленіи; возвышенная чувствительность слуха; *блѣдное, землистае цѣтло лицо* съ глубокими чертами, синевой подъ глазами и синими губами; частый *летучій жаръ въ лицѣ*; множество *везицекъ* и зудящихъ лишавей на лицѣ; желтизна зубовъ; гнилостный запахъ изъ рта; страсть къ сладкому; сильная чувствительность подъ ложечкою къ прикосновенію и давленію платьемъ; чувство стягиванія какъ бы обручемъ вокругъ подреберій; *боли въ печени*; страданіе отъ накопленія вѣтровъ; *твердыя испражненія* и запоръ съ тщетнымъ позывомъ; желчныя камни; возвышенное, или недостаточное половое побужденіе; продолжительная сухость маточнаго рукава; кашель съ изверженіемъ зеленой, соленого вкуса слизи или подобныхъ же свойствъ гноя; желчныя пятна на груди; желтизна кожи на затылкѣ.

Magn.-c.—Magnesia carbonica, Углекислая магнезія.—Слѣдующія явленія требуютъ сея употребленія: болѣзненное чувство, какъ бы разлома и необыкновенной усталости, въ костяхъ; слабость до такой степени, что больной падаетъ; припадки обморока, безъ потери самосознанія; появленіе и усиленіе бѣлѣйшей части припадка при сидячемъ положеніи, равно также во вечерамъ и ночамъ; малые, красные, чешуйчатые пятна; малые кровяные нарывы; необыкновенная сухость кожи; ночной жаръ съ тягостными сновидѣніями, кривошъ и вскакиваніемъ; вечерній ознобъ; кислый или жирный, вояющій потъ; тоска и боязливость; чувство досады, дурное расположеніе духа; головокруженіе до такой степени, что больной падаетъ; чувство разрыванія, колотья и сверленія въ головѣ; перхоть на волосистой части головы, при дурной погодѣ причиняющая зудъ; *чувство жжения въ глазахъ, съ слѣзоточеніемъ*; потемнѣніе роговой оболочки; опухоль глаза, какъ бы отъ накопленія водяной жидкости въ немъ; *шумъ и вѣніе въ ушахъ; блѣдный, землистый и неприятный, или же измѣняющійся цвѣтъ лица*; чувство напряженія въ лицѣ, какъ бы отъ высканія на немъ ячменнаго бѣля; одутливость и шишковатая опухоль на ладѣ; ночныя боли лица и зубовъ, рвущія, сверлящія, не дающія покоя въ постели и ожесточающіяся отъ холода; мушристая сыпь во рту и на языкѣ; внезапно прерывающаяся рѣчь; *сильный аппетитъ къ сырой зелени и отвращеніе отъ мяса*, кислый вкусъ во рту и кислая отрыжка; твердая испраженія, или запоръ на низъ; *поносъ пѣнистыми испраженіями кислаго запаха, или же зелеными съ рвзью въ животѣ*; выхожденіе значительнаго количества круглыхъ и ленточныхъ глистовъ; увеличенное отдѣленіе блѣдной или зеленоватой мочи; *замордамы, приостановившіяся реумы, или же слишкомъ рановременныя, обильныя, сопряженныя со многими страданіями; бѣлыя бѣдкою слизью и съ судорогами въ мышцахъ*; ночной судорожный кашель; часто появляющаяся негнѣбкость затылка.

Magn.-m.—Magnesia purgativa, Хлористая магнезія.—До-сихъ-поръ преимущественно употреблялась противъ ревматическихъ болей; слабости, происходящей какъ бы отъ желудка; истерическихъ и судорожныхъ припадкавъ; болей головы, появляющихся днемъ; пульсаціи въ ушахъ; красноты и опухоли носа,

азвенной боли повдрей съ чувствомъ жженія и струвьями на пихъ; тягостной сухости носа, или истечения острой, разъѣдающей водянистой жидкости; сыней лица; тошноты, часто повторяющейся, съ землястымъ, поблеклымъ цвѣтомъ лица; нервной раздражительности и плаксивости; хроническихъ воспаленій печени съ отвердѣнiемъ и чувствомъ давящей боли; судорогъ въ нижней части живота по время мѣсячныхъ кровей и бѣлей; болѣзненной твердости въ животѣ и постоянно вздутія его; измѣненія обыкновенной консистенціи кала въ твердую, причемъ испраженіе бываетъ трудно, имѣетъ видъ твердыхъ катюшекъ, похожихъ на овечьи пометы; продолжительной склонности въ поносу; ленточнаго глиста; судорогъ матки съ бл^млами; склерознаго затвердѣнія маточной шейки; почнаго судорожнаго кашля, съ щекотаніемъ въ горлѣ; чувства давящей боли въ колѣняхъ; ножнаго пота. (Сравни. съ Magn.-с., отъ которой Magn.-ш. немногимъ отличается).

Мајог.—**Мајоган**, **Мајоранъ**.—Средство неизслѣдованное, но оказывается полезнымъ при сильномъ возбужденіи полового влеченія.

Манг.—**Манганш**, **Марганецъ**.— До-сихъ-поръ съ отличною пользою былъ употребляемъ противъ: невыносимыхъ болей надкостной плены и сочлененій; членосуставной ломоты, съ чувствомъ сверлящей, жучей и раздражающей боли; подергиванія и волотья, по большей части въ одной половинѣ страдающаго органа, или простирающейся по крестцу; воспаления костей съ сверлящею болью по ночамъ; опрѣлости въ складкахъ суставовъ; облепченія и ухудшенія страданій при перемѣнахъ погоды; воспалительныхъ опухолей съ исходомъ въ нагноеніе; частой зѣвоты, однакожь безъ сонливости; уменьшенной дѣятельности виѣшнихъ чувствъ; большой сухости глазъ, жара и скопленія гноя въ нихъ; неяснаго зрѣнія, съ чувствомъ жженія въ глазахъ; тупости слуха, происходящей какъ бы отъ залеганія ушей, возникающей при сморзаніи и облегчающейся, или ухудшающейся при перемѣнахъ погоды; шума и свиста въ ухахъ, или треска при сморзаніи и глотаніи; страдальческой блѣдности лица, происходящей какъ бы отъ невоздержной жизни; хроническихъ опухолей горла съ болью какъ бы при опрѣлости; слишкомъ частаго отхожденія вѣтровъ и страданій отъ нихъ; труднаго, сухаго испраженія низомъ, въ видѣ катышекъ, или же

частаго, кольцеобразнаго; *болѣзней горла и дыхательнаго пути* съ жесткостью, сухостью въ горлѣ и охриплымъ голосомъ.

Men. — *Menyanthes trifoliata*, **Вахта** **трилистная.** — До-сихъ-пору съ успѣхомъ была употребляема противъ: артритическихъ страданій; вредныхъ послѣдствій отъ злоупотребленія хивной корки; отъ перемежающейся лихорадки съ чувствомъ холода въ животѣ; течи изъ ушей, конвulsiveй неснѣ снѣй.

Merph. — *Merphitis putorius*, **Зловонный оокъ хорька.** — Съ успѣхомъ употреблялся противъ: страданій, часто появляющихся по утрамъ; красноты соединительной оболочки глаза, съ невозможностью читать мелкую печать; катарра и продолжительныхъ болей отъ него.

Merco. — *Mercurius*, **Ртуть.** — Назначается въ случаяхъ, гдѣ между прочимъ припадкамъ въ особенности встрѣчаются слѣдующіе: приливы крови, волненія и кровотеченія; боль какъ при вывихѣ въ сочлененіяхъ съ такимъ безнокойствомъ, что больной не находитъ мѣста для пораженной части; *болѣзненное чувство разслабленія во всѣхъ членахъ, особенно въ бедрахъ, и боль во всѣхъ костяхъ; чувство растягиванія, разрыванія въ членахъ, особенно по ночамъ; картина болѣзни иногда осложняется обильнымъ потомъ, который однакожь не облегчаетъ состоянія болѣзнаго; скорое онѣмѣніе и оцѣпенѣніе членовъ съ нечувствительностью, такъ что они представляются какъ бы омертвѣвшими; чувство боли, при которомъ мягкія части какъ-будто отдѣляются отъ костей; сильное безнокойство и подергиваніе въ членахъ съ постояннымъ желаніемъ приводить ихъ въ движеніе; необыкновенное истощеніе и слабость съ невыразимымъ чувствомъ тѣлеснаго и душевнаго недуга; чрезвычайная усталость при малѣйшей ручной работѣ и кратковременной ходьбѣ; частые припадки обморока; необыкновенное истощеніе, усиленіе недуговъ, особенно по вечерамъ и ночамъ, въ теплой постели; ночная, воспалительная боль въ костяхъ; колющія боли въ членахъ и сочлененіяхъ съ чувствомъ холода въ нихъ; горячія воспалительная опухоли; воспаленныя, опухшія и воспаляющіяся железы; сухія, похожія на красуху сыпи, кровоточивыя при чесаніи; воспалительная опухоль съ медленнымъ излеченіемъ; позднее засыпаніе вслѣдствіе безнокойства и тоски; очень чуткій сонъ; холодъ и дрожь,*

особенно по вечерамъ и ночамъ; жаръ и волненіе крови по ночамъ, съ сонливостію; необыкновенное расположеніе къ испаринамъ, которая наступаетъ во время появленія болей; обильный кислый потъ, отдѣляющійся по ночамъ; сильное безпокойство, особенно по вечерамъ и ночамъ, съ тоскою и боязнью; своеправіе, нетерпѣливость, сварливая раздражительность и страсть противорѣчить; гипохондрическія опасенія и необъяснимое чувство какого-то внутренняго зла; чувство колотья и разрыванія въ одной половинѣ головы; чувство распирающей полноты, причѣмъ черепъ какъ-будто лопается; выпаденіе волосъ; вѣки, покрытыя нарывами, и струями вокругъ глазъ; сильная боязнь свѣта и огня; чувство колючаго разрыванія въ ухахъ; опухоль околоушныхъ железъ; красная, блестящая опухоль носа; землистаго, блѣднаго цѣтла лицо, нечистые желтые струпи на лицѣ; растрескавшіеся, иногда покрытые зубъ и десны, съ чувствомъ жженія и язвенной боли въ нихъ по ночамъ; шатаніе и выпаденіе зубовъ; гнилой запахъ изо рта; жгучіе паривы или молочница во рту; всякое слюнотеченіе; охрипшая, неясная рѣчь; чрезвычайный голодъ; неутолкаемая, жгучая жажда къ холодному; гнилостный вкусъ во рту; необыкновенная слабость пищева-ренія, съ постояннымъ чувствомъ голода; воспалительная опухоль и нагноеніе въ паховыхъ железахъ; тщетный позывъ на мизъ, особенно по ночамъ; испраженія частыя, жидкія, острыя, слизистыя, смѣшанныя съ кровью, которыя производятъ изъязвленія въ заднемъ проходѣ; обильное отдѣленіе мочи; темнокрасная зловонная моча; ночныя эрекціи съ болью; бѣды гнойныя, разъѣдающія; слиш-комъ обильныя мѣсячныя очищенія съ тоскою и болями живота; сухой, до того сильный кашель, что больному кажется, будто го-лова и грудь у него лопаются.

Мез.—Mezegeum, Волчье лыко.—До-сихъ-поръ съ от-личною пользою было употребляемо противъ: болѣзней костей и слизистыхъ оболочекъ; ревматическихъ болей съ чувствомъ разры-ванія, растяженія и напряженія въ членахъ; болей съ ознобомъ и дрожью въ одной половинѣ страдающей части, усиливающихся при дотрогиваніи и движеніи; необыкновенной чувствительности къ холодному воздуху; распуханія железъ? трехдневной перемежаю-щейся лихорадки, соединенной съ распуханіемъ селезенки и не-обыкновенною чувствительностію къ холодному воздуху; болей въ

жостяхъ черепа, съ чувствомъ растаженія и глухоты; чешуйчатой и зудящей мокрой сыпи на волосистой части головы; воспаленій глазъ; зудящей сыпи позади ушей; истеченія изъ носу желтой, жидкой, слизистой, смѣшанной съ кровью матеріи, производящей изъязвленія; щемлющихъ, или одуряющихъ болей лица; *комочей*, жгучей и сверлящей боли въ нутныхъ зубахъ; чувства осконины на зубахъ и удлиненія ихъ; *самыстала*, *разъдающихъ болей*.

Millef.—*Millefolium*, Тысячелистникъ. — Физиологическія дѣйствія средства еще мало изслѣдованы; впрочемъ его съ пользою употребляли при *кровотеченіяхъ всякаго рода*; истерикѣ, *ипохондріи*, судорогахъ у беременных и роженицъ; падучей болѣзни; *кровляхъ пятнахъ*; при разнаго рода *извахъ*; раненіяхъ и послѣдствіяхъ *ушиба и паденія*; при катаррахъ; *бѣльмахъ*; порчѣ пищеваренія; *поносѣ простомъ и кровавомъ*; при *кровотеченіяхъ изъ разнаго прохода*, геморроѣ; *кровавомъ мочеиспусканіи*, почечномъ *пескѣ*; при *слишкомъ обильныхъ реулахъ*, *маточномъ кровотеченіи*, при угрожающемъ *выкидышѣ*; при *бѣляхъ* и *слишкомъ сильномъ послѣродовомъ очищеніи*; при *кровохарканіи* и *кровотеченіи изъ легкихъ*.

Mosch.—*Moschus*, Мускусъ. — До-сихъ-поръ съ отличною пользою былъ употребляемъ противъ: *нервныхъ, ипохондрическихъ и истерическихъ припадковъ* съ безотчетнымъ плачемъ; *припадковъ обморока*; *эпилепсій*; *катамептического столбняка*; *нервныхъ припадковъ* *бессонницы* отъ возвышенной нервной раздражительности; *мужскаго безснія*, *Милларовой одышки*.

Mur. ac.—*Muriatis acidum*, Соляная кислота. — До-сихъ-поръ съ пользою была употребляема противъ: *золотушныхъ страданій*; *колющихъ, кровавыхъ чирьевъ*, *нервной горячки* съ *гнилостнымъ, торпиднымъ характеромъ*; *неправильности зрѣнія*, при которой больной видитъ *половину предметовъ въ перпендикулярномъ направленіи*; *вечувствительности слуховаго органа*; *тупости слуха* и *стучанія въ ушахъ*; *залеганія носа*, *угрей лица* и *веснушекъ*; *цынготнаго состоянія десенъ*; *воспаленія горла* и *трещинахъ въ глоткѣ*; *слабости желудка* съ *отвращеніемъ отъ мяса* и *расположеніемъ къ отрыжкѣ*; *чувства полноты* даже *послѣ умѣрен-*

паго стода; судорогъ въ нижней части живота; вѣтровъ и вздутіе живота; геморроидальныхъ шишекъ въ заднемъ проходѣ съ жгучею, звенною болью; истеченія крови изъ мочевого пузыря.

Natr. — **Natrum carbonicum.** — Углекислая сода. —
 Ода мѣтѣ ускорительна, чѣмъ Natr. m., однако съ пользою назначается, когда находимъ слѣдующія явленія: ревматическіе недуги съ укороченіемъ мускуловъ; золотушныя страданія; слабость отъ потери соковъ; припадки ипохондріи, *расположеніе къ онемѣламъ и надрывамъ*; вредныя послѣдствія отъ грозы; припадки боли съ тоскою, дрожаніемъ и потомъ; расположеніе къ простудѣ; бевеліе и вялость во всемъ тѣлѣ; необыкновенная усталость, даже послѣ малѣйшей ходьбы, или ручной работы; *сухость кожи при малѣйшемъ движеніи и напряженіи*; гнойныя лишав; желтыя круги отъ лишавныхъ пятенъ; рожистыя шишки у пораженныхъ проказою; кровоточивыя большія бородавки; сонливость днемъ съ позднимъ засыпаніемъ; фантастическіе сны; сильно охлажденные конечности; ночной потъ, смѣняющійся сухостію кожи; ипохондрическая печаль и уныніе; тоска и безпокойство; раздражительность съ расположеніемъ принимать все въ дурную сторону; недостатокъ силы при сжатіи чего-либо въ рукахъ и слабость вслѣдствіе усиленныхъ умственныхъ занятій; боль головы отъ палящаго солнца; воспаленіе глазъ съ свѣтобоязнію; свищъ слезнаго мѣшка; дальноворкость; туность слуха; залеганіе носа; постоянный насморкъ съ кашлемъ; часто повторяющійся жаръ въ лицѣ; желтыя пятна на лбу и верхней губѣ; сильная жажда; *необыкновенная слабость пищева-ренія, при дурномъ ипохондрическомъ расположеніи духа послѣ стола* и незначительной погрѣшности въ діетѣ; *страданія послѣ нитья*; накопленіе и задержаніе вѣтровъ со вздутіемъ живота; чувство давленія на женскія дѣтородныя части, какъ-будто все оттуда вываливается; неправильное образованіе маточнагорыльца; бѣли съ гнилостнымъ запахомъ; кровотеченія изъ матки; отдѣленіе слизи изъ маточнаго рукава послѣ соитія; соляное, гнойное изверженіе кашлемъ; кашель, продолжающійся днемъ и ночью, съ насморкомъ; чувство, похожее на рѣзъ въ рукахъ и ногахъ; шемленіе въ икрахъ. (Сравн. съ *бальмъ истытаннымъ* Natr.-m., который во всемъ почти сходенъ съ Natr.-carb. Такое подобіе замѣчается также между Magn.-c. и Magn.-m., и чѣмъ больше эти препараты

будутъ испитаны, тѣмъ яснѣе представится это сходство; тоже можно сказать объ Амм. и Амм.-ш., подобное же сходство замѣчается между Kal. и Kal.-nitrg.. Впрочемъ должно сказать, что мы до-сихъ-поръ употребляли съ большимъ успѣхомъ гомеопатическіе препараты металлическаго желѣза, мѣди и ртути, гдѣ по припадкамъ слѣдовало бы назначить ихъ соединенія съ уксусною, соляною и др. кислотами; такъ что это заставляетъ насъ полагать, что въ гомеопатическихъ препаратахъ всегда преобладаетъ дѣйствіе основанія солей; даже всѣ ртутные препараты въ своихъ дѣйствіяхъ носятъ на себѣ печать ртути, и если сулема въ большихъ, аллопатическихъ приемахъ не такъ легко производитъ слюнотеченіе, какъ другіе препараты ртути, даваемые въ такихъ же приемахъ, тѣмъ не менѣе металлическая ртуть и сулема, при гомеопатическомъ ихъ приготовленіи, производятъ хотя незначительную, но за то вѣрную саливацію; противъ осеннихъ поносовъ точно также исключительно предпочитали сулему, между тѣмъ какъ я, въ теченіи 10 лѣтъ, находилъ таковой же благоприятный успѣхъ въ употребленіи металлической ртути, какой слѣдовало бы ожидать отъ сулемы; совсѣмъ другое мы видимъ въ дѣйствіи основнаго соединенія, какъ наприм. кинюварь, сѣрный печень и т. п.. Здѣсь трудно замѣтить дѣйствіе той или другой составной части, потому что проявляется совершенно новое свойство тѣла).

Natr.-m. — Natrum muriaticum, Хлористый натръ. —

Назначается, гдѣ къ прочимъ соотвѣствующимъ обстоятельствамъ присовокупляются слѣдующія явленія: боли, при которыхъ мягкія части какъ-бы отдѣляются отъ костей, что появляется при движеніи частей; чувство судорожнаго онемѣнія въ членахъ; негибкость и трескъ въ сочлененіяхъ; сокращеніе мышцъ; истерическія страданія; усиленіе припадковъ въ лежащемъ положеніи; боли съ затруднительнымъ дыханіемъ и параличемъ половины тѣла; вредныя послѣдствія досады; склонность къ простудѣ; сильное безпокойство, съ волненіемъ крови и пульсаціею въ тѣлѣ; подергиванія въ мышцахъ и тѣлѣ; нервные припадки; *чувство необыкновенной тяжести въ тѣлѣ, лѣнность и особенная неагонна къ движеніямъ*; общая усталость съ трудностію удерживать собственное тѣло, и неспособность послѣ верховой ѣзды и незначительной ходьбы; необыкновенное исхуданіе; болѣзненная чувствительность всей кожи; большія

красныя, зудящія пятна; необыкновенная сонливость днемъ съ позу-
миа и трудными засыпаніемъ, и бессонница ночью съ сильнымъ же-
ланіемъ встать; необлегчающій сонъ, наполненный грезами; тягост-
ныя сновидѣнія и многія страданія ночью; неправильный, часто-
переменяющійся пульсъ; постоянная зябкость и недостатокъ жизнен-
ной теплоты въ тѣлѣ; обильный потъ днемъ при малѣйшемъ дви-
женіи; меланхолическая печаль съ плачемъ и чувство досады при
утѣшеніяхъ; хондрическая тоскливость и пугливость; чувство
далекаго отъ холода, такъ что она какъ-бы лопается; жестокая боль
головы, совмѣстная съ другими страданіями; выпаденіе волосъ на
головѣ, а иногда и на бакенбардахъ; вѣки покрытыя язвами, острота
слезъ; болящая опухоль одной половины носа; недостатокъ обоня-
нія; лице желтовато-землистаго цвѣта, съ жирнымъ блескомъ; ли-
шайная сыпь вокругъ рта; губы, покрытыя язвами и трещинами;
гнилостныя, легко кровоточивыя десны; зубной свищъ; жгучіе пу-
зыри во рту и на языкѣ; отвращеніе отъ жирной пищи и хлѣба;
вредныя послѣдствія отъ кислой пищи и хлѣба; постоянная жажда
съ чувствомъ жгучести носъ и тѣла; потеря вкуса; необыкновенная
слабость пищеваренія съ кислой отрыжкой и другими страданіями
послѣ обѣда; чувство сосанія глистовъ; рвота пищей; красныя пятна
подъ ложечкою; бальменное задержаніе вѣтровъ; тщетный позывъ
на испраженіе; запоръ и трудное испраженіе съ колотьемъ въ
заднемъ проходѣ; произвольное испраженіе на низъ; лишая у
задняго прохода; сильный позывъ на моченсусканіе, днемъ и
ночью, съ обильнымъ отдѣленіемъ мочи и произвольнымъ моче-
испусканіемъ при кашлѣ, чиханіи и ходженіи; частыя поножи,
эрекции и усиленное половое побужденіе; слишкомъ запоздалая или
совсѣмъ не являющаяся реумъ; острая бѣли съ желтизною лица;
горячее дыханіе; тоскливое сердцебіеніе и неправильныя, перемежа-
ющіяся удары сердца; обильное отдѣленіе пота на ладоняхъ; ногтеда.

Nitr. — **Nitrum**, Селитра. — До сихъ поръ преимуще-
ственно была употребляема противъ: жажды съ потерю аппетита,
судорогъ желудка; вѣтровъ, мучительныхъ поносовъ безъ боли;
кашли на свободномъ воздухѣ и при восхожденіи на лѣстницу; кашля
кровью; гнойной легочной чахотки; одышки, не позволяющей
низко класть голову въ постели; колотья въ груди при глубокомъ
вдыханіи.

Nitr.-ac. — Nitri acidum, Азотная кислота. — Назначается въ случаяхъ, гдѣ къ прочимъ обстоятельствамъ присовокупляются слѣдующія явленія: темные глаза и волосы; воспалительныя боли надкостной плевы; истерическіе припадки; растягивающія боли, быстро появляющіяся на короткое время; боли вывихныя и трескъ въ сочлененіяхъ; колючія боли, происходящія какъ бы отъ осколковъ; частыя волненія крови и скорое разгораченіе отъ незначительнаго движенія; необыкновенная склонность къ простудѣ и многія страданія отъ движенія на свободномъ воздухѣ; боли при переменѣхъ погоды; необыкновенная слабость, причиняемая болями; усиленіе припадковъ къ вечеру и облегченіе ихъ при ѣздѣ; чрезвычайное искуданіе; болѣзненное немощеніе и слабость съ дрожаніемъ членовъ, доводящая больнаго до необходимости постоянно лежать въ постели; чувство тяжести во всемъ тѣлѣ, въ особенности въ членахъ и сочлененіяхъ; нервные и эпилептические припадки; *растуханіе железа*; необыкновенная сухость кожи; зудящая лишайная сыпь, черные угри, *коричневато-красная пятна на коже* и часто появляющіеся кровяные чирья; болящія рубцы; язвы; бородавки, желваки отъ ознобленія и нарывы; мѣшеччатые опухоли; безпокойный ночной сонъ съ частымъ или слишкомъ раннимъ пробужденіемъ; многія страданія появляются ночью; чувствительныя боли во время сна; тягостныя, любострастныя, фантастическіе сны; большой жаръ и безпокойство въ крови; зловонный ночной потъ; *печальное расположеніе духа, будто убитеннаго*; своенравіе и капризная раздражительность съ чувствомъ досады и пугливости; необыкновенная слабость памяти и безсмысліе; приливъ крови къ головѣ съ чувствомъ жара и стука въ ней; боль головы и чувство, какъ-будто она крѣпко обтянута; сыпь въ видѣ нарывовъ на головѣ; сильное выпаденіе волосъ; нарывы на глазахъ съ колющемъ въ нихъ; *пятна роговой оболочки*; близорукость; тупость слуха; чувство паденія въ органѣ слуха; шумъ и жужжаніе въ ушахъ; опрѣлость, извники въ ноздряхъ и зловоніе изъ носу; блѣдность лица; *желтизна особенно вокругъ глазъ*; лишая и прыщи на лицѣ; язвенная боль, жженіе и нарывы въ горлѣ; постоянная сильная жажда съ тягостнымъ чувствомъ послѣ питья; отвращеніе отъ мяса; позывъ на землю, мѣлъ, известь; многія страданія послѣ стола, особенно тошнота, усталость и сонливость; колюще и пульсация подъ ложечкою; рѣзь и колюще въ животѣ; боли отъ всучи-

ванія живота и частое отхожденіе вѣтровъ; разположеніе къ наховитъ грижамъ; гноящіяся наховныя железы? продолжительныя и частыя испраженія мѣлкою каломъ; зудъ; болящія шишки въ заднемъ проходѣ; слишкомъ вонючая моча; испусканіе холодной мочи; невольное мочеспусканіе; красныя желудистыя пятна на головкѣ дѣтороднаго уда; чрезмѣрная похотливость; увеличенное отдѣленіе простатическаго сока и частыя поллюціи; страданія при мѣсячныхъ очищеніяхъ; коричневатыя, гнилостнаго запаха бѣлы; осиплость и колотье въ гортани; изверженіе моймыаго мокрота изъ десны; одышка съ сильными, порывистыми кашлемъ; боли въ спинѣ и поясницѣ.

N. jugl. — *Nux juglana*, Грецкій орѣхъ. — Золотушныя страданія разнаго рода; опухоль железъ; сифилитическія, золотушныя и меркуріальныя язвы и пятна; язвы съ твердыми, толстыми краями и салными дномъ; головная боль надъ глазами; скопленіе газовъ въ животѣ; угреватая смѣль на спинѣ, затылкѣ и плечахъ; прыщи и кровавыя подтеки на рукахъ.

N. — Mosch. — *Nux Moschata*, Мускатный орѣхъ. — До-сихъ-поръ его съ отличною пользою употребляли противъ: ревматическихъ болей, особенно обнаруживающихся отъ дѣйствія холода; артритическихъ болей и желваковъ? цинготныхъ страданій? кровотеченій и серозныхъ изліяній? страданій, происходящихъ отъ дѣйствія сыраго холода; болей съ сонливостію и склонностію къ обморокамъ; сухости кожи, мало расположенной къ отдѣленію пота; многоразличныхъ женскихъ и дѣтскихъ страданій; перемежающейся лихорадки съ простыми или сложными типомъ; слабости памяти; нервныхъ страданій мозга; тифозныхъ горячекъ? начинающагося чернаго бѣльма; зубной боли отъ дѣйствія влажнаго вечерняго воздуха, а также у беременныхъ, при рвущихъ и колющихъ боляхъ въ зубахъ; молочницы во рту? паралича языка? слабости желудка и пищеваженія; тошноты и рвоты у беременныхъ? чувства полноты, давленія и вздутія желудка; слизистыхъ поносовъ, какъ бы рублеными ядами, соединенныхъ съ потерей аппетита и сонливостію; тифозныхъ поносовъ? осиплости отъ хожденія по вѣтру; кашля, возбуждаемаго разгоряченіемъ тѣла и теплотою постели; катарра и чувства шероховатости въ дыхательныхъ вѣтвяхъ, происходящихъ отъ простуды; тоскливаго чувства въ груди, начинающагося съ подложечки; сердцебіенія съ припадками обморока.

N.-vom. — **Nux vomica, Чилибуха.** — Составляет одно изъ важнѣйшихъ средствъ, которое назначается такъ, гдѣ между прочими соответствующими обстоятельствами встрѣчаются слѣдующія явленія: периодическія и перемежающіяся страданія; *резматическія боли, особенно въ большихъ мышцахъ спины, поясницы, груди и крестца*; дергающее колотье по всему тѣлу; колотье и чувство разрыванія въ сочлененіяхъ, ожесточающееся при перемѣнѣ погоды; чувство растяженія и разрыванія въ сочлененіяхъ, ожесточающееся при перемѣнѣ погоды; чувство растяженія и разрыванія, особенно по почкамъ, съ чувствомъ онемѣнія въ страдающихъ частяхъ; жестокія боли, заставляющія больного желать смерти; *блѣзненное чувство разлома въ членахъ и сочлененіяхъ, особенно пояляющееся при движеніи или по утрамъ, въ постели*, и заставляющее больного постоянно перемѣнять положеніе, потому что долгое лежаніе на одномъ мѣстѣ ожесточаетъ боли; чувство судорожнаго влеченія въ мышцахъ по различнымъ направленіямъ, какъ-будто въ нихъ что-то движется; параличъ; дрожаніе членовъ, съ дерганіемъ сердца и трепетаніемъ; конвульси, судороги и эпилептическія судороги; припадки обморока послѣ малѣйшаго напряженія или послѣ ходьбы на открытомъ воздухѣ; *усталость во время сна*; *большое расклатаніе лежанья, лѣнь и особенная неохота къ движению*; *необыкновенная нервая слабость съ возвышенною раздражимостію всѣхъ органовъ чувствъ, особенно слуха и зрѣнія*; *чрезмѣрная чувствительность къ варужному воздуху*; *необыкновенная склонность къ простудѣ, даже отъ незначительнаго сквознаго вѣтра*; *уменьше лѣнь припадково отъ употребленія кофе, вина, куренія табуку, починать замкннй, напряженія ума*, а также отъ вѣтренной погоды, по утрамъ или послѣ обѣда; ослабленіе припадково, происходящихъ отъ сидячей жизни, при хожденіи, и на оборотъ; *необыкновенное искуданіе; красуха; синія пятна на тѣлѣ, похожія на кровяные подтеки; кровяные чвръя; желваки отъ ознобленій; желтуха; сонливостъ днемъ, послѣ обѣда или рано вечерамъ; позднее засыпаніе вслѣдствіе напора идей*; чувство холода съ синевой кожи и ногтей; *сильная тоска до такой степени, что больной покушается на собственную жизнь*; *ипохондрическая, безпокойная работливостъ о своемъ здоровьи*; *особенное чувство необходимости разсказывать о своемъ состояніи*; *глубокое изслѣдованіе его, сопровождаемое тоскою*; *возвышенная чувствительностъ ко всѣмъ впечатлѣніямъ, такъ*

что шумъ, разговоръ, сильный запахъ, яркій свѣтъ, даже музыка и пѣніе, становятся невыносимыми; боли, сопровождаемыя воплемъ и рыданіемъ, упреками и ссорой; необыкновенная страсть влелевать и упрекать другихъ; *всмысленность съ чувствами досады и внезапной мнѣи*; лѣность и особенное нерасположеніе къ работѣ; *усталость яловы отъ умственныхъ работъ*; головокруженіе; болѣзненное чувство разлома въ черепѣ; *напоръ крови къ яловы, съ жаромъ и краснотою лица*; землистый, желтоватый цвѣтъ лица и *желтоватый отпечатокъ вокругъ носа и рта*; страдальческій, блѣдный видъ больного съ синевою подѣ глазами и заостреннымъ носомъ; искаженныя, темныя черты лица; *язвы бѣлыя, обложенныя слезью*; *кислый окусъ послѣ употребленія пици и питья*, и особенно послѣ молока, которое производитъ кислоту въ желудкѣ; травяной или гнилостный вкусъ; совершенное отвращеніе отъ чернаго хлѣба; сильный голодъ, совмѣстный съ отвращеніемъ отъ пици; *млюстивые припадки послѣ обѣды*; постоянная тошнота, склонность ко рвотѣ, и самая рвота послѣ употребленія пици и питья; чувство застоя крови и тяжести въ животѣ; вздутіе живота, особенно послѣ пици и питья; болѣзненное чувство разлома въ брюшныхъ мышцахъ при дотрогиваніи и движеніи; легко выпадающія паховыя грыжи; *запоръ на мизъ, происходящій какъ-будто отъ суженія и стѣсненія задняго прохода и тѣтанный позывъ къ испраженію*; толстый, твердый калъ и трудное испраженіе, или частыя малокolicественныя испраженія, состоящія изъ слези и сопровождаемыя натугою и жженіемъ; выпаденіе прямой кишки; геморроидальныя шишки въ ваднемъ проходѣ; мучительный позывъ на мочеиспусканіе съ каплеобразнымъ истеченіемъ мочи; *сильно, или слабо возбужденная яловая похоть съ частыми эрекціями*, особенно по утрамъ въ постели, и частыми поллюціями; выпаденіе матки; *слишкомъ рано появляющіяся и дамо продолжающіяся, болѣзненные регулы*; сухой кашель, постоянный и сильный, съ позывомъ на рвоту; слезистая рвота, или одышка, происходящая какъ бы отъ астматическаго стягиванія груди въ косвенномъ направленіи; припадки задушенія; сердцебиеніе въ видѣ незначительныхъ приступовъ, съ волненіемъ крови.

Oleand.—**Oleander**, Олеандеръ.—Назначается въ случаяхъ, гдѣ въ особенности выдаются слѣдующія болѣзненныя явленія: чувство напряженія во всемъ тѣлѣ; *паралитическое окоченнiе яленовъ*;

параличи безъ боля; оцѣмѣніе и нечувствительность членовъ; слабость всего тѣла; припадки обморока, происходящаго какъ бы отъ слабости, съ потерю самосознанія, исчезающіе послѣ появленія пота; сны, похожая на чесотку; лишай; безпокойныя сновидѣнія съ частимъ пробужденіемъ отъ сна; *тугодность умственныхъ способностей и разсѣянность*; сны на волосистой части черепа шолудистыя, чешуйчатая или мокнущія; *омочія мѣста позади ушей и красныя, похожія на лишай пятна впереди ихъ*; попеременно блѣдность и темная краснота лица; пульсація подъ ложечкою, какъ будто всякій ударъ сердца ощущается во всей груди; частое и обильное моченспусканіе, особенно послѣ употребленія кофе; коричневатая, жгучая моча съ бѣловатымъ осадкомъ; тоскливость въ груди съ чувствомъ узкости въ этой полости, сопровождаемая продолжительнымъ и глубокимъ вдыханіемъ; колотье въ груди, ожесточающееся при глубокомъ вдыханіи; трепетаніе съ чувствомъ, какъ будто что-то раздается въ ногахъ и костяхъ; постоянный холодъ въ нижнихъ конечностяхъ; параличь ногъ.

Op. — **Opium, Опій.** — Назначается при слѣдующихъ болѣзненныхъ явленіяхъ: вредныя послѣдствія и страданія отъ употребленія спиртныхъ напитковъ; вредныя послѣдствія испуга или внезапной радости; мнимая смерть; уменьшенная чувствительность; *общая нечувствительность нервной системы и недостатокъ противо-дѣйствія (реакціи) принятымъ лекарствамъ*; *отсутствіе боли при страданіяхъ*; вторичное появленіе и усиленіе страданій при разгоряченіи тѣла; конвульсіи и судорожныя движенія; тетаническія судороги; эпилептическіе параличи; *необыкновенная сонливость съ безчувствіемъ и глубокой, какъ отъ одуренія происходящей, безжизненной сонъ съ храпимымъ дыханіемъ и открытымъ ртомъ*; безсонница съ отуманеніемъ, безпокойствомъ, бредомъ; обильный потъ, съ зудомъ и сыпью на кожѣ; *болзливостъ и пульсированіе*; притупленіе чувствъ или *совершенная потеря самосознанія*; бредъ, страшные фантастическіе образы, представляющіе мышей, скорпіоновъ и т. п.; ступоръ, пьянство, припадки головокруженія; пульсація головныхъ артерій; напоръ крови въ головѣ; *красныя, какъ бы, воспаленныя и чрезвычайно блестящія глаза*; пристальный взоръ; расширенныя и неподвижныя зрачки; шумъ въ ушахъ; синеватый цвѣтъ лица; судорожное сокращеніе лицевыхъ мышцъ; искривленіе рта; судорожное сжатіе челюстей; отвислость нижней челюсти; рвота каломъ

и мочей; сильное вспучиваніе живота, похожее на растяженіе его газамъ; *запоръ* и *испражненіе твердаю жала*; сильныя потуги, причѣмъ испражняемый калъ имѣеть видъ малыхъ и твердыхъ катышекъ; задержаніе мочи и приостановленное моченспусканіе; приостановившіяся потуги; храпявое и хрипявое дыханіе.

Oxal.-ac., — **Oxalissacidum**, — **Щавелевая кислота.**
Средство мало изслѣдованное, хотя со временемъ оно вѣроятно займетъ важное мѣсто въ ряду гомеопатическихъ лекарствъ, особенно при слѣдующихъ симптомахъ и болѣзненныхъ состояніяхъ: Искуданіе при болѣзняхъ сердца; параличи, обусловленные въ особенности страданіями спиннаго мозга; ревматическія боли на ограниченнхъ мѣстахъ, особенно въ суставахъ; *сильныя боли при ракъ*; желтуха; тифозная горячка; хроническія извы. Кровяной ударъ; обморокъ. Слезотеченіе изъ глазъ; нарости и извы въ полости рта и на деснахъ; жаба; воспаленіе глотки. *Рвота беременнахъ*; слабость пищеваженія; *судороги желудка*; воспаленіе и ракъ желудка. Боли печени; *судорожная и воспалительная камка*; *воспаленіе кишекъ*; кровавый поносъ; холера. Камни мочевого пузыря и почечный песокъ. Воспаленіе кадыка; катарръ бронхіей; воспаленіе легкихъ; органическія страданія сердца; сухотка спиннаго мозга.

Petr. — **Petroleum**. — **Нефть, горное маело.** — Назначается тамъ, гдѣ, кромѣ другихъ соотвѣствующихъ обстоятельствъ, встрѣчаются слѣдующія явленія: вредныя послѣдствія огорченія; страданія, происходящія отъ ѣвды; трескъ и щелканіе въ сочлененіяхъ, а также и негибкость ихъ; скорое огнѣнїе конечностей; волненіе крови; сильное расположеніе къ простудѣ; необыкновенная слабость послѣ всякаго напряженія, съ истощеннымъ видомъ лица, дрожаніемъ тѣла, съ шумомъ въ ушахъ и тошнотю; припадки обморока съ волненіемъ крови, жаромъ, давленіемъ въ сторонѣ сердца и сердцебіеніемъ; *коричневая и желтая пятна на коожь*; зудящїе, жгучїе прыщи (гнойныя пузырьки); зудящїе лишая; изъязвленныя мокрыя мѣста на ножѣ, съ зудомъ; *трещины на коожь*; желваки, происшедшіе отъ ознобленія; мозоли; распуханіе железъ; дикое мясо на гноившихся язвахъ; ночной сонъ съ фантастическими видѣніями и болѣе похожій на дремоту; частая дрожь, пробѣгающая по тѣлу; ночная испарина, нечаль, упадокъ духа и плаксивость; тоска и *необыкновенная боланность*; возбуж-

децное состояніе духа и страсть къ ругательству; недостатокъ силъ мышленія; забывчивость и нерасположеніе къ мышленію; чувство тяжести въ головѣ; сыпь на головѣ и затылкѣ; шолуды на волосяистой части головы; дальновзорность или близорукость; тупость слуха и глухота, происходящая отъ паралича слухового нерва; сухость и залеганіе носа; желтизна лица; опухоль подчелюстныхъ железъ; злощавый запахъ изо рта; приторный, или мокротный вкусъ во рту, происходящій отъ несправности желудка; *необыкновенный голодъ, утоляемый только количествомъ пищи; тошнота и рвота, приходящая нѣдой*; твердость подъ ложечкою и чувство боли при дотрогиваніи къ ней; испраженіе твердаго, въ видѣ ка-тышекъ, када и водянистаго, желтоватаго цвѣта испраженія, ежедневно повторяющіяся; слизистые поносы; выхожденіе ленточныхъ глистовъ; постоянный позывъ къ мочеиспусканію; непроизвольное испраженіе мочи въ кровати; зудъ и потъ на мужскомъ членѣ; лишай на кожѣ мошонки и бедра; отдѣленіе простатическаго сока и частыя поллюціи; слезотеченіе изъ маточнаго рукава, сопровождаемое страшными свовидѣніями; осиплость и сухой кашель, ли-шай на затылкѣ; вздутая, растрескавшаяся кожа на рукахъ; жел-ваки отъ ознобленій на рукахъ; холодъ въ нижнихъ конечностяхъ.

Phosph. — **Phosphorus**, **Фосфоръ**. — Назначается пре-имущественно при существованіи слѣдующихъ припадковъ: стра-данія, происшедшія вслѣдствіе простуды или огорченія; чувство возвышенной теплоты въ парализованныхъ частяхъ; жгучія боли; ощущение разрыванія и колотья ревматическаго свойства, послѣ простуды; *появленіе припадковъ по утрамъ и вечерамъ, въ постели, или же послѣ обѣда, между тѣмъ какъ во время обѣда начинаются другіе*; чувствительность къ прохладной погодѣ; *боли, обнаружива-ющіяся при перемены погоды и во время грозы*; расположеніе къ простудѣ на свѣжемъ воздухѣ; частыхъ волненія крови; кровоте-ченія изъ различныхъ частей тѣла; *чувство тяжести въ тѣлѣ и из-неможенія души*; изнеможеніе съ нервною слабостію и усталость, ощущаемая собственно въ ногахъ и колѣняхъ, причѣмъ даже не-значительная ходьба усиливаетъ страданія; *внезапный упадокъ силъ* дрожаніе, *исхуданіе*, особенно рукъ; ползаніе какъ-будто мурашекъ въ парализованныхъ частяхъ; небольшие, сухіе лишай; прозрачныя, коричневыя, синеватыя и желтыя пятна; кровавые пятна; кровавые чирьи; *необыкновенное кровоточеніе изъ небольшихъ язвъ; кровавой*

варость; лимфатическіе варвы, покрытыя свищевыми язвами; страданіе костей; *трудное засыпаніе и раннее пробужденіе отъ сна*; безпокойный ночной сонъ съ видѣніями, представляющими больному, будто онъ постоянно занятъ и хлопочеть о дѣлахъ; забвостъ, обнаруживающаяся по вечерамъ; *ночная и утренняя испарина*; необыкновенное уныніе и нерасположеніе; тоскливость и раздражительность больного, когда онъ остается одинъ; *возвышенная воспримчивость въслъ чувствъ и необыкновенная пухловость*; раздражительность и досада; сердитое и гнѣвливое расположеніе духа; *иловокруженіе*; *приливъ крови къ ялову съ жужжаніемъ, ворчаніемъ, сильнымъ жаромъ и чувствомъ жара въ головѣ*; выпаденіе волосъ; сухость корней волосъ; приливъ крови къ глазамъ; слезоточивость, особенно на свѣжемъ воздухѣ; свѣтобоязнь; близорукость; слѣпота дневная, такъ что глаза какъ-будто пеленою завѣшены; туность слуха; недостатокъ обоняніа; дурной запахъ и истеченіе желто-зеленой или желтой слизи изъ носу; *бальзменый, блѣдный, нечистый видъ лица, съ синевою подъ глазами*, которые глубоко впали въ орбиту; одутливость лица, особенно вокругъ глазъ; лишай на верхней губѣ и выше ея; кровоточивость десенъ, иногда растрекавшіа; страданія, происходящія отъ употребленія кислой пищи и молока; необыкновенный голодъ; *чрезвычайная слабость желудка и пищеваренія*; отрыжка съ чувствомъ, какъ-будто около подреберій все наполнено воздухомъ; кислая отрыжка послѣ всякой ѣды; *чувствительность желудка при дотрогиваніи и хожденіи*; жженіе въ желудкѣ и подъ ложечкою; вздутость живота съ испраженіемъ твердаго кала и накопленіемъ вѣтровъ; большія желтыя пятна и кровавыя чары на животѣ; *ежедневная, часто повторяющаяся испражненія низомъ, очень мягкой консистенціи*; колюція геморроидальныхъ шишки съ кровотеченіемъ изъ задняго прохода; слизетеченіе изъ задняго прохода; невольное моченспусканіе; моча водянистая, безцвѣтная и обильная; *усиленное половое побужденіе и необыкновенное, неотразимое желаніе къ соитію, съ эрекціями и поллюціями*; слишкомъ раннія, или слишкомъ обильныя регулы, сопровождаемыя страданіями; продолжительная потеря голоса и осиплость; хроническій кашель, происходящій какъ-бы отъ буторковъ, или отъ хроническаго воспаленія легкихъ; обильное изверженіе кашлемъ слизистой, или соляно-гношной матеріи; *затрудненное дыханіе, тоска и чув-*

ство жалованн въ зрудн; частое сердцебіеніе; желтыя пятна на груди; частое сердцебіеніе и нечувствительность пальцевъ; боль въ подошвахъ при хожденія, какъ-будто онѣ изъязвлены.

Phos.-ac. — **Phosphori acidum**, Фосфорная кислота. — Назначается тамъ, гдѣ между прочимъ встрѣчаются: болѣзни костей, въ особенности опуханіе, воспаленіе и костоѣда; чувство растягиванія и терванія въ членахъ; *слабость одновременно съ блѣдностію болвана*, также и нервная слабость, вмѣстѣ съ *расположеніемъ къ обильному поту днажъ*; рожиства, ярко-красныя воспаления; лишан; кровавыя чирьи; язвы зудящія, нечистыя, плоскія, съ нечистымъ гноемъ и неровнымъ основаніемъ⁽¹⁷⁾; трещины въ язвахъ кости; *неразговорчивость*, равно какъ и упорная молчаливость; апатическое равнодушіе въ высокой степени; *тупоуміе и неспособность къ умственнымъ занятіямъ*; слезотеченіе изъ глазъ; желтое пятно на бѣлкѣ глаза; свѣтобоязнь и ослѣпленіе глазъ при взглядѣ на что-нибудь яркое; близорукость; состояніе, при которомъ больной не выноситъ никакого шума и разговора, не терпитъ даже музыки; струпы на носу; жженіе въ кожѣ щекъ; угри на лбу и подбородкѣ; влаготочивые, струнистые лишан на щекахъ, губахъ и углахъ рта; оскомена зубовъ и желтизна ихъ; отдѣленіе десенъ отъ зубовъ; растрескиваніе десенъ и появленіе на нихъ болящихъ узловъ; вязкая, клейкая слюнь во рту; гнусливость; сильная жажда и пошмъ на сочныя освѣжающія вещества; отрыжка и другія страданія отъ употребленія кислотъ; особенное ощущеніе въ желудкѣ, какъ-будто что-то колеблется вверхъ и внизъ; сильная тошнота; ворчаніе и стужъ въ нижней части живота и вслучиваніе его, особенно послѣ употребленія кислой пищи; вздутіе матки отъ накопленія въ ней воздуха; испраженіе непереваренной пищей; поносы зеленовато-бѣлые; обильное выдѣленіе свѣтлой мочи съ студенистыми ключьями; смоквовидныя бородавки; чрезвычайная осиплость; кашель съ изверженіемъ гнойной, зловонной матеріи; невольное испусканіе мочи во время кашля; застарѣлыя, зудящія язвы на бедрѣ.

Plat. — **Platina**, Платина. — Назначается при слѣдующихъ явленіяхъ: вредныя послѣдствія досады, гнѣва и огорченія; *неуравнн съ быющимъ рителемъ и чувствомъ щемлющей, зудящей, тупой боли въ страдающихъ частяхъ*; судорожныя припадки, осо-

бенно у истерическихъ женщинъ; припадки судорожнаго свѣченія членовъ, безъ потери самосознанія; необыкновенная печаль, особенно по вечерамъ, съ плаксивостію и угрюмостію; тоска, будто предсмертная, причѣмъ больной терзаетъ способность мышленія; необыкновенная сердечная тоска и страхъ, происходящіе отъ утѣренности въ скорой смерти; страхъ при убѣжденіи, что всѣ окружающіе суть нечистые духи; истерическое расстройство духа съ необыкновенною нервною слабостію и раздражительностію судящей системы; *высокомеріе, гордость*; бредъ; шепчущая и стягивающая боли въ вискахъ или во лбу, съ жаромъ и краснотою лица; шумъ и трескотня въ головѣ; залеганіе носа на одну ноздрю; блѣдный, поблекшій, землистый цвѣтъ лица; жаръ въ лицѣ съ яркою краснотою; сжатіе челюстей; потеря аппетита; отрыжка и чувство давленія въ желудкѣ; чувство стягиванія въ животѣ; запоръ на низъ; необыкновенно возвышенное половое побужденіе и сладострастное щекотаніе въ дѣтородныхъ частяхъ; чувство давленія на дѣтородныя части и напоръ крови къ маткѣ; *слишкомъ раннія и обильныя регулы, или же очень продолжительныя, съ отдѣленіемъ густой, темной крови; недостатокъ голоса; короткій сухой кашель; короткое, затрудненное, тоскливое дыханіе.*

Puls. — Pulsatilla, Вѣтренница. — Назначается тамъ, гдѣ между прочимъ встрѣчаются слѣдующія явленія: *боли терзающія, держающія въ челюсть, или подергивающія въ мышцахъ, съ оцѣпеніемъ, параличней слабостію и опухолью страждущихъ частей; колотье и чувство холода въ страждущихъ частяхъ при переменѣ погоды; неправильныя боли, быстро перебѣгающія съ одного мѣста на другое, съ опухолью и краснотою суставовъ; болѣзненное чувство разлома и боли при дотрогиваніи, какъ отъ взъязвленія частей; страданія и боли въ одной половинѣ тѣла; припадки боли съ ознобомъ, тоскливымъ чувствомъ въ груди и блѣдностію лица; усиленіе страданій въ сидѣчемъ положеніи, при вставаніи, въ покоѣ, а особенно лежа на боку; облегченіе при переменѣ положенія, движеніи, хожденіи, давленіи на страждущую часть, при дѣйствии вишней теплоты и свѣжаго воздуха; сильное онемѣченіе припадковъ по вечерамъ, ночамъ и передъ полуночью; впрочемъ нѣкоторые припадки появляются и усиливаются также утромъ или*

послѣ обѣда, а иногда даже перемежаются черезъ вечеръ; тяжесть во всемъ тѣлѣ съ зябкостью, особенно въ рукахъ и ногахъ; сыпь, появляющаяся на ложную оспу, рожевидная опухоль; припуханія кожи отъ дѣйствія на нее влаги; кровоточивость язвъ; расклатываніе къ различнымъ родамъ сыпучихъ элементовъ; ознобленія съ синевато-красною опухолью; сонливость днемъ и безпокойный ночной сонъ, вслѣдствіе напора мыслей; чувство холода, дрожь, озноба и постоянная зябкость; жаръ попеременно съ ознобомъ, при раздѣваніи; утомленіе, плачь, печаль и страхъ при мысли о смерти; страхъ при видѣніи и боязнь по вечерамъ оставаться въ темнотѣ; застѣнчивость, плаксивость, корыстолюбіе, зависть, жадность въ сильной степени; усталость отъ умственныхъ занятій; пустота въ животѣ съ болію съ, какъ послѣ попойки или бессонной ночи; терзаніе и колюще въ головѣ, ушахъ и зубахъ; краснота и припухлость въѣкъ съ развитіемъ ячменя; слезотеченіе изъ глазъ на свѣжее, сырое воздухѣ; неясность зрѣнія, какъ бы отъ пленки передъ роговою оболочкою; гноетеченіе изъ ушей; насморкъ съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи и частымъ сморканьемъ; попеременная краснота и блѣдность лица; страдальческія черты лица; боли зубовъ съ трескомъ въ ушахъ; вловонный запахъ изо рта; непріятный вкусъ во рту, или же сливистый, гнилостный, какъ бы послѣ употребленія гнилаго мяса; горькій вкусъ во рту при питаніи и жеваніи; особенно чернаго хлеба; позывъ на спиртное надѣтаніи или острого вещества; отрыжка, имѣющая вкусъ принятой пищи; рвота принятой пищею, появляющаяся послѣ стола; пульсация подъ ложечкою; испраженіемъ низомъ, состоящимъ изъ одной слизи; позывъ на мочу; затрудненное, кашлеобразное моченспусканіе, или отдѣленіе безцвѣтной мочи; сильно возбужденная молочая позывъ, доходящая до болѣзненного напряженія дитороднаго члена (*proliferismus*), съ сильнымъ желаніемъ соитія; приостановленіе регуль; страданія во время мѣсячнаго очищенія, особенно если при этомъ обнаруживаются ознобъ и блѣдность лица; кровь регуль густа и черна; кашель, сопровождаемый изверженіемъ густой слизи; тоскливость въ груди при горизонтальномъ положеніи, съ ощущеніемъ стягиванія гортани; часто повторяющееся и сильное сердцебиеніе съ тоскою.

Ван. — *Vaniculus bulbosus*, **Жабникецъ.** — Характеръ и свойственныя ему симптомы малозвѣстны, но его до-

сихъ-поръ употребляли съ отличною пользою противъ: эпилептическихъ конвульсій; золотушныхъ страданій; желтухи; пузырстой сыпи, похожей на гангренозные пузыри; плоскихъ, разъѣдающихъ язвъ; роговыхъ и другихъ наростовъ; лишаявъ по всему тѣлу.

Rhab.—**Rhabarbarum**, Ревень.— Малоизвѣстенъ. До-сихъ-поръ его съ усѣхомъ употребляли противъ дѣтскихъ болѣзней, особенно грудныхъ дѣтей, также во время прорѣзыванія зубовъ; золотушныхъ страданій; противъ болѣзненного состоянія дѣтей, при которомъ они мечутся, кричатъ, блѣднѣютъ, капризничаютъ, причѣмъ появляются конвульсивное сведеніе пальцевъ, мимика лица и вѣкъ; противъ конвульсивнаго подергиванія въ пальцахъ, въ мышцахъ лица, углахъ рта и вѣкъ; кислаго, затхлаго, или слизистаго вкуса во рту; смертной тоски; поносовъ у роженицъ, или же противъ поносовъ не очень жидкихъ, кислаго запаха, сопровождаемыхъ тѣстною надутою; труднаго прорѣзыванія зубовъ.

Rhod.—**Rhododendron**, Вонрышникъ.— Извѣстенъ только общій характеръ этого средства, которое до-сихъ-поръ съ усѣхомъ употребляли противъ: ревматическихъ и артритическихъ болей въ членахъ, появляющихся отъ суровой, бурной погоды и ухудшающихся при похлѣдѣи и ночью въ постели, равно при пережвнѣ погоды; чувства сильнаго натягиванія, происходящаго послѣ злоупотребленія ртутью и сопровождаемаго опухолью и краснотой страдающей части; усиленія болей, особенно ночью и утромъ, причѣмъ онѣ увеличиваютъ напряженіе и негибкость въ сочлененіяхъ; чувства натяженія, цѣпанія и колотья въ членахъ, сопровождаемаго параличнымъ состояніемъ ихъ; скорого онѣмѣнія членовъ и ползанія мурашекъ въ нихъ; вторичнаго появленія всѣхъ припадковъ при наступленіи холодной погоды или грозы; болей въ костяхъ или въ ихъ плевѣ, появляющихся большею частію на ограниченныхъ мѣстахъ, при пережвнѣ погоды; отъ водянки; красноты и опухоли частей, подверженныхъ артритическому страданію; опухоли яичекъ съ чувствомъ натягивающаго давленія, также послѣ скривнагося переломъ и простуды; водяныхъ грижь.

Rhus.—**Rhus toxicodendron**, Сумахъ, Желтеникъ дрововидный.— Назначается тамъ, гдѣ встрѣчаются слѣдующія явленія: страданія сухожилья, сухихъ жилъ и синовиальныхъ оболочекъ; недостатокъ пластичности въ крови, съ расположеніемъ въ

ослабленіе органической дѣятельности, доходящимъ до паралича; страданія вълѣдствіе холоднаго купанья; чувствое напряженія и терзанія въ членахъ, усилывающееся съ покоемъ, а также съ злободневное время юда, или ночью отъ теплоты постели; и сопровождаемое притупленіемъ чувствительности и онѣмѣніемъ сираждущихъ частей послѣ производимаго ими движенія; колюще въ сочлененіяхъ во время покоя; боли *скачущаго свойства*; жестокія боли, отъ которыхъ больной стонеть; болѣзненное чувство разлома, или какъ будто мѣхія часты *отдѣлялися отъ костей*; чувство во внутреннихъ органахъ, какъ-будто тамъ что-то отрывается; *звонкая боли и расположеніе къ звонкамъ*; онѣмѣніе членовъ, на которыхъ больной лежитъ; онѣмѣмость нѣкоторыхъ частей, съ щекотаніемъ въ нихъ и нечувствительностію; негибкость членовъ, обнаруживающаяся при началѣ движенія послѣ покоя; онѣмѣніе и настоящій параличъ, а также параличъ одной половины тѣла; тетаническія судороги; сильная усталость, доводящая больного до того, что онъ долженъ постоянно сидѣть или лежать; припадки обморока; необыкновенная чувствительность къ свѣжему, даже теплему воздуху; *рожистыя воспаленія, особенно пузыристыя*; гнойные пузырьки, которые вскрываются и отдѣляютъ влагу; лишайная сыпь, струнья, трещины на кожѣ, бородавки, *номотода*; красная, блестящая опухоль; *эвота судорожная и до того сильная, что производитъ боль въ нижней челюсти, а иногда и самый звонкъ ея*; ознобъ, съ припадками боли и другими побочными страданіями, наступающими большею частію къ вечеру; вечерняя лихорадка съ поносомъ; потъ во время приступовъ боли, сопровождаемый сильною дрожью; сильная тоска со страхомъ смерти, появляющаяся въ сумеркахъ къ вечеру; расположеніе духа, при которомъ больной опасается быть отравленнымъ; мерещенья и бредъ; боли съ чувствомъ разрыва въ мозгу; свербежъ въ головѣ съ болью; опухоль, парша на головѣ; маля, мягкія шишки на волосяной части головы; свѣтобоязнь; припуханіе и воспаленіе околоушныхъ железъ; блѣдность лица и страдальческій видъ больного; синева подъ глазами и заостренный носъ; искривленное и обезображенное лице; сыпи на лицѣ; мѣдная сыпь вокругъ рта и на подбородкѣ; зловоніе изо-рта, происходящее отъ полыхъ зубовъ; истеченіе желтой, а иногда кровавистой слюны ночью; затруднен-

ное глотаніе плотной пищи, какъ-будто глотка и пищеварительный каналъ сужены; совершенное отвращеніе отъ всякой пищи, особенно отъ хлѣба; сильное желаніе холоднаго молока; язвенная боль въ предсердіи, какъ-будто что тамъ оторвалось, особенно когда больной нагнется, или остунится; вздутіе живота тотчасъ послѣ обѣда; жидкія и частыя испражненія; невольное испражненіе на явзъ во время сна; недержаніе мочи во время покоя, причеиъ она невольно испускается; крестецъ камется какъ-будто разбитымъ, особенно если больной споконно лежить на немъ или тихо сидитъ; боли, какъ отъ надрыва, въ спинѣ и лопаткахъ.

Rut.—*Ruta graveolens*, Рута. — Трудно опредѣлнть общіе симптомы этого лекарства; до-сихъ-поръ его съ отличною пользою употребляли при слѣдующихъ явленіяхъ: боли ѣдкія и жгучія въ костяхъ и въ надкостной плевѣ; боли въ костяхъ, членахъ и сочлененіяхъ, какъ послѣ толчка, паденія, ушиба; вреднія послѣдствія механическихъ поврежденій; усиленіе боли въ членахъ во время покоя, особенно при сидячемъ положеніи, равно какъ въ сырую и холодную погоду; легко появляющіяся ссадины на кожѣ, особенно отъ верховой ѣзды, и хожденія; воспалительныя извы; бородавка, подкожная водянка; *ушибы и поврежденія костей и надкостной плевы*; жаръ, распространяющійся по всему тѣлу; меланхолія и уныніе; мокнущіе струи на волосистой части головы; истеченіе слезъ и водянистой жидкости изъ глазъ, особенно на открытомъ воздухѣ; пятна роговой оболочки; *слабость отъ напряженія глазъ, при слишкомъ долгомъ умственномъ занятіи*; неправильность зрѣнія, при которой представляются красныя круги около пламени свѣчь; начинающаяся темная вода съ туманною неясностію зрѣнія и невозможностію видѣть отдаленные предметы; кровотеченіе изъ носу; боли желудка послѣ употребленія въ пищу чернаго хлѣба, или сырой и тяжелой пищи; отрыжка обыкновенная у истерическихъ женщинъ, или гнилая, появляющаяся послѣ употребленія мяса; тошнота во время ѣды и рвота приятою пищею; боли живота отъ присутствія глистовъ; чувство гнзвенія въ желудкѣ; частыя позывы на низъ съ неволокнественными, мягкими испражненіями; слизистый поносъ; выпаденіе прямой кишки при испражненіи; частый позывъ на моченспусканіе, съ уменьшеннымъ количествомъ мочи и со вторичнымъ тщетнымъ

повномъ къ моченосущанію; мочечные камни; слишкомъ раннія, обильныя, неправильныя, или же скудныя регулы съ незначительными послѣдовательными бѣлами; безплодіе; ѣдкія бѣлы послѣ сирывшихся мѣсячныхъ очищеній.

Sabad.—**Sabadilla**, Сабадилла, Китайская чемерица. — Характеръ ея малозвѣстенъ; до-сихъ-поръ съ пользою была употребляема противъ: большой чувствительности къ холоду; парализаго натаженія, ощущаемаго по всему тѣлу; необыкновенной сонливости; безпокойнаго, не освѣжающаго сна; перемежающейся лихорадки съ ознобомъ, жаромъ и жаждою; сильной тоски и безпокойства; чувства давленія во лбу; чувства давленія въ глазахъ, особенно если они обращены вверхъ; мокраго насморка съ лозомъ въ головѣ и искаженнымъ лицомъ; язвенной боли во-рту, какъ-будто онъ обваренъ кипяткомъ; толстаго обложенія языка желтоватымъ слоемъ слизи; необыкновеннаго голода, особенно чрезвычайнаго позыва на сладкое, медъ и хлѣбную пищу, чередующагося съ отвращеніемъ отъ мяса, вина и кислаго; позыва ко рвотѣ съ тошнотою и постояннымъ выплевываніемъ безвкусной воды; рвоты глистами; красныхъ пятенъ на животѣ, груди и рукахъ; страданія отъ ленточнаго глиста; кашля, обнаруживающагося при горизонтальномъ положеніи больного, а также кашля глубокаго, глухаго, съ изверженіемъ крови; кашля со рвотою, колотьемъ въ черепѣ, болями живота; гриппа и одышки.

Sab.—**Sabina**, Казацкій можжевельникъ. — До-сихъ-поръ его съ отличною пользою употребляли противъ женскихъ болѣзней; острыхъ и хроническихъ страданій; артритическихъ желваковъ; ревматическихъ болей; чувства стучанія и сжатія въ зубахъ, какъ-будто они лопаются; слишкомъ раннихъ регулъ; слишкомъ обильныхъ регулъ съ отдѣленіемъ сгустковъ свернувшейся крови; кровотеченія изъ матки въ мѣсячныхъ кровей, происходящаго послѣ родовъ или выкидыша; выкиды съ сильнымъ кровотеченіемъ изъ матки, особенно на третьемъ мѣсяцѣ; бѣлей при остановившихся регулахъ, или бѣлахъ съ отдѣленіемъ крахмаловидной, желтоватой, сукровичной матеріи, съ отдѣленіемъ зловонной крови, похожей на мясную воду.

вою была употребляема противъ: необыкновеннаго искуданія; гидропического опуханія всего тѣла; безночнойнаго сна съ тоскою и возмущеніемъ, дрожаніемъ членовъ и одышкою, доходящею до задыханія; несноснаго жара во всемъ тѣлѣ, причеиъ однако большой бѣтается скидывать одѣяло; перемежающейся лихорадки съ обильными потами; синевы и одутлости лица, ограниченной красноты щекъ; красныхъ пятенъ на лицѣ; опухоли мошонки; слишкомъ обильныхъ мѣсячныхъ очищеній, похожихъ на кровотеченіе изъ матки; воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей; перепончатой жабы; кашля съ обильнымъ изверженіемъ солоноватой или сладковатой слизи; хрипываго, свистящаго и скорого дыханія; сильной одышки; припадковъ одышки, похожей на Милларову; грудной жабы; давленія въ груди.

Sang.—**Sanguinaria canadensis**, Крoвавиикъ канадскій.—Употребляется съ пользою при слѣдующихъ симптомахъ: ревматическія или ломотныя страданія суставовъ; сухость и жаръ кожи; зудящая крапивная сыпь послѣ предварительной тошноты; старая, вялая язва съ твердыми краями и вонючимъ отдѣленіемъ; зубчатые наросты; бородавки; желтуха; летучій жаръ, какъ бы отъ горячей воды, протекающей изъ груди въ животъ; пульсъ твердый, частый, неправильный; болотная лихорадка; изнурительная лихорадка; обморокъ, сопровождаемый закрываніемъ глазъ и закидываніемъ головы назадъ; *ломота головы съ горькою рвотою*, появляющаяся по утрамъ; головная боль какъ бы отъ раненія, особенно въ вискахъ; головная боль, распространяющаяся отъ затылка; налитіе жидк. на вискахъ; жаръ въ ушахъ съ краснотою щекъ; *поливъ въ носу*; совершенно обнаженный, болѣзненный языкъ; значительная слабость пищеваренія; отсутствіе аппетита при обложенномъ бѣлою корою языкѣ; частая тошнота, сопровождаемая плеваніемъ; боль въ сторонѣ селезенки, ожесточающаяся при кашлѣ, нажатіи и поворачиваніи туловища въ сторону; недѣятельность печени; ощущеніе жара въ животѣ, при поносѣ; судорожная колика; отхожденіе газовъ изъ маточнаго рукава, при вздутіи живота по вечерамъ и раскрытомъ состояніи маточнаго звѣва; выкидышъ; *насморкъ*, сопровождаемый поносомъ и болью въ звѣвѣ и груди; *сильный кашель съ ограничеиною краснотою щекъ*; *боль въ груди при періодическомъ кашлѣ*; воспаленіе легкихъ; боль подъ ложечкою послѣ *надсады*; *ревматическія боли въ затылкѣ, плечахъ и*

рукавъ, охвещающаяся ночью отъ теплоты постели; тугость суставовъ ручной кисти; ногтѣда; ломота бедра, съ раздражающею башою; жженіе въ ступняхъ и ладоняхъ, усиливающееся ночью, въ постели,

Sassapar. — *Sassaparilla*, **Саосапарильный корень.** — Общность его симптомовъ малоизвѣстна, но до-сихъ-поръ его съ пользою употребляли противъ: артритическихъ и ревматическихъ страданій, съ уменьшеннымъ отдѣленіемъ мочи, а также послѣ скрывшагося перелома, или послѣ простуды отъ воды; чувства разлома, особенно въ конечностяхъ; яввъ, происходящихъ отъ злоупотребленія ртути; пота на лбу, также если онъ появляется по вечерамъ въ постели; тошноты въ горлѣ, происходящей отъ вѣтровъ; запора, съ сильнымъ позывомъ на мочеиспусканіе; отдѣленія крови при испраженіи низомъ; почечныхъ камней; каменной болѣзни; слизистыхъ, довольно обильныхъ бѣлей.

Sec. — *Secale cornutum*, **Спорынья, ржаные розжи.** — Трудно пока опредѣлять общій характеръ этого средства, но до-сихъ-поръ оно было употребляемо съ успѣхомъ при слѣдующихъ симптомахъ: судороги верхнихъ и нижнихъ конечностей съ подериваніями; жесткая, сухая, поблеклая кожа; жаръ съ ускореннымъ пульсомъ, безпокойствомъ и бессонницею; малый и сжатый пульсъ; родильная горячка; потъ, начиная отъ головы до предсердія, равно также холодный и клейкій потъ; необыкновенная печаль, меланхолія и тоска, страхъ смерти; бредъ, головокруженіе съ чувствомъ одуренія; слезы глаза; кровотечения изъ носу; слало, шократическое, блѣдное лицо; желтезна лица, съ глубокими, искаженными чертами; пятна на лицѣ; языкъ, обложенный густою, дурнаго цвѣта слизью, коричневатой или вовсе черною; сильная жажда; безгливость при тошнотѣ и позывѣ на рвоту; настоящая рвота принятою пищею и большая слабость; азиатская и спорадическая холера; болѣзненная волчка съ болѣзми въ крестцѣ и бедрѣ и съ частою отрыжкою; рвота и рѣвъ въ животѣ; жженіе въ животѣ, особенно въ сторонѣ салебенки, также въ поясницѣ, въ видѣ постоянной боли; урчанье въ животѣ; поносы съ большимъ упадкомъ силъ, или же водянисто-слизистые, коричневаго или дурнаго цвѣта; поносы послѣ холеры; пріостановленное отдѣленіе мочи; моча горячая, жгучая, малоколиче-

ственная; регулы слишкомъ обильныя, или слишкомъ продолжительныя; напоръ крови къ маткѣ; *кровоотеченія маточная послѣ выкидыша*; отдѣленіе черной, жидкой крови послѣ родовъ, показывающейся особенно при сильномъ движеніи; опухоли и бородавки на полуоткрытомъ маточномъ рыльцѣ; воспаленіе матки въ родильномъ періодѣ, или же во время беременности, послѣ толчка по животу; хроническое воспаленіе матки послѣ скрывшагося родильнаго очищенія, или скрывшихся регулъ; омертвѣніе и гангрена матки; страданія во время беременности; угрожающая опасность выкидыша; неправильныя, слабыя, недостаточныя, или судорожныя потуги; *плотное прикрѣпленіе плаценты*; слишкомъ продолжительное родильное очищеніе, постоянно кровянистое, или слишкомъ малоколичественное и вонючее; значительная красуха на затылкѣ в груди; жестокія судороги въ икрахъ и подошвахъ, появляющіяся ночью.

Seneg.—**Senega**, Многомлечникъ, Сенега. — До-сихъ поръ былъ употребляемъ противъ: болѣзней слизистыхъ оболочекъ, слезотеченій; водяныхъ болѣзней; укушеній ядовитыми животными; особенно приличенъ флегматическимъ, вливымъ, полносочнымъ температурамъ.

Ser.—**Seria**, Карахатица. — Назначается преимущественно при слѣдующихъ явленіяхъ: *страданія капиллярныхъ сосудовъ*; нервныя страданія; вредныя послѣдствія огорченія; вывихныя боли, появляющіяся особенно при напряженіи страдающихъ частей, а также ночью, въ теплой постели; колючія или жгучія боли, стрекотаніе, какъ отъ сокращенія мышцъ; чувство терзанія, съ натяженіемъ снизу вверхъ; чувство дерганія и рвущая боль въ членахъ, появляющаяся днемъ и ночью; скорое онѣмѣніе членовъ; околечность и неглубокость членовъ; *вазменія крови съ ощутительною пульсаціею въ члѣнѣ*; скорое разгоряченіе отъ непродолжительныхъ прогулокъ, сопровождаемое тоскою; *уменьшеніе страданій при сильномъ движеніи, хожденіи на открытомъ воздухѣ, флегмованіи и т. д.*, *появленіе и ожесточеніе ихъ въ спокойномъ сидячемъ положеніи*; усиленіе припадковъ вечеромъ и ночью; *большая чувствительность къ холодному воздуху, особенно къ северному отъру*; необыкновенное расположеніе къ простудѣ, особенно отъ вѣтра; чувство тяжести

жа душѣ и въ тѣлѣ съ затрудненнымъ дыханіемъ; внезапная онѣмѣлость вслѣдствіе огорченія; истерическія припадки слабости; обмороки; зудящая сыпь въ сочлененіяхъ; чесоточная сыпь; пятна на кожѣ керичевыя, красныя, лимфатическія; кольцевидныя лишай; лимфатическія опухоли; большая сонливость днемъ съ позднимъ засыпаніемъ ночью, по причинѣ живости идей; недостатокъ естественной теплоты и дрожь по вечерамъ и на открытомъ воздухѣ; обильный потъ при хожденіи и малѣйшемъ движеніи; печаль съ плачемъ, заботой о своей болѣзни; уныніе и меланхолія; недѣятельность духа и необыкновенное равнодушіе ко всему, даже къ роднымъ; боли одной половины головы съ рвотою; приливъ крови къ головѣ съ жаромъ въ ней; незолное трясеніе головою; сильное выпаденіе волосъ; прыщи въ роговой оболочкѣ глаза; параличъ вѣкъ; начинающаяся темная вода съ расширенными зрачками; чувствительный къ шуму и музыкѣ слухъ; чувство присутствія посторонняго тѣла въ носу и болящая сыпь на кончикѣ его; потеря обонянія; блѣдность лица съ синевой подѣ глазами; болѣзненный видъ съ мутными, красными глазами; желтая пятна на лицѣ и желтая полоса, перехватывающая носъ и щеки болѣзненно дугообразно; черныя угри на лицѣ; желтизна или лишайная сыпь на губахъ и вокругъ рта; отвращеніе отъ всякой пищи, особенно отъ мяса; сильный позывъ на укусъ или вино; чрезвычайный аппетитъ; обжорливость и болѣзненное чувство голода въ желудкѣ; необыкновенная слабость пищеваренія и многія страданія послѣ обѣда; тягостное накопленіе кислотъ въ желудкѣ; накопленіе желудочныхъ мокротъ; біеніе подѣ ложечкою; тяжесть и твердость въ нижней части живота; увеличенный объемъ живота у рожавшихъ; шипетный позывъ на испражненіе, которое происходитъ медленно и неполно, причѣмъ твердый калъ имѣетъ видъ камешекъ; отдѣленіе большаго количества крови при испражненіи; влаготочивость задняго прохода и истеченіе слизи изъ него; текучій геморрой; частое мочеотдѣленіе, даже ночью; непроизвольное мочеиспусканіе въ кровати; мутная моча съ осадкомъ песку, краснаго цвѣта; усиленное половое побужденіе; сладострастныя мысли и постоянная поллюціи и эректіи; необыкновенная слабость послѣ соитія; выпаденіе маточнаго рукава и матки; опрѣлость, язвы и краснота на половыхъ частяхъ; пріостановившіяся регулы; страданія во время мѣсячнаго очищенія; бѣлы съ зудомъ и изъязвленіемъ рукава матки; распо-

ложеиіе къ выкидышу; одышка, при которой спонившаяся слѣнь въ груди не извергается; криливъ крови къ груди и чувство какъ бы кипѣнія въ ней; біеніе сердца, перемешающіеся удары сердца; темноватая патна на груди; красныя патна на шеѣ и шеѣ борода; слушваніе кожицы на ладони; язвы на концахъ пальцевъ, безъ боли; ѣдкій ножной потъ, производящій изъязвленія, а также скрившіяся ножной потъ.

Sil.—Silicea, Кремнеземъ.—Назначается при слѣдующихъ припадкахъ: мышечная слабость у дѣтей, вслѣдствіе которой они долго не начинаютъ ходить; увеличенный объемъ головы и трудно закрывающееся темя; чувство натяженія въ членахъ, съ терзаніемъ и колотьемъ; колотье въ сочлененіяхъ, появляющееся ночью; болѣзненное чувство разлома; какъ-будто отъ неловкаго лежанія въ постели ночью; язвенная боль въ боку, на которомъ больной спитъ; расположеніе къ надсадамъ; подергиванія членовъ днемъ и ночью; эпилептическіе припадки; лѣнивая, тяжелая походка; необыкновенная слабость при умственныхъ занятіяхъ и лѣнность; безпокойство въ тѣлѣ съ волненіемъ крови и жаждою; необыкновенное исхуданіе; *появленіе болящей части припадка во время новолунія или полнолунія*, ощущеніе переменъ погоды въ членахъ и черепѣ; гроза производитъ сильное впечатлѣніе; чрезвычайное расположеніе къ простудѣ; необыкновенная нервная слабость и склонность къ обморокамъ; лимфатическія опухоли и гнойныя накопленія; опухоли железъ съ нагноеніемъ и затвердѣніемъ; скirrosныя затвердѣнія; *доброкачественная и злокачественная карнома*, особенно въ оболочкахъ; *болыная кожа*, такъ что всякое поврежденіе ея трудно залечивается; кровяные чирьи; злокачественныя, гангренозныя чирьи; страданія костей; необыкновенная сонливость днемъ и позднее засыпаніе ночью; безпокойный ночной сонъ съ грезами; многія *ночныя страданія*, говоръ, вскрикиваніе и трепеть тѣла во снѣ; волненіе крови и сильный жаръ; потъ при умѣренномъ хожденіи; *ночныя поты*, тоскливость и дурное расположеніе духа съ необыкновенною нервною слабостію; особеннаго рода *снисходительное расположеніе духа*; затруднительное мышленіе и усталость отъ умственныхъ занятій; головокруженіе и чувство напряженія и давленія въ головѣ, какъ-будто все вываливается изъ нея и черепъ лопається; стукъ въ голо-

вѣ, происходящій отъ прилива крови; ночное потѣніе волосистой кожи; зудящая, влагооточивая парша и шишковатая возвышенія на головѣ; *выпаденіе волосъ*; сосудистый ракъ (*fungus haematodes*), язвы, пятна и рубцы на роговой оболочкѣ; свѣтобоязнь и ослабленіе отъ дневнаго свѣта; помраченіе зрѣнія, такъ что предметы представляются какъ-будто сквозь сѣрое покрывало; *смезанная слезота, песторляющаяся приотунами*; залеганіе въ ухахъ, которое исчезаетъ съ трескомъ; струны, прыщи и язвы въ носу; постоянный насморкъ; опухлость и трещины на кожѣ лица; отвращеніе особенно отъ вареной пшеницы и мяса; чрезвычайный голодъ; многія страданія послѣ нищца; накопленіе мокроты въ желудкѣ и дрожь; рвота послѣ всякаго питья; вздутость, жаръ и напряженіе живота; увеличенный объемъ нижней части живота; *запоръ съ постояннымъ, тщетнымъ позывомъ на низъ и недостаточное и очень твердое испражненіе, въ видѣ бараньяго кала*; сильное возбужденіе похоти съ частыми эрекціями и сладострастными мыслями; *кашель съ иноймъ изверженіемъ*; затруднительное дыханіе при лежаніи на спинѣ, нагибаніи, бѣганіи и кашлѣ; пототѣда; *ножной потъ съ неприятнымъ запахомъ*; скрывшійся *ножной потъ съ послѣдовательнымъ холодежъ въ ногахъ*.

Spig. — Spigelia, Спигелия. — Съ пользою употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: чувство терзанія въ членахъ артрическаго и ревматическаго свойства; припадки обморока, обнаруживающіеся при натугахъ на низъ, или въ теплой комнатѣ; расположеніе къ простудѣ; простудная, слизистая и глистная лихорадка; періодическія, тиническія боли головы; *нервныя боли внутри мазъ или подѣ ними, или въ орбитахъ, съ болью въ глазномъ яблокѣ при движеніи, какъ-будто онъ увеличенъ въ объемѣ*; *колотье въ глазахъ, простирающееся до головы, съ невыразимою болью*; воспаленіе глазъ и краевъ вѣкъ съ изъязвленіемъ ихъ; тусклый, мутный видъ глазъ; особенное желаніе моргать глазами; опущеніе верхняго вѣка; какъ бы отъ паралича; необыкновенная чувствительность къ свѣту; слабость глазъ въ такой степени, что они останавливаются неподвижно на томъ мѣстѣ, на которое больной ихъ обращаетъ; *блескъ молніи передъ глазами*; темная вода; сѣрое бѣльмо; періодическая глухота; *блѣдное, искаженное лицо съ желтизною вокругъ мазъ*; попережѣнная блѣдность и тем-

ная краснота щекъ и губъ; боли лица, не переносящія малѣйшаго прикосновенія или движенія, съ блестящею опухолью больной стороны; боли зубовъ одновременно съ болями лица; необыкновенный голодъ съ тошнотою и жаждою; тошнота, съ чувствомъ, какъ-будто что изъ желудка восходитъ къ горлу; страданія отъ глистовъ; присутствіе круглыхъ глистовъ въ первыхъ путяхъ; аскариды въ прямой кишкѣ; гриппъ, одышка; очень затруднительное дыханіе, когда больной поворачивается въ постели, причемъ можетъ лежать только на правомъ боку и не иначе, какъ на высокомъ изголовьи; удушье при малѣйшемъ движеніи, особенно при поднятіи рукъ; внезапные припадки удушья съ тоскою и сердцебиеніемъ; судорожное чувство въ груди, начинающееся съ подложечки, съ приостановленіемъ дыханія; грудная водянка при органическихъ страданіяхъ груди; сердцебиеніе, ощущаемое снаружи и замѣтное черезъ одежду; волнообразное движеніе сердца; удары сердца, несоотвѣтствующіе ударамъ пульса; колотье около сердца; урчаніе въ груди, особенно около сердца, похожее на жужжаніе пралки; воспаленіе сердца; органическіе пороки сердца; аневризмы сердца или большихъ сосудовъ.

Spong.—*Spongia tosta*, **Жженая губка.**—Употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: страданія лимфатическихъ сосудовъ и железъ, съ опуханіемъ и затвердѣніемъ; жаръ, сухая горячая кожа съ постоянною жаждою, болью головы и бредомъ; чувство давленія и стучанья въ головѣ; приливъ крови къ головѣ съ замѣтнымъ біеніемъ шейныхъ артерій; краснота глазъ съ чувствомъ жженія и слезотеченіемъ; горькій вкусъ въ горлѣ; частая отрыжка съ рвѣзью и терзающими болями въ желудкѣ; твердое, замедленное испражненіе на низъ; частый позывъ на мочеиспусканіе съ малоколичественнымъ отдѣленіемъ; воспаленіе яичекъ съ распуханіемъ; затвердѣніе яичекъ; боль въ гортани при поворачиваніи и прикосновеніи къ желудку; чувство залеганія въ горлѣ съ затруднительнымъ дыханіемъ; жженіе въ гортани и дыхательныхъ вѣтвяхъ; сухость, нечистый голосъ и осиплость; воспаленіе гортани и дыхательныхъ вѣтвей; перепончатая жаба; горловая чихотка; кашель, исходящій изъ глубины груди, съ язвенною болью и жженіемъ, или продолжительный кашель съ изверженіемъ мокроты желтаго цвѣта и осиплость; свистъ при вдыханіи; свистящее дыханіе; удушье съ прекращеніемъ регулъ; зобъ. •

Squill.—*Squilla maritima*, Морской лукъ. — Употребляется противъ: усталости, чувства тяжести въ тѣлѣ, водянки, затвердѣннѣ железъ, бессонницы и беспокойнаго сна, жара въ тѣлѣ съ дрожью при малѣйшемъ раскрытїи, блѣдности лица послѣ исчезанїя жара, темной красноты лица.

Stap.—*Stannum*, Олово. — Назначается при слѣдующихъ явленїяхъ: необыкновенное расслабленїе души и тѣла; неслучайное беспокойство во всемъ тѣлѣ; судороги; истерическія или эпилептическія корчи у дѣтей во время прорѣзыванїя зубовъ; припадки падучей болѣзни съ выворотомъ большихъ пальцевъ; чрезвычайное исхуданїе; вечерняя дрожь; жгучїй жаръ въ членахъ, особенно въ рукахъ; горячїй потъ, распространяющїйся по всему тѣлу отъ малѣйшаго движенїя, при совершенномъ изнеможенїи; обильные поты каждое утро; медлительная лихорадка, уныніе и плаксивость; больной отвѣчаетъ неохотно и отрывисто; тяжесть въ головѣ и одуряющее давленїе въ мозгу; *блѣдное и осунувшееся лицо съ глубоко опалыми глазами*; болѣзненно вытянутое лицо; лицевыя боли; рыхлость и ошущенїе удлиненїя въ зубахъ; красный языкъ; тошнота послѣ пищи; рвота непереваренной пищею послѣ сильной тошноты; славмы желудка съ горькою отрыжкой, тошнотою и болѣзненная блѣдность лица; истерическія и ипохондрическія судороги нижней части живота; тщетный позывъ на низъ; сильный поносъ; частый позывъ на мочеиспусканїе съ обильнымъ отдѣленїемъ мочи; бѣли съ необыкновенною потерей силъ; чувство шероховатости въ гортани и осиплость; накопленїе слизи въ дыхательныхъ вѣтвяхъ; потрясающїй, глубокий кашель съ чувствомъ разлома подъ ложечкою, или удушливый кашель и рвота пищею; *кашель съ обильнымъ отдѣленїемъ слизи*; извергаемая мокрота желтая, соленоватая или гнилаго вкуса; захватыванїе дыханїя ночью, въ лежачемъ положенїи, или днемъ при всякомъ движенїи; давящая тяжесть въ груди съ чувствомъ недостаточнаго дыханїя и пустоты въ подложечкѣ; звенная боль, чувство слабости и пустоты въ груди, особенно если ти припадки появляются послѣ разговора или изверженїя мокроты; грудная водянка.

Staph. — *Staphyragia*, Соколка, Гнидникъ. —

Назначается при слѣдующихъ явленіяхъ: цыготныя страданія; *средняя послѣдствія опорченія, печали, хлопотъ и безпокойства*; истерическія и ипохондрическія страданія; боли въ костяхъ; воспалительныя боли; чувство натяженія въ сочлененіяхъ, преимущественно при неудобномъ положеніи членовъ; терзающія боли съ натяженіемъ въ мышцахъ; окоченѣлость суставовъ, обнаруживающаяся по утрамъ при вставаніи; болѣзненное чувство разбитости во всемъ тѣлѣ, какъ бы отъ долгаго путешествія пѣшкомъ; повсемѣстное ощущеніе боли, какъ въ мышцахъ при дотрогиваніи, такъ и въ сочлененіяхъ при движеніи; постоянное желаніе лежать; красуха съ ночными подергиваніями; лишавенными и чесоточныя сыпи; болѣзненная кожа, поврежденія которой упорно лечатся; часто появляющіяся кровяныя чирьи; распуханіе железъ; затвердѣніе и припуханіе костей; сонливость днемъ до такой степени, что глаза сами смыкаются; бессонница; вечерняя лихорадка, состоящая изъ одного озноба; большое расположеніе къ поту, или неспособность потѣть даже при весьма сильномъ напряженіи тѣла, причѣмъ блѣдный цвѣтъ лица и головная боль; холодный потъ на лбу и на ногахъ; печаль и необыкновенная плаксивость; *печальное расположеніе духа и плачь*; необыкновенное равнодушіе, или ипохондрическое желаніе смерти; *больной съ досады бросаетъ все, что попадается подъ руки*; притупленіе ума, препятствующее заниматься; чешуйчатая сыпь и парша на волосистой кожѣ, съ сильнымъ зудомъ, или влаготочивая сыпь съ дурнымъ запахомъ; *отпаденіе волосъ*; угловатости на краяхъ вѣкъ; тупость слуха отъ увеличенія миндалевидныхъ железъ; насморкъ съ являвленіемъ поздрей; *лицо измуренное, съ глубокоопавшими глазами, какъ послѣ дальнихъ ночныхъ закатій, или душевныхъ потрясеній*; синева вокругъ внутреннихъ глазъ, какъ послѣ чрезвычайныхъ излишествъ; багровый и синій цвѣтъ лица отъ досады; воспалительныя боли въ костяхъ лица; звынки на губахъ съ рвущою и ватагивающею болью; опуханіе десенъ и угловатость на нихъ; горькій вкусъ пищи; необыкновенный голодь даже при полномъ желудкѣ, съ накопленіемъ желудочныхъ мокротъ; повылъ на жидкую пищу; чувство слабости въ желудкѣ, какъ-будто онъ отпадаетъ; увеличенный объемъ живота у дѣтей; распуханіе паховыхъ железъ; *запоръ и замедленное испражненіе на низъ, отъ недостатка перистальтиче-*

состо демосенія; кровавый поносъ; частый позывъ на мочу съ каплеобразнымъ отдѣленіемъ; *умеленное возбужденіе похоти*; ночныя эрекции и поллюціи съ сладострастными *сновидѣніями*; осиплость съ трудностію отхаркиванія слюны; кашель съ изверженіемъ желтой, гноевидной слюны; судороги грудобрюшной преграды, происходящія отъ огорченія.

Stram.—**Stramonium, Дурманъ.**—Назначается при слѣдующихъ явленіяхъ: болѣзненное чувство, будто члены разна.д въ сочлененіяхъ; свербѣжъ въ членахъ и онѣмѣніе; судорожныя движенія и конвульсіи при взглядѣ на блестящія свѣтлыя предметы; подергиванія въ видѣ толчковъ; эпилептическія подергиванія; конвульсіи, похожія на эпилептическія, но безъ потери самосознанія; параличъ членовъ; дрожаніе; необыкновенная охота лежать; слабость тѣла съ шаткостію членовъ при ходженіи и стояніи; обморокъ съ крапивнымъ дыханіемъ, необыкновенною блѣдностію лица и наступающею послѣ обморока потерей аппетита; сонливость днемъ; *при пробужденіи больной принимаетъ важную, торжественную физіономію*; глубокій, крѣпкій сонъ съ крапивіемъ, крѣпкіемъ, кровавистою пѣною изо-рта и темнокофейнаго цвѣта лицомъ; *меланхолія съ оселаніемъ общества, солнца и солнечнаго сіянія, потому что отъ темноты и одиночества становится хуже*; печаль съ мыслями о смерти и плачемъ; страхъ и чувство одиночества; припадки бѣшенства съ сильнымъ напряженіемъ силъ; тупоуміе; притупленіе внѣшнихъ чувствъ и нечувствительность къ впечатлѣніямъ; страшное мерещенье безобразныхъ животныхъ; болливый бредъ; сумасшествіе, выражающееся гордостію и благородными тѣлодвиженіями; постоянный переходъ отъ смѣшныхъ къ печальнымъ движеніямъ; сильная головная боль съ потемнѣніемъ зрѣнія и тупостію слуха; сверкающіе глаза, пристально устремленные на одинъ предметъ, и расширенныя зрачки; обманы зрѣнія, блѣдность лица; *искривленная черта лица, какъ-будто отъ сильной боли, или смущенная отъ страха и тоски, съ глубокими складками и морщинами на лбу*; краснота лица съ неподвижными глазами; распуханіе лица съ приливомъ крови и добрымъ выраженіемъ; синева в припуханіе губъ; языкъ кажется парализированнымъ, отчего являются шепелявость и занкаиье; судорожное стягиваніе глотки и *отращеніе отъ воды и всякой кислоты*; сильная

икота; испражненія съ замахою животной гнили; приостановленное отдѣленіе мочи; похотливость и безстыдство; судороги въ груди.

Sulph. — Sulphur, Сѣра.— Назначается при слѣдующихъ припадкахъ: боли въ членахъ съ безсиліемъ и коченѣlostію, колотьемъ въ сочлененіяхъ и онѣмѣlostію; чувство жестокаго натаженія и терзающихъ болей, усиливающееся на мягкой постелѣ до невыносимаго; наружная теплота облегчаетъ, а холодъ усиливаетъ боли; страданія, появляющіяся только при покоѣ и исчезающія при движеніи страдающей части или при хожденіи; усталость въ тѣлѣ и усиленіе болей отъ разговора; помѣненіе или усиленіе страданій ночью; скорое онѣмѣніе членовъ; большое расположеніе къ простудѣ; необыкновенная чувствительность къ сырости и открытому воздуху, и отвращеніе отъ умыванія; боли при пережвѣнѣ погоды; сильное волненіе крови и безпокойство, съ вадуваніемъ венъ на рукахъ; сотрясеніе въ тѣлѣ; припадки надучей болѣзни послѣ испуга или скорого бѣгавія; дрожаніе членовъ, особенно рукъ; невѣрная походка съ согнутымъ туловищемъ; слабость мышцъ у дѣтей, вслѣдствіе чего они поздно начинаютъ ходить; необыкновенное исхуданіе; сны, похожія на часотку, и сны какъ послѣ коровьей оспы; меченочная пятна; родимыя пятна; трещины на кожѣ; болѣзненная кожа, вслѣдствіе чего поврежденія ея упорно излечиваются; опрѣлости кожи; ознобленія; кровоточивыя язвы; страданія железъ и костей; блѣдная немочь; гидрочическое состояніе; красныя, горчичія или блѣдныя, напряженныя опухоли; необыкновенная сонливость днемъ и позднее засыпаніе вечеромъ, съ частымъ пробужденіемъ; бодрость во все продолженіе ночи; во время сна трепетаніе и подергиванія членовъ, давленіе во снѣ и громкій говоръ; чувство холода, зябкость и онемобъ; потъ легко появляется въ сидячемъ положеніи, при чтеніи, писаніи, разговорѣ и при мажѣннѣмъ движеніи; обильный ночной потъ; меланхолия и плаксивость, раздраженіе, всмыльчивость и сосредоточеніе въ самою себя; страсть къ философствованію и религіозной мечтательности; стучаніе въ головѣ по утрамъ, вечеромъ или ночью въ постели; приливъ крови къ головѣ и часто летучій жаръ въ лицѣ; парша на головѣ; боли въ корняхъ волосъ, особенно при дотриваніи; выпаденіе волосъ; склоненіе головы при хожденіи; язвы на краяхъ вѣкъ; невозможность перенос-

силь солнечный свѣтъ; блѣдность лица съ одутловатостью; желтоватый, блѣдный, страдальческій видъ, какъ бы послѣ долгой болѣзни; синевы подъ глазами; ограниченная краснота щекъ; жаръ въ нѣрѣ съ красными пятнами; лишай надъ носомъ и въ ямъ; жесткость и краснота кожи лица; черныя поры на носу, губахъ и подбородкѣ; чувство шаткости зубовъ, которыя кажутся такъ высокими, что больной едва можетъ ими жевать; припухлость десенъ; молочница; сладкій вкусъ во рту; чрезмѣрный голодъ; страданія отъ накопленія кислоты въ желу^(т)дѣ; восхожденіе пищи, какъ у порежеывающихъ жвачку, и изжога; накопленіе мокроты въ желудкѣ; чувство давленія въ желудкѣ, какъ отъ комка; судорожная колика съ болью въ животѣ, отъ геморроя или отъ отравы; застой крови въ животѣ; продолжительный запоръ; недостаточное испраженіе пивомъ; бѣловато-слизистыя испраженія; изверженія непереваренной пищи; геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; болѣзненное мочеиспусканіе съ каплеобразнымъ, скуднымъ отдѣленіемъ; невольное мочеиспусканіе во время сна; опрѣлость въ складкахъ кожи, особенно при хоженіи; мужское безсиліе, или же возвышенная половая способность; частыя помятціи; давно пріостановившіяся мѣсячныя очищенія; слишкомъ блѣдныя мѣсячныя крови; бѣла, производящія изъязвленія половыхъ частей и сопровождаемыя жгучею болью; ослизеніе въ горлѣ и груди; слабость груди при разговорѣ; припадки удушья ночью, во время сна; чувство тяжести въ груди, какъ отъ давящаго комка; сильный приливъ крови къ груди съ волненіемъ крови; боли въ крестцѣ; ногтида; холодъ нижнихъ конечностей до того сильный, что онѣ даже въ постели не согрѣваются.

Sulph.-ac.—Sulphuris acidum, Сѣрная кислота.—

Съ пользою употребляется противъ: зуда по всему тѣлу; пятенъ на кожѣ, красныхъ или синеватыхъ, какъ отъ подтековъ крови; изъязвленій кожи съ гангренознымъ нагноеніемъ; слѣдствій механическихъ поврежденій, толчка, давленія, ушиба и т. д.; слизистой чахотки; тоскливаго и грустнаго настроенія духа и малодушія, перемежающагося возбужденнымъ состояніемъ духа; сѣдѣнія и выпаденія волосъ; хроническихъ воспаленій глазъ; притупленія слуха съ чувствомъ, какъ-будто ухо закрыто листомъ; молочницы во рту; кислоты въ горлѣ и изжоги; слишкомъ продолжительныхъ,

равно какъ и слишкомъ раннихъ регулъ; оснплости; насморка и позыва на кашель, или сухости и шероховатости въ горлѣ и надгортанномъ хрящѣ; кровохарканія и встарѣлаго кашля.

Tart. — *Tartarus emeticus*, Рвотный камень. — Съ пользою употребляется противъ: прыщевой сыпи; осипи; большой сонливости; сыпки; перемежающейся лихорадки съ сильною жаждою и бессонницею; кроваваго удара; блѣдности лица съ страдальческимъ выраженіемъ; позыва на рвоту; рвоты, сопряженной съ поносомъ и слабостію; кислой рвоты пищею; давленія въ желудкѣ и подъ ложечкою; стучанія и біенія въ желудкѣ; воспаления желудка; боли живота съ сильнымъ безпокойствомъ тѣла и духа; поносовъ, которымъ предшествуетъ рѣзь въ животѣ, съ испраженіемъ слизистымъ или темножелтымъ; чувствительности гортани при прикосновеніи; переполчатой жабы; оснплости; катарра съ слизистымъ хрипомъ въ дыхательныхъ вѣтвяхъ; кашля, сопровождаемаго чиханьемъ или рвотою, или затрудненнымъ дыханіемъ, какъ при удушливомъ кашлѣ; паралича легкыхъ; удушливаго катарра.

Thuja. — *Thuja occidentalis*, Негіючка, Дерево жизни. — Средство это не только уснпшно дѣйствуетъ противъ смоковидныхъ наростовъ (на половыхъ частяхъ), но также незамѣнимо во многихъ другихъ случаяхъ, преимущественно, гдѣ представляются слѣдующіе признаки: *терзаніе и стучаніе съ страждущихъ частяхъ, какъ-будто онѣ изгязвлены*; колюще въ членахъ и суставахъ; онѣивніе членовъ, особенно ночью, въ постели; ощущение, какъ-будто все тѣло становится тонкимъ и подвергается опасности распасться или разрушиться; усиленіе припадковъ съ жохъ и съ теплоты, особенно съ постели; облегченіе при движеніи, въ холодѣ и при отдѣленіи пота; ожесточеніе многихъ страданій въ послѣобѣденное время и ночью къ 3-мъ часамъ по полуночи, или вечеромъ, что мѣшаетъ больному заснуть; многіе припадки, по видимому, начинаются съ лѣвой стороны; вредныя послѣдствія разгоряченія, употребленія чая, жирной пищи и лука; сильное волненіе крови съ біеніемъ всѣхъ артерій; растяженіе подкожныхъ венъ; сыпь, похожая на летучую оспу и окруженная большими кругами; темная или мраморная пятна на кожѣ; кровавыя чирьи; ознобленія; смоковидные наросты; жаръ съ жаждою и сильно

возбужденное состояніе духа; безпокойство, причежъ все кажется противнымъ и скучнымъ и производить отвращеніе къ жизни; медленность въ размышленіи и въ разговорѣ, — больной прискивается слова для выраженія своей мысли; боль головы съ чувствомъ, какъ-будто въ маковку вколачиваютъ гвоздь; чувствительность волосъ къ прикосновенію; красно-кровоной цвѣтъ бѣла глаза; слезотеченіе изъ глазъ на открытомъ воздухѣ; чувство напряженія и натяженія въ носовыхъ костяхъ; изъязы и болящіе струпы въ глубинѣ носа; сморканье кровью; жаръ и краснота лица; молочница; припуханіе слюнныхъ железъ; опухоль подъ языкомъ; чувство сытости даже послѣ незначительнаго количества пищи; желаніе холодной пищи и питья; промѣглая отрыжка послѣ жирной пищи; боли какъ-будто отъ спутыванья и свиванія кишекъ; чувство выталкиванія брюшныхъ мышцъ изнутри кутроуши; чувство движенія чего-то живаго въ нижней части живота; завалы въ нижней части живота; запоръ на низъ, происходящій отъ недальности кишекъ; частое и обильное отдѣленіе мочи, которому предшествуетъ сильный позывъ, заставляющій больного ночью вставать съ постели; моча водянистая, свѣтлая; чувство истеканія жидкости въ мочевоомъ каналѣ; круглая, плоскія, нечистыя язвы на головкѣ мужскаго члена; смоквоводныя бородавки, особенно роговидныя или влаготочивыя, гнойныя и зудящія; постоянныя эрекции и поллюціи, съ чувствомъ суженія мочевого канала; истеченіе простатической влаги; нарости на маточномъ рыльцѣ, похожія на бородавки; колотье въ груди послѣ холоднаго питья; сильное сердцебиеніе, особенно при восхожденія на лѣстницу; чувствительность въ сторонѣ сердца; снєва кожи около ключицъ; бородавки на рукахъ.

Val.—**Valeriana, Маунъ, Валдырьянъ.**—Назначается при слѣдующихъ припадкахъ: подергывающія и потрясающія боли, съ натяженіемъ въ членахъ и костяхъ; внезапныя летучія боли; усиленіе страданій по вечерамъ, послѣ стола и въ покое, особенно послѣ движенія, и облеченіе при движеніи и треніи; сыпь въ видѣ бѣлыхъ, твердыхъ шишекъ; болызненная раздражительность нервовъ и возвышенная воспримчивость всѣхъ чувствъ съ дрожаніемъ; необыкновенное безпокойство и боязливость; сильное возбужденіе духа съ обманамъ чувствъ; необыкновенная боязливость, ипохондрическая тоска и отчаяніе; частая пустая отрыжка; вкусъ во

рту, какъ бы отъ промзглаго сала; язвенная боль и судорожное чувство растяженія въ животѣ.

Veratr. — *Veratrum album*, Вѣлая чемерица. — Назначается при слѣдующихъ принадлежкахъ: вредныя послѣдствія страха и испуга, или огорченія и гнѣва; *примадки боли, причиняющіе на короткое время бредъ и бѣшенство*; болѣзненное чувство разбитости въ членахъ и особенно въ костяхъ, или давящая боль въ членахъ; *боль въ частяхъ, на которыхъ лежишь, какъ-будто постель жестка*; парализная боль, какъ бы послѣ сильной усталости и истощенія; *боли въ членахъ, не переносимыя теплой постелью, уменьшающіяся при вставаніи, а при хожденіи совершенно исчезающія и болшею частію появляющіяся по утрамъ*; усиленіе страданій осенью и весной при дурной, холодной погодѣ; усиленіе болей при разговорѣ другихъ; дрожаніе членовъ съ сердечною тоскою и склонностію къ обморокамъ; потрясенія, или какъ-будто электрическіе удары и подергиванія, съ сильнымъ потомъ; судороги и конвульсіи съ загибаніемъ ладоней и подошвъ; каталептическое состояніе съ скатіемъ члвстей; общее искуданіе; *парализная слабость и склонность къ обмороку, при малѣйшемъ движеніи*; *поблеклость и потеря упругости въ кожѣ*; сонъ туманный, или полудремота, или же продолжительный непрерывный сонъ; *чувство холода во всемъ тѣлѣ, съ холоднымъ, клейкимъ потомъ*; жаръ въ лицѣ съ краснотою и дрожью; пульсъ медленный и почти незамѣтный; потъ днемъ, при малѣйшемъ движеніи; *сильная тоска, зависящая какъ-будто отъ нечистой совѣсти, или отъ предстоящаго несчастія*; боязнь съ крикомъ и безпокойствомъ, бѣганьемъ въ разныя стороны; настроеніе духа, въ которомъ больной старается открывать и выставлять чужіе пороки; ярость, шумливость и бранчивость; *помышлятельство на ревни, или любви, съ странными и глупыми выходками*; болѣзненное чувство разбитости въ мозгу, чувствительность волосистой кожи и чувство холода *въ темени, какъ-будто на головѣ лежитъ кусокъ льда*; холодный потъ на лбу; парализъ и отяжелѣніе вѣкъ; ночная слѣпота, начинающаяся въ сумерки; красныя пятна на носу; *холодное, мертвое и искаженное лице съ заостреннымъ носомъ и впадинами щекъ*; сипіе круги подъ глазами; синеватое или желтоватое лице; розовая смѣль на лицѣ, вокругъ рта и на подбородкѣ; сухія, черно-

ватня, растрескавшіася губы; сжатіе челюстей; истеченіе слизи и пѣны изо-рта; языкъ красный и припухшій, или сухой, черноватый, растрескавшійся; сильный позывъ на овощи, кислое; *необыкновенная прожорливость и чрезвычайный холодъ*; неутолимая жажда къ холодному питью; накопленіе желудочныхъ мокротъ; рвота веществами чернаго цвѣта; рвота съ поносомъ и чувствомъ давленія подъ ложечкою; *необыкновенная болѣзненная чувствительность предсердія и створота желудка и сильная тоска въ подсердечной ямкѣ*; рѣзь въ животѣ, какъ отъ ножей, или жжение, какъ отъ горячихъ угольевъ; *продолжительный запоръ отъ недѣятельности кишокъ*; испражненія зеленаго цвѣта, водянистыя съ хлопками, коричневатая, или черноватая; припадки удушья, зависящіе отъ судорожнаго сжатія гортани; сильное сердцебиеніе и *необыкновенная тоска въ сердцѣ*; свербѣжъ въ рукахъ и пальцахъ; ледяной холодъ въ ногахъ.

Zinc. — **Zincum**, **Цинкъ.** — До-сихъ-поръ еще мало употреблялся, однако съ успѣхомъ назначался противъ: нечувствительности тѣла, чувства холода въ костяхъ; сыпей острыхъ и хроническихкихъ; лишаявъ и лишайныхъ язвъ; трещинъ на кожѣ; сонливости и лѣности утромъ, или тотчасъ послѣ обѣда; громкаго вскрикиванія и разговора во время сна; грезъ и страшныхъ видѣній; потливости днемъ; ночныхъ потовъ; нерасположенія къ занятіямъ, работѣ и ходьбѣ; *необыкновенной забывчивости и слабости памяти*; извѣнной боли и жужжанія въ головѣ; боли въ волосяной части головы, какъ отъ подкожнаго възъязвленія; опаденія и паралича верхнихъ вѣкъ; чувствительности съ извѣнною болью въ зубахъ; болящихъ десенъ, какъ отъ възъязвленія; синеватыхъ лишаявъ на шеѣ, появляющихся послѣ дурно измеченнаго переломъ; напряженія въ боковыхъ частяхъ брюха; накопленія вѣтровъ, которые выдавливаютъ кнаружи геморроидальныя шишки; запора на нивъ; жидкаго испражненія и поноса; задержанія мочи; непроизвольнаго испусканія мочи при хожденіи, кашлѣ и чиханьѣ; мочевыхъ и почечныхъ камней; слишкомъ скорого отхожденія сѣмени, сильныхъ эрекцій; бѣлей, которымъ предшествуетъ рѣзущая боль въ животѣ; судорожнаго удушья, напряженія въ грудной кости; сердцебиенія и толчковъ въ сердцѣ съ перемежающимися ударами и затрудненіемъ дыханія; болей въ крестцѣ.

СПИСТИТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ

СТАТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ РУКОВОДСТВѢ ПО АЛФАВИТНОМУ ПОРЯДКУ.

I. Общее. А. *Тѣлосложеніе*, куда также относятся возрастъ, полъ и темпераментъ; *причины болѣзней*; *обстоятельства*, при которыхъ страданія ожесточаются; *обстоятельства* благопріятствующія улучшенію болѣзненнаго состоянія; *душевная потрясенія*; *простуда*; *скрышіяся* отдѣленія и сыпи; *механическія поврежденія*; *жаръ* и дурныя отъ него послѣдствія; страданія влѣдствіе употребленія различной пищи и питья; *разстройство желудка*, *страданія отъ злоупотребленія спиртными напитками*, періодъ развитія и сопутствующія ему страданія; *отравленія*, въ особенности квасцами, мышьякомъ; *слинльная кислота*; *свинець*; *злоупотребленіе хинной корки*; *вредные газы*; *жировой ядъ*; *древесный уксусъ*; *ядовитый медъ*; *злоупотребленіе іода*; *злоупотребленіе кофе*, *камфоры*, *ромашки*; *мѣдъ*, *отравленіе ею*; *злоупотребленіе ртути*; *сокъ мака*, *наркотизмъ*; *фосфоръ*; *вредные грибы*, *шафранъ*, *нашатырь*, *азотнокислое серебро*; *неумѣренное употребленіе поваренной соли*; *сассапарильный корень*; *сѣрная печень*; *злоупотребленіе сѣри*; *волчье лыко*; *шпанскія мушкетеры*; *дурманъ*; *злоупотребленіе табаку*; *чай*, *спиртъ*, *олово*.

В. *Омертвѣніе нѣкоторыхъ частей*, *растяженіе*, *аневризмы*, *примемъ кровъ*, *полнокровіе*, *малокровіе*, *кровотеченія*, *волненія кровя*, *воспаленіе*, *костоѣда суставовъ*, *водянна суставовъ*, *ломота*, *бамъ членахъ*, *страданія костей*, *судороги*, *параличи*, *контрактуры*, *полпы*, *рахитизмъ*, *ревматизмъ*, *бальменное отдѣленіе слизи*, *припадки боли*, *цынга*, *волотуха*, *туберкулы*, *типическія страданія*, *водянка*.

С. Истуданіе, усталость, слабость, сухотка золотушныхъ дѣтей, недостатокъ испарины, *неохота къ деижению*, синиха, дѣвичья (блѣдная) немочь, эклампсія, падучая болѣзнь, ожирѣніе, желтуха, катаlepsія; *болѣзни дѣтей; отерашеніе озо сѣткою воздуха*, старческое истощеніе, *нервная слабость*, обморокъ, мнимая смерть, кровавой ударъ (апоплексія), *слабость*, чахотка, лѣньность, жаловкость, пилса св. Витта, водобоязнь отъ укушенія бѣшеною собакой, глистяня страданія, дрожь, водобоязнь вслѣдствіе чувствительности кожи къ сырости.

II. Волѣвани возжи и наружныя страданія. **А.** Ползаніе мурашекъ, угри, проказа, острія сыпи, *оспа*, *кровоные мушеры*, *кровоная язва*, кровавые наривы, экцема, немлхорадочныя накожныя сыпи: *мишайная*, *пятнистая*, *фагаденическая*, *просовидная сыпь*; *поясная рожа*; *зудъ въ кожѣ*; *чесотка*, *лишай*, *корь*, *крапивная сыпь*, *чума*, *resphigus*, *пурпурная*, *просовидная сыпь*; *естһута*, *красуха*, *скарлатина*, *ложная оспа*, *guria*, *impetigo sифилитическая*, *варіолоиды*, *сыпи на мши*, *парша*, *лишай дѣтородныхъ женскихъ губъ*; *лишай подбородка*.

В. Наросты, жировая опухоль, ознобленія, *крибовидный наростъ* сустава, полипы, бугорки, родинки, *смоквовидные наросты*, *бородки*.

С. *Наривы*, *омертвѣніе*, *болѣзнь жезель*, *нагноеніе*, *опухоль*, *язвы*, *трещины*, *отвердѣніе кожи*, *подкожная водянка*, *укушеніе насѣкомыми*, *болѣзнь ногтей*, *ногтоѣда*, *отекъ*, *рожа*, *цынга*, *золотушная болѣзнь*, *отвердѣнія*, *механическія поврежденія*, *ссадины на коожь*.

Д. Синиха, блѣдная немочь, кровавый потъ, желтуха, *вшиность*, *краснота кожи у новорожденныхъ*, *водянка*.

III. Волѣзненныя измѣненія она. Чувство давленія во снѣ, зѣвота, *болѣзненный сонъ*, *бессонница*, *сонливость*, *сновидѣнія*.

IV. Лихорадка. *Горячка*, *лихорадка* гастрическая (слизи стал и желчная), катарральная и ревматическая; *первая горячка* (тифъ); *чума*; *болѣзненный*, *лихорадочный потъ*; *недостатокъ теплоты*; *перемежающаяся лихорадка*; *зубная лихорадка* (см. *болѣзнь дѣтскія*), *внуירתельная лихорадка*.

V. Страданія душевныя. Тоска, слабоуміе, бредъ, слабость памяти и мышленія; потрясенія и страданія душевныя; тоска по роднѣ, ипохондрія, истерика, несчастная любовь, мазантропія; болѣзни отъ неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ; *умніе, наклонность къ самоубійству, уполномощательство.*

VI. VII. Болѣзни головы и мозга. Бредъ, воспаленіе мозга, сотрясеніе мозга, утомленіе головы; приливы крови къ головѣ; боли головы, кровавой ударъ (аневризма), головокруженіе.

VIII. Поверхность головы. Роднички поздно закрывающіеся; увеличенный объемъ головы; выпаденіе волосъ; парша на головѣ; колтуны.

IX. Болѣзни глазъ. Кровотеченіе изъ глазъ, воспаленіе глазъ, слезотеченіе изъ глазъ, ракъ глаза, воспаленіе вѣкъ, судороги вѣкъ, параличъ вѣкъ, *мазныя боли, слабость и измѣненія зрѣнія,* уменьшеніе глазъ, гнойоточивость глазъ, меншее зрѣніе, ячмень на вѣкахъ, близорукость, свѣтобоязнь, куриная слѣпота, косоглазіе, бѣльмо сѣрое и зеленое, способность глаза видѣть только днемъ, свищъ слезной железы, дальновзоркость.

X. Ушныя болѣзни. Глухость слуха, болѣзненная острота, раздражительность слуха, воспаленіе околоушныхъ железъ, лишай на ухахъ, стрѣльба и боли въ ухахъ, ушные полипы.

XI. Болѣзни носа. Потеря обонянія, слишкомъ тонкое обоняніе, кровотеченіе носомъ, нагноеніе въ носу, опухоль носа, ракъ въ носу, полипы въ носу, насморкъ.

XII. Лицо. Опухоль щекъ, сыпь на лицѣ; *цѣтлы;* рожа на лицѣ; *лицевыя боли;* сжатіе челюстей, лишай на подбородкѣ, опухоль губъ.

XIII. Зубы. Болѣзни десенъ, боль зубная, прорѣзываніе зубовъ у дѣтей (см. дѣтскія болѣзни).

XIV. Полость рта. Опухоль подъ языкомъ, кровотеченіе изъ рта, гнилость рта, вонь изъ-рта, молочница, слюнотеченіе, пороки рѣча, болѣзни языка.

XV. Шея и глотка. Воспаленіе горла, жаба, трудное глотаніе, воспаленіе гѣба, воспаленіе пищевода и гортани.

XVI. Вкусъ и аппетитъ. Потеря аппетита, прихотливый аппетитъ, измененія вкуса, потеря вкуса; болѣзненный голодъ, расстройство желудка вслѣдствіе неумѣренности.

XVII. Гастритизмъ. Кровавая рвота, холера и холерина, рвота и тошнота, *гастрическія* (и желчныя) страданія, *пищевареніе слабое*, неота, изжога и отрыжка.

XVIII. Болѣзни желудка. Воспаленіе желудка и кишекъ, воспаленіе желудка, размигченіе желудка, судорога и боли желудка.

XIX. Подреберья. Воспаленіе печени, отвердѣніе печени, воспаленіе селезенки, воспаленіе грудобрюшной преграды.

XX. Животъ и нижняя его часть. Вадутіе живота, приливъ крови къ брюшнымъ внутренностямъ, воспаленіе брюшныхъ внутренностей, воспаленіе брюшнымъ, боли живота, бугорки брюшныхъ внутренностей, водянка брюшная, накопленіе жира въ животѣ, заворотъ кишекъ, раздутіе живота, грыжи, паховыя.

XXI. Испражненіе на нивъ и задній проходъ. Кровотеченіе изъ задняго прохода, зудъ въ заднемъ проходѣ, поносъ, холера и холерина, геморрой, свищъ задняго прохода, выпаденіе кашки, кровавый поносъ, запоръ, глестная болѣзнь.

XXII. Моча и болѣзни мочевыхъ путей. Катартъ мочевого пузыря, воспаленіе его, геморрой, сказы, параличъ, полипы, отолщеніе; *болѣзни мочеотдѣленія*, мочевоы свищъ, кровотеченіе изъ мочевого канала, воспаленіе его, перелой, суженіе, кровавая моча, задержаніе мочи, воспаленіе почекъ, почечные камни, каменная болѣзнь.

XXIII. Мужскія половыя части. Перелой, воспаленіе яичекъ; *половая похоть*, способность оплодотворенія; грыжи, затвердѣніе, незалуца, воспаленіе предстательной железы, лишай на половыя частяхъ, сифилисъ, смоковидные наросты.

XXIV. Женскія дѣтородныя части. Болѣзни яичниковъ, кровотеченіе изъ матки, воспаленіе матки, ракъ ея; *болѣзни матки*, выпаденіе ея, лишай на дѣтородныхъ частяхъ; *болѣзни*

отъ неправильныхъ менструальныхъ очищеній, недостатокъ ить, дѣвчья немочь, блѣм, половая похоть, способность къ зачатію, беременность, роды и родильный періодъ, родильная горячка, кормленіе грудью; груди, грудные соски.

NB. Болѣзни взрослыхъ дѣтей, грудныхъ и новорожденныхъ, см. дѣтскія болѣзни.

XXV. Воздухоносные пути. Жаба плевиная, гриппъ, охриплость и потеря голоса; кашель, катарръ, катарральная лихорадка, воспаленіе гортани, горловая чахотка, коклюшь, воспаленіе дыхательныхъ путей, чахотка дыхательныхъ путей, насморкъ.

XXVI. Грудь, дыханіе и сердце. Удушье, Милларова и Вигандова одышка, спазмодическое удушье, жаба грудная, приливъ крови къ груди, воспаленіе легкихъ, воспаленіе грудобрюшной преграды, боли грудныя, грудная водянка, удушливый катарръ, болѣзнь сердца (и біеніе сердца), кровотеченіе изъ легкихъ, параличъ и водянка легкихъ.

XXVII. Спина, крестецъ и шея. Боли поясницы, воспаленіе почекъ, спинная чахотка, воспаленіе спинного мозга, боли еочлененій, болѣзнь костей, судороги, параличи, англійская болѣзнь, ревматизмъ, приступы болей, золотуха.

XXVIII. Верхнія конечности. Омертвѣніе рукъ, воспаленіе суставовъ, водянка суставовъ, опухоль, артритическая ломота, хиралгра, боли сочлененій, ревматизмъ, болѣзнь ногтей, ногтебѣда.

XXIX. Нижнія конечности. Костоѣда въ суставахъ, воспаленіе, водянка, боли въ суставахъ, опухоль, лземъ; ломота, ломота бедреннаго сустава, болѣзнь костей, параличи; болѣзнь ногтей, отекъ конечностей; подагра, воспаленіе чресленныхъ мышцъ, сведенія, ревматизмъ.



Азотнокислое серебро *Argentum nitricum, Lapis infernalis.* Отравленіе имъ. — Сначала дается больному растворъ поваренной соли въ водѣ, въ большомъ количествѣ, для произведенія рвоты, а потомъ слизистое питье.

Амміакъ и селитра. *Ammonium et Nitrum.* Отравленіе ими. — При началѣ даютъ больному теплую воду съ свѣжимъ масломъ въ видѣ питья, до произведенія рвоты; затѣмъ въ большемъ количествѣ слизистое питье. Для уничтоженія послѣдственныхъ страданій, даютъ больному, смотря по обстоятельствамъ: *Nitr.-sr., Coff., N.-vom.*

Анаваржа. *Подкожная водянка, Anasarca.*

Главныя средства противъ нея: *Arg., Bry., Chin., Dig., Dulc., Hell., Merc. и Sulph.* Кромѣ этихъ, можно еще употреблять: *Camph., Convolv., Lact., Rhus., Samb. и Sol.-nigr.*

При подкожной водянкѣ, происшедшей послѣ накожныхъ силей, какъ-то: скарлатины, кори и т. п., часто отличную пользу обязаны—*Hell. и Arg.* При недостаточности этихъ средствъ, избираются другія, соотвѣтственно совокупности симптомовъ и обстоятельствъ. См. также *Водянка.*

Англійская болѣзнь, рахитизмъ, Rhachitismus.—Лучшія, опытомъ доказанныя средства противъ различныхъ видовъ этой болѣзни вообще суть: 1) *Aza., Bell., Calc., Lyc., Merc., Puls., Sil., Staph., Sulph.,* также 2) *Merc. Nitr.-ac., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rhus.*

Противъ искривленій позвоночнаго столба въ особенности рекомендуютъ: *Bell., Calc., Puls., Sil., Sulph.*—Противъ искривленій грудчатыхъ костей и опухолей въ сочлененіяхъ: *Aza., Calc., Sil., Sulph.*—Противъ слишкомъ увеличенную объема детской го-

ловки, причеъ роднички не скоро закрываются: Calc., Puls., Sil.—См. также *золотуха и костей болѣзни*.

Аневризмы, опухоль артерій, Aneurismata.—Противъ нихъ до-сихъ-поръ съ большимъ успѣхомъ употребляли: Carb.-veg., Lach., Lys., а также Guaj., Puls. и Sulph.—Въ нѣкоторыхъ случаяхъ достойны вниманія также: 1) Calc., Caust., Graph., Kali carb.; 2) Amb., Agn., Arg., Aug.-ш., Ferr., Natr.-m., Zinc..

Анемія, малокровіе, Anaemia.—Лучшія средства вообще: 1) Arg., Chin., Puls., Squill., Staph., Sulph.; 2) Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Cin., Con., Ferr., Her., Ign., Kal., Lys., Lach., Merc., Natr., Natr.-ш., N.-vom., Phosp., Phos.-ac., Rhus., Serp., Sil., Sulph., Veratr.—Если болѣзнь произошла отъ потери органическихъ жидкостей, крови, или другихъ соковъ, то отдается преимущество: 1) Chin., N.-vom., Sulph., или также. 2) Calc., Carb.-v., Cin., Phos. ac., Staph., Sulph.—Если же она есть слѣдствіе тяжелыхъ острыхъ болѣзней, то часто помогаетъ: Calc., Carb.-v., Chin., Her., Kal., Natr., Natr.-ш., Nux.-vom., Veratr.—См. также: *Блѣдная немочь, Слабость и Цыма*.

Апоплексія, кровяной ударъ, Apoplexia, Haemorrhagia cerebri.

§ 1. Средства, которыя до-сихъ-поръ съ успѣхомъ были употребляемы противъ апоплексіи, суть: 1) Acon., Agn., Barut., Bell., Coss., Lach., N.-vom., Op., Puls.—Кромѣ того рекомендуютъ еще: 2) Ant., Chin., Coff., Con., Dig., Hyos., Ipec., Aug., Merc., N.-mosch., Tart..

§ 2. При изліяніи крови въ существо мозга (apoplexia sanguinea), вообще болѣе всего приличны: 1) Agn., Bell., Lach., N.-vom., Op., или также: 2) Acon., Ant., Barut., Coff., Ipec., Hyos., Merc., Puls.—При изліяніи серозной жидкости (apoplexia serosa) рекомендуютъ: Agn., Ipec., Dig., Merc.. Иногда обстоятельства могутъ также потребовать: Barut., Chin., Coss., Con.—При нервноиъ ударѣ (apoplexia nervosa) назначаются преимущественно: 1) Agn., Bell., Coff., Hyos., Stram. 2) Camph., Laur.

§ 3. Противъ остающихся *опыльныхъ* вслѣдствіе апоплексіи, особеннаго вниманія заслуживаютъ: 1) Agn., Barut., Bell., Coss., Lach., N.-vom., Rhus., Stram., Zinc.; а также еще: Apac., Calc., Caust., Con., Dulc., Natr.-ш., Laur., Phosph., Plumb., Ruta., Serp., Sil.—При параличѣ одной половины тѣла (hemiplegia), въ особенности на-

значаются: Alum., Apac., Caust., Ooss., Graph., Kal., Lach., Phosph.-ac., Sulph.-ac.

§ 4. Смотра по причинамъ, вслѣдствіе которыхъ произошла апоплексія, назначаются противъ нея различныя средства; такъ, если она случилась у лицъ, преданныхъ пьянству, то преимущественно назначаются: Lach., N.-vom., Op., а также еще: Barut., Coff., Cop., Puls.—У пожилыхъ лицъ, употребляются: Barut. или Op. или также: Cop., Dig., Merc.—Отъ кровоизвлеченій или другихъ ослабляющихъ причинъ: Chin., Ires., или также: Carb.-v., Ooss., N.-vom., Puls., Ser.—Отъ переполненія желудка: Ires., N.-vom., или Puls., если нѣсколько ложекъ чернаго кофе, данныхъ внутрь, оказались безуспѣшными.

§ 5. То или другое средство назначается, смотря по различнымъ симптомамъ, характеризующимъ апоплексію.

Aconitum, при горячей головѣ, біеніи сонныхъ артерій, не холодной, но скорѣе теплой кожѣ, при подавленномъ, но твердомъ, жесткомъ и непрерывающемся пульсѣ. Въ особенности у полнокровныхъ, апоплектическихъ особъ, когда притомъ испугъ или инъя были причиною удара.

Agnica назначается при слѣдующихъ явленіяхъ: полный и крѣпкій пульсъ, параличъ членовъ, особенно лѣвой стороны, потеря самосознанія и отуманеніе съ храплымъ дыханіемъ; кромѣ того вздохн, боркотаніе, произвольное изверженіе кала и мочи.

Baruta—параличъ языка или верхнихъ конечностей (особенно правой стороны); искривленіе рта въ сторону; потеря самосознанія; дѣтскія тѣлдвиженія и невозможность сохранять равновѣсіе; спячка съ безповойствомъ, вздохами и боркотаніемъ; ограниченная краснота щекъ.

Belladonna—отуманеніе съ потерей самосознанія и способности говорить, или съ конвульсивными сокращеніями вѣкъ и мышцъ лица; параличъ членовъ, особенно правой стороны; искривленіе рта въ сторону; параличъ языка; слюпотеченіе; затрудненное или совершенно невозможное глотаніе, (потеря вѣрнія); расширенныя зрачки; красные и выкатившіеся глаза; красное и вздутое лице.

Osculus—когда удару предшествовало головокруженіе съ

тошнотой и когда во время самого удара замѣчаются конвульсивное движеніе глазъ и параличь особенно нижнихъ конечностей, съ потерей въ нихъ чувствительности.

Cirrhus, при нервной апоплексіи, съ судорогами, перекашиваніемъ лица и параличемъ органовъ рѣчи.

Huoscus, при нервной же апоплексіи, сопровождаемой спячкою, краснотою лица, потерей языка и чувствомъ онемѣнія въ рукахъ.

Trisacantha, въ серьезныхъ и нервныхъ случаяхъ, съ головокруженіемъ, отвислыми губами, отнятіемъ языка, истеченіемъ слюны и параличемъ конечностей.

Lachesis—отуманеніе и потеря самосознанія, съ синевой лица и конвульсивнымъ движеніемъ и *дрожаніемъ членовъ*; или параличь особенно *левой половины тела*; когда передъ началомъ изліянія замѣчались: припадки умопомѣшательства, или головокруженіе съ напоромъ крови къ головѣ.

Nuxvomica—отуманеніе съ храпѣніемъ и слюнотеченіемъ; тусклость въ глазахъ и слезотеченіе; *параличь особенно нижнихъ конечностей*; отвислость нижней челюсти; когда передъ припадкомъ замѣчались: головокруженіе съ болью головы и шумомъ въ ушахъ, или тошнота съ позывомъ на рвоту.

Opium—когда до припадка обнаруживались: притупленіе чувствъ; головокруженіе съ чувствомъ тяжести въ головѣ, шумомъ въ ушахъ, притупленіемъ слуха; пристальный взглядъ; бессонница или тягостныя сновидѣнія; наклонность ко сну; когда во время припада представляются: *тетаническое оцепенѣніе тела*, краснота, *вздутость и жаръ лица*; *языка горячая*, покрытая горячимъ потомъ, краснота глазъ, концы зрачки *расширены и нечувствительны*; *медленное, храпливое дыханіе*; *конвульсивное дрожаніе конечностей*; *пена изо рта*.

Pulsatilla—отуманеніе и потеря самосознанія, вздутое и синевато-красное лицо; потеря двигательной способности: *слабое сердцебиеніе*, совершенно *умертвленный пульсъ* и *храпливое дыханіе*.

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ принести большую пользу *Aris* и *Glon.*

§ 6. При ударѣ съ судорогами: *Bell.*, *Huosc.*, *Lach.*, *Op.*; съ послѣдовательнымъ параличемъ: 1) *Arn.*, *Bell.*, *N.-vom.*, *Stann.*, *Zinc.*

2) Анис., Соп., Лаш.;—съ параличемъ одной и судорогами другой стороны: Bell., Лаш., Stram.;—при слабоуміи вслѣдствіе удара: Hell. См. также: прилиже къ *чоловь, стлчка, судороги.*

Аппетитъ, Appetitus.

1. *Потеря аппетита, anorexia.* Хотя потеря аппетита составляетъ больше симптомъ другихъ болѣзней, однакожъ, во всякомъ случаѣ, распространяется-ли она на всякую пищу вообще, или выражается отвращеніемъ къ извѣстному только роду ея, она при выборѣ средствъ должна обращать на себя вниманіе. Сюда относятся: 1) Ant., Arg., Нер., Chin., Merc., N.-vom., Puls., Rhus., Sulph., Tart. 2) Baryt., Bryon., Calc., Cycl., Natr.-m., Serp., Sil. 3) Ars., Bell., Canth., Cicut., Coss., Соп., Ign., Lyc., Natr.-m., Op., Plat., Thuj., Veratr..

§ 2. Противъ потери аппетита, какъ самостоятельной болѣзни, безъ другихъ побочныхъ припадковъ, или если она представляется какъ единственный симптомъ, оставшійся послѣ гастрическихъ, или другихъ страданій желудка, служатъ преимущественно: 1) Ant., Cyclam., Sulph. 2) Chin., N.-vom., Puls., Rhus., Serp., Sil. 3) Arg., Baryt., Dulc., Magnes.-m., Sulph.-ac. Если къ этому присоединяется *совершенное отвращеніе отъ пищи*, то назначаютъ: 1) Ipec., Puls., Rhus; 2) Chin., Ignat., N.-vom.; 3) Arg., Bry., Coss., Natr.-m.

§ 3. Противъ *частной* потери аппетита, или отвращенія отъ нѣкотораго рода пищи и питья:

а) При отвращенія отъ *мяса*: 1) Bell., Chin., Coss., N.-vom. 2) Cham., Stann., Sulph.;—отъ *водки*: Ignat.;—отъ *вина*: Ignat., Лаш., Magnet.-aus., Merc., Sabad.;—отъ *воды*: Bell., Chin., N.-vom., Stram.;—отъ *молока*: Bellad., Bryon., Calc., Carb.-v., Cinn., Ign. Natr., Puls., Serp., Sil.;—отъ *кофе*: Bell., Bryon., Cham., Merc., Natr.-m., N.-vom., Rhus;—отъ *матѣя* вообще: Bellad., Canth., Hyosc., N.-vom., Stram.; 2) Лаш., Natr.-m.

б) При отвращенія отъ *чернаго хлѣба*: Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph.-ac., Sulph.;—отъ *хлѣба вообще*: Соп., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph.-ac. Puls.;—отъ *масла*: China., Carb.-v., Merc.;—отъ *жира*, и *жирнаго*: Bry., Carb.-an., Carb.-v., Helleb., Нер., Natr.-mur., Puls.;—отъ *мяса* и *мясного супа*: Iga, Merc., Mur.-ac. Puls., Sil., Sulph.; 2) Bell., Calc., Carb.-veg., Lyc., Rhus., Sabad., Serp.;—отъ *рыбы*: Graph.;—отъ *зелени*: Helleb., Magn.;—отъ

теплой вареной пищи: Calc., Graph., Ign., Lyc., Magn., Sil.; — *отъ ясной пищи*: 1) Bry., Staph., Sulph.: 2) Ferr., Merc..

с) При отвращеніи *отъ кислою*: Bellad., Cocc., Ferr., Sabad., Sulph.: — *отъ сладкою*: сахара и т. п.: Arg. Caust., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Sulph., Zinc.; — *отъ соленою*: Graph., Selen.

См. также: *Гастрическія страданія, слабость желудка, рвота и тошнота, и сходныя съ ними страданія.*

2) *Приготовленность аппетита, talacia*. Позывъ на необыкновенную или ненатуральную пищу разсматривается также, какъ симптомъ другихъ страданій, указывающій на средства, смотря по различнымъ видамъ:

а) При позывѣ на *мясо*: Acon., Caust., Cocc., Merc., Natr., N-vom., Petros., Puls., Sulph.; — на *водку*: Arg., Chin., Her., N-vom., Op., Selen, Ser., Sulph.; — на *вино*: Acon., Bryon., Calc., Cicut., Her., Lach., Ser., Staph., Sulph.; — на *горячительныя напитки вообще*: Her., Puls., Sulph., Sulph.-ac.; — на *ослабляющіе и охлаждающіе*: Caust., Cocc., Phosph., Phosph.-ac., Puls., Rhab., Sabim., Valer.; — на *кофе*: Angust., Arg., Aur., Bryon., Carb.-veg., Cop.; — на *молоко*: Arg., Bovist., Merc., Rhus., Sab., Sil., Staph..

б) При позывѣ на *жирную пищу*: N-vom., Nitr.-ac.; — на *сельди*: Nitr.-ac., Veratr.; — на *потченое*: Caust.; — *исключительно на мясо*: Alum., Magn.-c.; — на *устрицы*: Lach.; — на *олуры*: Ant., Veratr.; — на *кислую капусту*: Carb.-an., Cham.; — на *мучную пищу*: Sabad.; — *особенно на теплую пищу*: Cycl., Ferr., Lyc.; — преимущественно на *хлѣбъ*: Arg., Bell., Natr., Natr.-m., Puls.; — на *жидкую пищу* преимущественно: Bryon., Ferr., Merc., Staph., Sulph.

с) При позывѣ на *горькое*: Digit., Natr.-m.; — на *соленое*: Carb. v., Caust., Cop., Merhit., Veratr.; — на *кислое*: Ant., Arn., Arg., Borax., Bry., Cham., Her., Ign., Kali., Phosph., Puls., Ser., Squ. Stram., Sulph., Veratr.; — на *сладкое лекарство*: Amm., Baryt., Ipecac., Chin., Kali., Lyc., Magnes., Natr.-m., Rhab., Rhus., Sabad., Sulph.; — на *сочное*: Phosph.-ac.; — на *овощи*: Alum., Ign., Magnes.-c., Sulph.-ac., Veratr..

д) При позывѣ на *землю, известь, мѣль и т. п.*: Nitr.-ac., N-vom.; — на *древесный уголь*: Cicut., Cop.

См. также: *Гастрическія страданія, слабость желудка.*

Аскариды.—Глистная болѣзнь. *Helminthiasis.*

Лучшія средства: 1) Acon., Cin., Merc., Sulph.; 2) Calc., Carb.-v., Chin., Cic., Ferr., Fil., Graph., Iga., N.-mosch., N.-vom., Sabad., Sil., Spig.; 3) Ars., Val., Natr.-m., Petr., Phosph., Puls., Ruta, Sabin., Val.

§ 2. Противъ *Ленточной глисты, Солитера* (*Taenia*) назначается слѣдующее леченіе: при ущербѣ луны, даютъ внутрь сначала одинъ приемъ Sulph., потомъ, при наступающемъ полнолуніи, приемъ Merc., и чрезъ 8 дней опять Sulph.. Это повторяютъ нѣсколько разъ. Если же эти два средства не окажутъ пользы, то рекомендуютъ: 1) Calc., Carb.-v., Graph., Magn.-m., N.-vom., Puls., Sabad., Sil.; 2) Ign., Petr., Phosph.; 3) Fil., Fragar.-vesc., Gran..

§ 3. Отъ *крупицы глистовъ*: 1) Acon., Cin., Merc., Sabad.; 2) Sulph.; 3) Bell., Calc., Cham., Chin., Cic., Graph., Hyosc., Lys., Natr.-m., N.-vom., Rhus., Sil., Spig..

Если замѣчаются: лихорадка съ коликою, наклонность кривотѣ, напряженный и вздутый животъ, натуга при испражненіи низомъ или малоколичественныя слизистыя испражненія, то лучшее и главное средство Acon., послѣ котораго, если окажется нужнымъ, по истеченіи нѣсколькихъ часовъ, даютъ Cin., и если втеченіе 24 часовъ не произойдетъ никакой перемѣны, то Merc.. Если къ лихорадкѣ и коликѣ присоединяются: сильная жажда, возвышенная нервная раздражительность, внезапное вскакиваніе отъ сна и пугливость, то Bell. считается лучшимъ средствомъ, если же и оно не окажетъ благоприятнаго успѣха, то назначаютъ Lach..

Кромѣ сказанныхъ средствъ, съ успѣхомъ употребляли: *противъ острыхъ лихорадочныхъ припадковъ*: Chin., Cic., Sil., Spig.;—*колики и конвульсіи* Cic.;—*глистной колики, сопровождаемой чрезвычайнымъ голодомъ, поносомъ и дрожью*: Spig.;—*лихорадочныхъ припадковъ у золотушника*: Sil. Если болѣзнь употребленіемъ того или другаго средства значительно уменьшилась, то часто, для совершеннаго уничтоженія ея, достаточно назначить нѣсколько приемовъ Sulph., впродолженіе 4, 5, 6 недѣль, и если по прошествіи этого времени появляются еще признаки несовершенно исчезнувшей болѣзни, какъ-то: исхуданіе, прожорливость, блѣдность лица и т. д., то самыя приличныя средства: Barut., Calc., Graph., Lys. или Natr.-m..

§ 4. Противъ страданій, причиняемыхъ *мелкими листами, аскаридами*, лучшія средства: 1) Acon., Calc., Chin., Ferr., Ign., Merc., Sulph., или еще: 2) Graph., N.-vom., Phosph., Teucr..

Асонитизмъ составляетъ главное средство при сильномъ лихорадочномъ безпокойствѣ, особенно по ночамъ; при безсонницѣ и тревожномъ метаніи въ различныхъ стороны; а если Acon. недостаточно, то замѣняютъ его Ign.. Если же ни Acon., ни Ign., не оказываютъ желаемого успѣха, или если болѣзнь правильно возвращается при новолуніи и полнолуніи, то отдается преимущество Sulph., во время ущерба или увеличенія луны, или также Calc., Ferr., Chin..

Астенія. Слабость, Asthenia.

Слабость во многихъ случаяхъ составляетъ только принадлежъ другой болѣзни, по удаленіи которой силы опять возстановляются. Но иногда она, какъ самостоятельная болѣзнь, служитъ источникомъ другихъ страданій, особенно если происходитъ вслѣдствіе потери соковъ отъ неумѣреннаго совокупленія, тяжелыхъ острыхъ болѣзней или другихъ ослабляющихъ причинъ. Въ такомъ случаѣ надо стараться объ удаленіи ея надлежащими средствами, взявъ во вниманіе общее состояніе. Всего чаще показаны въ подобныхъ случаяхъ: 1) Arg., Carb.-v., Chin., Ipec., N.-vom., Phosph., Phosph.-ac., Staph., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Amm., Arn., Baryt., Calc., Camph., Caus., Cocc., Ferr., Graph., Kal., Lach., Lyc., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Oleand., Rhus., Sec., Sep., Sil.; 3) Anac., Canth., Fluor.-ac., Mosch., Mur.-ac., Plat., Stann. Zinc.

§ 2. Противъ слабости, происшедшей *вслѣдствіе потери соковъ*, лучшее средство: Chin.. Послѣ хины, если она окажется неудовлетворительною, слѣдуютъ: 1) Calc., Carb.-v., Cin., Lach., N.-vom., Phosph.-ac., Sulph., Veratr.; 2) Nitr.-ac., Sulph.-ac..

§ 3. Противъ слабости *вслѣдствіе неумѣреннаго совокупленія*, если только больной не занимался онанією, лучшимъ средствомъ считается Chin.; если же болѣзнь хроническая и причина давно уже произвела свои дѣйствія на больного, то надо обратиться къ другимъ средствамъ, изъ которыхъ дѣйствительнѣйшія: 1) Calc. N.-vom., Phosph.-ac., Sil., Staph. и Suph.; 2) Anac., Arn., Carb.-veg., Con., Merc., Natr.-m., Phosph., Sep..

Calc. — пріячна преимущественно тамъ, гдѣ всякій разъ послѣ сонѣмъ обнаруживается необыкновенная усталость, дрожаніе ногъ и головная боль. Старнута.—когда больной слишкомъ занятъ своею болѣзнію и всякій разъ послѣ совокупленія появляется удѣшливый кашель и ипохондрическое расположеніе духа.

§ 4. Послѣдствія *omanim* въ большей части случаевъ требуютъ: N.-vom., и вслѣдъ затѣмъ Sulph. и Calc., если только Phosph.-ac. или Starph., не были удовлетворительны. Иногда съ пользою также назначается Carb.-veg., Cin., Coss., Cop., Natr.-m., N.-mosch. и Phosph.. Хина здѣсь или мало, или вовсе никакой пользы не приноситъ, потому что здѣсь причина болѣзни не потеря соковъ, а потрясеніе нервной системы.

Для уничтоженія страсти къ этому пороку, можно преимущественно назначить: 1) Sulph., Calc., и также: 2) Chin., Coss., Merc., Phosph., а можетъ быть и 3) Ant., Carb.-v., Plat., Puls.

§ 5. При слабости отъ чрезмѣрныхъ физическихъ трудовъ: Acon., Arg., Ars., Bry., Calc., Chin., Coss., Merc., Rhus., Sil., Veratr.;—отъ *бессонныхъ* ночей: Carb.-v., Coss., N.-vom., Puls.,—отъ чрезмѣрныхъ *замятій* или умственныхъ трудовъ: Bell., Calc.-Lach., N.-vom., Puls., Sulph.;—отъ *сидячей жизни*: N.-vom., Sulph.;—*вслѣдствіе тяжкихъ острыхъ болѣзней*, главными средствами считаются: 1) Chin., Her., Sil., Veratr.; 2) Calc., Kal., Natr.-m., Phosph.-ac. и Sulph., — *отъ частаю общаю кровопусканія*, полезны: Chin., Phosph.-ac., Sulph.-ac.—У *субъектовъ молодыхъ, быстро растущихъ* помогаетъ Phosph.-ac.—У *стариковъ*: Arg., Barut., Chin., Coff., Op.

См. также: *Истерика* и *Нервная слабость*.

Атрофія, Сухотка, Atrophia. Дѣтская сухотка, Atrophia infantum.

Лучшія средства противъ сухотки золотушныхъ дѣтей: Sulph., и вслѣдъ за нею Calc., а также: 1) Arg., Barut., Chin., Cic., N.-vom., Phosph., Rhus., или также еще: 2) Arg., Cham., Her., Jod., Lach., Magn., Petr., Phosph., Puls..

Во многихъ, не особенно осложненныхъ случаяхъ, очень полезно начинать леченіе приемомъ N.-vom., при существованіи запора, или Arg., когда у дѣтати поносъ. По окончаніи дѣйствія того или другаго изъ этихъ средствъ, слѣдуетъ назначить Sulph., (1—2 приема продолженіе — 34 недѣль) и если затѣмъ бо-

лѣзнъ не вытечивается, то 1—2 приема Calc. (на 6—8 недѣль) обыкновенно достаточны для полного выздоровленія.

Изъ этихъ средствъ преимущественно рекомендуютъ:

Анэвемісумъ — когда представляются: сухая, пожелавшая на пергаментъ кожа, впалые глаза съ синими кругами, изверженіе непереваренной пищи низомъ или рвотою; *потребность часто, но понемногу пить, необыкновенное безпокойство и метаніе въ разныя стороны, ночью; короткій сонъ, прерываемый скакиваніями и подергиваніями*; отечная опухоль лица, частыя *темноватая или зеленоватая испражненія* низомъ, состоящія изъ непереваренныхъ веществъ, слабость съ постоянною охотою лежать; холодныя конечности, сердцебіеніе и ночные поты.

Вавута — при *опухлом затылочномъ и шейномъ железахъ*, обмененной физической слабости; *постоянной наклонности ко сну*; вздутости живота и лица при увеличенномъ объемѣ живота, *необыкновенной лпности и особенной неохотѣ ко всякой тѣлесной и умственной работѣ, даже ко ирѣ*; разсѣянность, невнимательность и слабость памяти.

Велладонна — при часто повторяющейся коликѣ съ *непроизвольнымъ испражненіемъ, капризахъ и своенравіи*; кашль по ночамъ съ *мокротамъ хрипомъ, распуханіи шейныхъ железъ*; безпокойный сонъ и бессонница; особенная неохота къ движенію и открытому воздуху; нервная раздражительность; въ особенности пригодна у больныхъ съ голубыми глазами, бѣлокурыми волосами и раннимъ развитіемъ ума.

Салсарела, когда представляются: сильное исхуданіе при *обыкновенномъ аппетитѣ*; *опалое, морщинчатое лице*; тусклые глаза, *принужденіе и затвердѣніе брыжеечныхъ железъ*; необыкновенная слабость и общая усталость, даже послѣ малѣйшаго напряженія, часто производящаго обильный потъ; частые поносы или на глинну похожія испражненія; сухая и поблекшая кожа; сухіе и жесткіе волосы; частое сердцебіеніе, ознобъ и дрожь; боли въ крестцѣ; *чрезмѣрная чувствительность нервной системы*; неохота къ движенію.

Снига, когда представляются: необыкновенное исхуданіе конечностей; отечное припуханіе животъ; обжорливость, поносъ, особенно ночью, съ *испражненіемъ непереваренныхъ веществъ*,

или же когда испражнения бывают обильны, бѣловаты и кашеобразны; обильный потъ, особенно ночью; лѣнность и равнодушіе; впалое, блѣдное или землистаго цвѣта лицо; не освѣжающій сонъ; необыкновенная слабость и истощеніе.

CINA, при страданіяхъ отъ глистовъ съ блѣдностію лица, произвольнымъ испусканіемъ мочи во время сна и необыкновенною прожорливостію.

NUX VOMICA — когда замѣчаются: желтоватый землисто-поблеклый цвѣтъ лица; одутлое лицо; упорный запоръ, или же смѣняющійся поносомъ; увеличенный объемъ живота, наполненнаго вѣтрами; сильный голодъ и рвота принятою пищею, особенная охота лежать; неохота къ движенію на воздухѣ; дурное расположеніе духа, склонность къ гнѣву; раздражительность нервной системы.

RHOENOVUS причтенъ молодымъ дѣвцамъ съ бѣлокурошми волосамъ, голубыми глазами, вѣжною кожею, тонкимъ и гибкимъ станомъ, особенно, когда замѣчаются: кашетическій кашель, поносъ и частые ванурительные поты, необыкновенная слабость и волненіе крови, сердцебіеніе или тоскливость въ груди при малѣйшемъ движеніи.

RHUS — необыкновенная слабость, постоянная охота лежать, блѣдность лица, твердый и вздутый животъ, сильная жажда, слизистые или кровавые поносы, сильный аппетитъ.

STARNUSSAGRIA: вздутость и увеличенный объемъ живота; обжорливость или чрезвычайный голодъ; медленное испраженіе на ввзъ; припуханіе шейныхъ и подчелюстныхъ железъ; часто повторяющійся или постоянный насморкъ съ корками въ поздрахъ; болѣзненность кожи, которая отъ малѣйшаго поврежденія нагнаивается; ночные воющіе поты; часто появляющіеся кровавые чирья.

SULPHUR почти во всѣхъ случаяхъ при началѣ леченія, и именно: при сильномъ голодѣ; потливости; при распуханіи назовыхъ, крыльцовыхъ или шейныхъ железъ, при твердости и вздутости живота; мокротномъ хрипѣ въ дыхательныхъ вѣтвяхъ; мокротномъ насморкѣ; обильныхъ слизистыхъ поносахъ или упорномъ запорѣ; при чувствѣ давленія въ груди; сердцебіеніи.

віи; блѣдномъ цвѣтѣ лица и болѣзненномъ наружномъ видѣ больного; впалыя глаза; колотыи въ груди и бокахъ.

Срав. также: *Изнурительная ангорка, чахотка и зло-туха.*

В.

Бессонница, Insomniа, Agrypnia.

§ 1. Бессонница почти всегда составляетъ симптомъ другой болѣзни, съ удаленіемъ которой сонъ самъ собою возстановляется. Поэтому леченіе бессонницы должно быть направлено на коренную болѣзнь, отъ которой оно зависитъ. Однако есть случаи, гдѣ бессонница происходитъ вслѣдствіе *возвышенной раздражимости* и составляетъ тогда *главный припадокъ*, требующій прямого леченія; иногда же этотъ припадокъ дѣлается такъ рѣзкимъ и важнымъ, что при выборѣ средствъ необходимо бываетъ обратить на него особенное вниманіе. Въ обоихъ случаяхъ можно руководствоваться слѣдующимъ:

2. Главнѣйшія средства вообще: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Coff., Con., Graph., Hep., Hyosc., Ign., Kal., Lach., Lyc., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sil., Sulph.; 2) Alum., Anac., Camph., Caust., Cin., Cocc., Ipec., Led., Magn.-arct., Magn.-m., Mosch., Nitr.-ac., Op., Phos.-ac., Plat., Rhus., Sulph.-ac., Thuj., Veratr..

§ 3. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ бессонница есть *единственный* или по-крайней-мѣрѣ *главный симптомъ*, преимущественно имѣютъ мѣсто: Acon., Bell., Coff., Hyosc., Ign., Mosch., N.-vom., Op., Puls.— Для ббльшей точности въ назначеніи средствъ, надо замѣтить слѣдующее:

А С О Н И Т У М назначается, когда бессонница произошла вслѣдствіе тревожныхъ и угнетающихъ вліаній, какъ-то: вслѣдствіе тоски, страха или испуга.

Б Е Л Л А Д О Н Н А—когда больной очень сонливъ, но не можетъ заснуть, или когда сну мѣшаютъ: сильная тоска, безпокойство, страшныя видѣнія, страхъ и т. д., или когда вечеромъ и утромъ появляется сонливость, но ночного сна все таки нѣтъ.

С О Ф Ф Е А — когда бессонница есть слѣдствіе *необыкновенной радости* или неожиданнаго пріятнаго впечатлѣнія; также у дѣтей;

послѣ долгаго ночнаго бдѣнія. Не менѣе важно это средство, если бессонница встрѣчается у особъ, неумѣренно употребляющихъ кофе.

НУТОВСІАМУС — противъ бессонницы, происходящей отъ возвышенной нервной раздражительности, какъ это бываетъ послѣ тяжкихъ болѣзней, или если она будетъ у раздражительныхъ, легко возбуждаемыхъ субъектовъ.

ІЕНАТІА — когда причиною бессонницы были: печаль, заботы, огорченія, тревожныя мысли и другія угнетающія душевныя потрясенія.

МОЭСІУС — во многихъ случаяхъ, когда больной страдаетъ бессонницею вслѣдствіе возвышенной нервной раздражительности, однакожъ чувствуетъ себя хорошо, какъ это бываетъ у истерическихъ и ипохондрическихъ субъектовъ.

Н.УОМІСА — если бессонница происходитъ отъ постояннаго размышленія, или чтенія до глубокой ночи, или отъ неумѣреннаго употребленія кофе.

ОРІУМ — послѣ душевныхъ потрясеній, какъ-то: *страха, испуга* и т. д., когда бессонница сопровождается появленіемъ привидѣній, а также когда она случается у стариковъ.

ПУЛСАТІЛЛА — для особъ, которыя по вечерамъ много ѣдятъ; или не могутъ заснуть отъ наплыва мыслей; также если обнаруживаются: волненіе крови, приливъ къ головѣ и мучительный жаръ.

СУЛФУР, — когда бессонница происходитъ отъ досады.

§ 4. Противъ бессонницы у *дѣтей*, сопровождаемой крикомъ, коликою, безпокойнымъ метаніемъ въ разныя стороны, смотря по обстоятельствамъ, употребляютъ: 1) *Asop., Bell., Cham., Coff., Jalap., Rhab.* или 2) *Boгах., Сіп., Ірес., Senn.*

АСОПІТУМ и **СОФФА** преимущественно назначается при *сильномъ безпокойствѣ и лихорадочномъ жарѣ.* — **ВЕЛЛАДОННА** — если дѣтя по цѣлымъ часамъ и днямъ кричатъ, и нельзя найти тому причини. — **СНАМОМІЛЛА** — если дѣтя въ одно и то же время страдаетъ *головною болью и терзающими болями въ ушахъ.* — **ЖАЛАПРА** — при сильной коликѣ съ поносомъ. — **РНАВАКВАВУМ** — при частомъ позывѣ на низъ съ натугами при испраженіи и коликою.

§ 5. Кроме того, при всѣхъ другихъ случаяхъ, надо обратить вниманіе на слѣдующія обстоятельства:

Если страданія больного начинаются преимущественно *вечеромъ*, и ищаштъ ему заснуть, то лучшія средства суть: 1) Ars., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Her., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sulph., 2) Arg., Bell., Caust., Coss., Graph., Kal., Merc., Phosph.-ac., Thuj.—При бессонницѣ отъ слишкомъ сильнаго *возбужденія нервной системы или души*: 1) Calc., Chln., Coff., Her., Lach., Lyc., Mosch., N.-vom.; Plat., Puls., Ser.; 2) Borax., Bry., Caust., Coss., Con., Graph., Hyos., Kal., Magn.-arct., Phosph.-ac., Rhus., Sil., Spong., Staph., Sulph.—Отъ *блѣмоты*, волненія крови, жара и т. п.: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Cin., Graph., Kal., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhab., Senn., Ser., Sil.; 2) Alum., Ambr., Ars., Aur., Carb.-an., Caust., China, Con., Magn.-c., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Op., Rhus., Sec., Thuj.—Отъ *боли*: 1) Acon., Alum., Aur., Bell., Cham., Chin., Coff., Her., Lach., Lyc., Magn.-c., Merc., Nitr.-ac., Puls. Sil., Sulph.; 2) Amm., Ars., Calc., Carb.-veg., Magn.-m., Mur.-ac., Natr.-m., Phosph. Rhus., Ser.—Отъ *голода въ нижнихъ конечностяхъ*: Amm.-m., Bry., Carb.-v., Kal., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Sulph., Zinc.

§ 6. Дальше, если бессонница преимущественно наступаетъ *передъ полночью*, и больной передъ 12 часами не въ состояніи заснуть, то даютъ: 1) Alum., Ars., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Con., Graph., Lach., Lyc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus., Ser., Sil., Sulph.; 2) Anac., Arg., Bell., Borax., Carb.-an., Caust., Her., Ign., Kal., Led., Magn.-c., Magn.-m., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Op., Phosph.-ac., Plat., Sassa., Spig., Staph., Sulph.-ac., Thuj.—Если больной *тотчасъ послѣ полночи* пробуждается и не можетъ болѣе спать, то назначаютъ: 1) Ars., Caps., Coff., Her., Nitr.-ac., N.-vom., Sil. Aur., Bry., Cann., Caust., Dulc., Graph., Lach., Magn.-c., Natr., Phos.-ac., Ser., Sulph.-ac.. При *бодрствованіи ночью* продолженіе нѣсколькихъ часовъ и *трудномъ засыпаніи* послѣ пробужденія: 1) Natr.-m., Phosph., Ser., Sil., Sulph.; 2) Ars., Aur., Bell., Calc., Caust., Dulc., Graph., Magn.-c., Merc., Mur.-ac., Natr., N.-vom., Puls., Sassa., Sulph.-ac. При *совершенной бессонницѣ всю ночь*: 1) Ars., Chin., Cin., Coff., Hyos., Magn.-c., Mosch., N.-vom., Op., Rhus., Sil., Sulph.; 2) Amm., Aur., Bell., Camph., Carb.-v., Cham., Clem., Coloc., Dulc., Graph., Her., Kreos., Merc., Natr.-m.,

Nitr.-ac., Thuj. — При *сильной сонливости*, за которую однакожь не слѣдуетъ сна. 1) Bell., Cham., Lach., Op., Phosph., Puls., Ser.; 2) Arg., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Clem., Coss., Con., Herp., Kal., Magn.-aust., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phos.-ac., Samb., Sulph., Thuj..

Верременность, Gravedo.

Средства противъ различныхъ страданій, причиняемыхъ беременностію, вообще:

Противъ *коњульсий и судорогъ*: 1) Bell., Cham., Cic., Hyosc. Ign.; 2) Coss., Ipec., Mosch., Plat., Stram., Veratr.; — *душевные страданія*: 1) Bell., Puls.; 2) Acon., Cupr., Lach., Merc., Plat., Stram., Veratr.; — *юловой боли*: 1) Bell., Bry., Coss., N.-vom., Puls., Plat., Veratr.; 2) Acon., Calc., Magn., Ser., Sulph.; — *желтый или кофейный цвѣтъ пятна на лицѣ*: Con., Ferr., Nitr.-ac., Ser.; *зубной боли*: 1) Magn. N.-mosch., N.-vom., Puls.; 2) Alum., Bell., Calc., Hyos., Rhus., Staph.; — *болѣзненно усиленную голода (bulimia)*: Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Petr., Ser. — *страданія желудка, тошноты, рвоты и т. д.*: 1) Con., Ipec., N.-vom., Puls. или также: 2) Acon., Arg., Ferr., Kreos., Lach., Magn.-m., Natr.-m., N.-mosch., Petr., Phosph., Ser., Veratr.. — *Отъ болей живота*: 1) Arg., Bry., Cham., N.-vom., Puls., Ser.; 2) Bell., Hyos., Lach., Veratr. — *запорозъ на низѣ*: 1) Bry., N.-vom.; 2) Alum., Lyc., Op., Ser. — *поносозъ*: 1) Ant., Phosph., Ser., Sulph.; 2) Dulc., Hyos., Lyc., Petr. — *Противъ натугъ на мочеиспусканіе и труднаго мочеотдѣленія (Dysuria)*: 1) Coss., Phos.-ac., Puls.; 2) Con., N.-vom., Sulph. — *Противъ венозныхъ узловъ (varices)*: Lyc., Carb.-v., Puls..

Близорукость, Myopia.

Противъ близорукости во многихъ случаяхъ съ успѣхомъ употребляя: 1) Apm., Apac., Carb.-v., Con., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sulph. — *вслѣдствіе воспаленія мазь, дѣйствительнѣйшія средства*: Puls. и Sulph. — *вслѣдствіе злоупотребленія ртути*: 1) Carb.veg., Nitr.-ac. и Sulph., или можетъ быть еще: 2) Puls. — *вслѣдствіе перенной мигорадки (Typhus), или вслѣдствіе ослабляющей потери соковъ*: Phos.-ac..

Влѣдная немочь, Дѣвичья немочь, Chlorosis.

Лучшія средства противъ этой болѣзни: 1) Bell., Coss., Ferr., Lyc., Nitr.-ac., Plat., Puls., Sulph.; 2) Chin., Con., Dig., Graph., Hell., Ign., Kal., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plumb., Ser., Spig.,

Staph., Val.; 3) Ars., Carb.-v., Caust., Graph., Phosph.-ac., Sabin., Sulph.-ac., Zinc..

Сравн. *Страданія, производимыя мышечными очищеніями и недостаткомъ мышечныхъ очищеній.*

Боли артритическія и ревматическія вообще.

§ 1. Главныя средства противъ страданій, выражающихся ощущеніемъ сильныхъ болей, вообще суть: Acon., Arn., Ars., Bry., Cham., Chin., Coff., Herp., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus., Veratr.; 2) Bell., Caps., Colch., Coloc., Con., Kal., Magn.-c., Mez., Phosph., Ruta, Sep., Spig., Stann., Staph., Thuj., Val., Verb.; 3) Agn., Alum., Anac., Ant., Arg., Asa, Asar., Aur., Baryt.; Calc., Caust., Canth., Cocc., Ferr., Graph., Hyosc., Led., Magn.-aust., Natr., Natr.-m., Phosph., Rhod., Sabin., Sassar., Spong., Stront., Sulph., Zinc..

§ 2. Если эти боли обнаруживаются у *субъектовъ раздражительною, нервннхъ*, то рекомендуются преимущественно: 1) Acon., Ars., Bry., Cham., Chin., Coff., Herp., Ign., Merc., N.-vom., Val., Veratr.; 2) Asar., Aur., Canth., Cocc., Ferr., Magn.-arct., Phosph., Puls., Rhus., Sil., Staph.;—у *субъектовъ, страдающихъ ревматизмомъ*: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Cham., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus.; 2) Ant., Ars., Carb.-v., Caust., Chin., Colch., Ferr., Ign., Lach., Lyc., Rhod., Ruta, Sassar., Sep., Sulph., Thuj., Veratr.—*ломотою*: 1) Acon., Bell., Bry., Colch., Kal., Merc., Phosph., Rhod., Rhus., Sabin., Spong., Staph.; 2) Agn., Arg., Baryt., Calc., Caust., Chin., Cocc., Ferr., Graph., N.-vom., Puls., Sassar., Sep., Stann., Sulph., Thuj.—*ртутиальною кахексіею*: 1) Arn., Carb.-v., Cham., Chin., Herp., Puls. 2) Arg., Bell., Dulc., Calc., Guaj., Lach., Lyc., Mez., Phos.-ac., Sassar., Sulph.—*неумеренно употребляющихъ кофе*: 1) Cham., Coff., Ign., N. vom.; 2) Bell., Cant., Caust., Cocc., Herp., Merc., Puls., Sulph; — *потокровамыя*: 1) Acon., Arn., Bell., Ferr., Hyosc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls.; 2) Aur., Bry., Calc., Chin., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sulph..

§ 3. Что касается до *совокупности симптомовъ*, то можно руководствоваться слѣдующими показаніями:

АСОНИТУМЪ: *невыносимыя ночныя боли, бѣднаго и колючаго свойства; лихорадочный жаръ, вздохи, жалобы, неутѣшенный плачь, а также страхъ смерти; жажда, краснота щекъ, малый и ускорен-*

ный пульсъ; необыкновенная чувствительность нервной системы вообще, и нервовъ слуха и зрѣнія въ особенности; бессонница съ безпокойнымъ метаніемъ въ разныя стороны.

Авнѣса — свербеніе въ страждущихъ частяхъ, съ безпокойствомъ до такой степени, что больной постоянно приводитъ ихъ въ движеніе; ожесточеніе страданій при малѣйшемъ напряженіи и при самомъ незначительномъ шумѣ.

Аввѣнисум — боли свойства жгучаго или терзающаго, особенно если онѣ являются по ночамъ и во время сна, или когда бывають такъ несносны, что доводятъ больного до отчаянія; когда къ нимъ присоединяются: необыкновенная тоска, слабость, заставляющая больного постоянно лежать; перемежаемость припадковъ; чувство холода въ страждущей части; ожесточеніе при покоѣ послѣ работы, или же вечеромъ изъ постели, также послѣ стола; облегченіе отъ наружной теплоты.

Велладонна — колюція, жгучія боли, которыя усиливаются при всякомъ движеніи, при яркомъ свѣтѣ и всякомъ шумѣ, и также при малѣйшемъ сотрясеніи, даже при хожденіи окружающихъ; припадки боли повторяются ежедневно отъ полудня до полуночи; ухудшеніе отъ сквознаго вѣтра, теплой постели и т. д..

Ввтонга — боли свойства давящаго, натягивающаго, терзающаго, колючаго, или ощущенія боли какъ-бы отъ подкожнаго нагноенія; ухудшеніе при движеніи тѣла, иногда облегченіе при движеніи страждущей части; раздражительность и вспыльчивое расположеніе духа, склонность къ ревматическимъ страданіямъ.

Снамомилла — боли подергивающія, терзающія и бьющія съ ощущеніемъ кочевѣлости въ страждущихъ частяхъ; необыкновенная чувствительность, вслѣдствіе которой малѣйшая боль кажется невыносимой; потеря силъ, доводящая больного до обморока при первомъ припадкѣ боли; вздутое лице, или краснота одной щеки и блѣдность другой; горячій потъ на головѣ, въ волосахъ, съ безпокойствомъ, крикомъ, плачемъ, раздражительнымъ и сварливымъ расположеніемъ духа.

Снина — необыкновенная чувствительность кожи; ухудшеніе болей при малѣйшемъ дотрогиваніи, ощущеніе кочевѣлости и параличной слабости въ больной части, давящія боли, дурное расположеніе духа; недовольство всѣмъ окружающимъ; нервный темпера-

ментъ, блѣдное лице съ часто появляющимися летучими жаромъ и краснотою въ немъ; боязливость или необыкновенное безпокойство ночью. Вообще это средство съ большою пользою можно назначить послѣ употребленія Coff..

СОФФЕА — плаксивость, невыносимыя боли, отъ которыхъ больной выходитъ изъ себя, безпокоится, мечется въ разныхъ стороны, кричать и сильно тоскуеть; дрожь отъ пребыванія на открытомъ воздухѣ; возвышенная воспримчивость всѣхъ внѣшнихъ чувствъ, особенно слуха, причемъ малѣйшій шумъ становится невыносимымъ. (Послѣ Coff. иногда пригодны: N.-vom., Ign., Chia. или Puls.).

НЕРАВ — боли какъ при изъязвленіи или подкожномъ нагноеніи, усиливающимся при малѣйшемъ дотрогиваніи; припадки обморока при ощущеніи малѣйшей боли, особенно вечеромъ.

ІОНАТІА — боли терзающія, или ощущеніе давленія изнутри кваружи, или колючаго сверленія, притомъ блѣдность лица, водянистая моча; облегченіе на короткое время при пережвѣнѣ положенія; вторичное появленіе припадковъ послѣ стола, вечеромъ, ложась въ постель, или утромъ при вставаніи; пережвѣчивое расположеніе духа и пугливость; печальное, молчаливое настроеніе духа; кроткій, чувствительный темпераментъ.

МЕРСУРИУС — для особъ, склонныхъ къ ревматическимъ страданіямъ, при ночныхъ потахъ, терзающихъ и колющихъ боляхъ; ухудшеніе по ночамъ; чувство холода въ страдающихъ частяхъ, необыкновенная слабость и волненіе крови при малѣйшемъ напряженіи; блѣдность или летучая краснота лица, и красныя пятна на щекахъ.

ПУХ-ВОМІСА — для субъектовъ, предавшихся пьянству или неумѣренно употребляющихъ кофе, живаго и холерическаго темперамента съ красноватымъ лицомъ; для ведущихъ сидячую жизнь; при боляхъ, подергивающихъ или натягивающихъ, которыя появляются или усиливаются по утрамъ въ постели, послѣ стола или по вечерамъ, также на открытомъ и холодномъ воздухѣ, при чтеніи или размышленіи.

ПУЛСАТИЛЛА — терзающія колючія и бьющія боли, занимающія *одинъ бокъ*, усиливающимся *по вечерамъ передъ сномъ*, или же по утрамъ при вставаніи, а также при покоѣ и въ сидячемъ поло-

женіи, если къ болямъ еще присоединяются страданія отъ пребыванія на открытомъ воздухѣ, отъ движенія и теплоты; притомъ спокойный темпераментъ, склонность къ унынію и скорби, или къ припадкамъ тоски.

Rhus — при перебирающихъ и жгучихъ боляхъ, или натягиваніи и колотѣхъ; при извѣнныхъ боляхъ, ожесточеніи въ спокойномъ положеніи и на воздухѣ, нездоровьи отъ движенія и тепла; при спокойномъ темпераментѣ, склонности къ хандрѣ, печали или припадкамъ страха.

Veratrum — сильныя боли, причиняющія на короткое время бредъ, бѣшенство и т. д., или боли со слабостію, доводящею до обморока, съ *холоднымъ потомъ*, общимъ холодомъ тѣла и жаждою; ухудшеніе отъ теплой постели и по ночамъ, ближе къ утреннему времени; страданія при вставаніи и хожденіи.

§ 4. Далѣе принимается въ соображеніе: Если боли сопровождаются *возбужденіемъ нервною и сосудистой системы, лихорадочнымъ жаромъ*, краснотой щекъ и т. п.: 1) Acon., Cham., Chin., Coff., Ign., Merc., Val.; 2) Arn., Ars., Bell., Bry., Canth., N.-vom., Puls., Rhus. Если же къ нимъ присоединяются значительная слабость, ознобъ и холодъ, то: 1) Arg., Ver.; 2) Arn., Chin., Her., Merc., N.-vom., Puls.—Если при боляхъ пораженная часть *очень худѣетъ* или *сидаетъ*: 1) Caust., Staph.; 2) Arg., Carb.-v., Graph., Led., Merc., Natr. m., Plumb., Sil.—Если пораженная часть *сильно похлѣетъ*: Bell., Calc., Cham., Chin., Graph., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Rhod., Ser., Sulph..

§ 5. При боляхъ, сопровождаемыхъ чувствомъ, какъ-будто страдающая часть *вытянута, увеличена*: Bell., Bry., Carb.-v., Chin., Dulc., Hyos., Ign., Laur., Merc., N.-vom., Oleand., Op., Puls., Rhus, Ser., Spig., Staph., Sulph.-ac.—При чувствѣ *напряженія* въ страдающей части: 1) Asa., Bell., Bry., Caust., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Stront., Sulph.; 2) Arg., Arn., Ars., Aur., Calc., Coloc., Con., Kal., Magn.-m., Magn., Merc., Mez., Mosch., Nitr.-ac., Phosph.-ac., Plat., Rhod., Rhus., Ser., Stann., Veratr., Zinc.—При чувствѣ *тисноты*: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Carb.-v., Chin., Merc., Mosch., Phosph., Rhus., Sil., Sulph. 2) Amm., Amm.-m., Asa., Calc., Caps., Cham., Coff., Con., Graph., Hell., Kali, Lyc., Magn.-c., Magnes.-m., Natr., Natr.-m., N.-vom., Petr., Puls., Ser., Spong., Sulph.-ac..

При ощущеніи, какъ-будто въ страдающей части все стремится отъ выйти: 1) Acon., Bell., Bry., Caust., Cham., Chin., Cocc., Kal., Lach., Lyc., Magn.-arct., Magn.-m., Mosch., Natr., N.-vom., Plat., Puls., Sep., Sil., Sulph., Sulph.-ac; 2) Alum., Amm., Amm.-m., Calc., Cann., Con., Croc., Magn.-c., Phosph., Phos.-ac., Spig., Spong., Staph., Stront., Thuj.. — При чувствѣ, какъ-будто часть лопается: 1) Bell., Bry., Calc., Caust., Con., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., Puls., Sep., Sil., Spig., Sulph.; 2) Acon., Amm., Ant., Baryt., Caps., Carb.-an., Carb.-veg., Chin., Con., Graph., Her., Kal., Magn.-arct., Merc., Mez., Natr., N.-vom., Oleand., Petr., Phosph., Ran., Sabin., Spong., Staph., Thuj..

§ 6. Равнымъ образомъ: при чувствѣ болѣе сжимающихъ, сдавливающихъ, какъ-будто страдающая часть ввинчивается: Alum., Bell., Cocc., Hell., Ign., Ipec., Magn.-c., Mosch., Natr.-m., N.-vom., Plat., Spig., Spong., Sulph., Sulph.-ac. — Когда страдающая часть какъ бы обвязана, или обхватывается обручемъ: Anac., Aur., Bell., Chin., Con., Graph., Ign., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sassar., Sulph. — Какъ-будто плоть слишкомъ обтягиваетъ, сжимаетъ или сдавливаетъ страдающую часть, или оно кажется тяжелымъ: 1) Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Kreos., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Sulph.; 2) Amm., Carb.-an., Caps., Nitr.-ac., Puls., Sassar., Sep., Sil., Spong., Stann. При чувствѣ тяжести въ страдающей части: 1) Acon., Bell., Calc., Carb.-v., Chin., Magn.-arct., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus., Sep., Sil., Stann., Sulph.; 2) Alum., Amm.-m., Arn., Ars., Baryt., Bry., Carb.-an., Cham., Con., Dulc., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Mur.-ac., Natr., N.-mosch., Op., Petr., Plumb., Sabad., Sabin., Spig., Spong., Staph., Thuj., Veratr..

§ 7. При давлении болятъ: 1) Arn., Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Cupr., Ign., Lyc., N.-vom., Phosph., Sep., Staph., Stann., Sulph., Zinc.; 2) Acon., Alum., Amb., Amm.-m., Anac., Ars., Aur., Carb.-v., Cocc., Cupr., Ign., Magn.-arct., Merc., Natr., Natr.-m., Phos.-ac., Plat., Ruta., Sassar., Veratr.. При чувствѣ давленія, какъ-бы отъ сколоченнаго клина или иглы: 1) Arn., Her., Ign., N.-vom., Oleand., Plat., Ruta., Sulph.-ac.; 2) Acon., Anac., Ant., Asa., Carb.-v., Cocc., Coff., Dulc., Hell., Lyc., Magn.-arct., Natr.-m., Rhus., Ruta., Spig., Spong., Sulph., Thuj. При ощущеніи сверлящихъ болей: 1)

Bell., Calc., Dulc., Hep., Merc., Natr.-m., Puls., Ran.-sc., Sep., Spig.; 2) Acon., Agn., Ant., Arg., Aur., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Cin., Cocc., Hell., Ign., Kal., Laur., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Mosch., Rhod., Sil., Stann., Staph., Thuj., Zinc. При боляхъ съ чувствомъ *буравленія*: 1) Амм.-м., Arn., Bell., Cin., Dulc., Magn., N.-mosch., Rhod., Sep., Spig., Stann.; 2) Acon., Asa., Bry., Calc., Carb.-an., Cin., Cocc., Con., Kal., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Plat., Rhod., Rhus., Ruta., Seneg., Sulph., Val. При чувствѣ, какъ-будто шаръ поднимается, или крѣпко сидитъ въ одной какой-либо части: Acon., Ign., Lach., Natr.-m., Plumb., Sep., Sil.

§ 8. При чувствѣ *стягиванія* въ страждущихъ частяхъ: 1) Alum., Anac., Bell., Chin., Graph., Ign., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Plat., Plumb., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Aur., Calc., Canth., Cocc., Con., Dig., Dros., Ipec., Lyc., Mosch., N.-mosch., Phos.-ac., Sassa., Sep., Stann., Sulph.-ac., Thuj., Veratr.—При чувствѣ *жгучихъ болей*: 1) Arn., Bell., Calc., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Amb., Ars., Cham., Colch., Mez., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Rhab., Sep., Staph., Veratr.—При чувствѣ *натяженія*, какъ-будто страдающая часть слишкомъ укорочена или стаянуть: 1) Амм.-м., Baryt., Caust., Coloc., Con., Graph., Lach., Natr., Natr.-m., Phosph., Puls., Rhus., Sep., Sulph.; 2) Alum., Arn., Asa., Bell., Bry., Carb.-an., Lyc., Magn.-m., Merc., Mez., Nitr.-ac., N.-vom., Olean., Phos.-ac., Plat., Rhod., Seneg., Stann., Stront., Zinc.—При *сводливыхъ судорожныхъ* боляхъ: 1) Amb., Calc., Carb.-veg., Coloc., Ign., Oleand., Phos.-ac., Plat.; 2) Acon., Anac., Ang., Ars., Bell., Carb.-an., Caust., Chin., Cin., Cocc., Con., Graph., Kal., Lyc., Magn.-m., Mez., Natr., Natr.-mur., N.-vom., Phosph., Puls., Rhod., Sep., Stann., Staph., Sulph.—При чувствѣ *настоящаго сведенія* въ членахъ: 1) Anac., Ang., Bell., Calc., Caust., Cin., Coloc., Graph., Lyc., Merc., Plat., Rhus., Sep.; 2) Agar., Ambr., Ars., Asa., Camph., Cann., Cocc., Con., Dulc., Ign., Kal., Magn.-arct., Mez., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phosph., Sec., Spig., Stann., Sulph.—при ощущеніи *искривленія*: 1) Calc., Caust., Coloc., Graph., Guaj., Lyc., Merc., Rhus., Sec., Sil.; 2) Anac., Carb.-an., Caps., Chin., Cic., Cin., Ferr., Hyosc., Lach., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Plat., Sol.-nigr., Stram., Tart..

§ 9. Равнымъ образомъ: При *охлаждающихъ* боляхъ, съ чувствомъ онемѣлости страждущихъ частей: 1) Acon., Bry., Cham., Cocc.,

Con., Lyc., N.-vom., Oleand., Plat., Puls., Rhus., Sulph.; 2) Amm., Anac., Ars., Asa., Bell., Calc., Carb.-an., Caust., Chin., Hell., Hyosc., Ign., Merc., Mosch., Op., Phosph., Phos.-ac., Sec., Sep., Stram.—
 При *параличѣ* боляхъ: 1) Aur., Capsic., Carb.-v., Cham., Chin., Cin., Cocc., Calc., N.-vom., Puls., Rhus., Sabad., Sabin., Staph.; 2) Acon., Bell., Caust., Ign., Magn.-arct., Natr.-m., Phosph., Rhod., Sil., Veratr.—
 При *болѣзненно́мъ чувствѣ развитости*: 1) Arn., Chin., Cocc., Hep., Ign., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus., Ruta., Sep., Sulph., Veratr.; 2) Arg., Aur., Bry., Calc., Camph., Carb.-v., Caust., Con., Dros., Ferr., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sil., Stann., Thuj.—
 При чувствѣ, какъ-будто *мягкія части отдѣляются отъ костей*: Bry., Canth., Igu., Led., Merc., Mosch., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Rhus., Staph., Sulph., Thuj.—
 При боли, какъ-будто *отъ ушиба, толчка или удара*: 1) Arn., Cic., Cin., Con., Dros., Lach., Oleand., Plat., Puls., Ruta; 2) Acon., Alum., Amm., Caust., Ign., Kal., Natr.-m., N.-mosch., Phosph., Plumb., Rhus., Sulph.—
 При чувствѣ боля, происходящей какъ-бы *отъ вывиха или осту́па*: 1) Arn., Bry., Calc., Caust., Ign., Natr.-m., Petr., Phos., Puls., Rhod., Rhus., Sulph.; 2) Amb., Amm., Carb.-v., Graph., Lach., Nitr., N.-vom., Ruta, Sep., Spig., Stann., Thuj..

§ 10. Далѣе: При *терзающихъ боляхъ*: 1) Acon., Arn., Bell., Bry.; Caust., Chin., Ign., Kal., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Rhod., Rhus., Sil., Stront., Sulph., Zinc.; 2) Alum., Arg., Amb., Calc., Camph., Carb.-v., Ferr., Led., Natr., Natr.-m., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Sassap., Sep., Thuj., Val.—
 При *вспухающихъ*: 1) Bell., Calc., Canth., Coloc., Dros., Kal., Lyc., Merc., Natr., Phos.-ac., Rhus., Sil., Sulph.-ac.; 2) Alum., Caust., Chin., Con., Dulc., Graph., Hyosc., Igu., Mur.-ac., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Spig., Staph., Sulph.—
 При *колющихъ*: 1) Acon., Asa., Bell., Bry., Calc., Canth., Chin., Guaj., Ign., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus., Sep., Spig., Staph., Sulph., Thuj.; 2) Amm., Amm.-m., Arn., Ars., Caust., Cocc., Colch., Con., Dros., Graph., Hell., Kal., Magn.-c., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Sabad., Sassap., Sil., Spong., Sulph.-ac., Verb.—
 При чувствѣ *ползанія въ частяхъ*: 1) Amb., Calc., Cic., Colch., Ign., Magn.-arct., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sep., Sil., Spig., Stann., Sulph.-ac.; 2) Anac., Arn., Ars., Bell., Cann., Cham., Lyc., Magn.-c., Mez., Petr., Rhus., Spong., Tart.—
 При *подергивающихъ*.

боляхъ: 1) Asa, Calc., Caust., Chin., Colch., Caps., Graph., Ign., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Sil., Sulph; 2) Alum., Anac., Aur., Bell., Bry., Cin., Clem., Con., Graph., Lyc., Magn.-aust., Merc., Phosph.-ac., Sep., Spig., Stann., Val.—При *уязвляющъ*, разъѣдающихъ, своблящихъ: 1) Alum., Ars., Asa, Baryt., Bell., Calc., Canth., Caust., Cham., Con., Cupr., Dros., Kal., Kreos., Lach., Lyc., Magn., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac., Plat., Puls., Rhus, Ruta, Sabad., Spig., Staph.—При *свербѣнн* въ частяхъ: 1) Acon., Arn., Bell., Caps., Chin., Colch., Kal., Phos.-ac., Plat., Puls., Sec., Sep., Solan.-nigr., Spig., Sulph; 2) Alum., Ars., Caust., Croc., Euphr., Ign., Magn.-aust., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Sabad., Zinc.—При чувствѣ *ползанья или бѣганья* въ страдающей части: 1) Alum., Aur., Bell., Calc., Kal., Nitr.-ac., N.-vom., Rhod., Rhus, Sulph., Sec., Sep., Staph., Thuj.—При часто повторяющейся *опытлостн* частей: 1) Calc., Carb.-v., Carb.-an., Chin., Cocc., Croc., Graph., Kal., Lyc., Merc., Petr., Phos.-ac., Puls., Rhus., Sep., Sil., Sulph; 2) Amb., Arg., Baryt., Caps., Cham., Con., Guaj., Hyos., Ign., Magn.-arct., Magn.-aust., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Rhod., Stram., Sulph., Thuj., Verat.—При чувствѣ, какъ-будто на пораженную часть *дуетъ оттеръ*, или какъ-будто сквозь нее проходить воздухъ: Aur., Colch., Graph., Magn.-aust., Oleand., Puls., Rhus, Sabin., Spig., Stram., Zinc.— При чувствѣ *холода* въ пораженной части: 1) Ars., Calc., Camph., Carb.-v., Chin., Colch., Dros., Ipec., Laur., Lyc., Magn.-aust., Merc., Mez., Natr., Natr.-m., Nitr., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sep., Sulph., Veratr.— При *жужжнхъ* боляхъ: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Canth., Carb.-v. Caust., Euphor., Graph., Merc., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sabad., Sep., Stann., Sulph; 2) Arn., Calc., Chin., Kal., Lach., Lyc., Mez., Petr., Plumb., Rhod., Ruta., Sabin., Sil., Veratr.—При *бьющихъ, стучащихъ, какъ бы молотомъ ударяющихъ, пумьсирующихъ* боляхъ: 1) Acon., Amm.-m., Ars., Bell., Calc., Carb.-v., Cham., Cocc., Ferr., Ign., Kal., Magn.-aust., Natr.-m., Phosph., Puls., Sep., Sil., Sulph., Tart.; 2) Alum., Asa., Bry., Cann., Caps., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Nitr.-ac., Petr., Rhod., Rhus, Ruta., Sabad., Stram., Veratr.—При боли, какъ бы *отъ лезвн*: 1) Amm.-m., Bry., Caust., Kal., Lach., Phosph., Puls., Ran., Rhus, Sil.; 2) Cann., Caust., Cham., Cic., Graph., Ign., Mang., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Thuj.,

Zinc.—При чувствѣ боли, какъ бы при ожогахъ: Baryt., Bell., Bry., Caust., Hyos., Ign., Lach., Magn.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sulph.-ac.—При чувствѣ боли, какъ при опрелости и въ трещинахъ: 1) Arg., Caust., Cic., Graph., Her., Ign., Mez., N.-vom., Plat., Sep., Sulph.-ac., Zinc.; 2) Alum., Arn., Bry., Calc., Caust., Cin., Kal., Kreos., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Ran., Rhus, Sil., Stann., Staph., Sulph.— При чувствѣ *выпускающихся* болей: 1) Acon., Agar., Baryt., Bell., Bry., Canth., Caps., Carb.-v., Caust., Chin., Cin., Ferr., Graph., Kal., Kreos., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Sabin., Sassap., Sep., Sulph., Val., Veratr., Zinc.— *восходящихъ*: Acon., Alum., Anac., Arn., Ars., Bell., Carb.-v., Calc., Caust., Cham., Cin., Colch., Con., Dulc., Euphor., Magn.-arct., Magn.-c., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Sep., Spong., Stront., Sulph., Thuj., Val.— При боляхъ, идущихъ *снаружи внутрь*: 1) Arg., Asa., Bell., Bry., Chin., Con., Rhus, Spig., Spong., Stann., Sulph., Val.; 2) Acon., Alum., Calc., Dros., Dulcam., Ign., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Merc., Mez., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sep., Sil., Staph.— При боляхъ, идущихъ *снаружи наружу*: 1) Anac., Arn., Calc., Canth., Ign., Kal., Plat., Spin., Staph., Zinc.; 2) Bell., Calc., Cann., Caust., Cocc., Dulc., Hell., Laur., Mez., Nitr.-ac., Oleand., Plumb., Rhus, Sabin., Sulph.-ac.— При боляхъ въ *одной половинѣ тела*: 1) Alum., Asa., Calc., Cocc., Coloc., Dulc., Graph., Kal., Magn.-arct., Magn.-aust., Mang., Mez., N.-vom., Oleand., Phos.-ac., Plat., Puls., Sassap., Spig., Staph., Sulph.-ac., Verb.; 2) Agar., Ambr., Anac., Arg., Ars., Caust., Carb.-v., Canth., Chin., Cic., Cin., Guaj., Ign., Lach., Merc., Mur.-ac., Phosph., Rhus, Sabad., Sassap., Stann., Zinc.— При боляхъ, *крестообразно* распространяющихся: Agar., Calc., Magn., Nitr.-ac., Sil., Val.— При боляхъ на *левой сторонѣ*: 1) Calc., Chin., Coloc., Lach., Merc., Petr., Phosph., Sulph.; 2) Arn., Asa., Asar., Colch., Cupr., Graph., Her., Lyc., Mez., Nitr.-ac., Phosph., Rhod., Sep., Spig., Sulph.-ac., Thuj.— На *правой сторонѣ*: 1) Amm., Amm.-m., Canth., Caust., Sabad., Stront., Zinc.; 2) Agar., Alum., Calc., Dros., Ign., Lyc., Mosch., Ruta, Sabin.— *Переходящихъ съ мѣста на мѣсто*, летучихъ: 1) Arn., Chin., Daph., N.-mosch., Puls., Rhod., Sulph.; 2) Ars., Asa., Bell., Con., Ign., Jod., Mang., Sabin., Sassap., Sec., Sep., Val., Zinc.

См. также: *Обстоятельства, причины, ревматизмъ и ломота въ суставахъ.*

Боли головы. Cephalalgia.

§ 1. Во многихъ случаяхъ головная боль составляетъ только припадокъ другой болѣзни, съ удаленіемъ которой исчезаютъ сами собой. Но иногда боли эти имѣютъ значеніе *идіопатическое*, или составляютъ на столько важный симптомъ другой болѣзни, что могутъ служить указаніемъ при выборѣ средствъ. При этомъ надо обратить вниманіе на ихъ свойство, причину и признаки, которыми характеризуется данный случай.

Различнымъ видамъ головныхъ болей соотвѣтствуютъ: 1) Acon., Ant., Bell., Bry., Calc., Caps., Cham., Chin., Coff., Coloc., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus., Sep., Sil., Sulph., Veratr.; 2) Arn., Ars., Aur., Carb.-veg., Cin., Cocc., Dulc., Hep., Ipec., Lyc., Op., Plat.; 3) Alum., Amm.-m., Asar., Clem., Con., Ferr., Graph., Guaj., Hyos., Kal., Lach., Mosch., Natr.-m., Petr., Phosph.

§ 2. Смотра по патологическому происхожденію этихъ болей, противъ нихъ предлагаются различныя средства; такъ: противъ *ломотныхъ головныхъ болей*: 1) Bell., Bry., Coloc., Ign., Ipec., N.-vom., Sep., Veratr.; 2) Arn., Ars., Aur., Caps., Caust., Cin., Mang., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Puls., Sabin., Zinc.; — *катарральныхъ*: 1) Acon., Cham., Chin., Cin., Merc., N.-vom., Sulph.; 2) Ars., Bell., Carb.-v., Ign., Lach., Lyc., Puls.; — *въслѣдствіе напора крови къ голове*: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Coff., Merc., Op., Puls., Rhus, Veratr.; 2) Cham., Chin., Cin., Cocc., Dulc., Hep., Ign., Nitr.-ac., Sil., Sulph.; 3) Alum., Amm.-c., Con. Lach., Led.; — *въслѣдствіе гастрическаго состоянія или расстройства въ пищевареніи*: 1) Ant., Ipec., N.-vom., Puls., Sulph; 2) Arn., Verb., Bry., Carb.-v., Cocc., N.-Mosch., а если главную причину головной боли составляетъ заворъ, то: Bry., Coff., Magn.-c., N.-vom., Op. или Veratr.—Противъ *истерическихъ болей*: 1) Aur., Cocc., Hep., Ign., Magn., Magn.-m., Mosch., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Sep., Val., Veratr.; 2) Caps., Cham., Lach., Rhus., Ruta. — *нервной головной боли, мигрени*: 1) Calc., Chin., Coloc., Puls., Sep.; 2) Bry., Caps., Ign., Ipec., N.-vom., Rhus, Veratr.; 3) Acon., Arn., Ars., Bell., Cham., Chin., Cic., Coff., Hep., Nitr.-ac., Petr., Sil., Sulph.; 4) Agar., Asar., Caust., Con., Graph., Hyos., Mang., Mosch., Natr.-m., Phosph., Plat., Sabin.,

Spig., Zinc.—*режматическихъ*: 1) Acon., Cham., Chin., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Spig., Sulph.; 2) Bell., Bry., Chin., Ign., Phosph.; 3) Caust., Lach., Led., Magn.-ш..

§ 3. Противъ головныхъ болей у *женщинъ*: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Calc., Chin., Coss., Coloc., Dulc., Magn.-ш., N.-vom. Puls., Plat., Spig., Veratr.;—*чувствительныхъ*, нервныхъ субъектовъ: Acon., Cham., Chin., Coff., Ign., Ipec., Spig., Veratr.;—*дѣтей*: Acon., Bell., Caps., Cham., Coff., Ign., Ipec..

§ 4. Смотря по причинамъ, вслѣдствіе которыхъ развиваются головныя боли, самыя средства будутъ различны. Такъ, если онѣ произошли отъ *неумѣренной употребленія кофе*, то преимущественно назначаются: 1) Cham., Ign., N.-vom.; 2) Bell., Caust., Coss., Her., Lyc., Merc., Puls.. — Отъ *жара* или *разгоряченія*: 1) Acon., Bell., Bry., или Carb.-v.; 2) Amm., Calc., Baryt., Caps., Ign., Ipec., Sil.—Вслѣдствіе *неумѣренной употребленія спиртныхъ напитковъ*: 1) Ant., Arg., Bell., Bry., Calc., Chin., Coff., Ipec., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.. — Вслѣдствіе *чрезмѣрныхъ напряженій и усиленныхъ умственныхъ занятій*: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Arg., Calc., Lach., Natr., Natr.-m., Puls., Sil.; 3) Anac., Graph., Lyc., Magn., Phosph., Mang.-arct.—Вслѣдствіе *душевныхъ потрясеній отъ печали*: Ign., Phos.-ac.; отъ *огорченія* и *инья*: 1) Cham, N.-vom.; 2) Coloc., Lyc., Magn.-с., Natr.-m., Petr., Phosph., Plat, Rhus, Staph.—Отъ *наружныхъ поврежденій, удара, паденія, сотрясенія мозга* и т. д.: 1) Arg. или Cic.; 2) Merc., Petr., Rhus. — Отъ *навады*: 1) Calc., Rhus; 2) Ambr., Arg, Bry., Natr., Phos.-ac., Sil.—Отъ злоупотребленія *металлическихъ препаратовъ*: Sulph., а если *жѣдь* была причиною болей, то лучшее средство противъ нихъ Her.. При боляхъ отъ злоупотребленія *ртути*, преимущественно приносятъ пользу: 1) Carb.-veg., Chin., Puls.; 2) Arg., Her., Nitr.-ac., Sulph.. — Отъ головныхъ болей вслѣдствіе *простуды*: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Cham., Dulc., N.-vom.; 2) Ant., Chin., Coloc., Puls.; — *сквозную вѣтра*: Acon., Bell., Chin., Coloc., N.-vom.; — *купанья*: Ant., Calc., Puls.;—*холодную питья*: 1) Acon., Bell.; 2) Arg., Natr., Puls.;—*холодной похоты*: Bry., Carb.-v., N.-vom., Rhod.; — *неумѣренную куренія или нюханія табаку*: Acon., Ant., Ign.;—*долгими ночными бдѣній*: 1) Coss., N.-vom., Puls.; 2) Bry., Colch., Chin., Sulph..

§ 5. Относительно симптомовъ, на которые обращается вниманіе при выборѣ средствъ, нужно замѣтить слѣдующее:

АСОНИТУМ—*симптомъ, ослушающія, сдавливающія или стискивающія боли, особенно если онѣ имѣютъ мѣсто надъ корнемъ носа; большая тяжесть и чувство полноты во лбу и вискахъ, какъ-будто голова лопается; острая боль сквозь мостъ, или съ одной половины волосъ съ чувствомъ жужжанія; боль головы, сопровождаемая шумомъ въ ушахъ и насморкомъ, или наклонностию ко рвотѣ, тошнотамъ, жалобамъ, страхомъ смерти, необыкновенною чувствительностию при малѣйшемъ шумѣ или движеніи; блѣдное и холодное, или же красное и вздутое лице съ краснотой носа; сильный, полный и скорый, или же малый и перемежающійся пульсъ; чувство, какъ-будто кто тянетъ за волосы, или какъ-будто шаръ поднимается въ голову и распространяетъ въ ней холодъ; ожесточеніе болей при движеніи, разговорѣ, непрямленномъ положеніи и питьѣ; улучшеніе на открытомъ воздухѣ.*

АНТИМОНІУМ—*если вслѣдствіе неистратности желудка или пищеваренія, простуды или скрившейся сѣтви, обнаруживаются слѣдующія явленія: боли во лбу, какъ-будто онѣ лопаются, или же сверлящія, судорожныя, тупыя (и терзающія), особенно во лбу, вискахъ или въ темени; ухудшеніе при восхожденіи на лѣстницу; улучшеніе на открытомъ воздухѣ; выпаденіе волосъ; тошнота, отвращеніе отъ пищи и потеря аппетита, отрыжка и наклонность ко рвотѣ (часто полезно послѣ Puls.).*

ВІЛЛАДОННА—*чувство тошноты, сильная, острая и раздавливающая боль, какъ-будто голова лопается, или какъ-будто все стремится выйти вонъ чрезъ лобъ, или какую-либо сторону; боли, особенно имѣющія мѣсто надъ глазами или носомъ, или боли въ одной половинѣ головы, съ чувствомъ натяженія; терзающія или колющія; ощущеніе колебанія, толканія, или какъ бы движенія вала въ голову и какъ-будто черепъ очень тонокъ; сильное бѣшеніе головныхъ артерій и растаженіе венъ; боль, начинающіяся всякій день отъ 4 часовъ пополудни и продолжающіяся до слѣдующаго утра; усиленіе ихъ при движеніи глазъ, также при восхожденіи на высоту, отъ прикосновенія, на открытомъ воздухѣ, или отъ сквознаго вѣтра, или также по ночамъ, съ теплой постелью; головокруженіе, ослушеніе, краснота и вздутость лица и краснота глазъ; необыкновенная чувствительность къ малѣйшему шуму, сѣтви, толчку и даже къ самому легкому прикосновенію; дурное расположеніе духа;*

вздохи; потребность лежать въ постели; шумъ въ ухахъ или потемнѣніе зрѣнія. (Послѣ Bell. бывають приличны: Ner., Merc. или Plat).

ВНУОПІА—чувство растлывающаго давленія или сжатія въ голову, чувство полноты, какъ-будто все вываливается черезъ лобъ; бьющія, дергающія боли, съ чувствомъ натяженія и колотье въ голову, особенно въ одной половинѣ, или боли, начиная отъ глазныхъ костей до висковъ, жгучія боли во лбу или жаръ въ головѣ; боль со рвотою, тошнотою и потребностью лежать; появленіе боли всякій разъ послѣ стола или утрома при пробужденіи и открытій глазъ; ухудшеніе болей при хожденіи, нагибаніи и прикосновеніи; сердитое и сварливое расположеніе духа; частые ознобы. (Послѣ Вгу. бывають прилично Rhus, или N.-vom.).

САЛСАВЕА—отмучивающія, давящія, какъ-бы молоткомъ бьющія боли одной половиною головы съ тошнотою, отряскою и необходимостію лежать; сверленіе во лбу, какъ-будто голова лопается; ощущеніе холода или жара въ голову, туманеніе и сдавленіе, какъ будто въ тискахъ; появленіе болей всякое утро при вставаніи; усиленіе ихъ отъ умственныхъ занятій, жарчителимаго напиткаго, тѣлеснаго напряженія, отъ движенія, нагибанія, огорченія и т. п.; выпаденіе волосъ. (Calc. прилично послѣ Sulph., или Nitr.-ac.; послѣ Calc. часто приличны: Lys., Nitr.-ac., или Sil.).

САРВИСУМ—боли въ одной половинѣ головы, колющія или давящія, съ тошнотою, рвотою и слабостію памяти; боли съ ощущеніемъ, какъ-будто черепъ раздѣляется на-двое; усиленіе болей при движеніи головы или глазъ, а также при движеніи на открытомъ воздухѣ и холодѣ; у флегматическихъ, лѣнивыхъ субъектовъ недовѣрчиваго характера, или же у своерравныхъ особъ, которые не любятъ воздуха и движенія и часто забнутъ, особенно послѣ принятія пищи или питья.

СНАМОПІЛА—въ особенности для дѣтей и особъ, которыхъ малѣйшая боль доводитъ до отчаянія; также если замѣчаются: чувство терзанія и подергиваніе въ одной сторонѣ головы (до челюстей); колотье, тяжесть или болызнетное біеніе въ голову; краснота одной щеки и блѣдность другой; жарчій потъ на голову и между волосами; одутость лица, болызнетность глазъ, катарральное жораченіе горла и дыхательныхъ кѣтвей, или горькій, гнилостный

вкусъ во рту и т. п. (Снам. вообще умѣства послѣ Асон., или Соф.; послѣ Снам. приличны Вел., или Puls.).

СНИНА—для особъ, чувствительныхъ ко всякой боли и въ особенноти; когда замѣчаются: *давящія боли по мочкамъ, мигающія заснути*; или пронзающія, дергающія боли во лбу, какъ-будто все стремится черезъ лобъ выйти вонъ; *сверление въ темени съ болью въ мозгу, какъ при ушибѣ*; усиленіе болей отъ прикосновенія, размышленія, бесѣды на открытомъ воздухѣ, отъ сквознаго и обыкновеннаго вѣтра; особенно, если въ то же время обзавается *чувствительная болезненность волосистой части головы къ прикосновенію*; также у особъ угрюмаго, недовольнаго характера; у своенравныхъ, непослушныхъ, падшихъ до ласкомствъ дѣтей съ блѣднымъ лицемъ, летучимъ жаромъ и краснотою въ лицѣ, много говорящихъ или беспокоящихся во снѣ. (Прилично особенно послѣ Соф., или Сарв.).

СОФРЕА—боли одной половины головы, какъ будто въ эту половину *сколочено железо*, или весь мозгъ разорванъ; притомъ необыкновенная чувствительность къ шуму, музыкѣ и въ особенности къ самымъ болямъ, которыя кажутся немыслимыми и больной кричитъ, плачетъ, беспокоится и сильно тоскуетъ, причемъ является *завлость и отвращеніе отъ воздуха*; назначается также особамъ, непривыкшимъ къ кофе, или же такимъ, которые обыкновенно пьютъ кофе, но получаютъ минутное отъ него отвращеніе, и особенно тамъ, гдѣ причиною боли были: долгое размышленіе, досада, простуда и т. п.. (Соф., прилично послѣ Асон., или Снам., или передъ Ign., N.-vom., и Puls.).

СОЛОСУПТИС—сильныя, терзающія боли съ натяженіемъ въ одной половинѣ головы, или же *судорожныя, давящія, съ тошнотою и рвотою*; *сжиманіе во лбу, ожесточающееся при нагибаніи, или при лежаніи на спинѣ*; постоянное появленіе болей послѣ полудня и въ вечеру, съ сильной тоскою и безпокойствомъ до такой степени, что больной не можетъ даже лежать на постелѣ; сильныя боли, отъ которыхъ больной невольно кричитъ, причемъ *потъ пахнетъ мочею*; обильная и водянистая моча во время болей, или же скудная и вонючая въ минуты, свободныя отъ боли.

ИГНАТИА—давящія боли надъ носомъ, которыя *облегчаются или усмиряются при нагибаніи, или чувство дергающего и бью-*

еще раздавливанія, или же сверленіе и колюще въ глубинѣ мозга; терзаніе въ мозгу съ ощущеніемъ, какъ-будто козодъ околотомъ съ нѣю, сопровождаемое тошнотою, потемнѣніемъ зрѣнія, свѣтобоязнію, блѣдностію лица, обильною и водянистою мочою; минутное исчезаніе болей при перемѣнѣ положенія; вторичное появленіе ихъ послѣ стола, вечеромъ, ложась спать, или же утромъ, послѣ пробужденія; усиленіе болей отъ употребленія кофе, водки, куренія табаку и острыхъ ваннъ; пугливостъ; перемѣчливый нравъ, молчаливостъ и уныніе. (Часто употребляется послѣ Cham., Puls., или N.-vom.).

МѢКСУРИУС—ощущеніе полноты, какъ-будто черевъ лопається, или какъ-будто голова обтянута повязкою; при этомъ *терзающія, жгучія и сверлящія боли, или чувство терзанія съ одной половины головы, распространяющееся до зубовъ и горла, съ колющемъ съ ухаго; ожесточеніе болей ночью, съ теплой постели, а также отъ дѣйствія теплоты и холода; постоянный ночной потъ, не приносящій облегченія.*

ПУХ-УОМІСА—боли съ ощущеніемъ, какъ-будто козодъ околотомъ съ головою, или колющія боли, сопровождаемыя тошнотою и кислою рвотою; колюще и давленіе съ одной половины головы, ожесточающіяся утромъ до того, что больной теряетъ рассудокъ и способность думать; большая чувствительностъ мозга къ малѣйшему движенію; *ощущеніе тяжести съ головою, особенно при поворачиваніи глазъ и размышленіи, съ чувствомъ, какъ-будто черевъ лопается; жужжаніе въ головѣ съ головокруженіемъ, или съ ощущеніемъ толканія въ ней во время ходьбы; боль, какъ-будто отъ ушиба въ мозгу; ежедневно повторяющіяся боли, но утрама при пробужденіи, носъ стала, на открытомъ воздухѣ, при напѣваніи, также при движеніи и поворачиваніи глазъ; появленіе этихъ болей въ особенности послѣ кофе, который возбуждаетъ отвращеніе; блѣдный, страдальческій видъ больного; запоръ, приливы крови къ головѣ; раздражительный, вспыльчивый нравъ, или же живой, сангвиническій темпераментъ.*

ПУЛВАТИЛЛА—терзающія боли, усмиающіяся къ вечеру или бьющія новаливанія утромъ послѣ сна и вечеромъ, ложась спать; *терзающія боли съ одной половины головы; толчки и покалыванія, сопровождаемыя головокруженіемъ, рвотою и тяжестью съ головою;*

потемнѣніе зрѣнія; свѣтобоязнь; жужжаніе или терзаніе и покачиваніе въ ушахъ; блѣдность лица, плаксивость, недостатокъ аппетита и жажды; ознобъ, тоска, по временамъ кровотеченіе изъ носу; сердцебиеніе; ухудшеніе болей по вечерамъ и при покоѣ, особенно въ сидячемъ положеніи; облегченіе на открытомъ воздухѣ, отъ давленія на голову или отъ утихомиривъ ея; притомъ краткій, пріятный характеръ, или же флегматическій темпераментъ.

Риуи—терзающія, колючія боли, распространяющіяся на уши, корень носа, скуловые кости и челюсти, и сопровождаемая болью въ зубахъ и деснахъ; жгучія или бьющія боли; полнота и давящая тяжесть въ головѣ; боли, начинающіяся послѣ стола; потребность лежать и держать себя спокойно; возобновленіе болей при малѣйшемъ огорченіи, а также при хожденіи на открытомъ воздухѣ; чувство качанія и колебанія черепа на всякомъ шагу и свербенія въ затылкѣ. (Прілично послѣ вуг.).

Sanguinaria,—одно изъ превосходныхъ и быстро дѣйствующихъ средствъ при мигрени, особенно въ слѣдующихъ обстоятельствахъ: боли приступами, начинаются по утрамъ и оканчиваются къ вечеру; голова какъ бы налита, какъ бы готова лопнуть, при ощущеніи выплыванія глазъ; колючія или бьющія боли, сосредоточенныя по большей части во лбу и передней части головы, сильнѣе на правой сторонѣ; при этомъ знобъ, тошнота, рвота, желаніе лежать и ожесточеніе припадковъ при всякомъ движеніи. Послѣ sang. часто показана bell.

Scria,—колючія и сверлящія боли, отъ которыхъ большой кричитъ, причемъ бываетъ тошнота и рвота; боли головы всякое утро, натяженіе и терзаніе въ одной половинѣ затылка; давленіе и натяженіе въ затылкѣ; свѣтобоязнь и невозможность открыть глаза; заноръ, сильная похотливость; отвращеніе отъ пищи; напоры крови къ головѣ съ ощущеніемъ тяжести и пустоты въ ней; давленіе на глаза отъ дневнаго свѣта; ощущеніе холода въ головѣ.

Silybia—бьющія боли съ жаромъ и приливомъ крови къ головѣ; ежедневная боль, особенно утромъ и послѣ обѣда; усиленіе боли при умственныхъ занятіяхъ, разговорѣ и нагибаніи; боли по ночамъ, распространяющіяся отъ затылка къ макушкѣ; чувство, какъ-будто голова лопается, или какъ-будто все изъ нея стремится выйти черезъ лобъ или глаза; колючія или терзающія боли въ од-

ной половиной голою, распространяющіяся на носъ и на лице; появленіе желваковъ на головѣ; частый потъ на головѣ; большая чувствительность кожи черепа; выпаденіе волосъ. (Часто прилична послѣ пер., или лус.).

SULPHUR—чувство полноты, давленія и тяжести въ головѣ, особенно во лбу, или чувство раздавливанія, какъ-будто голова лопается; терзающія, колющія, дергающія боли, съ чувствомъ натяженія, преимущественно въ одной половинѣ головы, или же бѣшеніе и болѣзненное клочтаніе въ мозгу, сопровождаемое жаромъ и приливомъ крови; боль во лбу, надъ глазами, вслѣдствіе которой больной постоянно морщитъ лобъ, или же закрываетъ глаза; боль, сопровождаемая мутнымъ взглядомъ, неспособностію думать, тошнотою и склонностію ко рвотѣ; появленіе болей всякій день или каждыя восемь дней, преимущественно по утрамъ и по ночамъ, также вечеромъ въ постели и послѣ стола; усиленіе болей отъ размишленія, сѣжанія воздуха, движенія и кожденія; большая чувствительность черепныхъ покрововъ къ прикосновенію; выпаденіе волосъ.

VERATRUM—когда боли такъ сильны, что причиняютъ бредъ и бѣшенство; когда замѣчаются: давящее бѣшеніе въ одной половинѣ головы, или же одновременное стягиваніе головы и гортани; чувство, какъ-будто мозгъ разбитъ; боли желудка; болѣзненная коченѣлость затылка; обильное отдѣленіе свѣтлой, чистой мочи; тошнота, рвота, и т. п.; большая слабость, причиняющая обмороки съ чувствомъ неловкости въ тѣлѣ при вставаніи; холодъ и холодный потъ по всему тѣлу; жажда; поносъ или запоръ, сопровождаемые приливами крови къ головѣ.

§ 6. Затѣмъ достойны вниманія еще слѣдующія средства:

ARNICA—боли надъ однимъ только глазомъ, сопровождаемыя зеленою рвотою; судорожное сжатіе во лбу, какъ-будто мозгъ сдавленъ и отвердѣлъ; жаръ въ головѣ съ холодомъ въ прочихъ частяхъ тѣла.—**ARSENICUM**—бьющія боли въ одной половинѣ головы съ тошнотою, жужжаніемъ въ ушахъ; періодически появляющіяся боли, въ особенности послѣ стола или по утру, также ночью и вечеромъ въ постелѣ, съ плачемъ и вздохами; ожесточеніе болей до отчаянія; болѣзненная чувствительность кожи черепа; облегченіе припадковъ отъ наружнаго употребленія холодной воды.—**AURUM**—болѣзненное чувство разбитости, особенно утромъ и во

времи *узмѣненнаго замѣннѣи*, доводящее больнаго до сумасшествія; жужжаніе и шумъ въ головѣ. Также у истерическихъ женщинъ. — *Сакво-чиг.*—при давящихъ и бьющихъ боляхъ преимущественно надъ глазами и во всей головѣ, начиная съ затылка; появленіе болей особенно послѣ стола или вечеромъ; приливъ крови и жаръ къ головѣ. — *Сина*—при терзающихъ, натягивающихъ или давящихъ боляхъ, съ чувствомъ значительной тяжести въ головѣ; также если боли усиливаются на открытомъ воздухѣ, при чтеніи и размышленіи, при насморкѣ. — *Соссулюс*—при боляхъ головы съ чувствомъ пустоты въ ней или съ желчною рвотою. — *Дулсамана*—если къ болямъ головы присоединяются: давящая, оглушающая боль во лбу, залеганіе носа, или сверленіе и жженіе во лбу, съ чувствомъ ковырнанія въ мозгу; ухудшеніе при малѣйшемъ движеніи, даже при разговорѣ, съ ощущеніемъ тяжести въ головѣ. — *Нерав*—противъ болей, происходящихъ какъ бы отъ присутствія гвоздя въ мозгу; сильнаго сверленія въ головѣ, или ночныхъ болей, какъ-будто лобъ вырывается, съ болящими опухолями на головѣ. — *Пресасуанна*—когда при самомъ началѣ головной боли является тошнота; ощущеніе разбитости въ головѣ; настоящая рвота и склонность къ ней. — *Лусородиум*—при боляхъ головы съ расположеніемъ къ обмороку и сильному беспокойству; при терзающей боли, обнаруживающейся преимущественно послѣ полудня или вечеромъ; при боляхъ, простирающихся на носъ, глаза и зубы, и не дающихъ больному вставать съ постели. — *Ориум*—при приливахъ крови къ головѣ, сопровождаемыхъ запоромъ, сильными терзающими болями и напряженнымъ давленіемъ по всему мозгу, біеніемъ и тяжестью въ головѣ; особенно если при этомъ замѣчаются: беспокойный взглядъ, сильная жажда, сухость во рту, кислая отрыжка, склонность къ рвотѣ и т. п. — *Рлатина*—при сильныхъ, судорожныхъ боляхъ преимущественно надъ корнемъ носа, съ жаромъ и краснотой лица, беспокойствомъ и плаксивостію; или при жужжаніи и шумѣ въ головѣ, происходящемъ какъ бы отъ воды; при холодѣ въ ушахъ, глазахъ и одной части лица, мерданіи передъ глазами и обманахъ зрѣнія, такъ что предметы кажутся въ меньшемъ противъ обыкновеннаго видѣ (Прилично часто послѣ bell.).

§ 7. Вообще можно руководствоваться слѣдующимъ:

При боляхъ *раздавливающихъ*, гнетущихъ, съ чувствомъ, какъ-будто *голова лопается*, или какъ-будто все *стремится выйти* *изъ черепа*: 1) Bell., Bry., Chin., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sep., Sil., Sulph.; 2) Acon., Amm., Ant., Baryt., Calc., Caps., Caust., Graph., Magn.-arct., Merc., Mez., Natr., Plat., Phosph., Phos. ac., Rhus, Spig., Spong., Staph., Stront; — *давящихъ*: 1) Anac., Arn., Bell., Calc., Carb.-an., Carb.-v., Chin., Cocc., Ign., Kalc., Lye., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Sep., Stann., Sulph.; 2) Acon., Ars. Asa., Aur., Bry., Caust., Cham., Cic., Dig., Dulc., Ferr., Ipec., Lach. Mez., Natr., Petr., Plat.; — *натрляющихъ*: 1) Arn., Asa., Bell., Caust., Lye., N.-vom., Puls., Sil., Stront., Sulph.; 2) Acon., Ars. Asa., Aur., Bry., Cann., Carb.-an., Carb.-v., Clem., Graph., Magn.-arct., Mosch., Natr., Natr.-m., Nitr., Petr., Spig., Stann.; Tart., Veratr.; — *сводящихъ*, *щемлящихъ* и *судорожныхъ*: 1) Acon., Arn., Calc., Carb.-veg., Coloc., Ign., Phos.-ac., Plat., Stram.; 2) Ambr., Ang., Chin., Colch., Mez., Mosch., N.-mosch., N.-vom., Petr., Sep., Stann., Zinc.; — *сдавливающихъ*, когда голова кажется какъ бы въ тискахъ, или какъ бы сжата: 1) Arn., Bry., Carb.-v., Chin., Cocc., Hell., Lye., Mez., Mosch., Natr.-m., N.-mosch., Phos.-ac., Plat., Sil., Spig., Staph., Tart.; 2) Acon., Alum., Anac., Calc., Caust., Cic., Con., Dulc., Graph., Magn.-arct., Nitr.-ac., Oleand., Sep., Staph., Sulph.-ac.; — *стягивающихъ*: 1) Anac., Asa., Carb.-v., Chin., Cocc., Graph., Laur., Merc., Natr.-m., Nitr., Petr., Phosph., Plat., Puls.; 2) Acon., Cann., Camph., Hyos., Ipec., Lach., Mosch., Petr., Phos.-ac., Stann., Sulph.-ac., Val., Veratr. — При чувствѣ *сжатія*, какъ-будто голова *обязана*, или какъ-будто *сдавлена обручемъ*: Cycl., Jod., Laur., Merc., Nitr.-ac., Sassa., Stann., Sulph.

§ 8. Равнымъ образомъ: при *сверлящихъ*, *роющихъ* боляхъ: 1) Calc., Dulc., Her., Puls., Sep.; 2) Amm., Amm.-m., Bell., Cocc., Ign., Laur., Magn.-c., Merc., Mez., Phos.-ac., Plat., Sabin., Spig., Stann., Staph.; — *бьющихъ* какъ бы *молоткомъ*: 1) Acon., Ars. Bell., Calc., Carb.-v., Ferr., Ign., Kreos., Lach., Natr.-m., Phosph., Puls., Sep., Sil., Stram., Sulph.; 2) Borax, Bry., Cham., Cocc., Dros., Euphr., Kal., Laur., Led., Mang., Nitr.-ac., Op., Oleand., Petr., Plat., Sabad., Seneg., Squill. — При ощущеніи какъ-бы *когда* или *клина* въ мозгу: 1) Anac., Arn., Her., Ign., Magn.-arct., N.-vom.,

Plat., Sulph.-ac.; 2) Asa., Carb.-v., Cocc., Coff., Dulc., Hell., Kreos., Natr.-m., Oleand., Rhus, Thuja.—При *терзающихъ* боляхъ: 1) Arn., Ars., Bell, Calc., Chin., Cocc., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Serp., Sil., Sulph.; 2) Amb., Aur., Bry., Caps., Carb.-an, Carb.-v., Cham., Natr., Phosph., Spig., Staph;—*колющихъ*: 1) Acon., Bell, Bry., Canth., Caust., Con., Ign., Merc., Natr., Petr., Puls., Rhus, Serp., Sil., Stann., Sulph; 2) Alum., Arn., Asa., Calc., Chel., Chin., Lach., Laur., Magn.-c., Natr.-m., N.-vom., Selen, Staph.—При боляхъ *какъ отъ лезв., или нарыванія*: 1) Amm., Ars., Carb.-v., Caust., Chin., Ign., Lyc., Magn.-c., Mez., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Serp., Sulph., Zinc.; 2) Acon., Borax., Kreos., Lach., Magn.-arct; Mang., Oleand., Rhus, Sabad., Sabin., Stront.—При чувствѣ боля въ мозгу, *какъ-будто онъ разбивается, разрывается или распадается*: 1) Aur., Bell., Camph., Chin., Con., Hell., Ign., N.-vom., Puls., Veratr.; 2) Alum., Amm.-m., Ars., Carb.-an., Caust., Coff., Con., Euphr., Herp., Ipec., Merc., Mur.-ac., Phosph., Phos.-ac., Rhus., Serp., Stann., Sulph., Zinc.—При *дергающихъ* боляхъ: 1) Amb., Arn., Bell., Calc., Chin., Ign., Cal., Magn.-aust., Nitr.-ac., Puls., Serp., Sil.; 2) Anac., Caust., Graph., N.-vom., Lyc., Petr., Phosph., Phos.-ac., Plumb., Sulph..

§ 9. При ощущеніи *холода* въ головѣ или черепѣ: 1) Bell., Calc., Phosph., Serp., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Arn., Dulc., Mosch.;—*ожженія* въ головѣ: 1) Acon., Bell., Bry., Merc., N.-vom., Phosph., Sabad., Serp.; 2) Amm., Arg., Arn., Carb.-v., Caust., Cocc., Dulc., Graph., Hell., Kal., Mur.-ac., Phos.-ac., Rhus, Spig., Stann., Sulph.-ac., Veratr;—*жужжанія, шума, рева, треска*: 1) Aur., Calc., Graph., Lach., Plat., Puls., Staph., Sulph., Zinc.; 2) Acon., Baryt., Carb.-v., Caust., Cocc., Dulc., Graph., Hell., Kal., Mur.-ac., Phos.-ac., Rhus, Spig., Stann., Sulph.-ac., Veratr.—*движенія, рыхлости, выпаденія, приколачиванія* въ мозгу: 1) Acon., Bell., Chin., Serp., Sulph.; 2) Acon., Ars., Baryt., Bry., Calc., Carb.-an., Cic., Coff., Kal., Lyc., Magn.-c., Phos.-ac., Plat., Puls., Rhus, Spig.;—*плесканія, какъ бы отъ воды*: 1) Bell., Dig., Amm., Asa, Aur., Carb.-an., Herp., Hyos., Lach., Magn.-m., N.-vom., Rhus., Spig., Squill.;—*свербенія, шекотанія, присутствія какаго-то живаго существа* въ мозгу: 1) Arn., Colch., Hyos., Laur., Magn.-aust., Plat., Puls., Rhus; 2) Acon., Baryt., Canth., Cic., Cocc., Cupr., Petr., Phosph.,

Phos.-ac., Sil., Sulph.; — какъ-будто шаръ къ голови подымается: Acon., Ign., Lach., Plumb., Sep.; — какъ-будто шаръ дуется на большую часть: Aur., Colch., Magn.-aust., Puls., Sabin., Zinc.

§ 10. При боляхъ, идущихъ внизъ: 1) Carb.-v., Caust., Ferr., Magn.-arct., Puls., Sulph.; 2) Ambr., Cin., Con., Cupr., Mur.-ac., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph.-ac., Plat., Rhus, Spig., Spong., Tart., Veratr.; — поднимающимся вверхъ: 1) Bell., Caust., Cham.; 2) Phos.-ac., Rhus, Sep., Sil., Staph.; — внутри жарушки: 1) Asa, Bell., Bry., Calc., Chin., Con., Dulc., Merc., Mez., Phosph., Rhus, Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Sulph., Val.; 2) Acon., Alum., Carb.-veg., Dros., Ign., Lach., Lyc., Magn.-arct., Magn.-m., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Phos.-ac., Rhod., Sabad., Samb., Staph., Verbas.; — жарушки внутри: 1) Anac., Arn., Calc., Canth., Laur., Plat.; 2) Cocc., Dulc., Hell., Ign., Plumb., Sabin., Spig., Stann., Staph., Sulph.-ac.; — ограничивающихся небольшимъ пространствомъ: 1) Acon., Bry., Lyc.; 2) Amb., Anac., Dulc., Ferr., Graph., Hep., Laur., Led., Mosch., N.-mosch., Plat., Sep., Spig., Squill., Staph.; — занимающихъ преимущественно наружные покровы черепа: 1) Acon., Arn., Bell., Calc., Chin., Lyc., Merc., Mez., N.-vom., Rhus, Staph.; 2) Alum., Carb.-v., Caust., Graph., Guaj., Hep., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Ruta, Sep., Spig., Sulph., Thuj., Veratr.

§ 11. Когда преимущественно поражаются болями лобъ и лобная часть головы: 1) Acon., Amm., Ars., Bell., Calc., Chin., Cocc., Dulc., Ign., Kreos., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Plat., Sabad., Stann., Sulph.; 2) Alum., Arn., Caps., Carb.-v., Ferr., Hep., Ipec., Lach., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Mez., Natr., Nitr.-ac., Puls., Spig., Thuj.; — височная часть головы: 1) Bell., Calc., Natr.-m., Plat.; 2) Acon., Alum., Anac., Chin., Kal., Kreos., Magn.-c., Mang., N.-mosch., Petr., Puls., Sabin., Sulph.-ac.; — боковая часть головы: 1) Acon., Bry., Natr.-m., Phos.-ac.; 2) Asa, Canth., Graph., Guaj., Kali, Laur., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Magn.-c., Magn.-m., Mang., Plat., Puls., Sulph., Thuj., Veratr.; — половине черепа: 1) Ars., Calc., Chin., Cic., Coloc., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Sep.; 2) Agar., Alum., Amm.-m., Anac., Asa., Cin., Dulc., Kal., Mang., Mez., Mur.-ac., Phos., Phos.-ac., Plat., Sabad., Sabin., Sassa., Spig., Staph., Sulph.-ac., Verb.; — на левой стороне: Ant., Arn., Asa., Asar., Calc., Chin., Colch., Coloc., Dros., Lach., Merc., Mez., Nitr.-ac., N.-mosch.,

Rhod., Selen., Sil., Spig., Sulph., Zinc.;—на *правой стороне*: Acon., Alum., Calc., Caust., Dros., Ferr., Her., Ign., Lyc., Mosch., Plumb., Ruta, Sabad., Sabin., Sil.;—*средней части мозга*: 1) Agn., Calc., Caust., Con., Lach., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Spig.; 2) Acon., Amb., Anac., Carb.-an., Cocc., Cupr., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Phosph., Sep., Sil., Staph., Sulph., Veratr.;—*в затылке*: 1) Acon., Calc., Carb.-v., Ign., Kal., Nitr.-ac., Petr., Rhus, Sep., Sulph.; 2) Amb., Carb.-an., Colch., Magn.-m. Mez., Mosch., N.-vom., Natr., Sil., Thuj.;—*всей мозгом*: Bell., Bry., Caust., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sep.;—*как бы в самом мозгу*: Arg., Bell., Bry., Calc., Chin., Dulc., Ign., N.-vom., Merc.

§ 12. Если *глаза* поражаются болями, или боли простираются до глазъ: 1) Acon., Baryt., Bell., Bry., Calc., Coloc., Her., Lach., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Selen., Sep., Sil.; 2) Arg., Borax, Carb.-v., Caust., Cic., Ign., Kreos., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Spong., Sulph.-ac.;—*уши*, или боль простирается до ушей: 1) Canth., Lyc., Merc., Mosch., Mur.-ac., Puls., Rhus, Sep., Sulph.; 2) Anac., Alum. Arg., Borax, Calc., Caps., Caust., Con., Ign., Natr.-m., Nitr., Phosph.;—*надъ ноздрями*, или доходятъ до него: 1) Acon., Her., N.-vom., Phosph., Rhus; 2) Arg., Ign., Lach., Lyc., Merc., Mez., Mosch., Stann.—на *лице*: 1) Acon., Her., Rhus, Sil.; 2) Amb., Bry., Calc., Carb.-v., Cin., Dros., Graph., Kreos., Lach., Natr.-m., Nitr., Nux.-vom., Petr., Phosph., Spong., Sulph., Thuj.—Если боли причиняютъ *жаръ* съ *лице* съ краснотою: Acon., Bell., Ign., Lach, Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plat., Sil., Sulph.—распространяются и на *зубы*: 1) Lach., Lyc., Puls., Rhus, Sep.; 2) Calc., Carb.-v., Caust. Ign., Kreos., Magn.-c., Merc., Sulph.—На *затылокъ*: Baryt., Bell., Carb.-v., Caust., Con., Graph., Kal., Lyc., Puls., Sabin.

§ 13. Если боли такъ жестоки, что больной отъ нихъ *мигаетъ* *гла* и затрудняется въ размышленіи: Acon., Amb., Arg., Bell., Bry., Calc., Carb.-an., Caust., Cocc., Hell., Kal., Lach., Magn.-c., Natr., N.-vom., Op., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Sil., Sulph.;—*причиняютъ головокруженіе*: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Carb.-an., Caust., Lach., N.-vom., Phosph., Puls.; 2) Anac., Chin., Cocc., Con., Hell., Magn.-m., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Rhus, Sep.;—*отуманеніе зрѣнія* или *слабость зрѣнія*: Acon., Arg.,

Bell., Calc., Cham., Cic., Hyos., Ign., N.-vom., Puls., Sil., Stram.;—сопровождается *шумом* въ ушахъ: Acon., Ars., Borax, Chin., N.-vom., Puls., Rhus, Staph., Thuj.;—производить *потиноту*, или *рвоту*: 1) Амш., Arn., Bell., Bry., Carb.-v., Coloc., Ipec., Lach., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Sep., Sulph.; 1) Alum., Calc., Chin., Cocc., Con., Dulc., Ign., Kal., Magn.-c., Natr.-m., Phosph., Stann., Vegetr.;—заставляютъ больного *лежать въ постели*: Bry., Calc., Con., N.-vom., Phosph.-ac., Puls., Rhus, Selen., Sep.; 2) Alum., Амш., Анас., Bell., Graph., Kal., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Oleand., Op., Petr., Sil., Stann., Sulph.

§ 14. Если боли появляются преимущественно *вечеромъ*: 1) Alum., Carb.-an., Carb.-v., Laur., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Coloc., Нер., Merc., Mur.-ac., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Rhus, Sep., Sil., Val.;—*ночью* или *вечеромъ въ постели*: 1) Bell., Chin., Нер., Lach., Lyc., Puls., Sil., Sulph.; 2) Alum., Ars., Magn.-c., Merc., Nitr.-ac., Op., Sassaп., Sep.;—при *вставаніи*: 1) Bry., Calc., Kal., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Baryt., Bell., Cham., Chin., Coff., Con., Нер., Ign., Ipec., Lach., Magn.-c., Magn.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Thuj.;—*въ утреннее время*: 1) Bry., Calc., Caust., Chin., Нер., Kal., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Petr., Phosph.-ac., Sep., Sil., Sulph.; 2) Амш., Амш.-м., Ars., Aur., Baryt., Bell., Carb.-an., Con., Jod., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Mang.-Mur.-ac., Natr., Nitr., Nitr.-ac., N.-mosch., Puls., Thuj.;—*послѣ обѣда*: 1) Амш., Ars., Bry., Carb.-an., Carb.-v., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Alum., Arn., Baryt., Calc., Canth., Caust., Chin., Cin., Coff., Con., Graph., Kal., Lach., Magn.-c., Magn.-m., Natr., Nitr., Nitr.-ac., Puls.;—вызываются или усиливаются отъ *умственныхъ занятій*,—отъ чтенія, письма и размышленія: 1) Calc., Chin., Natr., N.-vom., Puls., Sil.; 2) Arn., Aur., Carb.-v., Caust., Cin., Cocc., Coff., Ign., Lyc., Natr.-m., Petr., Phosph., Sep., Sulph.;—появляются преимущественно на *открытомъ воздухѣ*, а во время пребыванія въ *комнатѣ* облегчаются: 1) Calc., Caust., Chin., Coff., Con., Rhus, Spig., Sulph.; 2) Bell., Ferr., Hell., Нер., Magn.-arct., Mang., Merc., Mur.-ac., N.-vom., Petr., Puls., Staph., Sulph., Sulph.-ac.;—*ожесточаются въ комнатѣ*, а на *открытомъ воздухѣ* облегчаются: 1) Alum., Амш., Arn., Asar., Bor., Carb.-an., Magn.-c., Magn.-m., Phosph., Puls., Sabin.; 2) Acon., Ant., Arn., Hell., Sep., Sulph.

Сравни.: *Приливы крови къ голове, причины, обстоятельства.*

Боли грудныя, Dolores pectoris.

Подъ именемъ грудныхъ болей здѣсь разумѣются только тѣ, которыя происходятъ вслѣдствіе *ревматизма*, различные же виды другихъ болей изложены въ статьяхъ: *Удушье, приливы крови къ груди, воспаленіе плевры, воспаленіе легкихъ, чахотка легочная, болѣзнь сердца* и т. п..

Противъ грудныхъ болей дѣйствительнѣйшія средства суть: 1) Асеп., Арг., Вру., Chin., N.-vom., Puls.; 2) Ars., Bell., Caust., Carb.-v., Cham., Colch., Lach., Merc., Phosph., Sulph. Veratr..

Противъ такъ называемаго *ложнаго колющаго съ боку (Pneumonia pleur.)* остается главнымъ средствомъ Арг., часто однакожь Вру. или Асеп. скорѣе оказываютъ помощь, особенно если у больного замѣчаются безпокойство и лихорадочный ознобъ. Противъ ревматическихъ болей, которыя угрожаютъ переносомъ на сердце, незамѣлимое средство, по замѣчанію Геринга, Лаш., а за нямъ уже слѣдуютъ Caust. и Carb.-v. (см. впрочемъ *Ревматизмъ, причины, времена дня и обстоятельства*).

Боли живота. Коллея и судороги нижней части живота. Enteralgia, Colica.

§ 1. Лучшія средства противъ болей живота: 1) Bell., Coloc., N.-vom., Puls.; 2) Асеп., Арг., Carb.-v., Cham., Chin., Cocc., Coff., Hyosc., Ign., Lyc., Merc., Phosph., Sec., Sulph.; 3) Агн., Alum., Ant., Арг., Calc., Caust., Colch., Cupr., Ferr., Ipec., Kal., Lach., Magn.-ш., Natr., Natr.-ш., Nitr.-ас., N.-mosch., Op., Plat., Rhab., Rut., Sen., Stann., Veratr., Zinc..

§ 2. Противъ коллея отъ *судорожнаго спутыванія кишокъ (Miserere, Passio iliaca)* преимущественно приличны: Вру., N.-vom., Op., Plumb., Thuj.;—вслѣдствіе *скопленія отъроговъ (Colica flatulenta)*: 1) Bell., Carb.-v., Cham., Chin., Cocc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Агн., Colch., Coloc., Ferr., Graph., Lyc., Natr., Natr.-ш., Nitr.-ас., N.-mosch., Phosph., Magn.-arct., Veratr., Zinc.;—*геморроидальной*: Carb.-v., Coloc., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.;—*воспалительной (C. inflammatoria)*, завязавшей отъ воспалительнаго состоянія брюшныхъ внутренностей: 1) Асеп., Bell., Hyosc., Merc.; 2) Ars., Вру., Cham., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.. (Сравни.

Enteritis).—*судорожной колики* или *судороги тазовой части живота* (C. spasmodica): 1) Bell., Cham., Cocc., Coloc., Hyos., Ipec., Magnes., Magn.-m., N.-vom., Puls.; 2) Ars., Cupr., Ferr., Kal., Lach., Phosph., Stann., Sulph.;—*нервной колики живота* (Neuralgia coeliaca): Ars., Magn.-c., N.-vom.;—*листной колики* (C. verminosa): 1) Merc. 2) Cin., Sulph. 3) Cic., Ferr., Fil., N.-mosch., Rut., Sabad. (см. *листья*).

Колика желудка, печени, почек, матки и т. д., изложены в статьях: *Судороги желудка*, *Воспаление печени*, *Боли почечная*, *Матки страдания* и т. д..

§ 3. Смотри по причинамъ, вслѣдствіе которыхъ произошла колика, назначаются различныя средства; такъ, если причину колики составляютъ: *неисправность желудка* или *скопленіе нечистотъ въ первыхъ путяхъ*, то противъ нея назначаются: Bell., N.-vom., Puls., или также: Acon., Arg., Bry., Carb.-v., Chin., Coff., Her., Sulph., Tart. (Сравни. *гастрическія страданія*).—Колика вслѣдствіе *огорченія и зноба* требуетъ преимущественно: Cham. или Coloc. или также Sulph..—Вслѣдствіе *наружннхъ поврежденій*, послѣ *насады* или *удара по животу* и т. д.: 1) Agn., Bry., Rhus, или 2) Carb.-v., Lach.;—вслѣдствіе *отравленія свинцомъ* (C. saturnina) Op., Bell., или также: Alum., Plat.;—*простуды*: Cham., Chin., Coloc., Merc., N.-vom.;—отъ *дѣйствія мокрая холода*: Puls..

См. *слабость пищеваренія*, *спазмы желудка*, *гастрическія страданія*, *поносъ* и т. п..

§ 4. Противъ колики у *мамъ дѣтей* болѣе всего приличны: 1) Cham., N.-mosch., Rhab.; 2) Acon., Bell., Caust., Cic., Coff., Sil., Staph., или также 3) Bor., Cin., Ipec., Jalap., Senn.—У *беременныхъ*, или *роженицъ*: Agn., Bell., Bry., Cham., Hyosc., Lach., N.-vom., Puls., Ser., Veratr.—У *истерическихъ женщинъ* (C. hysterica): 1) Cocc., Ign., Ipec., Magn.-m., Mosch., N.-vom., Stann., Val.; 2) Ars., Bell., Bry., Stram.;—во время *менъ* (C. menstrualis): Bell., Cham., Carb.-v., Cocc., Coff., N.-vom., Puls., Sec., Sulph., Zinc..—У *мнотрохондриковъ*: Calc., Chin., Grat., Natr., Natr.-m., Stann..

§ 5.* Назначеніе сказанныхъ средствъ обусловливается свойствами каждому лекарству принадлежи.

VELLADONNA—чувство натяженія и цнпанія, какъ-будто все выпадаетъ вивъ; ухудшеніе болей при движеніи и хожденія; *за-*

чрезмерная притупленность ободочной кишки, вытолкнувшая наружу; уменьшение болей при давлении и пригибании ногъ къ животу; появленіе болей въ нижней части живота съ чувствомъ, какъ-будто внутренности наполнены колючими, также судорожное сжатіе въ животѣ съ чувствомъ жжения и давленія въ крестцѣ и подъ лобкомъ, особенно когда замѣчаются: жидкія или гнойныя испраженія низомъ, приливы крови къ головѣ, съ краснотою лица, раздутостью головныхъ венъ, доводящая до умопомѣшательства. (Послѣ bell. часто приличенъ мерс.).

Colocynthis—*необыкновенно сильная, рѣжущая, стѣсывающая или судорожная боль; рѣзь и колотье какъ-бы кожами; большая чувствительность и чувство разлома въ животѣ; вздутость живота или ощущение въ немъ пустоты; сведеніе нкръ во время боли или дрожь и терзаніе въ костяхъ; сильная тоска и безпокойство, вслѣдствіе чего больной мечется съ разными сторонами; недостаточное испраженіе низомъ, или же поносъ и желчная рвота, которая обнаруживается при облегченіи болѣзни; облегченіе послѣ употребленія кофе. Во многихъ случаяхъ, даже иногда въ самыхъ жестокихъ, можно уничтожить колику посредствомъ Coloc., повторяя его приемы, или давая въ промежуткахъ по нѣскольку ложекъ чернаго кофе, но только тогда, когда послѣ каждаго приѣма лекарства боли вновь появляются. Лишь только Coloc. оказался успѣшнымъ, его нужно оставить и нѣтъ нужды прибѣгать къ кофе.—Если остаются послѣдствія, которыя не допускаютъ назначенія Coloc., то съ успѣхомъ можно употребить Caust.*

Nuxvomica—*упорный запоръ, или твердая, трудная испраженія; при этомъ: чувство давленія и перекачиванья въ животѣ, какъ-бы отъ присутствія въ немъ камня; также ощущение внутренняго жара; щиплющая, натягивающая, стѣсывающая или сдавливающая боль, давленіе въ предсердіи, вздутость и чувствительность живота къ прикосновенію; сжатіе и полнота преимущественно съ подреберьяхъ, и чувство тяжести, причиняемой платьемъ; холодъ конечностей во время приступа болей, или одурѣніе, доходящее до потери самосознанія; вспучиваніе и рѣзь въ глубинѣ живота; давленіе чѣмъ-то острымъ и твердымъ надъ мочевымъ пузыремъ и прямою кишкою, причѣмъ больной пригибаетъ ноги къ животу; уси-*

леніе болей на всякомъ шагѣ; облегченіе въ покоѣ, равно какъ въ сидѣчѣхъ или въ лежачемъ положеніи; сильныя боли въ крестцѣ и въ бедрахъ, или гнетущая головная боль.

Pulsatilla—біеніе въ предсердіи, безпокойство, тяжесть и полнота въ животѣ, со *вздутостію* и *испрямленнымъ сжатіемъ*, чувствительностію и болью при дотрогиваніи къ животу какъ-бы отъ ушиба; спертые вѣтры, съ *урчаньемъ*, *чувствомъ перекатыванья* и тягостнымъ жаромъ въ животѣ, или щипаніе, рѣзь и терзаніе преимущественно въ верхней части живота, усиливающимся при дотрогиваніи; общій жаръ и напряженіе венъ на рукахъ и на лбу; непереносимое давленіе пояса; *ожесточеніе всего страданій при сидѣчѣхъ или лежачемъ положеніи, а также вечеромъ, сопровождаемое дрожью, которая увеличивается соразмѣрно болямъ*; облегченіе при хожденіи; болѣзненное чувство разбитости при вставаніи; склонность ко рвотѣ; поносъ; блѣдное лице съ синевою вокругъ глазъ; давящая и жгучая боль головы.

§ 6. Затѣмъ достойны вниманія:

Asonitum—пораженіе мочевого пузыря, присоединяющееся къ коликѣ съ *сильными судорожными болями*; стигиваніе въ нижней части живота около мочевого пузыря; постоянный, но тщетный позывъ на моченспусканіе; *возвышенная чувствительность живота*; боли въ поясницѣ, съ чувствомъ разбитости въ ней; тоска, безпокойство и метаніе въ *различныя стороны*.—**Arsenicum**—жестокія, мучительныя боли въ животѣ, сильная рѣзь, судорожная, натягивающія, терзающія или грызущія боли, часто сопровождаемыя *невыносимымъ ожженіемъ*, или ощущеніемъ холода въ животѣ; появленіе болей преимущественно ночью, или *послѣ приимтія пищи и нитья*; склонность ко рвотѣ и настоящая *водлистая или желчная рвота*, запоръ или поносъ; сильная жажда; ознобъ съ дрожью и необыкновенная слабость.—**Salvo vegetabilis**—полнота и *вздутость живота* съ чувствомъ, какъ-будто онъ лопается; *урчаніе и перекатываніе, спертые вѣтры*; щипаніе въ животѣ; затрудненное дыханіе и пустая отрыжка; приливъ крови къ головѣ съ давящею въ ней болью; *недѣятельность кишокъ, сопровождаемая запоромъ*; жаръ въ животѣ и въ головѣ; появленіе болей особенно *послѣ приимтія даже самой легкой пищи*.—**Stomachica**—терзающія, натягивающія боли, сопровождаемыя *сильнымъ возбужде-*

нiемъ и безпокойствомъ, которое заставляетъ больного постоянно перемѣнять мѣсто; ощущение, какъ-будто внутренности съжимаются въ комокъ, или какъ-будто весь животъ пустъ; отвращенiе отъ пищи; *горькая рвота* или *желчный поносъ*; боли поясницы, какъ-будто она разбита; спертые вѣтры, тоска, гнетенiе, давленiе и полнота въ *предсердiи* и *подреберьяхъ*, или же чувство напора къ нахамъ; синiе круги подъ глазами; попеременная блѣдность и краснота лица; появленiе болей преимущественно ночью, или утромъ при восходѣ солнца, или *послѣ стола*. (Послѣ снана. бываетъ прилична *puls*).—**SINGA**—необыкновенная вздутость живота, съ чувствомъ *намоты*, *давленiя чѣмъ-то твердымъ*, или судорожныя, стягивающiя боли; при этомъ *спертые вѣтры* и *напоръ къ подреберьямъ*; особенно, когда боли появляются ночью или у особъ, ослабленныхъ усиленнымъ отдѣленiемъ пота, кровотеченiями или другими потерями соковъ.—**SOSULUS**—судорожное стягиванiе въ *подреберьяхъ*, сопровождаемое тошнотой, затрудненнымъ дыханiемъ и *обильнымъ скопленiемъ вѣтровъ*, полнотой и вздутостiю желудка и верхней части живота; *чувство пустоты въ животѣ*; терзанiе, жженiе въ кишкахъ и сжатiе въ желудкѣ; склонность ко рвотѣ; запоръ; тоска; возвышенная нервная раздражительность и пугливость.—**SOPHEA**—при *чрезвычайныхъ боляхъ*, доводящихъ до *отчаянiя*, съ тоскою и давленiемъ въ предсердiи; сильное волненiе и безпокойство, съ крикомъ, скрежетомъ, конвульсiями, холодомъ конечностей, вздохами и припадками удушья.—**NUOVIAMUS**—при судорожныхъ боляхъ и *рвѣ со рвотой*, крикомъ, головою болью, при твердомъ, вздутомъ и къ прикосновенiю чувствительномъ животѣ.—**IGNATIA**—при ночныхъ коликахъ, мѣшающихъ спать; колотыи около селезенки; свирпанiе вѣтровъ съ труднымъ, но облегчающимъ отхожденiемъ ихъ; полнотѣ и вздутости подреберiй, особенно у нѣжныхъ женщинъ.—**LUCORIDIUM**—*накопленiе и частое истусканiе вѣтровъ* преимущественно *послѣ стола*, хотя бы очень умѣреннаго; давленiе въ желудкѣ и верхней части живота; *гнетенiе, намота и вздутость живота и предсердiй*; *запоръ*, или *малоколичественныя твердыя испраженiя*.—**MERCURIUS**—жестокiя сводящiя боли со вздутостiю и твердостiю живота, преимущественно вокругъ пупка; или гнетущiя, жгущiя и *комочья боли*; *жвота*; чрезвычайный голодъ, отвращенiе отъ сладкой пищи; на-

клонность ко рвотѣ и слюнотеченію; частый помывъ на нѣвъ, или *слизистый поносъ*; усиленіе болей ночью, особенно послѣ полуполночь и ознобъ, сопровождаемый краснотой и жаромъ щекъ; большая чувствительность живота при дотрогиваніи; сильная усталость. — *RHOERHONUS* — противъ колики, причиненной вѣтрами, ощущаемой въ глубинѣ живота и облегчающейся при хожденіи. — *SCYALIA* — для мужчинъ, когда замѣчаются: колика и боль въ крестцѣ; терзаніе въ лядвеяхъ; отрыжка и рвота; для женщинъ, когда у нихъ, во время мѣсячнаго очищенія, замѣчаются: жгучая боль въ правой сторонѣ, запоръ и боль въ нижней части живота, блѣдность лица, холодъ конечностей; малый, слабый пульсъ и холодный потъ. — *SULPHUR* — *геморроидальная колика* послѣ тщетно употребленныхъ Carb.-v., или N.-vom.; при *желчной* коликѣ, если ни Cham., ни Coloc. не оказали успѣха, или также при коликѣ вслѣдствіе скопленія *оттровоъ*, если она не уменьшилась послѣ Cham., Coss., N.-vom., или Carb.-v., или также при *слизистой* *коликѣ*, если Merc. или Cin. не успѣли уничтожить ея.

§ 7) Можно также руководствоваться слѣдующими обстоятельствами:

При значительной *вздутиости живота*: Acon., Arn., Ars., Bell., Carb.-v., Cham., Chin., Coss., Dig., Graph., Hyos., Jod., Kal., Lach. Magn.-m., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Natr., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Rhus, Sep., Sil. — При *большомъ накопленіи оттровоъ*: Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Chinin., Col., Graph., Her., Ign., Ipec., Jod., Kal., Lyc., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sil., Sulph., Veratr. — При *твердости живота*: Anac., Calc., Caps., Carb.-v., Graph., Magn.-m., N.-mosch., Petr., Phos., Plumb., Sil. — При частомъ *отдѣленіи оттровоъ*: Agar. Canth., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Graph., Hell., Kal., Lyc., Magn., Merc., Nitr.-ac., Oleand., Plumb., Veratr. — При *сверлящихъ боляхъ*: Cin., Coloc., Sen., Sep., Tart. — При чувствѣ *жестоты* въ животѣ: Acon., Ars., Bell., Canth., Carb.-v., Cham., Caust., Lach., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sec., Sep., Sil., Veratr. — При *давящихъ боляхъ*: Bell., Carb.-v., Caust., Kal., Lach., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Sep., Sulph. — При *болыней чувствительности живота*: Acon., Amb., Canth., Carb.-v., Cham., Coloc., Graph., Her., Hyos., Lach., Lyc., N.-vom., Puls., Sulph., Ther., Thuj., Veratr. — При *м-*

сдавливающихъ боляхъ: Bell., Dulc., Lach., Plat.—При *выжимающихъ боляхъ:* Aca., Bell., Berb., Con., Lys., Prun., Sulph., Sulph.-ac., Zinc.— При *ощущеніи жара съ животъ:* Bell., Canth., Carb.-v., Mez., Phosph., Sil.—При *чувствѣ пустоты:* Arn., Coccul., Coloc., Her., Lach., Mur.-ac., Phos., Puls., Ser., Stann.—При *чувствѣ холода въ животѣ:* Arg., Calc., Chin., Hell., Kal., Hyos., Magn.-acet., Oleand., Petr., Phos., Plumb., Rut., Sec., Ser.—При *бьющихъ боляхъ:* Cann., Caps., Cin., Kal., Lach., Lys., Ser., Sulph.-ac., Tart.— При *щиплющихъ:* Bell., Calc., Carb.-v., Chin., Lys., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Sil., Sulph.— При *судорожныхъ, щемлящихъ, сватывающихъ, стягивающихъ боляхъ:* Anac., Asa., Bell., Calc., Carb.-v., Cham., Chin., Chinin., Coss., Coloc., Her., Ipec., Jod., Lys., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Plat., Puls., Thuj.— При *боляхъ, заставляющихъ болѣею сдвинуть колѣна:* Bov., Calc., Carb.-v., Coloc., Lys., Sulph.—При *чувствѣ урзема и развѣданія въ животѣ:* Canth., Oleand., Rut., Sen.—При *терзающихъ боляхъ:* Arg., Bry., Cham., Ign., Kal., Lach., Lys., Magn.-m., Sec., Sulph.—При *трясущихъ боляхъ:* Arg., Calc., Coloc., Con., Lys., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phos., Sec., Ser., Sil., Spong., Sulph., Veratr.— При *колющихъ:* Bell., Calc., Caust., Cham., Chin., Con., Lach., Merc., Natr., Nitr.-ac., Nux.-vom., Ser., Sulph.— При *чувствѣ толканія въ животѣ:* Anac., Arn., Cann., Con., Croc., Nitr., Oleand., Plat.— При *боляхъ, какъ-будто въ животѣ что-то изъязвлено или жестко:* Arn., Arg., Asa., Bell., Calc., Canth., Carb., Colch., Con., Her., Hyos., Ipec., N.-vom., Phos., Stann.— При *вечернемъ ожесточеніи:* Amb., Amst., Ant., Arn., Bell., Bov., Bry., Calc., Caust., Chin., Con., Dulc., Her., Ign., Kal., Lach., Laur., Led., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Mez., Nitr.-ac., Phos., Plat., Puls., Ran., Rhus, Sen., Ser., Stront., Sulph., Val., Zinc.— При *появленіи болей вслѣдствіе прохлады вечеромъ воздуха:* Carb.-v., Merc.— При *усиленіи или появленіи болей отъ движенія:* Asar., Bell., Bry., Can., Dig., Graph., Kreos., Ipec., Magn.-acet., Merc., Natr.-m., N.-vom., Natr., Ther.— При *усиленіи или появленіи болей отъ прикосновенія:* Acon., Arn., Arg., Bell., Carb.-v., Cupr., Hyos., Lys., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Plumb., Puls., Sulph., Veratr.— При *усиленіи болей послѣ стола:* Arg., Carb.-v., Cham., Chin., Coloc., Graph., Jod., Kal., Lys., Magn.-c., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sil., Sulph.,

Zinc. — При *ночныхъ боляхъ*: Acon., Arn., Arg., Bar., Bry., Calc., Cham., Chin., Graph., Her., Magn.-m., Merc., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sil., Sulph. — При *усиленіи боли отъ нитъ*: Arg., N.-vom., Sulph. — При *облегченіи боли отъ наружной теплоты*: Alum., Amm., Arg., Canth., Natr., Sil. — Если при боляхъ замѣчаются *сильная тоска, безпокойство*: Arg., Carb., Cham., Lyc., Merc., Mosch., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sec., Sulph., Veratr. — При боляхъ, сопровождаемыхъ *злостью*: Arg., Colch., Ferr., Kal., Merc., Puls. — При боляхъ живота, соединенныхъ съ *болями вуды*: Bell., Caps., Carb.-v., Lach., Lyc., N.-vom., Phos., Sulph. — При осложненіи болями въ *крестцѣ*: Alum., Amm., Bar., Calc., Caust., Cham., Kal., Kreos., Natr.-m., N.-vom., Phos., Sulph.; — *носомъ*: Arg., Cham., Coloc., Merc., Phosph., Puls., Rhab., Saph., Tart.; — *запорами*: Alum., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Op., Plumb., Ser., Sulph.; — *тошнотою и рвотою*: Ant., Arg., Con., Ipec., Natr.-m., N.-vom., Tart., Veratr.; — *частою отрыжкою*: Bell., Bry., Her., Lach.

§ 8. По *мѣсту*, занимаемому болями, назначаются различныя средства; такъ, при боляхъ, занимающихъ *надчрепную часть*, преимущественно употребляются: 1) Agn., Caust., Cham., Chin., Cocc., Ign., Lyc., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Amm., Ant., Bell., Coloc., Canth., Chel., Cin., Coloc., Kal., Magn.-arct., Merc., Phos., Plumb., Rhus, Staph., Sulph. — При пораженіи *области пупка*: 1) Bell., Bry., Coloc., Chin., Ipec., Kreos., Phos.-ac., Plumb.; Rhus, Sulph., Veratr.; 2) Acon., Amm.-m., Anac., Cin., Con, Ign., N.-mosch., N.-vom., Plat., Rhab., Ser., Sulph.-ac., Verb.; — *нижней части живота*: 1) Amb., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Chin., Lyc., Ser.; 2) Ant., Calc., Caps., Cocc., Coloc., Ign., Kal., Merc., N.-vom., Phos., Sil., Spig., Thuj.; — *боковыхъ частей*: 1) Asa., Asar., Bry., Carb.-v., Chin., Ign., Sulph., Zinc.; 2) Bell., Calc., Caust., Cocc., Led., Lyc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Staph., Tart., Thuj.; — *брюшную камы и лобковой области*: 1) Arg., Cocc., Ign., Lyc., Magn.-arct., N.-vom., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Alum., Amm.-m., Calc., Cham., Clem., Coloc., Magn.-austr., Rhus, Sil., Spig., Thuj., Veratr.; — *живота вообще*: 1) Acon., Arg., Bell., Carb.-v., Cham., Chin., Cocc., Coloc., Coff., Hyos., Ign., Lyc., Merc., N.-vom., Phos., Puls., Sec., Sulph.; 2) Agn., Alum., Ant., Arn., Calc., Caust., Colch., Cupr., Ferr., Ipec., Kal., Lach.,

Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-fosch., Op., Plat., Rhab., Rut., Sen., Stann., Veratr., Zinc..

Боли зубные. Dolores dentium.

§ 1. Лучшія средства противъ зубныхъ болей вообще: 1) Bell., Cham., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Bry., Calc., Chin., Hyos., Ign., Mez., Rhus, Spig., Staph., Magn.-arct.; 3) Acon., Ant., Arn., Ars., Carb.-v., Coff., Нер., Sep., Sil, Veratr.; 4) Baryt, Caust., Cycl., Dulc., Euphorb., Magn.-c., Nitr.-ac., Phos.-ac., Plat., Sabin.,

§ 2. Противъ болей *комъ* зубовъ: 1) Ant.; 2) Magn.-arct., Mez., Sep., Staph.; 3) Acon., Bell., Borax., Chin., Merc., Natr., N.-vom., Puls.; 4) Baryt., Bry., Calc., Cham., Coff., Hyos., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-c., Phosph., Phos.-ac., Plat., Plumb., Rhus, Sabin., Sil., Sulph. Въ этихъ случаяхъ довольно трудно прибрать приличное средство, но какъ скоро оно найдено и употреблено, то боли вдругъ прекращаются. Въ трудныхъ случаяхъ, можно предложить, какъ полезное и болѣе вѣрное средство, Acon. (Tinct. fort.) или Bell., которою налитываютъ кусокъ хлопчатой бумаги и вкладываютъ въ полость зуба, но если это втеченіи 5—10 минутъ не приноситъ облегченія, то надо его оставить, потому что если Acon. помогаетъ, то поможетъ сразу; въ противномъ же случаѣ повторенные приемы ни къ чему не послужатъ.

§ 3. Кромѣ того, средства, дѣйствующія противъ зубной боли, которая *поражаетъ нѣсколько зубовъ или часть челюсти*, суть: Cham., Merc., Rhus, Staph.; если же *поражена цѣлая сторона*, то: Cham., Merc., Puls., Rhus; 2) Calc., Chin., Ign., Mez., Phos.-ac., Plat., Spig., Sulph. — Противъ зубной боли, поражающей въ то же время *и кости лица*: Clem., Hyos., Magn., N.-vom., Rhus, Spig., Sulph. — Если боли распространяются и на *глаза*: Cham., Calc., Clem., Puls., Spig. — Если на *уши*, то: Ant., Ars., Bell., Cham., Hyos., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; — и на *голову*: Ant., Ars., Sulph. — Противъ болей съ *припухlostію щеки*: 1) Arn., Cham., Lyc., Magn.-arct., Merc., N.-vom., Puls., Sep., Staph.; 2) Ars., Aur., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Sulph.; — съ *припухlostію десенъ*: Acon., Bell., Cham., Chin., Нер., Hyos., Merc., N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Sep., Staph., Sulph.; — съ *припухlostію подчелюстныхъ железъ*: Carb.-v., Cham., Merc., N.-vom., Sep., Staph..

§ 4. Боли, зависящія отъ *прилива крови*, требуютъ: 1) Acon.,

Bell., Calc., Cham., Chin., Hyos., Mex., Puls., Serp.; 2) Aur., Phosph., Plat., Sulph.—*Ревматическія и мышечная*: 1) Acon., Bell., Cham., Chin., Merc., N.-vom., Puls., Staph., Sulph.; 2) Arn., Bry., Herp., Lyc., Magn.-c., Phosph., Rhus, Sabin., Veratr., Magn.-arct.—*Нервы*: 1) Acon., Bell., Cham., Coff., Hyos., Ign., N.-vom., Plat., Spig., Magn.-arct.; 2) Ars., Magn.-c., Mex., Sulph., Veratr..

§ 5. Противъ зубной боли, происходящей отъ *неумереннаго употребленія кофе*: 1) Cham., Ign., N.-vom.; 2) Bell., Carb.-v., Merc.; 3) Coss., Puls., Rhus.—Отъ *неумереннаго куренія табаку*: 1) Bry., Chin., Spig.; 2) Cham., Merc., Sassar.—Вслѣдствіе злоупотребленія *ртутію*: 1) Carb.-v., Nitr.-ac.; 2) Bell., Chin., Serp., Puls., Staph., Sulph.—Вслѣдствіе *простуды*: 1) Acon., Bell., Cham., Coff., Dulc., Ign., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Baryt., Calc., Chin., Hyos., Magn.-arct., N.-mosch., Phosph., Rhus, Sulph.—Отъ *холоднаго и влажнаго воздуха*: 1) N.-mosch., Puls.; 2) Bell., Calc., Hyos., Merc., Sil., Staph., Sulph.—Отъ *неосторожнаго употребленія холодной воды, послѣ разгорленія*: 1) Bry., Carb.-v., Merc., Staph., Sulph.; 2) Calc., Cham., Mosch., N.-vom., Puls., Sil., Sulph..

§ 6. При зубной боли, встрѣчающейся у чувствительныхъ или нервныхъ субъектовъ: Acon., Bell., Coff., Hyos., Ign., N.-vom., Plat., Spig.—У *женщинъ*: Acon., Bell., Calc., Cham., Chin., Coff., Hyos., Ign., Puls., Sab., Serp., Spig.—У *молодыхъ патокротахъ дѣвкамъ*: Acon., Bell., Calc.—Во время *мысленнаго очищенія*: Amm., Baryt., Calc., Carb.-v., Cham., Graph., Lach., Magn.-c., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Serp.—Во время *беременности*: 1) Bell., Calc., Magn., N.-vom., N.-mosch., Puls., Serp., Staph.; 2) Alum., Hyos., Rhus.—Во время *кормленія грудью*: Chin.—У *истерическихъ женщинъ*: Ign., Serp.—У *дѣтей*: Acon., Bell., Calc., Cham., Coff., Ign., Merc., Sulph..

§ 7. По различнымъ принадлежамъ, назначаются:

Велладонна—сильная тоска и безпокойство, уныніе и плаксивость, боли въ зубахъ и деснахъ съ чувствомъ, какъ-будто всѣ эти части възвзвлены; терзающія, рѣжущія, болючія, или *наплавывающія* боли въ зубахъ, лицѣ и ушахъ, появляющіяся *вечеромъ и съ особенностію усиливающіяся ночью*; чувство сверленія въ зубахъ, пораженныхъ костоѣдою, какъ-будто происходящее отъ *примеса крови*; кровотеченіе изъ нихъ при сосаніи; болящая опухоль де-

осъ съ чувствомъ жара, зудъ, пузырьками и жжениемъ въ нихъ; припухлость щекъ, слюнотеченіе, или же сухость съ жаромъ и бо рту съ сильною жаждою; появленіе болей послѣ умственнаго занятія, или же послѣ стола; ухудшеніе на открытомъ воздухѣ и отъ прикосновенія нити къ зубамъ (при жеваніи во время ѣды); жаръ и краснота лица; чувство бьенія съ жаромъ или щемятъ; жжение и краснота глазъ. (Послѣ Bell. часто бывають причины: Merc., Ner., или Spath., Puls.)

С К А М О М І Л Л А — раздражительность, гнѣвъ и плаксивость во время болей; сильныя, натягивающія, бьющія, или колоущія боли; невыносимыя боли, особенно ночью, съ теплой постелью, доводящія больного до отчаянія, съ жаромъ опухолью и краснотой щекъ; лоснящаяся опухоль десенъ и припухлость подчелюстныхъ железъ; боли, поражающія одну часть челюсти, такъ что больной съ вѣрностію не можетъ опредѣлить, какой именно болятъ зубы; чувство ковырнанія и грызенія въ шатающихся зубахъ, подверженныхъ костоѣдѣ; колющія или бьющія боли съ одной стороны челюсти, съ усть и съ нити соответствующей стороны; появленіе или усиленіе болей отъ принятія въ ротъ жидкости, холодной или теплой, и особенно боли послѣ употребленія кофе; боли, сопровождаемыя жаромъ и краснотой преимущественно одной щеки; теплый потъ даже между волосами; тоска и безпокойство, или слабость, доводящая больного до обморока.

М Е Р С У Р І У С — терзающія, бьющія боли въ гнилыхъ зубахъ, или въ корняхъ зубовъ, и занимающія всю боковую сторону головы и лица до самыхъ ушей; лоснящаяся опухоль щеки или подчелюстныхъ железъ и слюнотеченіе; появленіе или ухудшеніе болей по вечерамъ или ночью, съ теплой постелью, гдѣ онѣ становятся невыносимыми; возобновленіе болей отъ прохладнаго и влажнаго воздуха, также при ѣдѣ, или послѣ употребленія холодной или горячей пищи и питья; туность и шаткость зубовъ, съ чувствомъ какъ-будто они удлинены; припухшія, бѣловатыя, изъязвленныя и безцвѣтныя десны, которыя дѣлаются кровоточивыми, зудящими; жжение, язвенная боль въ нихъ при дотрогиваніи и ночной потъ; ревматическія страданія членовъ; угрюмый, злобный нравъ, или плаксивость; ознобъ съ краснотой щекъ. (Прилично до или послѣ употребленія Bell., или Dulc., или передъ Ner., или Carb.-v.)

NUX VOMICA назначается въ особенности субъектамъ *холерическаго темперамента*, съ живымъ цвѣтомъ лица, или людямъ, которые пьютъ много *кофе, вина и водки*, или ведутъ сидячую жизнь. *Боли какъ при изъязвленіи, или дергающее, натягивающее чувство боли въ зубахъ и челюсти, или же только въ зубахъ, пораженныхъ костоѣдою; боли, распространяющіяся на голову, уши и скуловые кости, сопровождаемыя болящею опухолью подчелюстныхъ железъ; принужденность и болящая чувствительность десенъ, бѣшеніе въ языкъ, какъ при нарываніи; красныя и горячія пятна на щекахъ и шеѣ; ухудшеніе или появленіе болей ночью или утромъ при пробужденіи, или же послѣ обѣда, также при заходѣнн на открытомъ воздухѣ, при чтеніи, размышленіи, или какой-либо другой умственной работѣ; ухудшеніе отъ комнатной теплоты, облегченіе во время пребыванія на свободномъ воздухѣ; боли съ жалобами и отчаяніями, или же съ угрюмымъ, сварливымъ и недовольнымъ расположеніемъ духа.*

PULSATILLA прилична людямъ кроткаго, спокойнаго и застѣчиваго характера; *зубныя боли съ чувствомъ терзанія въ ушахъ и болѣю одной половиной челюсти; натягивающія, колющія или дергающія боли, какъ-будто нервъ напряженъ и потомъ вдругъ спущенъ, или бьющія, ковыряющія боли съ свербеніемъ въ деснахъ; боли, распространяющіяся на лицо, голову, языкъ, ухо страдающей части, съ блѣдностію лица, жаромъ въ головѣ, холодамъ тѣла и чувствомъ тоски въ груди; ухудшеніе или появленіе болей по вечерамъ или ночамъ, послѣ полуночи; также въ теплой постели или комнатѣ, иногда отъ употребленія теплой пищи или питья, при сидячемъ положеніи и при дотрогиваніи зубочисткою; улучшеніе послѣ обмыванія зубовъ холодною водою (которая перѣдко и ожесточаетъ боли) и отъ холоднаго воздуха.*

§ 8. Кромѣ всчисленныхъ средствъ, заслуживаютъ вниманія также:

ВЕТОНІА — особамъ живаго и холерическаго темперамента, или склоннымъ къ гнѣву и своеравнымъ. Боли въ гнѣвыхъ зубахъ и еще сильнѣйшія въ зубахъ непораженныхъ; дергающія и натягивающія боли, сопровождаемыя шаткостію зубовъ, съ чувствомъ, какъ-будто они удлинены, особенно во время ѣды или послѣ нея; покалыванія въ ушахъ; боли, заставаляющія лечь, уси-

лижающихся ночью, отъ чего-либо теплаго и отъ лежанія на здоровой щекѣ, а отъ лежанія на больной облегчающихся; боли въ деснахъ, какъ бы отъ изъязвленія. — *Сальсавета* — зубная боль съ *примизами* крови къ *юловъ*, особенно ночью; бьющія, колющія, сверлящія боли, или какъ бы отъ изъязвленія; чувство грызенія, ковыранія въ зубахъ, пораженныхъ или непораженныхъ костоѣдою; припухлость, болѣзненная чувствительность, кровоточивость десенъ; колотье и бѣненіе въ нихъ; ухудшеніе или появленіе болей отъ *сказанно* *отъ* или *холодно* *воздуха*, а также отъ *примизанія* *теплаго* или *холоднаго* *питія*, отъ магѣйшаго шума, самой незначительной простуды, и во время мѣсячнаго очищенія. — *Спина* — послѣ ослабляющей потери соковъ, во время кормленія грудью и т. п., или когда веселыхъ, рѣзвыхъ субъектовъ зубныя боли дѣлаютъ скучными и сварливыми; при турыхъ, мучительныхъ боляхъ въ зубахъ, пораженныхъ костоѣдою; при натягивающихся, бьющихся и дергающихся боляхъ, когда онѣ появляются или усиливаются послѣ стола, ночью, при *малѣйшемъ* *дотрогиваніи*, когда вновь появляются на воздухѣ или сквозномъ вѣтрѣ и уменьшаются при закрываніи рта и сжиманія зубовъ; при сухости во рту съ жаждою, приливомъ крови къ головѣ съ напряженіемъ венъ на лбу и рукахъ, при безпокойномъ ночномъ снѣ. — *Нюосіамиз* — при сильныхъ, терзающихъ и бьющихъ боляхъ, распространяющихся отъ щекъ ко лбу; притомъ замѣчается опухоль десенъ съ терзающею болью, съ жужжаніемъ въ шаткяхъ зубахъ; *попаденіе* *болей* *на* *холодномъ* *воздухѣ*, или также *утромъ*; *напоръ* *крови* къ *юловъ* съ *краснотою* и *жаромъ* *лица*, судороги гортани и конвульсивныя подергиванія въ пальцахъ, въ рукѣ или въ плечѣ; возвышенная нервная раздражительность; красные блестящіе глаза. — *Іонатіа* — во многихъ случаяхъ сходна съ *N.-vom.* или *Puls*; но особенно прилична субъектамъ чувствительнымъ, кроткаго, миролюбиваго и нѣжнаго нрава, или же особамъ, склоннымъ къ рѣзкимъ переходамъ отъ веселости къ плачу, и преимущественно тѣмъ, которыхъ всякая бездѣлица въ состояніи опечалить, или когда зубы кажутся разбитыми или шаткими; также когда боли становятся чувствительными подѣ конецъ обѣда, послѣ котораго усиливаются; также, когда онѣ усиливаются послѣ употребленія кофе, куренія табуку, вечеромъ при засыпаніи, или утромъ при

пробужденіи. (Сравн. Cham., N.-vom., Puls.)—**МАГНЕТІВ РОЛУС АВСТІСУС**—боли въ эмальзъ зубовъ съ чувствомъ, какъ-будто они сжимаются, или ощущение толчковъ по надкостной плевѣ челюстей, съ натягивающими, давящими, терзающими,ковыряющими, жгучими или колющими болями; принужденность и болѣзненная чувствительность десенъ при дотрогиваніи, или чувство оглушенія въ нихъ по уменьшеніи боли; ухудшеніе боли послѣ стола и съ теплотою, облегченіе на открытомъ воздухѣ и при хожденіи; красная и жаркая опухоль щекъ; холодъ по всему тѣлу; возвышенныя нервная раздражительность; безпокойство и трясеніе членовъ.—**МИЗІВІУМ**—боли, занимающія исключительно эмальзъ зубы, съ жгучимъ, сверлящимъ или напильнивающимъ характеромъ, простирающимися до эмальзъ костей и висковъ; ощущение туности и удлиненія въ зубахъ; усиленіе болей при дотрогиваніи, движеніи, или также вечеромъ, съ чувствомъ озноба, волненія крови, приливомъ къ головѣ; чувство воченѣлости и натягивающія боли въ страдающей сторонѣ головы; запоръ, потеря аппетита и дурное расположеніе духа.—**НИУС** показанъ преимущественно особахъ тѣлаго характера, расположеннымъ къ печали и скорби, или страху и тоскѣ; при терзающихъ, держающихъ и колющихъ боляхъ; равно при чувствѣ копанія и свербенія или изъязвленія въ зубахъ; усиленіе или появленіе болей на открытомъ воздухѣ, или ночью; облегченіе отъ приложенія наружной теплоты; болѣзненная чувствительность, жженіе въ деснахъ, шаткость и зловоніе гнилыхъ зубовъ.—**СПІГЕНІА**—давящія разжимающія боли, или держающее, быстрое терзаніе въ гнилыхъ зубахъ; появленіе сильныхъ болей тотчасъ послѣ стола или ночью; ухудшеніе отъ холодной воды или открытаго воздуха, особенно если въ то же время обнаруживаются жгучія, терзающія и держающія боли въ скуловыхъ востяхъ; вздутость живота и желтизна вокругъ глазъ; боли въ глазахъ; частый позывъ на мочеиспусканіе; сердцебиеніе, холодъ и безпокойство.—**СТАРНУСАВІА**—чернѣющіе гнилые зубы; крошенье зубовъ а бѣдностью, быстрое цѣпканье, изъязвленіе, припуханіе и чувствительность десенъ, которыя легко источаютъ кровь и бывають иногда покрыты нарощеніями; опухоль щекъ и подчелюстныхъ железъ; давящія, терзающія и напильнивающимъ боли въ деснахъ, въ гнилыхъ зубахъ, и въ корняхъ цѣльныхъ зубовъ; появленіе

или ухудшение болей при жеваніи, или *погибаетъ* *послѣ* *принятія* *холоднаго* *кннѣя*, или же *послѣ* *стола*, а также при доступѣ *воздуха*, по утрамъ или ночью.—**SULPHUR**—*терзающія*, *дергающія* и *бьющія* *боли* *въ* *иногда* *и* *иногда* *зубахъ*; боли, *простирающіяся* *въ* *голову*, съ опухолью *щеки*, *примешана* *крова* *къ* *молоку* и *давящая* *болью* *головы*; *воспалительная* *краснота* *глазъ* и *носа*; *покалыванія* *въ* *ушахъ*; *запоръ* съ частыми, но тщетными *повывомъ* *на* *низъ*; боли въ крестцѣ; *безпокойство* *въ* *членахъ*; сонливость *днемъ* и *печаль*, *усиленіе* или *появленіе* *болей* *по* *вечерамъ*, *ночью*, также *въ* *теплой* *постели*, или *отъ* *воздуха*, или *сквознаго* *вѣтра*, равно какъ и *отъ* *холодной* *воды*, *принятія* *пищи* и *жеванія*; *шаткость*, *чувство* *удлиненія* и *притупленія* *зубовъ*; *кровооточивость* *зубовъ* и *десенъ*; *отслаиваніе* *десенъ*.

§ 9. Изъ остальныхъ средствъ, достойны вниманія слѣдующія:

АСОНИТУМ—когда боли бываютъ неопредѣленныя, и преимущественно, когда *Сoff.* не принесъ никакой пользы; также если замѣчаются: *опущеніе* *толчковъ*, *боли* *бьющія*, боли съ *приливомъ* *крови* *къ* *головѣ*, *жаромъ* *въ* *лицѣ*, *краснотой* *щеки* и *безпокойствомъ* *въ* *тѣлѣ*.—**АНТИМОНІУМ**—боли въ *иногда* *зубахъ* съ *чувствомъ* *дерганія* и *грызенія*, которое распространяется на *голову*; боли, *появляющіяся* преимущественно *вечерамъ* *въ* *постели*; *усиливающіяся* *отъ* *холодной* *воды* и *уменьшающіяся* *на* *воздухѣ*; *кровооточивость* и *отпаденіе* *десенъ*.—**АНИСА**—боли *послѣ* *операціи* *надъ* *зубами*; *боль* *какъ-бы* *отъ* *выщипа*; *чувство* *натяженія* и *сгибанія* *зубовъ* *во* *время* *ѣды*, или же при *примучности*; *краснота* и *твердость* *щеки*, съ *бѣтениемъ* и *свербѣниемъ* *въ* *деснахъ*.—**АВВЕНІСУМ**—*чувство* *удлиненія* *зубовъ*, *шаткость* *ихъ* и *болѣзненность*; *натягивающія*, *дергающія* боли въ *зубахъ* и *деснахъ*, *распространяющіяся* *на* *щеку*, *ухо* и *виски*; *невыносимая* *боли*, *доводящая* *больнаго* *до* *бѣшенства* и *отчаянія*; *появленіе* *ихъ* *ночью*; *усиленіе* *при* *лежанніи* *на* *больной* *сторонѣ* и *уменьшеніе* *отъ* *теплоты*.—**САВВОУВВ**.—когда *агъ.* или *шөгс.* не имѣли желаемого *успѣха* и *когда* *представляются*: *отпаденіе* и *кровооточивость* *десенъ*; *десны*, *покрытыя* *язвинами*, *шаткость* и *болѣзненная* *чувствительность* *зубовъ* *при* *дотрогиваніи*, преимущественно *послѣ* *стола*; *натягивающія*, *теревающія* или *бьющія* *боли*, особенно *когда* *на* *зубы* *попадаетъ* *что-нибудь* *горячее*, *холодное* или *очень* *соленое*.—

СОРРНА — противъ сильнѣйшихъ болей, отъ которыхъ больной выходитъ изъ себя, плачетъ, дрожить, сильно тоскуетъ и безнокойво мечется въ различныя стороны; *трудно опредѣляемая боль*, или ощущение терзанія и дерганія, преимущественно ночью или послѣ стола. — **НЕРВА** — часто причина послѣ Мегс. или Белл., преимущественно при болищей, или рожистой опухоли щеки; при дергающихъ и натягивающихъ боляхъ въ зубахъ, усиливающихся при жеваніи, прижатіи лица, въ теплой комнатѣ или же ночью. — **СЕРІА** — противъ *бьющихъ* и *колющихъ* болей у особъ съ желтоватымъ цвѣтомъ лица; болей, распространяющихся до ушей и по плечу до пальцевъ, гдѣ онѣ производятъ чувство свербежнія; особенно, если при нихъ обнаруживаются астматическія страданія, *опухоль щеки*, кашель и припухлость подчелюстныхъ железъ. — **СИЛІСКА** — при колющихъ боляхъ, *примухами надкостной плесы* или *самой челюстной кости*, боляхъ въ челюстной кости, а не въ зубахъ; *ночныхъ боляхъ* и *бессонницѣ*; *болѣзненности* *языка*; *усиленіи болей ночью*, или когда больной принимаетъ что-нибудь холодное или горьчее. — **ВИВАТРИМ** — когда боли сопровождаются опухолью лица, холоднымъ потомъ на лбу, тошнотою и настоящею желчною рвотою, *коченѣлостью членовъ*; *упадкомъ* *силы* до обморока; *холодомъ* *всего тѣла* и *внутреннимъ жаромъ*, вслѣдствіе котораго является неустолимая жажда холодной воды, равно при боляхъ *бьющихъ*, съ чувствомъ давленія и тяжести въ зубахъ.

§ 10. Наконецъ:

ВАКУТА САВВОНІСА — когда десны и щеки блѣдны и припухли, съ чувствомъ бѣшенія въ ушахъ, *подвляющагося* особенно ночью, или когда обнаруживается *згучее покалываніе* въ зубахъ какъ скоро что-нибудь теплое прикасается къ нимъ. — **САУСТИСУМ** — при *бьющихъ* и *колющихъ* боляхъ, съ *болѣзненными* и *кровоточивыми деснами*, и *ревматическими болями* въ *мышцахъ* лица, *глазахъ* и *ушахъ*. — **СУСЛАМЕН** — при *колющихъ* и *сверлящихъ* боляхъ, или *глухомъ подергиваніи*, преимущественно ночью и у людей, *подверженныхъ ломотѣ*. — **ДУЛСАМАВА** — когда, кромѣ болей, обнаруживается *поносъ* вслѣдствіе простуды и когда *Шам.* не принесла надлежащей пользы противъ этого состоянія; или при *чувствѣ* *сжатія* *головы*, съ *слюноотеченіемъ*, *отпаденіемъ*

и губчатымъ видомъ десенъ, и когда Bell. или Merc. остались безуспѣшны. — *Euphorbium* — при давящихъ, колючихъ или сверлящихъ боляхъ, сопровождаемыхъ рожевидною опухолью щеки или крошечкѣмъ зубовъ. — *Magnesia carbonica* — противъ сверлящихъ болей, появляющихся ночью; терзающихъ, дергающихъ, язвенныхъ болей, нестерпимыхъ въ покое, заставляющихъ больного вставать съ постели и метаться въ различныя стороны, причемъ также бываетъ опухоль щеки. — *Nitric acidum* — при бьющихъ, дергающихъ, колючихъ и натягивающихъ боляхъ, преимущественно вечеромъ въ постели, или же ночью, и мѣшающихъ больному спать. — *Rhus toxicaria* — при опухшихъ, отпадающихъ и кровоточящихъ деснахъ, съ терзающими болями, которыя усиливаются въ теплой постели, или отъ принятія холодной или горячей пищи; боляхъ въ рѣзцахъ, ночью. — *Platina* — при бьющихъ и ковыряющихъ боляхъ, при усиленіи припадковъ вечеромъ и въ покое; судорожномъ чувствѣ и глухой боли въ страдающей части лица; назначается особамъ горядаго, высокохѣрнаго характера. — *Sabina* — при бьющихъ и давящихъ боляхъ, которыя появляются вечеромъ и ночью въ теплой постели и послѣ стола, съ чувствомъ, какъ-будто зубъ лопается или вырывается; чувство бѣшенія по всему тѣлу, частая отрыжка и кровотеченіе изъ матки.

§ 11. Во всякомъ случаѣ, можно также имѣть въ виду: а) При чувствѣ полноты, опухоли, разжиманія въ зубахъ: *Amb.*, *Amm.*, *Graph.*, *Mur.-ac.*, *N.-vom.*, *Phosph.-ac.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Ran.*, *Sabin.*, *Spig.*, *Spong.* — Когда они какъ-будто отделяются или вырываются: *Bry.*, *Cocc.*, *Magn.-arct.*, *Mez.*, *Mur.-ac.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *Sulph.* — При чувствѣ сверленія: *Bell.*, *Calc.*, *Cham.*, *Cycl.*, *Laur.*, *Magn.-arct.*, *Magn.-c.*, *Mez.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Plat.*, *Puls.*, *Sil.*, *Sulph.* — При жужжачихъ боляхъ: *Barut.*, *Cham.*, *Kal.*, *Magn.-arct.*, *Merc.*, *Mez.* — При чувствѣ жужжанія, шума въ зубахъ: *Hyos.*, *Magn.-arct.*, *N.-vom.*, *Sep.*, *Sulph.* — При давящихъ боляхъ: 1) *Arg.*, *Carb.-v.*, *Caust.*, *Magn.-arct.*, *N.-mosch.*, *Sep.*; 2) *Anac.*, *Asa.*, *Chin.*, *Graph.*, *Kal.*, *Natr.-m.*, *Phosph.*, *Staph.*, *Sulph.* — При чувствѣ разламыванія или гризенія: *Carb.-v.*, *Cham.*, *Kal.*, *Puls.*, *Staph.*, *Thu.* — При боли, какъ отъ излалженія: *Alum.*, *Amm.*, *Carb.-v.*, *Caust.*, *Graph.*, *Magn.-c.*, *Magn.*, *Natr.*, *Phosph.*, *Sil.* — При ошущеніи

какъ бы ижемя въ зубахъ: Lys., Nitr.-ас., Spig. — При чувствѣ
копанія или свертыванія въ зубахъ: Amm., Ant., Borax., Carb.-ап.,
Ign., Kal., Magn.-м., Rhus, Sulph.-ас. — При неистомимыхъ бо-
ляхъ: Amb., Bell., Graph., Нер., Jod., Magn.-с., Nitr.-ас., Puls.,
Tab. — При ощущеніи холода: Nitr.-ас., Phosph.-ас., Ser. — При
жгучихъ боляхъ, когда зубы какъ бы сдавлены: Amb., Анас.,
Carb.-v., Cham., Magn.-arct., Plat., Spig. — При бьющихся боляхъ:
1) Caust., Chin., Kal., Magn.-arct., Natr.-м., Nitr.-ас., Ser.; 2)
Acon., Amm., Bell., Cham., Coloc., Hyos., Magn.-с., Plat., Puls.,
Spig., Sulph. — При свербеши въ зубахъ: Acon., Arg., Baryt., Rhus.
— При чувствѣ рыхлости въ нисъ: 1) Acon., Arg., Aur, Hyos., Ign.,
Merc., Nitr.-ас., N.-mosch., Rhus, Sulph.; 2) Alum., Amm., Baryt.,
Carb.-ап., Carb.-v., Caust., Нер., Hyos., Ign., Natr.-м., N.-vom.,
Puls., Rhus, Sil., Staph., Sulph.; — терзанія: 1) Bell., Cupr., Hyos.,
Lach., Magn.-arct., Merc., N.-mosch., N.-vom., Puls., Rhus, Sil.; 2)
Amm.-м., Amm., Borax., Carb.-v., Caust., Chin., Mur.-ас., Ser., Staph.,
Sulph.-ас.; — толчковъ: Baryt., Bell., Calc., Magn.-arct., Merc., Ser.,
Spig., Sulph.; — слабости въ зубахъ: Amm., Merc.; — тяжести: Ser.,
Veratr. — При колющихъ боляхъ: 1) Baryt., Bell., Caust., Calc., Cham.,
Con., Cycl., Graph., Kal., Lach., Magn.-аust., Merc., Mez., N.-mosch.,
N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Sulph.; 2) Amm., Clem., Laur., Natr.-
м., Nitr.-ас. — При чувствѣ припуленія: 1) Amm., Merc., Mez.,
Sulph., Sulph.-ас.; 2) Aur., Dulc., Caps., Kal., Lys., Natr.-м., Nitr.-
ас., N.-mosch., Phosph., Phos.-ас., Ser., Sil., Staph.; — опуханія:
Arg., Chin., Ign., Magn.-arct., Natr.-м., Plat.; — удлиненія зубовъ:
1) Bell., Caust., Cham., Hyos., Kreos., Mez., Stann., Sulph.; 2) Alum.,
Carb.-ап., Carb.-v., Lach., Magn.-arct., Magn.-с., Nitr.-ас., Petr.,
Ser. — При чувствѣ, какъ будто зубы вывихнуты: Arg., Merc.,
N.-vom. — При ощущеніи размаченія зубовъ: Alum., Caust., Ign.,
Lys. — При язвенной боли: 1) Bell., N.-vom., Rhus, Thuj. — При
держивающихъ боляхъ: 1) Cham., Clem., Coff., Magn.-arct., Nitr.-ас.,
N.-vom., Puls., Sil., Spig., 2) Bry., Chin., Rhus.

§ 12. Если зубы легко ломаются, крошатся, то назначаютъ
Bell., Borax., Euphorb., Lach., Plumb., Sabad., Staph. — Если они
легко кровоточатъ: Amm., Ant., Amb., Baryt., Bell., Carb.-v., Lach.,
Phosph., Phos.-ас., Ser., Sulph. — Если они очень мяджи: Phosph.

Sei.—Если они *послабшим*: Lyc., Nitr.-ac., Phos.-ac. — Если они *удлиняются*: 1) Bell., Caust., Cham., Hyos., Kreos., Mez., Stann., Sulph.; 2) Alum., Carb.-an., Carb.-v., Lach., Magn.-arct., Magn.-c., Magn.-m., Nitr.-ac., Petr., Ser.—Если они *дѣлаются рыжыми*: 1) Alum., Amm., Carb.-v., Caust., Puls., Sulph.; 2) Baryt., Carb.-an., Her., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Rhus, Sil., Sulph.—Если на зубахъ *осаждаетъ много слизи*: Alum., Arn., Cham., Hyos., Jod., Mez., Petr., Plumb., Sulph.—Когда они *чернеютъ*: Merc., Plumb., Ser., Squil., Stann..

§ 13. Если поражаются преимущественно *коренные* зубы: 1) Amm., Bry., Carb.-v., Chin., Cop., Ign., Jod., Kreos., Magn.-arct., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Sil., Staph., Sulph., Zinc.;—*зубы верхней челюсти*: Acon., Aur., Bell., Carb.-v., Chin., Kreos., Magn.-c., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Ser., Zinc.;—*рѣзцы*: Agar., Alum., Carb.-v., Chin., Ign., Kal., Magn.-arct., Merc., Natr.-m., N.-mosch., Rhus, Phosph., Ser., Sulph.;—*мозговые* зубы или *вѣлки*: Calc., Mur.-ac., N.-vom., Petr., Rhus, Ser., Squil., Sulph.-ac.;—*зубы нижней челюсти*: Amb., Amm., Anac., Arn., Aur., Bell., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Cham., Magn.-arct., Natr., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Rhus, Ruta, Sabad., Sabin., Spig., Sulph.-ac., Thuj., Zinc..

§ 14. Смотра по времени ожесточения или облегчения боли, назначаются различныя средства. Если боли *усливаются вечеромъ*, то: Alum., Her., Kal., Lyc., Magn.-arct., Merc., Mez., Natr., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Sabin., Sulph.;—*вечеромъ въ постели*: Amm., Bell., Cham., Chin., Coff., Calc., Graph., Kal., Magn.-c., Merc., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sabin., Sil., Staph., Sulph.;—*отъ жеванія уменьшаются*: Chin., Coff., Magn.-m.;—*усливаются отъ прикоснѣнѣи лица*: Aur., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Cham., Graph., Kal., Lach., Magn.-arct., Magn.-c., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Sil. — Въ *противномъ случаѣ* назначаются: Amb., Amm., Cham., Magn.-arct., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus, Sil. — При ожесточеніи во время *пады въ экстазъ*: Calc., Magn.-c. — При появленіи болей на *открытомъ воздухѣ*: Alum., Amb., Amm., Caust., Cop., Graph., Magn.-c., Natr., N.-vom., Petr., Phosph., Staph. — Если боли *облегчаются на воздухѣ*: Bry., Her., Magn.-arct., Magn.-m., N.-vom., Sabad., Stann.—Если онѣ *появляются преимущественно*

утрама: Arg., Baryt., Bry., Caust., Dros., Hyos., Ign., Kreos., Magn.-ш., Merc., Mez., Nitr., Nux.-vom., Petr., Phosph., Sabin., Ser., Sil., Staph., Sulph., Tart., Thuj.; — ожесточаются отъ *напряженія умственныхъ способностей*: Bell, Ign., N.-vom.; — отъ *употребленія кофе*: Bell., Cham., Ign., Merc., N.-vom.; — отъ *холода*, а отъ *теплоты* уменьшаются: Calc., Lyc., Magn.-с., Nitr.-ас. — Если *холодная пища* увеличиваетъ боли: Baryt., Calc., Carc.-v., Cham., Cop., Magn.-ш., Merc., Mur.-ас., Nitr., Nitr.-ас., N.-vom., Phos.-ас., Puls., Thuj.; — въ *противномъ случаѣ*: Amb., Magn.-с., Magn.-ш. — Если *холодное питье*, холодная вода и т. д. ожесточаютъ боли, то: Bry., Calc., Cham., Graph., N.-mosch., N.-vom., Puls., Rhus, Ser., Sil., Spig., Sulph.; — въ *противномъ случаѣ*: Bry., Clem., Puls. — Если *холодный воздухъ* усиливаетъ боли, то: Bell., Calc., Chin., Hyos., Magn.-arct., Merc., Nitr., N.-mosch., N.-vom., Petr., Sassa., Ser., Sil., Staph., Sulph.; — въ *противномъ случаѣ*: N.-vom., Puls., Ser. — Если *доступъ воздуха вообще* усиливаетъ боль: Amm., Ant., Aur., Bell., Bry., Calc., Caust., Chin., Hyos., Magn.-arct., Merc., Natr.-ш., N.-vom., Petr., Phosph., Ser., Sil., Spig., Staph., Sulph. — Если боли являются преимущественно *ночью*, то: Amm., Bell., Calc., Cham., Chin., Clem., Coff., Graph., Kal., Lyc., Magn.-с., Merc., Natr., Natr.-ш., Nitr., Nitr.-ас., N.-vom., Oleand., Phosph., Puls., Rhus, Sabin., Sil., Staph., Sulph. — Если *влажность*, влажный воздухъ ожесточаютъ ихъ: Amm., Borax., Natr.-ш., Rhus. — Если онѣ обнаруживаются во время *ревуа*: Amm., Baryt., Calc., Carb.-v., Cham., Graph., Lach., Natr.-ш., Nitr.-ас., Phosph., Ser.; — начинаются при *чищеніи зубовъ*: Carb.-v., Graph., Lach., Lyc., Phos.-ас., Ruta, Staph.; — ожесточаются отъ употребленія *соленнаго*: Carb.-v.; — въ *противномъ случаѣ*: Magn.-с.; — усиливаются отъ *сосанія*, производимаго больнымъ съ цѣлю облегченія: Amm., Bell., Carb.-v., N.-mosch., N.-vom., Zinc.; — въ *противномъ случаѣ*: Clem. — Если *ковыряніе* вызываетъ или усиливаетъ боли: Puls.; въ *противномъ случаѣ*: Amm., Sassa. — Если боли возбуждаются отъ *сладкаго*, то: Natr. — усиливаются отъ *курения табаку*: Borax., Merc., Natr., Spig. — отъ *питьсяя*, то: Amm., Caust., Cham., Dros., Lach., Rhus, Sabin., Sil., Spig. — отъ *теплой пищи*: Agn., Amb., Anac., Baryt., Bry., Calc., Carb.-v., Magn.-arct., Kal., Lach., Merc., Puls., Ser., Sil., Sulph.; въ *противномъ случаѣ*: Magn.-ш., Nitr.-ас., Phosph., Sil.; — отъ *теплаго*

натыя: Амт., Cham., Dros., Lach., Magn.-arct., N.-vom., Puls., Sil.;
 въ *противномъ* случаѣ: Lyc., Sulph. — *отъ тьмоты*: Cham., Нер.,
 Magn.-arct., Magn.-с., N.-vom., Puls.; — въ *противномъ* случаѣ:
 Arg., Kal., Natr., N.-mosch., N.-vom., Rhus, Sulph.-ас..—Если боли
 въ *теплой* комнатѣ усиливаются, то: Cham., Нер., Magn.-arct.,
 Magn.-с., N.-vom., Puls. — Если онѣ усиливаются *отъ теплой по-*
стели: Cham., Graph., Magn.-с., Merc., Phosph.-ас., Puls., Sabin.,
 Spig., Sulph.-ас.; — въ *противномъ* случаѣ: Амт., Bry., Lyc., N.-
 vom.—Если боли ожесточаются *отъ стѣны*: Acon., Graph., Puls.,
 Sil.;—*отъ сквознаго стѣны*: Bell., Calc., Chin., Sassar., Sep., Sulph.;—
отъ сжатія зубовъ и жеванія: Alum., Амт., Bry., Graph., Guaj.,
 Нер., Hyos., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ас., Phosph., Phos.-ас., Puls.,
 Rhus, Sil., Spong., Sulph.;—въ *противномъ* случаѣ: Bry., Chin., Coff.,
 Seneg..

Боли крестца и поясницы. Lumbago.

Онѣ всегда составляютъ симптомъ другихъ болѣзней, преимуще-
 ственно геморроя у мужчинъ и маточныхъ страданій у женщинъ,
 и указываютъ на слѣдующія средства: 1) Alum., Амт., Bry., Caust.,
 Kal., Kreos., Lach., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus., Sep., Sulph.;
 2) Amb., Baryt., Borax., Calc., Dulc., Graph., Lyc., Natr., Sil., Ve-
 ratr.; 3) Arn., Carb.-an., Cham., Chin., Coccul., Ign., Magn.-m.,
 Merc., N.-mosch., Phosph., Ruta, Sabin., Spong., Zinc..

Боли лица, Protopalgia.

§ 1. Лучшія средства вообще: 1) Acon., Bell., Caust., Coloc.,
 Con., Нер., Lyc., Merc., Mez., N.-vom., Phosph., Plat., Spig., Staph.;
 2) Bry., Calc., Caps., Chin., Lyc., Puls., Rhus, Sil., Stann., Sulph.,
 Thuj., Veratr.; 3) Agar., Arn., Aur., Bar.-с., Cham., Coff., Kal.

§ 2. *Воспалительная* боль лица часто гребуетъ: 1) Acon., Aur.,
 Bry., Phosph., Stann., Sulph.; 2) Bar.-с., Bell., Lach., Merc., Plat.,
 Thuj., Veratr..

§ 3. Прогнавъ *ревматической* боли: 1) Acon., Caust., Chin., Merc.,
 Mez., Phosph., Puls., Spig., Sulph., Thuj.; 2) Arn., Bry., Нер., Lach.,
 N.-vom., Veratr.—*Артритическая* боль во многихъ случаяхъ тре-
 буетъ: Caust., Coloc., Merc., N.-vom., Rhus, Spig.—*Нервная* (Neu-
 ralgia facialis): 1) Spig.; 2) Bell., Caps., Lyc., Plat., Spig., Magn.-
 arct.; 3) Hyos., Lach., Magn., N.-vom.—Боль лица вследствие зло-

употребленія ртути: Aug., Carb.-v., Chin., Ner., Sulph. и другія, изложенныя при *меркуріальныхъ* *страдаваніяхъ*.

§ 3. Боль лица у *намокромата* молодыхъ людей, а особенно у молодыхъ дѣвицъ, чаще всего требуетъ: 1) *Acov., Bell.* или 2) *Calc., Chin., Lach., Phosph., Plat.*—У *нервныхъ субъектовъ: Bell., Lach., Lyc., Plat., Spig.*

§ 4. По сходству припадковъ, можно имѣть въ виду:

АСОНІТИМЪ—при краснотѣ и жарѣ въ лицѣ и боли въ одной его половинѣ, свербящей или язвенной; опухоли щекъ или челюстей; лихорадочномъ жарѣ, жаждѣ, сильной боли съ безпокойствомъ и тоскою.

ВЕЛЛАДОННА—если боли идутъ по направленію нерва *infra-orbitalis* и легко вновь появляются отъ тренія большого жѣста; при терзающихъ колючихъ боляхъ въ костяхъ, челюстяхъ или скуловыхъ костяхъ, причемъ часто замѣчаются: негибкость затылка, спазмы вѣкъ; конвульсивное подергиваніе мышцъ лица и искривленіе лица; краснота и жаръ лица.

САУСТИСИМЪ—при напругающихъ или бьющихъ боляхъ въ костяхъ лица, и преимущественно подъ глазами, съ нѣкотораго рода параличемъ мышцъ лица; или при натягивающей боли въ челюстяхъ, такъ что больной не можетъ раскрыть рта; ревматической боли въ членахъ, шумъ въ ушахъ.

ГОЛОСУНТИСЪ—при терзающихъ, колючихъ боляхъ, занимающихъ преимущественно лѣвую сторону лица и простирающихся въ голову, виски, носъ, ухо и зубы, съ припухlostью лица, ухудшеніемъ болей при малѣйшемъ дотрогиваніи.

СОНИМЪ—если боли появляются по ночамъ и становятся терзающими или колючими.

НЕРАВЪ—когда онѣ усиливаются преимущественно при дотрогиваніи до костей лица (скуловой) и распространяются въ уши и виски.

ЛУСОРОДИМЪ—противъ болей, начинающихся чувствомъ холода, занимающихъ правую половину и усиливающихся ночью или вечеромъ.

МЕРСУРИУСЪ—если боли бываютъ свойства терзающаго или колющаго, если онѣ занимаютъ одну сторону лица отъ виска до зубовъ и усиливаются по ночамъ въ теплой постели, сопровож-

дакъ слюнотеченіемъ, слезотеченіемъ, появленіемъ мота на лицѣ и головѣ, бессонницею.

Меззеверум — противъ судорожныхъ, оглушающихъ болей, занимающихъ лѣвую скуловую кость, распространяющихся въ глазъ, носокъ, ухо, зубы, горло и плечи, и начинающихся или усиливающихся послѣ принятія теплой пищи, или по приходѣ больного съ воздуха въ комнату.

Нихомиса — при терзающихъ и потягивающихъ боляхъ, которыя распространяются въ уши; при опухоли щеки, краснотѣ лица или щекъ (часто одной только) или желтоватомъ налетѣ вокругъ рта и носа; свербеніи въ лицѣ и подергиваніи мышцъ; усиленіи болей отъ размышленія и всякаго умственнаго занятія, равно отъ употребленія вина и кофе.

Рнозгноция — при терзающихъ боляхъ, преимущественно въ лѣвой половинѣ, зудѣ и напряженности кожи лица; опухоли и блѣдности лица; ухудшеніи болей отъ всякаго движенія лицевыхъ мышцъ во время стола, раскрытія рта, разговора и т. д.; также отъ малѣйшаго движенія; боляхъ, идущихъ отъ челюстей до корня носа или до уха; приливѣ крови къ головѣ съ головокруженіемъ; шумѣ въ ушахъ.

Рлатина — при свербащей боли съ чувствомъ холода и глукотѣ въ пораженной части; при судорожной боли и напрягающемъ давленіи въ скуловыхъ костяхъ и верхнихъ челюстяхъ, если притомъ боли возобновляются или усиливаются по вечерамъ и въ покоѣ; плавскости, краснотѣ лица и жаждѣ.

Спигелиа — при подергивающемъ терзаніи, жженіи и давленіи въ слуховыхъ и верхнечелюстныхъ костяхъ; сильной боли, не переносимой ни слабѣйшаго дотрогиванія, ни малѣйшаго движенія, и лоснящейся опухоли страдающей части; равно при сердечной тоскѣ и безпокойствѣ.

Старпуагвѣа — при давящихъ, бьющихъ боляхъ, идущихъ отъ зубовъ до глазъ, или же колючихъ, жгучихъ, натягивающихъ, или терзающихъ, рѣжущихъ, съ чувствомъ припуханія въ пораженной части, судорожномъ плачѣ, холодѣ рукъ и холодномъ потѣ лица.

§ 5. Нужно также имѣть въ виду:

При *разжимающихъ* боляхъ: Bell., Ign., Phosph., Plat., Spig.—

При *жгучихъ*: Bell., Cham., Coloc., Graph., Ign., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Samb., Spig., Veratr. — При *давящихъ*: Bell., Chin., Mez., Rhus, Spig., Stann., Staph. — При *щелочныхъ*, судорожныхъ: Mez., Nitr.-ac., Plat., Stann., Thuj. — При *бьющихъ*: Acon., Bell., Merc., Plat., Staph. — При *свербящихъ*: N.-vom., Plat. — При *терзающихъ*: Alum., Carb.-v., Chin., Coloc., Con., Herp., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Spig., Staph. — При *рвущихъ*: 1) Bell., Staph.; 2) Calc., Coloc., Rhus. — При *колющихъ*: Alum., Arg., Bell., Coloc., Con., Graph., Lyc., Merc., Rhus, Sil., Staph., Sulph. — При *напрямляющихъ*: Arg., Baryt., Caust., Coloc., Herp., Phosph., Rhus. — При боляхъ, съ чувствомъ *жгучести* въ пораженной части: Mez., Plat. — При *буравящихъ*: Coloc., Plat. — При *потливающихъ*: Arg., Carb.-v., Herp., Kal., Rhus, Sil., Stann. — При *поддерживающихъ*: Chin., N.-vom., Phosph., Spig., Thuj.

§ 6. Если боли усиливаются отъ *дотрогиванія*: Chin., Dros., Herp., Phosph., Spig.; — отъ *движенія*, разговора, жеванія: Bell., Bry., Calc., Mez., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Spig., Sulph. — При боляхъ *одной только половины лица*: Acon., Bell., Coloc., Con., Dros., Mez., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Spig., Stann., Staph. — преимущественно *левой стороны*: 1) Coloc., Graph., Lach., Staph., Sulph.; 2) Acon., Calc., Con., Nitr.-ac., N.-vom., Spig., Veratr.; — преимущественно *правой стороны*: Bell., Bry., Con., Rhus, Spig.; — усиливающихся по *вечерамъ*: 1) Bell., Con., Lach., Mez., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Puls.; 2) Acon., Bry., Calc., Coloc., Kal., Rhus, Stann. — При *ночныхъ* боляхъ: 1) Acon., Con., Merc., Nitr.-ac., Sil.; 2) Bell., Bry., Calc., Cin., Dros., Kal., Lach., Mez., Natr.-m., Phosph., Puls., Rhus, Spig., Staph., Thuj.; — *утреннихъ*: Bell., Spig., Verb. — Если боли появляются или усиливаются всякій разъ послѣ *принятія пищи*, то: 1) Bry., Calc., Con., Kal., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Sil.; 2) Nitr.-ac., Puls., Rhus. См. также: *Боли головы, зубовъ, Причины, Обстоятельства.*

Боли суставовъ и членовъ.

§ 1. Хотя во многихъ случаяхъ знаніе мѣста боли не заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ скоро избранное средство вполне соотвѣтствуетъ даннымъ признакамъ, однако иногда случается, что между 2—3 приличными средствами находится такое, которое,

по мѣсту дѣйствія, имѣеть болѣе тѣсное отношеніе къ пораженной части. Чтобы знать и имѣть въ виду такіе исключительные случаи, можно руководствоваться слѣдующими указаніями:

§ 2. Средства, болѣе всего соответствующія *болямъ въ суставахъ* вообще: 1) Agn., Calc., Caust., Ferr., Kal., Led., Lyc., Magn., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Stront., Sulph.; 2) Amb., Amm., Ant., Arn., Aur., Bry., Carb.-v., Caps., Coloc., Dros., Hell., Hep., Petr., Phosph., Rhod., Ruta, Sassa., Sil., Spig., Stann., Staph., Sulph.-ac., Thuja., Zinc.. — Если поражается преимущественно *плечевой суставъ*: 1) Bry., Calc., Carb.-v., Ferr., Ign., Kal., N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Staph., Sulph., Zinc.; 2) Amb., Arn., Caust., Caps., Led., Lyc., Natr.-m., Petr., Phosph., Veratr.. — Если поражается преимущественно *локтевой суставъ*: 1) Arg., Bell., Calc., Caust., Kal., Led., Merc., Rhus, Sep., Sulph.; 2) Ant., Bell., Graph., Lyc., Mez., Petr., Phosph., Puls., Ruta., Staph., Veratr.; — *сочлененіе кисти руки*: 1) Amm., Calc., Caust., Graph., Kal., Nitr., Rhus, Ruta., Sep., Sulph.; 2) Alum., Amm., Carb.-v., Euphorb., Hell., Lach., Lep., Mang., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Puls., Sabin., Sil., Stront.. — Если страдает преимущественно *сочлененіе пальцевъ*: 1) Agn., Calc., Carb.-v., Caust., Graph., Hep., Lyc., Sep., Spig., Sulph.; 2) Agn., Aur., Carb.-an., Cham., Chin., Colch., Clem., Cycl., Graph., Hell., Ign., Kal., Lach., Led., Natr.-m., Nitr., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Sabin., Sil., Spong., Staph., Sulph.; — *тазобедренное сочлененіе, или бедро*: 1) Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Coloc., Led., Merc., Rhus, Sulph.; 2) Ant., Coccul., Ferr., Hell., Ipec., Kal., Lyc., Mez., Natr.-m., Phosph., Puls., Rhus, Sabad., Sep., Sil., Stront., Veratr.. — При страданіи *коленной сустава*: 1) Bry., Calc., Caust., Chin., Lach., Led., Natr.-m., N.-vom., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Sil., Sulph.; 2) Alum., Anac., Ars., Asa., Carb.-v., Cocc., Con., Ferr., Graph., Hell., Hep., Jod., Kal., Lyc., Magn.-c., Merc., Nitr.-ac., Rhod., Ruta, Spig., Stann., Staph., Stront., Veratr., Zinc.; — *ступневой сустава*: 1) Bry., Caust., Lyc., Merc., Natr.-m., Phosph., Puls., Rhus, Ruta, Sep., Sulph.; 2) Amb., Ars., Carb.-an., Dros., Hep., Ign., Kal., Kreos., Led., Natr., N.-vom., Oleand., Spig., Staph., Zinc.; — *сочлененій можныхъ пальцевъ*: 1) Arn., Caust., Chin., Kal., Led., Sabin., Sep., Sulph., Zinc.; 2) Aur., Calc., Cham., Con., Ferr., Lyc., N.-vom.,

Rhus., Sil.; — *палец*: 1) Bry., Cocc., Ferr., Sep., Sulph.; 2) Ara., Asa., Bell., Chin., Ign., Magn.-arct., Mez., Nitr., Puls., Stann., Val. — При боляхъ, преобладающихъ въ *предлечии*: 1) Calc., Carb.-v., Caust., Lyc., Merc., N.-vom., Rhus, Sassap., Sep., Staph., Sulph.; 2) Arg., Carb.-an., Chin., Ferr., Con., Dulc., Kal., Mez., Nitr., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhod., Spig., Stront., Thuj. — При *пораженіи кисти руки*: 1) Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Lach., Lyc., N.-vom., Rhod., Sep., Sulph.; 2) Anac., Amb., Aur., Caust., Cham., Chin., Clem., Cocc., Ferr., Graph., Hep., Hyos., Cal., Merc., Mez., Natr., Natr.-m., Petr., Phosph., Rhus, Sil., Spig., Spong., Zinc.; — *пальцевъ*: 1) Amm., Carb.-v., Graph., Hep., Lyc. N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Amb., Amm., Calc., Caust., Cycl., Kal., Lach., Magn., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phos.-ac., Rhod., Sep., Spig., Staph., Sulph.-ac., Thuj., Veratr.; — *бедра*: 1) Bry., Calc., Chin., Hep., Merc., Petr., Phos.-ac., Rhus, Sep., Sil. Stann., Sulph.; 2) Arn., Bell., Cupr., Carb.-v., Caust., Coccul., Graph., Guaj., Led., Mez., Natr.-m., N.-vom., Oleand., Plat., Rhus, Sassap., Spig., Spong., Thuj.; — *беруа*: 1) Bell., Bry., Caust., Calc., Ferr., Kal., Lyc., N.-vom., Puls., Sep., Sil., Staph.; 2) Anac., Asa., Borax., Con., Graph., Ign., Merc., Mez., Phos.-ac., Rhod., Rhus, Sulph.; — *юлены*: 1) Asa., Calc., Lach., Merc., Mez., Phosph., Puls., Sabin.; 2) Agar., Arn., Bell., Caust., Con., Dulc., Ign., Kal., Lyc., Magn., Mur.-ac., Phos.-ac., Rhus, Sep., Sil. — При боляхъ въ *икроухъ*: 1) Alum., Ars., Calc., Cham., Con., Graph., Lyc., Natr., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sep., Staph., Sulph., Val.; 2) Ant., Bry., Chin., Coloc., Euphr., Ferr., Ign., Kal., Magn.-arct., Natr.-m., N.-vom., Sil., Spig., Stann., Zinc. — При страданіи *Ахиллова сухожилия*: Anac., Caust., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Puls., Rhus, Staph., Sulph., Zinc. — При страданіи *ноги въ особенности*: 1) Arn., Bell., Bry., Camph., Caust., Lyc., Puls., Sep., Sulph.; 2) Ars., Aur., Baryt., Ferr., Graph., Hell., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhod., Ruta, Rhus, Sulph.; — *стоны*: 1) Amm.-m., Ant., Arn., Caust., Graph., Ign., Led., Lyc., Magn.-arct., Natr., Nitr.-ac., Puls., Sabin., Sep., Sil., Sulph.; 2) Coloc., Con., Magn.-arct., Merc., Petr., Rhod., Rhus, Spong.; — *передней поверхности стоны*: 1) Calc., Camph., Carb.-an., Caust., Lyc., Merc., Puls., Spig., Thuj.; 2) Anac., Asa., Bry., Chin., Colch., Hep., Ign., Led., Mur.-ac., Natr., N.-vom., Rhus, Sassap.

Staph., Sulph., Zinc.;—*стугнией*: 1) Amb., Cau², Graph., Mur.-ac., Phosph., Phos.-ac., Puls., Spig., Sulph.; 2) Bell., Bry., Calc., Chin., Cupr., Ign., Led., Lyc., Natr., Rhus, Sil., Tarax., Zinc.;—*пальцею* *ноги*: 1) Arn., Ava., Caust., Graph., Sabin., Sulph., Thuj.; 2) Agar., Aur., Carb.-an., Carb.-v., Chin., Kal., Led., Lyc., Magn.-arct., Merc., Phosph., Phos.-ac., Plat., Sep., Sil., Staph.;—*болитъ пальцею* *ноги*: 1) Arn., Arg., Ava., Bry., Calc., Caust., Kal., Plat., Sab., Sil., Sulph., Zinc.; 2) Amb., Amm.-m., Aur., Coccul., Cycl., Led., Magn.-arct., Natr., Puls., Rhus, Sassa², Sep., Thuj.

См. также *Домета*, *Ремазмизма*, *Неврозмизма*, *Воспаленіе колѣна*.

Болезни душевныя, Morbi mentales. — § 1. При указаніяхъ леченія душевныхъ болезней, мы не будемъ строго держаться ихъ патологическихъ названій. Нанлучшими средствами здѣсь служатъ: 1) Aur., Bell., Hyos., Ign., Lach., Lyc., Op., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sep., Stram., Veratr.; 2) Acon., Anac., Ars., Calc., Cann., Caust., Cham., Coccul., Con., Graph., Hell., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Op., Rhus, Sil., Sulph.; 3) Ant., Baryt., Bry., Canth., Chin., Cic., Coff., Caps., Her., Rhus, Stann., Staph.

§ 2. Смотря по различію данныхъ случаевъ, назначаются: При чувствѣ *тоски*: 1) Ars., Puls., Veratr.; 2) Acon., Arn., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Cham., Graph., Ign., Lyc., Merc., N.-vom., Phosph., Rhus, Samb., Spig., Spong., Sulph.;—*страха и опасенія*: Acon., Anac., Ars., Baryt., Bell., Bry., Calc., Caust., Cic., Cocc., Graph., Her., Hyos., Lach., Merc., N.-vom., Op., Sulph.-ac., Veratr.;—*безпокойства, какъ-бы отъ упрязеній совѣсти*: Alum., Amm., Ars., Aur., Carb.-v., Caust., Cin., Coccul., Con., Cycl., Dig., Ferr., Graph., Hyos., Merc., N.-vom., Puls., Sil., Stram., Sulph., Veratr.;—*тоски, заставляющей больного ходить, бѣгать и т. п.*: Acon., Arg., Aur., Bell., Bry., Canth., Carb.-v., Coloc., Cupr., Dros., Graph., Hyos., Merc., N.-vom., Op., Plat., Puls., Sep., Spig., Staph., Stront., Veratr.;—*огорченія и досады*: 1) Ars., Calc., Caust., Cham., Ign., Kal., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sulph.; 2) Acon., Alum., Aur., Bell., Bry., Chin., Con., Graph., Her., Lach., Natr., Natr.-m., Petr., Phosph., Phos.-ac., Plat., Sil., Staph., Zinc.. При *раздражимости*, вслѣдствіе чего больной огорчается отъ бездѣяны: 1) Ars., Bry., Carb.-v., Caust., Con., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Staph., Sulph.; 2) Arn., Aur., Bell.,

Cham., Chin., Coccul., Her., Ign., Lys., Merc., Natr., Petr., Phos.-ac., Plat., Ser., Spig.—При склонности къ *жлоу*: Aug., Bry., Carb.-v., Cham., Caust., Her., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Ser., Sulph.—При *недоверчивости*: 1) Baryt., Caust., Cic., Hyos., Lys., Puls.; 2) Anac., Ant., Aug., Bell., Cham., Dros., Hell., Lach., Merc., Op., Ruta, Sulph.-ac.—При *людобоязни*: Amb., Baryt., Hyos., Natr., Puls., Rhus; 2) Bell., Cic., Con., Cupr., Lys., Selen.—При *возвышенной раздражительности* и возбужденномъ состояніи вообще: 1) Acon., Arg., Aug., Bell., Calc., Cham., Coff., Magn.-arct., Merc., Phosph., Val.; 2) Bry., Carb.-v., Chin., Ferr., Her., Hyos., Lys., Natr.-m., Ser., Sulph., Veratr.—При *пугливости*: Acon., Bell., Borax., Calc., Carb.-v., Caust., Cham., Coccul., Con., Natr.-m., Petr., Phosph., Sil., Sulph.—При *злѣбѣ*: 1) Anac., Bell., Hyos., Lach., Lys., N.-vom., Stram., Veratr.; 2) Ars., Caps., Cupr., Natr.-m., Petr., Phosph., Plat., Sec.; — *склонности къ брани*: Anac., Veratr.; — *къ буйству*: Ars., Chin., Her., Lach., Stram.; — *къ насиліямъ* вообще: 1) Bell., Hyos., Stram., Veratr.; 2) Anac., Ars., Baryt., Chin., Cocc., Cupr., Her., Lach., Lys., Mosch., Natr., N.-vom., Plat.—При *лстительности*: Agar., Anac., Aug., Lach.—При *лукавствѣ* и хитрости: Cupr., Lach., N.-vom.; — *чрезмѣрной дерзости и смѣлости*: 1) Ign., Magn.-arct., Op.; 2) Acon., Agar., Merc., Sulph.; — *своеправію*, непослушанія, упорствѣ: Bell., Calc., Ign., Kal., Lys., Nitr.-ac., N.-vom., Sil., Sulph.; — *сварливости* и *страсти клеветать*: 1) Ars., Caps., Chin., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., Veratr.; 2) Arg., Aug., Bell., Caust., Cham., Hyos., Lach., Lys., Mosch., N.-vom., Petr., Staph.—При *постояннымъ идеямъ*: 1) Bell., Coccul., Ign., Phosph.-ac., Sabad., Stram., Sulph.; 2) Acon., Amb., Cic., Hell., Hyosc., Lys., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Plat., Puls., Rhus, Sec., Sil., Val., Veratr.—При *ипохондрическихъ идеямъ* и опасеніяхъ: 1) Calc., Chin., N.-vom., Natr., Sulph.; 2) Anac., Aug., Con., Grat., Lach., Mosch., Natr.-m., Phos.-ac., Ser., Staph.—При *чрезмѣрной серьезности*: Alum., Aug., Bell., Caust., Euphorb., Hell., Hyos., Ign., Led., Merc., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Spig., Stann.; — *молчаливости* и сосредоточенности: Aug., Bell., Caust., Cham., Caps., Euphorb., Hell., Hyos., Ign., Ipec., Lys., N.-vom., Phos.-ac., Plat., Puls., Stann.; — *неохотѣ говорить*: 1) Amb., Bell., Bry., Ign., Lach., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Stann.; 2) Alum., Calc.,

Chin., Coloc., Cycl., Hell., Natr.-m., Plat., Sulph.—При *необыкновенномъ равнодушии*, апатіи и безучастіи: 1) Ars., Bell., Calc., Ign., Phosph., Phos.-ac., Puls., Ser., Sil., Staph.; 2) Arn., Cham., Chin., Cocc., Con., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Plat.—При *ослабчивости*: 1) Bry., Carb.-v., Caust., Herp., Lys., Natr.-m., N.-vom., Ser.; 2) Anac., Aur., Dros., Kal., Mosch., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Plat., Sulph.;—*корыстолюбіи*, зависти: 1) Ars., Bry., Puls.; 2) Calc., Lys., Ser.;—*частыхъ жалобахъ*, плачѣ, крикѣ: Acon., Ars., Bell., Calc., Bry., Cham., Cin., Coff., Graph., Hyos., Ign., Lys., Natr.-m., N.-vom., Plat., Puls., Ser., Stram., Sulph., Veratr.;—*чрезърной веселости*, рѣзвости, пѣнія, пляскѣ и пр.: 1) Bell., Coff., Croc., Lach., Lys., Natr.-m., Op., Plat., Stram., Veratr.; 2) Aur., Carb.-an., Cann., Cic., Hyos., Natr., Spong., Zinc.;—*упадку духа* и отчаяніи: Acon., Aur., Calc., Caust., Con., Graph., Ign., Lach., Lys., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sep., Sil., Stann., Sulph., Veratr.;—*отраженіи отъ жизни*: Amb., Amm., Ars., Aur., Bell., Chin., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Rhus, Sep., Sil., Staph., Sulph., Sulph.-ac., Thuj.;—*покушенія на самоубійство*: 1) Ars., Aur., N.-vom., Puls.; 2) Alum., Ant., Bell., Carb.-v., Chin., Dros., Herp., Hyos., Mez., Rhus, Sec., Ser., Spig., Stram., Tart.;—*обманахъ воображенія*, видѣній и т. п.: 1) Bell., Stram.; 2) Anac., Lach., Natr.-m., Op., Puls., Sil., Sulph.; 3) Acon., Ars., Bry., Calc., Canth., Carb.-v., Cham., Dulc., Hell., Herp., Kal., Magn.-m., Merc., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Plat.;—*чрезърной склонности къ религіознымъ размышленіямъ*: 1) Bell., Hyos., Lach., Puls., Stram., Sulph.; 2) Ars., Aur., Croc., Lys., Selen.;—*чрезърно кроткомъ*, спокойномъ расположеніи духа: Coccul., Croc., Ign., Lys., Magn.-acet., Mosch., Puls., Sil.;—*чрезърной гордости*, высокохъри, важности: 1) Lys., Plat., Stram., Veratr.; 2) Alum., Arn., Caust., Chin., Cupr., Hyos., Ipec., Lach., Phosph.;—*печали, меланхоли*: 1) Ars., Aur., Bell., Ign., Lach., Puls., Sulph.; 2) Acon., Bry., Calc., Caust., Cham., Coccul., Con., Graph., Hell., Hyos., Lys., Merc., Natr.-m., N.-vom., Petr., Plat., Rhus, Sep., Sil., Staph., Stram., Sulph., Veratr.;—*любчивости*: 1) Ant., Hyos., Veratr.; 2) Graph., Ign., Lach., Lys., Merc., Natr.-m., Nux.-vom., Plat., Puls., Sil., Stram.—При *чрезърномъ сладострастіи*: 1) Canth., Phosph., Hyos., Stram., Veratr.; 2) Chin., Lach., Lys., Merc.,

Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Plat., Puls. — При *блещеност*: 1) Acon., Bell., Calc., Hyos., Lach., N.-vom., Op., Plat., Stram., Veratr.; 2) Agar., Anac., Ant., Arn., Ars., Canth., Caust., Cic., Cann., Coccul., Coloc., Con., Croc., Cupr., Dig., Dulc., Ign., Lyc., Merc., Natr., N.-mosch., Oleand., Par., Phosph., Plumb., Puls., Rhus, Sec., Sil., Sulph., Zinc. — При *крости и неустоитъ*: 1) Bell., Canth., Hyos., Lyc., Stram., Veratr.; 2) Agar., Ars., Camph., Cann., Coccul., Croc., Cupr., Lach., Merc., Plumb., Sec. — При *перемежливости расположенія духа*: 1) Acon., Alum., Bell., Croc., Ferr., Ign., Plat., Stram., Sulph.-ac.; 2) Aur., Cann., Caps., Carb.-an., Caust., Chin., Coccul., Cycl., Ferr., Graph., Hyos., Kal., Lyc., Magn.-arct., Natr.-m., Ser., Val.

Сравни. *Памяти слабость, Водобольнъ, Ипохондрія, Меланхолия.*

Вородавки, Verrucae.—§ 1. До-сихъ-поръ здѣсь съ усѣблостью употреблялись: 1) Calc., Caust., Dulc., Natr., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Sulph., Thuj.; 2) Ars., Baryt., Bell., Нер., Lyc., Natr.-m., Phos.-ac., Sil., Staph.—Противъ бородавокъ на *рукахъ у онанистовъ*: Nitr.-ac., Ser., Sulph., Thuj..

§ 2. Кромѣ того, можно руководствоваться слѣдующими указаніями: При *застарѣлыхъ* бородавкахъ: Calc., Caust., Nitr.-ac., Rhus, Sulph.;—*кровооточивыхъ*: Magn.-aust., Natr., Nitr.-ac., Thuj.;—*воспаленныхъ*: 1) Caust., Natr., Nitr.-ac., Sil., Sulph.; 2) Amm., Calc., Rhus, Ser., Staph.;—*изъязвленныхъ*, гноящихся: 1) Calc., Caust., Нер., Thuj.; 2) Ars., Phosph., Sil.;—*зудящихъ*: Euphr., Kl., Nitr.-ac., Phosph., Thuj.;—*болящихъ*: 1) Calc., Caust., Petr., Phosph., Rhus; 2) Lyc., Nitr.-ac., Ser., Sil., Sulph..

§ 3. При *плоскихъ* бородавкахъ: Dulc., Lach.;—*большихъ*: Caust., Dulc., Kal., Nitr.-ac., Ser.;—*малыхъ*: 1) Calc., Nitr.-ac., Rhus, Sarsap., Ser., Sulph., Thuj.; 2) Dulc., Ferr., Нер., Lach.;—*твердыхъ*, роговидныхъ: Aur., Borax., Dulc., Graph., Sulph., Thuj.;—*бородавокъ съ ножкою*: Dulc., Lyc., Thuj..

§ 4. При бородавкахъ на *лицѣ*: Caust., Dulc., Kal., Nitr.-ac., Ser., Sulph.;—на *тычкахъ*: Caust.;—на *бровяхъ*: Nitr.-ac.;—*подъ глазами*: Sulph.;—на *плечѣ*: Calc., Caust., Nitr.-ac., Ser., Sulph.;—на *рукахъ*: Calc., Dulc., Lach., Lyc., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Sulph., Thuj.;—на *пальцахъ*: Lach., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Sulph., Thuj..

Вредъ, Delirium.

§ 1. Вредъ лихорадочнаго или безлихорадочнаго происхожденія всегда составляетъ только припадокъ другой болѣзни, который при выборѣ средствъ однакожъ необходимо имѣть въ виду. Все, что относится къ безлихорадочному бреду, сказано въ статьѣ умопомѣшательство, а содержаніемъ настоящей статьи будетъ бредъ лихорадочный, или тотъ, который присоединяется къ лихорадкѣ и сопровождается возвышеннымъ раздраженіемъ мозга.

Противъ бреда, назначаются преимущественно: 1) Bell., Hyos., Op., Stram., Veratr.; 2) Acon., Aug., Bry., Cupr., Lach., Lyc., N.-vom., Phosph., Sulph.; 3) Arn., Ars., Calc., Canth., Cham., Cin., Ign., Kal., Puls., Rhus, Sec., Spong..

§ 2. При *тоскливомъ*, въ *испулъ* приводящемъ и страхъ возбуждающемъ бредѣ: 1) Acon., Bell., Hyos., Op., Puls., Sil., Stram.; 2) Anac., Calc., Her., N.-vom., Phosph., Veratr.. — При бредѣ, представляющемъ много *фантастическихъ образовъ*: 1) Bell., Stram., Sulph.; 2) Cham., Hyos., Op., Ser., Sil., Spong.; 3) Graph.; — когда больной старается удалиться отъ *виднѣй*, его преслѣдующихъ, и вскакиваетъ съ постели: 1) Bell., Bry.; 2) Acon., Coloc., Op.; — при *болтливомъ бредѣ*: 1) Bell., Rhus, Stram., Veratr.; 2) Lach., Op.; — съ представленіемъ *многоразличныхъ лицъ и образовъ*: 1) Bell., Hyos., Op., Stram.; 2) Ars., N.-vom., Puls., Sulph.; 3) Calc., Camph., Carb.-v., Dros., Hell., Her., Nitr.-ac., Plat.; — выражающемъ *веселость и радость*: 1) Bell.; 2) Acon., Op., Sulph., Veratr.; — при *постоянномъ и неясномъ бормотаніи*: 1) Bell., Hyos., Stram.; 2) N.-vom.; — при *обманахъ въ мѣстностяхъ*: Bell., Bry., Lach., Veratr.; — при бредѣ *о религіозныхъ предметахъ*: 1) Bell., Puls., Stram., Veratr.; 2) Aug., Croc., Lach., Sulph.; — сопровождаемомъ *криками*: Plat., Puls., Stram.; — когда больной постоянно говоритъ объ *умершихъ особахъ*: 1) Bell., N.-vom., Op.; 2) Ars., Caust., Her.; — при бредѣ, выражающемся *максимостію и нечаяно*: Acon., Bell., Puls.; — *неистовомъ бредѣ*: Acon., Bell., Op., Plumb., Veratr..

Сравн. *Лихорадка, Умопомѣшательство, Сомъ и Сновиднѣя*.

Вугорки вообще, Tuberculosis.

§ 1. Главныя средства противъ вугорчатки вообще суть: 1) Arg., Calc., Jod., Kal., Lyc., Phosph., Puls., Staph., Sulph.; 2) Acon.,

Amb., Bell., Bry., Carb.-an., Carb.-v., Chin., Con., Dros., Ferr., Her., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph.-ac., Seneg., Ser., S.l., Thuj.

§ 2. Изъ этихъ средствъ, въ периодъ *раздраженія* или даже *воспаленія*, назначаются: Acon., Amm., Bell., Bry., Calc., Dros., Lyc., Phosph.—Въ периодъ *размиченія*, *нагноенія* или *настоящей чахотки*: 1) Ars., Calc., Ferr., Jod., Her., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Stann., Sulph.; 2) Carb.-v., Chin., Con., Nitr., Phos.-ac., Ser., Staph.

§ 3. Какія отношенія каждое изъ указанныхъ средствъ въ отдѣльности имѣеть къ различнаго рода мѣстнымъ туберкуламъ, какъ напр. къ *туберкуламъ мозга*, *лежки*, *кишечнаго канала*, еще не опредѣлено въ точности, по недостатку наблюденій надъ этими предметомъ. Навѣрное можно только сказать, что всякое изъ нихъ принесетъ пользу, какое-бы ни было мѣсто бугорковъ, какъ скоро къ употребленію средства будетъ служить показаніемъ соотвѣтственная ему *общность принадлеж.*

Бѣли, Leucorrhoea, Fluor albus.

§ 1. Бѣли всегда составляютъ только принадлеж., который зависить отъ воспалительнаго раздраженія слизистой оболочки рукава, или глубже лежащихъ частей матки. Имѣя въ виду всѣ сопровождающіе признаки и припадк., можно назначить: 1) Calc., Merc., Puls., Ser., Sulph.; 2) Alum., Amb., Amm., Carb.-an., Carb.-v., Chin., Coss., Con., Graph., Kal., Kreos., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Mez., Natr., Nitr.-m., Phosph., Ruta, Sabin., S.l., Stann., Z.nc.; 3) Acon., Agn., Bor., Cann., Caust., Dros., Her., Jod., Nitr.-ac., Novom., Petr., Phos.-ac., Sulph.-ac..

§ 2. Смотри по свойству бѣлей, назначаются: а) При *слизистокровяныхъ*, похожихъ на мясную воду: Baryt., Calc., Carb.-v., Chin., Coss., Con., Kreos., Nitr.-ac., Ser., Sulph.-ac.— При бѣляхъ *синеваго цвѣта*: Amm.— При бѣляхъ *цвѣта темнаго*: Amm.-m., Coss., Nitr.-ac.— При бѣляхъ, состоящихъ изъ *чистой слизи*: Ars., Borax., Carb.-v., Con., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Puls., Ser.— Если онѣ *жидки, водянисты*: Alum., Amm., Carb.-an., Carb.-v., Graph., Magn.-c., Magn.-m., Puls., Sil., Sulph.— При *моксидныхъ*: Chin., Coss., Ign., Con., Merc., Nitr.-ac., Ser.— При *бѣлообразныхъ*: Amm.-m., Borax., Mez., Petr., Plat.— При бѣляхъ, состоящихъ изъ *желтой слизи*: Arg., Carb.-an., Carb.-v., Cham., Kal., Kreos.,

Natr., Phosph.-ac., Sabin., Serp., Stann., Sulph.—При бѣлахъ *цветна*, *зеленоватая*: Carb.-v., Lach., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Serp.—При *млекообразныхъ*: Amm., Calc., Carb.-v., Con., Lyc., Phosph., Puls., Sabin., Serp., Sil., Sulph.-ac.—При *слизистыхъ*: Amb., Amm., Calc., Carb.-v., Chin., Con., Magn.-c., Merc., Mez., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sassar., Serp., Stann., Tart., Thuj., Zinc.—При *мошонныхъ*, *шилохвостно запаха*: Caps., Kreos., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Sabin., Serp.—При *жучихъ*: Alum., Amm., Calc., Carb.-an., Con., Kreos., Puls., Sulph.-ac.—При *прыщюныхъ*, *зудящихъ*: Calc., Cham., Con., Ferr., Lach., Merc., Phosph., Serp., Sulph.—При *пядихъ*, *острыхъ*, производящихъ язвзавленія: Alum., Amm., Arg., Borax., Carb.-v., Cham., Con., Ign., Kreos., Merc., Natr.-m., Phosph., Puls., Ran., Ruta, Serp., Sil., Sulph.—Если бѣли показываются *до наступленія регуль*: Baryt., Calc., Carb.-v., Graph., Kreos., Lach., Phosph., Puls., Serp., Sulph., Zinc.—Если онѣ появляются *во время регуль*, или же замѣняютъ ихъ: Alum., Chin. Soss., Lach., Puls., Zinc.—Если онѣ обнаруживаются *послѣ регуль*: Alum., Graph., Kreos., Nitr.-ac., Phosph.-ac., Puls., Ruta, Sil., Sulph.—Наконецъ если въ бѣляхъ присоединяются *боли живота* или судороги въ нижней его части: Caust., Con., Dros., Lyc., Magn.-m., Puls., Serp., Sil., Sulph., Zinc.—Если при нихъ будутъ еще боли въ *крестцѣ*: Baryt., Caust., Con., Graph., Kreos.—Если онѣ сопровождаются значительною *слабостію*: Baryt., Chin., Kreos., Stann.—При осложненіи *мошонною болью*: Natr.-m.; *желтоватостію лица*: Chin., Ferr., Natr.-m., Serp.; *блѣдностію лица*: Arg., Graph., Kreos., Puls., Serp.

Срвн. *Регуль недостатка*.

ВѢЛЬМО, Cataracta et Glaucoma. Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленныя противъ сѣраго потемнѣнія хрусталика суть: 1) Capn., Caust., Con., Magn., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Amm., Baryt., Calc., Chel., Dig., Euphr., Her., Huos., Nitr.-ac., Op., Ruta., Seneg., Spig., Stram.—Противъ *страго бѣльма*, образовавшагося вслѣдствіе травматическаго поврежденія (Cataracta traumatica), предъ прочими средствами отдають преимущество Con. Не менѣе того *однакожъ* заслуживаютъ вниманія: Amm., Euphr., Puls. и Ruta.—

Глаукома, зеленая-вода или тотъ видъ потемнѣнія хрусталика, при которомъ онъ получаетъ голубой цвѣтъ или цвѣтъ морской воды, излечивалась до-сихъ-поръ посредствомъ Phosph.

Противъ *стиччатую блѣнну* главными средствами служатъ Caust. и Plumb.

В.

Валеріана, булдырьянъ.—Приличнѣйшее средство противъ злоупотребленія валеріаны вообще Cham. Затѣмъ слѣдуетъ Coff. Въ рѣдкихъ случаяхъ назначается N.-vom. или Sulph. смотри по припадкамъ.

Вариолоиды (видозмѣненіе оспы).—Главные средства: Bell. и Merc., или также: Ars. и Rhus. При сильной *мыгродкѣ и юловской боли*, передъ высыпаніемъ рекомендуютъ: Acon. и Bell., а при боляхъ въ крестцѣ: Bry. Въ періодѣ *высыпанія* Sulph.—Противъ *катарра* вслѣдствіе этой болѣзни, главные средства Merc. и Bell., а при астматическихъ страданіяхъ съ слезистымъ хрипомъ: Seneg и Tart. Страданія *костей* требуютъ преимущественно: Sil. и Phos.-ac., а страданія *сочлененій*: Bell., Bry. и Merc.

Верёда или чирьи, Furunculi:— 1) Arn., Bell., Her, Lyc., Phosph., Sulph.; 2) Alum., Ant., Calc., Lach., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph.-ac., Sec., Sep., Sil., Staph., Tart., Thuj.—При *большихъ чирьяхъ*: 1) Her., Lyc., Nitr.-ac., Sil.; 2) Hyosc., Phosph., Tart.;—*малыхъ*: 1) Arn., Bell., Sulph.; 2) Graph., Magn.-c., Natr.-m., Zinc.—Если созрѣваніе идетъ медленно, то показана Her., а при сильномъ воспаленіи и боли—Bel. или Merc.—Въ началѣ образованія большихъ чирьевъ, для разрѣшенія: Calc.— При *большихъ чирьяхъ, угрожающихъ перейти въ омертвѣніе* или принять *злокачественный характеръ* (Carbunculus): 1) Ars., Bel., Sil.; 2) Caps., Hyosc., Lach., Rhus. Sec., Sil.—Противъ *расположенія къ чирьямъ*: Lyc., N.-vom., Phosph., Sulph., Alum., Asa., Bar., Carb.-an., Caust., Cham., Magn.-arct., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph.— При *урчаніи, ворчаніи, перекатываніи вѣтровъ*: Agar., Ant., Arn., Bry., Canth.,

Carb.-v., Caust., Chin., Hell., Ign., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sassap., Sep., Sulph., Veratr. — При испусканіи *обильныхъ вѣтровъ*: Agar., Canth., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Graph., Hell., Kal., Lyc., Mang., Merc., Nitr.-ac., Oleand., Phos., Plumb., Veratr. — При испусканіи вѣтровъ *безъ всякаго запаха*: Amb., Bell., Carb.-v., Lyc. — При вѣтрахъ *очень зловонныхъ*: Arn., Ars., Asa., Calc., Carb.-v., Ign., Oleand., Puls., Sulph. — При вѣтрахъ съ запахомъ *гнилыхъ яицъ*: Arn., Coff., Sulph., Tart., Teucr. — Если вѣтры *влажны и теплы*: Carb.-v., Chin. — Если они *горячи*: Acon., Cham., Phos., Staph., Zinc. — Если они *холодны*: Con. — Если *пахнутъ чеснокомъ*: Agar., Asa., Mosch., Phosph. — Если *пахнутъ кислотой*: Arn., Calc., Cham., Graph., Ner., Magn.-s., Merc., Natr., Natr.-m., Rhab., Sep., Sulph. — Если *отходятъ съ шумомъ*: Lach., Merc., Squil., Teucr., Zinc.

Вкуса измѣненія болѣзненныя.

§ 1. Всѣ измѣненія вкуса составляютъ симптомы другихъ гастрическихъ страданій, но заслуживаютъ вниманія при выборѣ лекарствъ. Соответствующія средства: 1) Acon., Ant., Arn., Ars., Bell., Bry., Cham., Chin., Coccul., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Bry., Caps., Barb.-v., Ner., Lach., Kal., Natr.-m., N.-vom., Petr., Phosph., Rhab., Sabin., Sep., Squill., Staph., Sulph., Tart., Veratr.; 3) Asar., Asa., Calc., Cupr., Ign., Lach., Lyc., Magn.-m., Sil., Stann., Sulph.-ac., Tarax.

§ 2) Въ частности, заслуживаютъ вниманія: При *горькомъ вкусѣ*: 1) Acon., Arn., Ars., Bry., Calc., Cham., Chin., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sabad., Sep., Sulph., Veratr.; 2) Amm., Carb.-an., Carb.-veg., Coloc., Con., Dros., Ferr., Ipec., Kal., Lach., Lyc., Magn.-m., Sil., Spong., Staph., Tart. — При *вкусъ крови во рту*: 1) Ipec., Sil., Zinc.; 2) Alum., Amm., Ferr., Kal., Natr., Sabin. — При *пригорѣломъ*: Cycl., Puls., Ran., Squill., Sulph. — При *вкусъ мочы*: Merc., Natr., Puls. — При *землистомъ*: Cann., Chin., Ferr., Ner., Ign., Phosph., Puls., Stann. — При *воднистомъ*: Bry., Chin., Natr.-m., Puls., Staph.; 2) Acon., Ant., Arn., Ars., Bell., Caps., Ipec., Kal., Lyc., Magn.-m., Natr., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rhab., Rhus., Ruta., Stann., Sulph. — При *мыломъ, какъ отъ гнилыхъ яицъ или гнилаго сыра и т. д.*: 1) Acon., Ars., Merc., Puls., Rhus; 2) Bell., Bry., Carb.-v.,

Cham., Con., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Ser., Veratr. — При жирномъ, маслянистомъ: Alum., Asa., Caust., Lyc., Mang., Puls., Rhus, Sabin., Sil., Val. При травянистомъ: N.-vom., Phosph.-ac., Puls., Sassa., Veratr. При металлическомъ, мѣдномъ и т. д.: 1) Agn., Amm., Calc., Coccul., Cupr., Lach., Natr.-m., Rhus; 2) Alum., Coloc., Magn.-aust., Ran., Sassa., Seneg., Sulph., Zinc. — При слизистомъ, клейкомъ: Cham., Chin., Dig., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Merc. N.-vom., Petr., Phosph., Puls., Rhab., Rhus. — При прогорклости: Alum., Amb, Asa., Bry., Cham., Ipec., Mur -ac., Petr. — При соляномъ: 1) Arg., Carc.-v, Merc., Phosph., Puls., Ser, Zinc., 2) Chin., Lach, Lyc., Natr., Rhus, Sulph., Veratr. — При кислому: 1) Amm., Bell., Calc., Chin., Kal., Merc., Natr.-m., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Alum., Carb.-an., Cham., Chin., Coccul., Con., Graph., Ign., Lach., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Natr., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Stann, Тагх. — При дурномъ вкусѣ вообще, противномъ, какъ-бы вслѣдствие расстройства желудка: 1) Bry., Calc., Kal., Merc., N.-vom., Puls, Ser.; 2) Arg., Asa., Caust., Chin., Ign., Natr.-m., Petr., Stann, Sulph.-ac., Val., Zinc. — При сладковатомъ: 1) Bell, Bry., Chin., Dig., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Plumb., Puls., Sabad., Squill., Stann., Sulph.; 2) Acon., Alum., Amm., Chin., Ferr., Ipec., Kal., Lyc., Merc., N.-vom., Rhus, Sassa., Sulph.-ac. Кроме того, должно различать вкусъ пищи: горькій: Bry., Coloc., Ferr., Rhab., Rhus, Sulph; горькій послѣ ѣды и питья: Arg., Bry., Puls; имлостный вкусъ послѣ ѣды: Rhus; соленый вкусъ пищи: Carb.-v, Sulph; — кислый: Calc., Chin.; — кислый вкусъ во рту послѣ ѣды: Carb.-v., Cocc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sil.; — послѣ питья: N.-vom., Sulph; — послѣ питья молока: Carb.-v, Sulph; сладковатый вкусъ молока: Merc.; — пива: Puls; совершенное безвкусіе пищи: Arg., Bry., Merc., N.-vom., Puls., Staph.; ѣдкій вкусъ табаку: Staph.; горькій: Cocc.; — оторатительный: Ipec.; — неприятный вообще: Arg., Calc., Ipec., N.-vom., Puls.; — утромъ горькій вкусъ: Arg., Puls.; — имлостный: Rhus, Sulph; — кислый: N.-vom., Sulph; — сладкий: Sulph.

Вкуса потеря. § 1.: 1) Bell., Lyc., Natr.-m., Phosph., Puls, Sil.; 2) Alum., Amm.-m., Anac., Calc., Her., Hyosc., Kal., N.-vom., Sec., Ser., Veratr.

§ 2. Если потеря вкуса чисто нервною происхожденія, напр.,

вслѣдствіе *паралича*: Bell., Lyc., Hyosc., Natr.-m., N.-vom., Ser., Veratr.; если же она происхожденія *катаррального*, вслѣдствіе *напора* и т. д., то: Alum., Calc., Ner., Natr.-m., Puls., Rhod., Ser., Sulph..

Водобоязнь, Собачье бѣшенство (Hydrophobia). Лучшій способъ леченія отъ водобоязни есть способъ доктора Геринга. По его совѣту, *лужно сѣзую рану* отъ укушенія бѣшеною собакою лечить сперва *дѣйствіемъ жара на разстояніи до-тѣхъ-поръ*, пока не обнаружится *лихорадочной дрожи*, потомъ повторить это два-три раза въ день, пока рана не заживетъ совершенно и не образуетъ безцвѣтнаго рубца. Въ то же время больному каждые 5—7 дней, или всякій разъ, какъ скоро состояніе раны ухудшается, давать по одному приему Bell., или Lach., или Hydrophobin, до совершеннаго заживленія раны. Если по прошествіи 7 или 8 дней, вмѣстѣ съ лихорадочными движеніями, *покажется пузырькъ подъ языкомъ*, то вскрыть его остриемъ ножа и выполоскать ротъ воднымъ растворомъ поваренной соли.

Если бѣшенство обнаружилось прежде, чѣмъ предприняты мѣры противъ его развитія, то, смотря по обстоятельствамъ, назначаютъ: Bell., или Lach., или же Canth., Hyos., Merc., или еще Stram., Veratr. (Срвн. *умопомышательство и воспаленіе горла*).

Въ Индіи существуетъ еще средство, именно Cedron, которое туземцы очень успѣшно употребляютъ отъ покуса бѣшеною собакою. Къ сожалѣнію, оно почти вовсе не изслѣдовано.

Водобоязнь, чувствительность кожи къ водѣ. Кромѣ водобоязни, происходящей отъ укушенія бѣшеною собакою, есть другая, которая состоитъ въ томъ, что больной, вслѣдствіе *возвышенной чувствительности кожи къ сырости и холоду*, боится воды и мытья. Это состояніе составляетъ принадлежъ другой болѣзни, которому соотвѣтствуютъ преимущественно: Amm., Calc., Nitr.-ac., Sassa., Ser., Sulph.. Сверхъ того, можно предложить еще: 1) N.-mosch., Puls.; 2) Amm., Ant., Bell., Carb.-v., Dulc., Merc., Rhus.

Водянка вообще, Hydrops.

§ 1. Средства, съ успѣхомъ употребленныя противъ различныхъ видовъ водянки, суть: 1) Apis, Arg., Chin., Dig., Dulc., Hell., Kal., Led., Lyc., Merc., Sulph.; 2) Bry., Camph., Canth., Convolv.,

Ferr., Fluor.-ac., Lach., Phos., Prun, Rhus., Samb., Sol.-nigr., Squill;
3) Ant., Baryt., Chel., Con., Hyos., Sabad., Sabin..

§ 2. Водянка, развившаяся вследствие *скрытія острой сими*, требуетъ: Ars., Dig., Hell., Rhus и Sulph.. — Вслѣдствіе *перемежающейся лихорадки*: Ars., Dulc., Ferr., Merc., Sol.-nigr. и Sulph. — Вслѣдствіе *ослабляющей потери соковъ или крови*: Chin., Ferr., Merc. и Sulph.. — У *пьяницы*: Ars., Chin., Hell., Led., Rhus и Sulph. — Вслѣдствіе *злоупотребленія ртути*: Chin., Dulc., Hell. и Sulph. — Водянка вслѣдствіе *простуды*: Apis, Ars., Dulc., Tart.; — При *страданіяхъ печени или селезенки*: Aur., Chin., Fluor.-ac., Lach., Lyc, Merc.; — Разстройствѣ *рекулы*: Apis, Ars.; — *порокахъ сердца*: 1) Apis, Ars., Aur., Bry., Carb.-v., Dig., Fluor.-ac., Hell., Lyc, Squill., Tereb.; 2) Cann, Croc..

§ 3. По общности припадковъ, можно избрать:

APIS — почти во всѣхъ случаяхъ, особенно при водянкѣ сердца, подкожной, брюшной и грудной.

ARSENICUM — при *водянкѣ подкожной, брюшной, грудной* и отека ногъ, преимущественно, когда цвѣтъ кожи, особенно лица, землисто-поблеклый, блѣдный или зеленый; при *слабости и истощеніи силъ*, сопровождающихся сухостью и краснотой языка, сильною жаждою и астматическими страданіями съ припадками удушія при лежаніи на спинѣ.

BRYONIA — при *подкожной водянкѣ и отека ногъ*, особенно если опухоль днемъ увеличивается, а ночью уменьшается.

SAMBUCA — при *подкожной водянкѣ*, если моча красна и образуетъ густой осадокъ.

SANTALIS — при *водянкѣ* вслѣдствіе атоніи мочевыхъ путей, сопровождающихся труднымъ испусканіемъ мочи (Dysuria), натугами въ мочевомъ пузырьѣ, болями въ членахъ и хроническимъ насморкомъ.

SINGA — при *подкожной и брюшной водянкѣ* у пожилыхъ людей. Вообще это средство умѣстно при органическихъ страданіяхъ печени и селезенки, хотя въ этихъ случаяхъ оказываются полезными также Ars. и Ferr..

CONVOLVULUS — противъ *отечной опухоли* всякаго рода, а

также и противъ другихъ гидроческихъ страданій, при запорѣ, страданіи живота и слабости.

DIGITALIS — противъ *водянки брюшной, подкожной и грудной*, вообще при органическихъ страданіяхъ сердца и ускоренномъ пульсѣ.

DULCAMARA — противъ *подкожной водянки*, и особенно послѣ скрытія испарины на сырость холодѣ, или при сильномъ ночномъ жарѣ, съ сильнымъ безнокоичествомъ, скудною и вонючею мочою, жаждою, потерю аппетита, расслабленіемъ.

HELLEBORUS — противъ *водянки подкожной, брюшной, грудной и т. д.* Вообще противъ острой *водянки* и когда притомъ замѣчаются: большая слабость, сонливость, лихорадочные припадки, колючія боли въ членахъ, испраженія въ видѣ поноса, почти задержанное отдѣленіе мочи.

KALI — при *брюшной водянкѣ* и другихъ гидроческихъ страданіяхъ, особенно у людей пожилыхъ.

LACTUCA — при *брюшной водянкѣ* съ значительнымъ отекомъ ногъ, живота и вѣкъ.

LEBUM — при *водянкѣ* съ болями въ членахъ и сухостью кожи.

LUSORIDIUM — особенно при гипертрофіи сердца, при опухоли ногъ, съ опасностью развитія *брюшной и грудной водянки*.

MERCURIUS — противъ *водянки брюшной, грудной и острой или хронической подкожной*, сопровождающейся страданіемъ печени, чувствомъ сжатія въ груди, общимъ жаромъ и потомъ; постояннымъ, короткимъ и потрясающимъ кашлемъ; тоскою.

RHOSPORUS — противъ *водянки* съ отеочною опухолью рукъ, ногъ и лица.

RUINUS — Противъ *брюшной* и общей *водянки*.

RHUS, SAMBUCUS и **VOLANUM NIGRUM** — при общей *водянкѣ*.

Сравни. *Водянку подкожную, брюшную, грудную, черепа, Грыжи кошачья.*

Водянка брюшная, Ascites.

Средства противъ *брюшной водянки* вообще: 1) Ars., Chia.

Hell., Kal., Merc., Sulph.; 2) Acon., Bry., Cin., Colch., Dulc., Euphr., Prun., Ser.; 3) Asa., Colch., Dig., Led., Lyc., Puls., Squill.

При водянкахъ, которыя происходятъ отъ сильной потери соковъ и обильныхъ кровопусканій, прекрасно дѣйствуетъ Chin. Въ прочихъ случаяхъ, при выборѣ средствъ, надо руководствоваться патологическими причинами и сопровождающими припадками.

Водянка грудная, Hydrothorax. — 1) Amm., Apis, Arg., Bry., Carb.-v., Dig., Hell., Kal., Lach., Merc., Spig.; 2) Aur., Calc., Dulc., Fluor.-ac., Lyc., Sen., Squill., Stann.;—При водянкахъ груди вслѣдствіе органическихъ страданій сердца, показаны: 1) Arg., Lyc.; 2) Aspar., Colch., Seneg.; 3) Aur., Bry., Dig., Fluor.-ac., Hell., Squill., Tereb.; 4) Cannab., Carb.-v.

О припадкахъ, рѣшающихъ выборъ изъ этихъ средствъ, см.: *Удушье, Воспаленіе легкихъ, Частотка легочная, Сердца болѣзнь и Удушливый катарръ.*

Водянка подкожная, анасарка, Anasarca.

Главныя средства противъ нея: Arg., Bry., Chin., Dig., Dulc., Hell., Merc. и Sulph. Кромѣ этихъ, можно еще употреблять: Camph., Convolv., Lact., Rhus, Samb. и Sol.-nigr.. — При подкожной водянкѣ, происшедшей послѣ наложныхъ сыпей, какъ-то: скарлатины, кори и т. п., часто отличную пользу оказываютъ Hell. и Arg. При недостаточности этихъ средствъ, избираются другія, соотвѣтственно совокупности симптомовъ и обстоятельствъ. См. *Водянка.*

Водянка сочлененій, Hydrarthrus. — Часто излечивается посредствомъ Sulph.. Кромѣ того, заслуживаютъ также вниманія: Ant., Arg., Bry., Calc., Jod., Kal., Lyc., Puls., Rhus., Sil..

Водянка черепная, Hydrocephalus. — § 1. Средства противъ этой болѣзни вообще: 1) Acon., Apis, Bell.; 2) Bry., Hell., Sulph.; 3) Arg., Arg., Cin., Con., Dig., Hyosc., Lach., Merc., Op., Stram.—*Острая водянка* полости черепа (Hydrocephalus acutus) излечивается преимущественно: Acon., Apis, Bell., Calc., Bry., Hell., Sulph.—*Хроническая черепная водянка* требуетъ: Arg., Hell., Sulph..

§ 2. Опытному гомеопату скорѣе и чаще удается вылечить острую головную водянку, нежели врачамъ старой школы. Согласно съ данными припадками, надо имѣть въ виду слѣдующее:

АСОНИТУМ — назначается всегда въ началѣ болѣзни, въ *первомъ периодѣ лихорадки*, при сильно-возбужденномъ состояніи нервной и сосудистой системы, какъ это бываетъ во всѣхъ воспалительныхъ лихорадкахъ и при воспаленіи мозга.

АРИЗ — особенно пригоденъ въ случаяхъ, гдѣ болѣзнь развилась отъ подавленной краснухи, просовидной или скарлатинной сыпи.

BELLADONNA — послѣ Асоп., когда удалось умѣрить лихорадку, или когда, несмотря на употребленіе Асоп., болѣзнь идетъ впередъ, а припадки воспаления мозга требуютъ Bell.

ВУОНИА — когда Асоп. и Bell. не принесли пользы, а болѣзнь угрожаетъ переходомъ въ выпотѣніе, или когда вообще замѣчаются слѣдующія явленія, хотя бы это было послѣ употребленія Асоп. или Bell.: Лице красное или темнокрасное; глаза закатываются подъ лобъ и попеременно открываются и закрываются; сухія губы; сухой и темножелтый, обложенный слизью языкъ; животъ напряженный и вздутый; запоръ на низъ; малоколичественное отдѣленіе мочи, или она жгучая; скорое дыханіе, прерываемое стопами и рыданіями; кожа повсему тѣлу сухая, горячая; сильная жажда, при которой дитя быстро проглатываетъ питье.

Неллеворус — одинъ приемъ дается послѣ Вуо., если послѣдняя оказалась недостаточною, или употреблена не во-время. Особенно же при слѣдующихъ припадкахъ: не очень сильная лихорадка; малый, не очень скорый, мягкій и неправильный пульсъ; затрудненное дыханіе съ глубокими вздохами; совершенная апатія; невозможность держаться прямо; частое и произвольное забрасываніе дрожащихъ рукъ на голову; наклоненіе головы въ сторону при прямомъ положеніи туловища; раздраженіе въ носу, вслѣдствіе котораго дитя часто третъ его руками; глаза полуоткрыты съ врачками, обращенными въ сторону или вверху, и конвульсивными движеніями вѣкъ; расширенныя зрачки; лобъ морщинистый и покрытый холоднымъ потомъ. Сильная жажда; дитя много пьетъ, и постоянно двигаетъ челюстями, какъ при жеваніи; злится, бьетъ ручками близь лежащіе предметы, не смотритъ на окружающихъ и сердится, если съ нимъ говорить. Лицо блѣд-

ное и одутлое; снятца; испугъ во снѣ; врикъ и стони; сухія и грязныя носдри; отвислая нижняя челюсть.

SULPHUR — если нѣсколько приѣмовъ *Hell.* не улучшаютъ состоянiя больного.

Кромѣ того, заслуживаютъ вниманiя: *Artemisia*, при переходѣ болѣзни въ періодъ выпотѣнiя, послѣ безуспѣшнаго употребленiя *Bell.*, *Hell.* и *Cin.*, при судорогахъ правой стороны тѣла и параличѣ лѣвой; при сняткѣ и зеленоватомъ поносѣ. — *Digitalis*, тоже при переходѣ въ выпотѣнiе, при полномъ упадкѣ силъ, расширенiи зрачковъ, значительномъ безпокойствѣ и скорои, прерывистомъ пульсѣ. — *Ferrum acet.* у слабыхъ, малокровныхъ дѣтей. — *Mercurius* часто пригоденъ послѣ *Bell.* въ первомъ или даже во второмъ періодѣ, особенно если ребенокъ страдаетъ глистами. — Противъ такъ называемаго длительнаго и незамѣтно развивающагося *Hydrocephaloid'a* который зависитъ, по видимому, отъ обѣднѣнiя кровью и обезсиленiя мозга и обнаруживается по большей части послѣ изнурительнаго поноса или значительной потери крови, при частомъ (150—160) пульсѣ, зеленослизистомъ поносѣ и негорячей головѣ, главными средствами служатъ: *Calc.*, *Phosph.*, *Sulph.*, *Zinc.*.

Волненiя душевныя, послѣдствiя отъ нихъ.

§ 1. Лучшiя средства противъ болѣзней вслѣдствiе душевныхъ волненiй: 1) *Acon.*, *Aur.*, *Bell.*, *Bry.*, *Cham.*, *Coff.*, *Coloc.*, *Hyos.*, *Ign.*, *Lach.*, *Merc.*, *N.-vom.*, *Op.*, *Phosph.*, *Phos.-ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Staph.*, *Veratr.*; 2) *Arg.*, *Calc.*, *Caust.*, *Coccul.*, *Cupr.*, *Lyc.*, *Natr.-m.*, *Rhus*, *Sep.*, *Stram.*, *Sulph.*.

§ 2. Противъ послѣдствiй отъ тоски, испуга и страха, назначаютъ преимущественно: 1) *Acon.*, *Ign.*, *Op.*, *Puls.*; 2) *Bell.*, *Caust.*, *Coff.*, *Hyos.*, *Lach.*, *N.-vom.*, *Samb.*, *Veratr.*; — отъ чрезмерной радости: 1) *Coff.*, *Op.*, *Puls.*; 2) *Acon.*, *Caust.*, *Croc.*; — отъ печали, досады и огорченiя: 1) *Ign.*, *Phos.-ac.*, *Staph.*; 2) *Arg.*, *Coloc.*, *Graph.*, *Hyos.*, *Lach.*, *N.-vom.*, *Veratr.*; — отъ тоски по родителю: 1) *Caps.*, *Mers.*, *Phos.-ac.*; 2) *Aur.*, *Carb.-an.*, *Caust.*, *Staph.*; — отъ несчастливой любви: 1) *Hyos.*, *Ign.*, *Phos.-ac.*; 2) *Aur.*, *Caust.*, *Coff.*, *Hell.*, *N.-vom.*, *Staph.*; — отъ ревности: *Hyos.*, *Ign.*, *Lach.*, *N.-vom.*, *Phos.-ac.*, *Staph.*; — отъ неприятности и обиды: 1) *Bell.*,

Coloc., Ign., Plat., Puls., Staph.; 2) Aug., Cham., Natr.-m., Phos. ac., Seneg.; — отъ *противорѣчій*: 1) Acon., Bry., Cham., Coloc., Ign., N.-vom., Plat., Staph.; 2) Ars., Bell., Coff., Phos., Puls., — если къ этому присоединяется еще *презрѣніе*: Coloc., Staph. Противъ послѣдствій *слабнато мѣла*: Acon., Bry., Cham., N.-vom., Phosph.

§ 3. Изъ сказанныхъ средствъ, смотря по принадлежкамъ, можно назначать:

АСОНИТУМ—при боли головы, *лихорадочномъ жарѣ*, *напорѣ* крови къ мозгу и *постоянномъ страхѣ*, преимущественно у дѣтей; или когда послѣ *испула* нельзя было тотчасъ употребить Ор.

ВЕЛЛАДОННА—при потерѣ самосознанія или при постоянной тоскѣ, сопровождаемой страхомъ, плачемъ, ревомъ и злобью (у дѣтей), или когда, послѣ *испула*, Acon. и Ор. не въ состояніи были устранить дурныхъ послѣдствій.

ВКУОНІА—при чувствѣ озноба и дрожи во всемъ тѣлѣ, *наклонности къ гнѣву*, потерѣ аппетита, тошнотѣ, рвотѣ и желчныхъ страданіяхъ вслѣдствіе *мѣла*.

КАРСІСУМ—когда *тоска по родинѣ* причиняетъ бессонницу, причемъ краснота и жаръ въ лицѣ.

СНАМОМІЛЛА—когда вслѣдствіе гнѣва замѣчаются: горькій вкусъ во рту, тошнота, *наклонность ко рвотѣ* и настоящая рвота желчными веществами; *рѣзь съ животѣ*; поносъ; *давленіе подъ ложечкою* и *съ желудкѣ*; головная боль; жаръ съ лихорадкой; жажда, краснота лица и глазъ; тоска и безпокойство; желтуха; кашель; *сердцебіеніе*, короткое дыханіе; тоскливое чувство въ груди и *припадки удушья*; у дѣтей, при появленіи одышки и конвульсій; при разстройствѣ желудка вслѣдствіе обильной пищи и питья въ разстроенномъ состояніи.

СОФЕБА—когда сильно поражается нервная система вслѣдствіе *необыкновенной радости*; дрожаніе членовъ и *наклонность къ обморокамъ*, именно у женщинъ и дѣтей; или когда больной послѣ гнѣва напился ромашки.

СОЛОСУПТНІС—если вслѣдствіе *досады* или *огорченія* замѣчаются: *судорожная колика*, сведеніе нервъ, тошнота; горькій вкусъ со рвотою, бессонница.

НЕРРА—когда дѣти, подъ вліяніемъ гнѣва, безпрестанно плачутъ, и когда Bell. не принесла пользы противъ такого состоянія.

HYOSCIA MUS — когда вслѣдствіе страха обнаруживаются притупленіе и оглушеніе чувствъ и апатія; невозможность глотать; конвульсій, внезапное вскакиваніе или непроизвольный смѣхъ во время сна, желаніе убѣжать, и когда, вслѣдствіе несчастной любви, обнаруживается необыкновенная *ревность*, безпокойство и бѣганье въ разныя стороны.

IGNATIA — противъ послѣдствій *испуга*, *огорченія*, *непріятности или печали*, напр.: послѣ потери *друга или родственника*, или *вслѣдствіе несчастной любви*, и когда замѣчаются: глубокая, терзающая и непреодолимая печаль, рвота, гастрическія страданія, боль и круженіе въ головѣ, блѣдность лица, или даже конвульсій или эпилептическіе припадки, преимущественно у дѣтей отъ испуга и страха.

MERCURIUS — противъ недавнихъ или застарѣлыхъ послѣдствій *испуга* или *огорченія*, а также противъ тоски по родицѣ, и вообще когда замѣчаются: большая тоска, дрожанье членовъ и безпокойство; внезапное вскакиваніе отъ сна, волненіе крови при малѣйшемъ напряженіи; бессонница; невозможность оставаться въ теплой постели; при этомъ возвышенная нервная раздражительность, сварливое расположеніе духа, при которомъ больной жалуется на весь міръ, даже на собственное семейство; желаніе убѣжать; постоянная дрожь, ночные поты.

NUX-OMISA — противъ послѣдствій гнѣва, сопровождаемыхъ постоянною дрожью, и когда Вгу. была недостаточна, или когда больной, подъ вліяніемъ досады, выпилъ ромашки или вообще подъ вліяніемъ гнѣва пилъ и ѣлъ, и когда Cham. при этомъ оказалась недостаточною.

OPUM — тотчасъ послѣ испуга или радости; когда притомъ замѣчаются: боли во лбу, оглушеніе или даже потеря самосознанія, жаръ и потъ на головѣ при холодѣ прочихъ частей тѣла, напоръ крови къ головѣ, отрыжка или кислая рвота, большая тоска и тяжесть въ животѣ; поносъ или непроизвольное испраженіе на нвзъ; давленіе въ груди и затрудненное дыханіе; припадки обморока, приступы судорогъ или даже падучей болѣзни; дрожаніе членовъ, крики или спячка и храпѣніе во снѣ; судорожная ооченѣлость тѣла; внутренній жаръ при холодѣ всего тѣла и холодномъ потѣ.

PHOSPHORIC-ACIDUM — противъ послѣдствій *глубокой печали, несчастной любви или тоски по родимъ*, наконецъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ Ign. оказалась недостаточною, а именно: когда замѣчаются: молчаливое, неразговорчивое расположеніе духа; идиотическое, глупое притупленіе чувствъ и апатія; выпаденіе волосъ, которые иногда вообще скоро сѣдѣютъ; изнурительная лихорадка и обильный утренній потъ; постоянная сонливость.

PLATINA — когда вслѣдствіе *имѣла* или огорченія обнаруживаются: равнодушіе, скорбь, перемежающаяся смѣхомъ, гордость и презрѣніе къ другимъ; необыкновенная тоска и страхъ передъ мыслию о смерти; у женщинъ при этомъ страждетъ половая система.

PULSATILLA — противъ послѣдствій *страха*, выражающихся поносомъ, жаромъ въ животѣ и холодомъ конечностей, или противъ послѣдствій *гнѣва* у людей кроткаго нрава, или когда большой точасъ послѣ гнѣва вапился ромашки, или вообще чтонибудь съѣлъ или выпилъ, и если Cham. не дѣйствуетъ.

SAMBUCUS — если вслѣдствіе страха или испуга замѣчаются: холодъ во всемъ тѣлѣ, трясеніе членовъ, конвульсивныя подергиванія, тоскливость въ груди, храпчивая сначка, и если Op. оказался бесполезнымъ противъ этого состоянія.

STAPHYSAGRIA — противъ послѣдствій *гнѣва*, когда замѣчаются: дурное расположеніе духа и досада, такъ что больной съ гнѣвомъ кидаетъ и бьетъ все, что ему попадаетъ подъ руку; безпокойство и страхъ; или когда, вслѣдствіе глубокой печали, замѣчаются: расположеніе толковать все въ другую сторону, большое опасеніе будущности, сонливость днемъ, бессонница ночью; выпаденіе волосъ; слабый голосъ, инокендрическое расположеніе духа.

VERATRUM — если вслѣдствіе испуга или страха замѣчаются: поносъ или непроизвольное испражненіе на низъ и холодъ во всемъ тѣлѣ.

§ 4. Смотря по послѣдствіямъ отъ волненій душевныхъ, назначаются: при *послѣдовавшей желтухѣ*: Cham., Merc., Chin.— При *конвульсіяхъ и подергиваніяхъ*: Bell., Cham., Ign., Hyos., Op., Sep., Samb.— При *судорогахъ*: Coloc.— При *тетаническихъ припадкахъ*: Bell., Ign. Op.— При *припадкахъ эпилепсін*: Ign., Op., (Bell., Lach., Caust.).— При *необыкновенной слабости съ трясеніемъ членовъ*: Merc., Op., Phos.-ac., Veratr.— При *припадкахъ обморока*:

Coff., Op., Veratr.—При необыкновенной нервной раздражительности и возбудимости: Acon., Coff., Magn.-arct., Merc., N.-vom.— При волнении крови: Acon., Coff., Merc.— При последовавшем лихорадочном жару: Acon., Bry., Cham., N.-vom.— При чувстве озноба и дрожи: Bry., Merc., Dulc.— При холодъ во всемъ тѣлѣ: Op., Puls., Samb., Veratr.— При краснотѣ и жару въ шею: Acon., Caps., Ign.— При ночномъ потѣ: Merc., Phos.-ac.— При изнурительной лихорадкѣ: Ign., Phos.-ac., Staph.— При бессоницѣ: Acon., Coff., Merc., Caps., Coloc., Staph.— При слячкѣ: Op., (Phos.-ac., Staph.)— При меланхоли и печали: Aur., Ign., Phos.-ac., Plat., Staph.— При постоянномъ плачѣ и рыданіяхъ: Bell., Нер.— При постоянномъ крикѣ: Bell., Op.— При постоянной тоскѣ и страхѣ: Acon., Bell., Cham., Merc., Staph.— При умопомраченіи: Bell., Hyos., Lach., Op., Stram., Veratr.— При равнодушіи, притупленіи чувствъ и апатіи: Hell., Hyos., Phos.-ac.— При постоянной апатіи и возмущенномъ состояніи духа: Coloc., Staph.— При олушеніи и потерѣ самосознанія: Bell., Hyos., N.-vom., Op.— При напорѣ крови и боли въ голову: Acon., Bell., Coff., Ign., Merc., N.-vom., Op.— При выпаденіи или раннемъ стѣпніи волосъ: Phos.-ac., Staph.— При потерѣ аппетита, тошнотѣ и рвотѣ: Bry., Cham., Coloc., Ign., N.-vom., Op., Puls.— При желчныхъ страданіяхъ: Acon., Bry., Cham., Coloc., Ign., N.-vom.— При боляхъ желудка: Cham., N.-vom., Puls.— При боляхъ живота и носоглазъ: Cham., Puls., Veratr.— При произвольныхъ испраженіяхъ на низъ: Op., Veratr.— При грудныхъ страданіяхъ, припадкахъ удушья и т. п.: Aur., Bell., Cham., N.-vom., Op., Samb.— При сильномъ сердцебиеніи: Acon., Cham., Нер., Op., Puls.

Сравни. *Больши душевныя, Умопомраченіе, Меланхоли*

Волосъ выпаденіе и плѣшивость, Alopecia.

§ 1. Главнѣйшія средства противъ выпаденія волосъ вообще:

- 1) Calc., Нер., Graph., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Phosph.-ac., Sil., Sulph.;
- 2) Aur., Bar.-c., Carb.-v., Caust., Chin., Kal., Magn., Merc., Natr.-m., Ser., Staph., Zinc.

§ 2. Выпаденіе волосъ, наступающее послѣ тяжкихъ острыхъ болѣзней, лечится посредствомъ: 1) Lyc., Нер., Sil.; 2) Calc., Carb.-v., Natr.-m., Phos.-ac., и Sulph., а для роженіи, у кого-

рых выпадаютъ волосы, съ большимъ усѣхомъ назначаются Calc., Lyc., Natr.-m., Sulph. — Противъ выпаденія волосъ вслѣдствіе *ослабляющей потери соковъ*, (послѣ кровопусканій, распутной жизни и т. д.): Chin., Ferr., а если оно произошло вслѣдствіе обильнаго *пота*, то Merc. — При выпаденія волосъ, происшедшемъ отъ *доловременной печали*: Phos.-ac., или Caust., Graph., Ign., Lach. — Послѣ *частыхъ нервныхъ или истерическихъ головныхъ болей*: 1) Нер., Nitr.-ac.; 2) Ant., Calc., Sil., Sulph.; 3) Arg., Phosph. и Ser. — Если причиною выпаденія волосъ было *злоупотребленіе ртути*: Нер., или Carb.-v., а послѣ злоупотребленія *ромашки*: Bell., или Нер..

§ 3. Смотра по состоянію волосистой кожи и самихъ волосъ, назначаются различныя средства; такъ, при *большой чувствительности кожи головы*, преимущественно: Bar.-c., Calc., Carb.-v.-Chin., Нер., Natr.-m., Sil., Sulph. — При *сильномъ зудѣ* волосистой кожи вслѣдствіе застарѣлыхъ *скрытыхся сыпей*: Graph., Kal., Lyc., Sil., Sulph. — При обильной на головѣ *перхоти*: Calc., Graph., Magn., Starph. — При расположеніи къ *сыдинѣ*: Graph., Lyc., Phos.-ac. и Sulph.-ac. — При большой *сухости* волосъ: Calc., Kal., Phos.-ac. — Когда волосы часто покрываются *клейкимъ потомъ*: Chin., Merc..

§ 4. При выпаденія волосъ, *растущихъ по сторонамъ* головы: Graph., Phos.; — *на передней части* головы: Arg., Natr.-m., Phosph.; — *на макушкѣ*: Barut., Graph., Lyc., Ser., Zinc.; — *на затылкѣ*: Carb.-v., Phosph., Sil.; — *на вискахъ*: Calc., Kal., Lyc., Natr.-m.; — *позади ушей*: Phosph.; — когда *отдельныя мѣста* пльшивѣютъ: Canth., Jod., Phosph.

§ 5. При выпаденія волосъ на другихъ частяхъ туловища, а именно: *на бровкахъ*: Agar., Bell., Caust., Kal.; — *на бакенбардахъ*: Calc., Graph., Natr.-m.; — *вокругъ губъ*: Kal., Natr.-m., Plumb.; — *на лобкѣ*: Natr.-m., Rhus.

Сравни. Парша на голову, Нолти, Зудъ съ кожей.

Воспаленіе вообще.

§ 1. Самое лучшее противувоспалительное средство въ го-меопатіи, безспорно, Acon.; во многихъ острыхъ воспаленіяхъ оно само по себѣ устраняетъ болѣзнь. Но оно не всегда дѣйствуетъ специфически; для этого нужно, чтобы ему соотвѣтствовала со-вокупность припадковъ. Acon. необходимъ при всѣхъ воспаленіяхъ

съ сильнымъ лихорадочнымъ жаромъ, твердымъ и скорымъ пульсомъ, сухостью кожи и т. д..

§ 2. Въ хроническихъ же воспаленияхъ, первое мѣсто занимаетъ Sulph.—Въ этомъ могутъ убѣдиться какъ тѣ врачи, которые за основаніе хроническаго воспаления принимаютъ скритное воспаление, такъ и тѣ, которые происхождение его приписываютъ псорѣ. Но для того, чтобы Sulph. вѣрно дѣйствовалъ, нужно чтобы показаніемъ для его употребленія служила съ точностію подмѣченная совокупность признаковъ.

Сравни. *Лихорадка воспалительная.*

Воспаленіе брюшины, Peritonitis.

Лучшія средства: 1) Acon., Bell., Bry., Cham.; 2) Coff., Coloc., Huoa., N.-vom., Rhus. Выборъ опредѣляется различными условіями и признаками.

Здѣсь также, въ первомъ періодѣ болѣзни, пока не образовалось еще выпотѣніе и не появилось нагноенія, наилучшими средствами служатъ Acon., а послѣ него, когда первый приступъ горячки уже ослабѣетъ, Bell.—При развитіи же нагноенія, наилучшимъ средствомъ служитъ Merc., который перѣдко способствуетъ быстрому выведенію гноя чрезъ брюшную стѣнку или кишечный каналъ. Олѣтнимъ средствомъ соперничать также Нер. и Lach.—При водянистомъ выпотѣніи, главное средство Bry..

Сравни. *Воспаленія органовъ нижней части живота (кишечъ, матки) и въ особенности Лихорадку воспалительную.*

Воспаленіе вѣкъ, Blepharitis.

§ 1. Лучшія средства: 1) Acon., Ant., Ars., Bell., Calc., Cham., Chin., Coss., Coa., Euphras., Graph., Нер., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Spig., Sulph., Veratr.; 2) Alum., Bar.-с., Bry., Caust., Dig., Jod., Kreos., Lys., Natr., Natr.-m., Phos.-ac., Sen., Sep., Staph., Thuj., Zinc.

§ 2. Если воспалена *наружная поверхность века*, то назначаютъ: Acon., Bell., Нер., Sulph. — Противъ *воспаленія краевъ века*, *Мейбомиевыхъ железъ*: Bell., Cham., Euphr., Нер., Merc., N.-vom., Puls.—Противъ *ячменя*: Amm., Calc., Ferr., Staph., Puls.—Противъ *воспаленія верхняго века*: 1) Alum., Bry., Calc., Caust., Croc., Нер., Phos., Puls., Rhus, Sep., Spig., Staph., Sulph.; 2) Bar., Bell., Cham., Chel., Con., Cycl., Ferr., Lys., Merc., Sil.—При *воспаленіи нижняго века*: 1) Ars., Bry., Calc., Dig., Merc., Natr.-m., Rhus, Ruta, Sen., Sep.; 2) Alum., Bell., Caust..

§ 3. Против *острого воспаления* *вѣкъ* рекомендуются преимущественно: Acon., Bell., Cham., Euphr., Her., Merc., N.-vom., Puls.— Против *хроническаго*: Ant., Ars., Calc., Chin., Sulph..

§ 4. АСОНІТУМ показанъ, когда замѣчаются: *опухоль, твердость и краснота вѣкъ съ жаромъ, жжениемъ и сухостию, или блѣдная и лоснящаяся опухоль вѣкъ съ жгучими и напрягающими болями; обильное отдѣленіе слизи изъ глазъ и носа; необыкновенная светобоязнь; лихорадка съ сильнымъ жаромъ и жаждою. Послѣ Acon., часто приличны: Bell., Her., Sulph..*

АНТИМОНІУМ. Красная опухоль вѣкъ съ *накопленіемъ густой слизи съ умалъ ихъ; светобоязнь и покалываніе въ глазахъ.*

АРСЕНІСУМ — при воспалительной краснотѣ соединительной оболочки съ налитіемъ ея сосудовъ, сухостию особенно краевъ вѣкъ и судорожнымъ смыканіемъ ихъ ночью.

ВЕЛЛАДОННА — при опухоли и краснотѣ вѣкъ, съ жжениемъ и зудомъ, съ постояннымъ склеиваніемъ и кровоточивостью ихъ при открываніи глазъ, также при *выворотѣ краевъ вѣкъ* и чувствѣ параличной тяжести въ нихъ.

САЛСАРВА — при рѣжущихъ, жгучихъ или очень чувствительныхъ боляхъ, особенно *во время чтенія*, сопровождающихся красною, твердою и большою опухолью, обильнымъ отдѣленіемъ слизи, ночнымъ слезиваніемъ; вообще тогда, когда Sulph. не оказала успѣха.

СНАМОМІЛЛА — при большой сухости краевъ или обильномъ отдѣленіи слизи, сопровождаемыхъ склеиваніемъ вѣкъ ночью, судорожнымъ смыканіемъ ихъ и слезотеченіемъ.

СНИА — при частомъ свербеніи на внутренней поверхности вѣкъ, по вечерамъ, съ слезотеченіемъ.

ЕУРНАСІА — при изъязвленіи краевъ вѣкъ, съ зудомъ днемъ и склеиваніемъ ночью, съ краснотою, опухолью, светобоязнью, постояннымъ морганьемъ, болью головы или жаромъ въ ней. Если Euphr. недостаточна, то часто приносятъ пользу: N.-vom. и Puls.

НЕРАВ — при сильной воспалительной краснотѣ вѣкъ съ язвенною болью отъ прикосновенія; при склеиваніи вѣкъ ночью, или судорожномъ ихъ смыканіи. Это средство часто очень прилично послѣ Acon., или Merc., а послѣ Her., умѣстна Bell..

HYOSCINAMUS — при судорожномъ сокращеніи и смиканіи вѣкъ.

MERCURIUS — при отвердѣніи вѣкъ, какъ бы отъ сильнаго ихъ сокращенія; при опухоли, затруднительномъ открываніи глазъ, рѣжущихъ боляхъ, язвахъ на краяхъ, нарывкахъ на соединительной плевѣ, коркахъ, заворотѣ вѣкъ; при колючихъ, жгучихъ боляхъ съ зудомъ, или при совершенномъ отсутствіи боли (послѣ Merc., часто умѣства Her.).

NUX VOMICA — при жгучемъ зудѣ вѣкъ, особенно краевъ, или при язвенной боли, которая ожесточается при дотрогиваніи; при склеиваніи вѣкъ по утрамъ; накопленіи густой слизи на краяхъ; насморкѣ, боли головы или жарѣ въ ней (N.-vom. очень часто умѣствна послѣ Euphr.).

PULSATILLA — при воспалительной краснотѣ соединительной плесви или краевъ вѣкъ, обильномъ отдѣленіи слизи, неправильномъ ростѣ рѣсницъ, ячменѣ, склеиваніи вѣкъ ночью; боляхъ напрягающихъ или натягивающихъ. (Если Euphr. или N.-vom. были недостаточны, то часто излечиваетъ Puls.).

RHUS — при негибкости вѣкъ, какъ-будто они поражены параличемъ, съ жгучимъ зудомъ.

SULPHUR — при сильной воспалительной краснотѣ вѣкъ, съ жгучими болями, истеченіемъ слизи и гноя; при изъязвленіи краевъ пустахлахъ, язвинахъ вокругъ глазъ и т. п.. Предъ употребленіемъ Sulph., иногда не дурно назначить Acon., а послѣ Sulph., — Calc.

VERATRUM — при необыкновенной сухости вѣкъ съ слезотеченіемъ, трудностью при движеніи ихъ и большомъ жарѣ внутри глаза.

При *разрыленіи* вѣкъ: Arg., Bell., Merc., Sulph. — При *пузырькахъ* на нихъ: Barut., Bell., Con., Her., Merc., Rhus, Sep. — При *опухель*: Merc., Sulph. — При *разстланіи сосудовъ*: Arg., Bell., Calc., Con., Euphr., Her., Merc., Puls., Rhus., Sulph. — При *краснотѣ, какъ отъ каменія кровью*: Merc., Sulph. — При *распузаніи*: Acon., Arg., N.-vom., Rhus., Sulph. — При *боллезненности*: Acon., Arg., Calc., Euphr., Her., Merc., Puls., Sep., Sulph. — При *розовомъ окрашеніи*: Cocc., Euphr., Merc., Puls., Spig., Sulph. — При *обыкновенной краснотѣ*: Acon., Arg., Bell., Cocc., Con., Euphr., Graph., Her., Merc., Puls., Rhus., Spig., Sulph. — При *мышечной опухоли*: Sulph. — При *калитѣ омы*: Puls. — При *опухели* *есть* въ видѣ *салма*: Acon., Arg., Rhus., Sulph.

Сравни. *Воспаленіе* *мазь*.

Воспаленіе глазъ Ophthalmitis.

§ 1. Средства противъ воспаленій глаза, болѣе другихъ до-
званныхъ опытомъ, слѣдующія: 1) Acon., Ars., Bell., Calc., Cham.,
Euphras., Herp., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Ant., Arn.,
Bry., Caust., Chin., Coloc., Dig., Dulc., Ferr., Graph., Hyos., Lach.,
Nitr.-ac., Petr., Rhus, Sepia., Sulph.-ac., Veratr.; 3) Alum., Aug.,
Baryt., Borax, Cannab., Canth., Clem., Con., Led., Lyc., Natr.-m.,
Phosph., Sil., Staph., Thuja..

§ 2. При *остромъ* воспаленіи глазъ первое и главное средство
Acon., послѣ котораго, въ большинствѣ обыкновенныхъ случаевъ,
одинъ приемъ Bell. довершаетъ излеченіе. Кромѣ того, рекомен-
дуютъ еще слѣдующія средства: 1) Cham., Dulc., Euphr., Ign.,
Merc., N.-vom., Puls.; 2) Ant., Arn., Bor., Canth., Lach., Nitr.-ac.,
Spig., Sulph.-ac., Veratr..

Въ *хроническомъ же* воспаленіи глазъ, первое мѣсто въ обы-
кновенныхъ случаяхъ занимаетъ Sulph.; затѣмъ заслуживаютъ
вниманія: 1) Alum., Ars., Bor., Calc., Euphr., Herp., Lach., Lyc.,
Nitr.-ac., Spig., Phos., Sil., Thuja.; 2) Ant., Bar., Caust., Chin.,
Col., Dig., Dulc., Ferr., Graph., Hyos., Petr., Rhus, Sep.,
Veratr..

§ 3. Смотря по происхожденію болѣзни, назначаются: при
артритическомъ воспаленіи глазъ: 1) Acon., Bell., Calc., Spig.; 2)
Ars., Cham., Dig., Herp., Merc., N.-vom., Rhus; 3) Berb., Colch.,
Led., Lyc. (Ср. *Домота*). — При *ревматическомъ*: 1) Acon., Bell.,
Bry., Cham., Euphr., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.,
Veratr.; 2) Bell., Led., Lyc., Spig. — При *катарральномъ*: 1) Acon.,
Ars., Bell., Cham., Euphr., Herp., Ign., N.-vom., Puls.; 2) Dig., Euphr.,
Merc., Sulph. — При *золотушномъ*: 1) Ars., Bell., Calc., Dulc., Herp.,
Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Caust., Chin., Ferr.,
Graph., Petr., Sep.; 3) Aug., Bar., Cann., Cham., Con., Dig., Euphr.,
Jod., Lyc., Magn.-c., Natr.-m. — При *сифилитическомъ*: Merc.,
Nitr.-ac., Thuja. — При *нагноеніи* глазъ (*hypopyon*): Ars., Herp., Merc.,
Sulph. — При *воспаленіи* глазъ *въ* *слѣдствіе* *скрывшагося* *перелома*: 1)
Acon., Puls.; 2) Nitr.-ac., Merc., Thuja., Sulph. — При *воспаленіи*
глазъ у новорожденныхъ: 1) Acon., Bell., Cham., Euphr., Merc.,
Sulph.; 2) Calc., Dulc., Puls., Rhus; 3) Bar., Bry., N.-vom. — При

заразительномъ египетскомъ: 1) Acon., Bell., Calc., Euphr., Merc., Nitr.-ac., Sulph.; 2) Phos., Staph., Thuj.—При *инфектионномъ*: Amm., Amm.-m., Caust., Carb.-v., Merc., N.-vom., Mur.-ac., Staph., Sulph.; 2) Cānth., Cist., Hep., Natr.-m., Nitr.-ac.

§ 4. Относительно *внѣшнихъ* причинъ: если воспаление глазъ произошло вслѣдствіе *простуды*, то назначаются: Acon., Ars., Bell., Calc., Dulc., Hep., N.-vom., Puls., Sulph.; — *поврежденія, произведеннаго попавшимъ въ глазъ инороднымъ тѣломъ*, или другими механическимъ насиліемъ: 1) Acon., Arg., Calc., Sil., Sulph.; 2) Euphr., Nitr.-ac., Petr., Puls., Ruta, Phosph.-ac.; — *чрезмѣрную напряженія глазъ отъ долгой или тонкой работы*: Bell., Carb.-v., Ruta, Spig.; — *злоупотребленія ртути*: 1) Bell., Hep., Nitr.-ac., Puls., Sulph.; 2) Dulc., Chin., Lach., Lyc., Staph., Thuj.. — *Послѣ острого воспаленія кожи* (кори, скарлатины и оспы) Bry., Cham., Hep., Hyos., Merc., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sulph.; — *послѣ скрившихся сыпей вообще*: Alum., Ars., Carb.-v., Caust., Graph., Lach., Natr.-m., Sel., Sep., Sulph., Zinc.

§ 5. Относительно *принадлежн* различнаго рода воспаленій глазъ, требующихъ назначенія того или другаго средства, надо руководствоваться слѣдующимъ:

АСОНИТУМЪ—назначается во всѣхъ случаяхъ острого воспаленія въ началѣ леченія и вообще, когда замѣчаются: краснота глазъ и темная краснота сосудовъ; невыносимыя, жгучія, давящія, или колющія боли, преимущественно при движеніи глазъ; сильная свѣтобоязнь, обильное слезотеченіе и сливотеченіе, или большая сухость вѣкъ (послѣ Acon. часто уиѣтны: Ant., Bell., Hep.).

АВВЕНИСУМЪ—когда замѣчаются: жгучія боли, причиняемыя какъ-бы раскаленными угольями, или давящія и колющія боли, усиливающіяся отъ дѣйствія свѣта и движенія глазъ; сильныя боли, заставляющія больного лечь въ постель, или *невыносимыя боли съ тоскою до такой степени, что больной не можетъ спокойно оставаться въ постели*; краснота глазъ и сосудовъ; острота и ѣдкость слезъ, склеиваніе вѣкъ по ночамъ; необыкновенная свѣтобоязнь, *пятна и язвочки на роговой оболочкѣ*.

ВЕЛЛАДОННА—яркая краснота непрозрачной оболочки глаза съ красными жилами въ ней; отдѣленіе жгучихъ и разъѣдаю-

щихъ слезъ, или значительная сухость глазъ и *болѣзненная чувствительность ихъ къ свету*; *давящія боли вокругъ глазъ, или въ глубинѣ мазной впадины, распространяющіяся и на голову, или колючія боли въ глазахъ и носовъ*, преимущественно вокругъ глазной впадины, появляющіяся въ видѣ приступовъ; *усиленіе болей при движеніи глазъ*; расширенныя зрачки; сильный насморкъ и кашель, или сильная головная боль, съ *головокруженіемъ, олушеніемъ и стърми темными пятнами передъ глазами*; *потемнѣніе зрѣнія или пятна и язвочки на роговой оболочкѣ* (Bell. часто умѣстна послѣ Асов., Нер., или Merc.).

Салсабелла — сильныя давящія или колючія боли съ зудомъ, или жгучія и рѣжущія боли, которыя усиливаются при чтеніи и вечеромъ, при *сетѣтъ сетчи*; краснота непрозрачной роговой оболочки и обильное отдѣленіе слизи; слезотеченіе особенно на воздухъ; *пятна и язвы на роговой оболочкѣ, светобоязнь*; неясное зрѣніе, при которомъ предметы представляются какъ-бы въ туманѣ, или какъ-будто предъ глазами находятся пятна, что бываетъ преимущественно при чтеніи или при *друломъ какомъ-либо напряженіи глазъ*. (Calc: умѣстна послѣ Sulph., или Dulc.).

Снамомилла — краснота глазъ, давящія боли при движеніи глазъ и поворачиваніи головы; колючія, жгучія, давящія боли съ чувствомъ, будто жаръ приближается къ глазамъ; краснота и опухоль глазъ, обильное отдѣленіе слизи и склеиваніе вѣкъ ночью; большая сухость глазъ. Прилична для дѣтей и вообще при значительной раздражительности больного подъ *вліаніемъ болей*.

Еурназіа — давящая боль въ глазахъ; краснота бѣлка и сосудовъ; воспаленіе роговой оболочки съ пузырьками или даже съ пятнами и язвами на ней; обильное слезотеченіе и слизотеченіе; припухлость вѣкъ; частое сокращеніе вѣкъ и миганіе; на красуху похожая сыпь вокругъ глазъ, или насморкъ съ сильною головною болью; *свѣтобоязнь*, при ощущеніи, будто свѣтъ кружится передъ глазами.

Нѣрав — краснота глазъ и вѣкъ съ *язвенною болью при дотриваніи*; судорожное смыканіе вѣкъ; трудность при движеніи глаза; *свѣтобоязнь* преимущественно вечеромъ; зрѣніе то мутное, то ясное и вѣрное; *пятна и язвы на роговой оболочкѣ и вокругъ*

глазъ и вѣкъ; обильное отдѣленіе слезъ и склеиваніе вѣкъ ночью, (Нер. часто умѣстна послѣ Bell. или Merc.).

IGNATIA — когда глаза болѣе болѣзненны, чѣмъ красны; при чувствѣ сильнаго давленія, зависящаго какъ-бы отъ присутствія песку въ глазахъ; притомъ обильное отдѣленіе слезъ, особенно при солнечномъ свѣтѣ; склеиваніе вѣкъ ночью; *необыкновенная слѣтуболезнь*; предметы кажутся какъ-бы въ туманѣ; сильный мокротный насморкъ, съ головою болью или безъ нея.

MERCURIUS — *рыжущія боли или давленіе*, какъ-бы отъ присутствія песку въ глазу, и преимущественно *послѣ напряженія глаза*, а также *вечеромъ* и въ *теплой постели*; *краснота бѣлка и сосудовъ съ глазу*; обильное слезотеченіе, преимущественно *вечеромъ*; необыкновенная чувствительность глазъ къ огню и солнечному свѣту; *пузырьки на бѣлкѣ*; *азвинки на роговой оболочкѣ*; *пустулы и струнья вокругъ глазъ и на краяхъ векъ*; мутное зрѣніе, при которомъ предметы кажутся какъ-бы въ туманѣ; *возвратъ воспаленія отъ малѣйшей простуды*. (Merc. часто приличенъ послѣ Bell.).

NUX VOMICA — краснота угловъ глазъ; размягченіе бѣлка и подтекъ крови на немъ; *жгучія и давящая боли, зависящая какъ-бы отъ присутствія песку съ глазами*; слезотеченіе, свѣтуболезнь, преимущественно *утромъ*; обильное накопленіе слизи въ углахъ глазъ и склеиваніе вѣкъ ночью, когда въ то же время обнаруживаются: *сильная и давящая головная боль*, насморкъ съ залеганіемъ носа; *ухудшеніе по утрамъ*, при пробужденіи или послѣ стола, или же *вечеромъ въ постели*.

PULSATILLA — чувство давленія какъ-бы отъ присутствія песку, или *терзающія, колющія, рыжущія и сверлящія боли въ глазахъ*; краснота глазъ и вѣкъ и обильное отдѣленіе слизи; *обильное слезотеченіе*, при дѣйствіи холода, вѣтра, на воздухъ и при *дневномъ свѣтѣ*; притомъ большая сухость вѣкъ, преимущественно *вечеромъ*; *жгучія и ѣдкія слезы*, склеиваніе вѣкъ ночью; *отечная опухоль вокругъ глазъ или на векахъ*; *слѣтуболезнь съ покалываніемъ въ глазу при дневномъ свѣтѣ*; усиленіе всѣхъ этихъ *припадковъ* *вечеромъ*, или послѣ полудня; *плаксивое расположеніе духа и ухудшеніе состоянія послѣ плача*. Puls. часто умѣстна въ

началъ леченія золотушной офталміи, до употребленія Ferr., а въ ревматическихъ страданіяхъ,—послѣ Acon.

SULPHUR — давленіе какъ-бы отъ песку въ мазахъ, или же зудъ и жжженіе въ мазахъ и отъкахъ; ухудшеніе при движеніи глазъ и солнечномъ свѣтѣ; краснота глазъ и вѣкъ; воспаленіе радужной оболочки и неправильный видъ зрачка; мутность роговой оболочки, какъ-будто она покрыта пылью; пузырьки и язвочки на ней; пустулы, язвы и струпа вокругъ глазъ и на отъкахъ; обильное слезотеченіе, особенно на воздухѣ; большая сухость глаза, преимущественно въ комнатѣ; свѣтоязнь съ сокращеніемъ вѣкъ; искры и туманъ передъ глазами. Sulph. часто умѣстна послѣ Puls., Merc., или также послѣ Acon. Послѣ Sulph., часто бываетъ умѣстна Calc..

§ 6. Изъ другихъ вышесказанныхъ средствъ, можно имѣть въ виду: **ANTIMONIUM**—при очень большой краснотѣ вѣкъ, наполненіи слезы въ углахъ глаза, свѣтобоязни и колющихъ боляхъ. **ARNICA**—при затрудненномъ и болѣзненномъ движеніи глазъ и вѣкъ съ чувствомъ, какъ-будто кожа изъязвлена; при расширенныхъ и чувствительныхъ къ свѣту зрачкахъ, красныхъ и припухлыхъ вѣкахъ и глазахъ. **BYONIA**—при краснотѣ глазъ съ жгучею или давящею болью, съ чувствомъ присутствія въ нихъ какъ-бы песку, ухудшеніи по вечерамъ или ночамъ; при опухшихъ вѣкахъ съ болями головы при ихъ раскрываніи (Byu. часто умѣстна послѣ Puls. въ ревматическомъ воспаленіи глазъ). **CLAUSTRICUM**—при опухли и изъязвленіи вѣкъ и склеиваніи ихъ ночью; чувствѣ давленія и жгучихъ боляхъ въ глазу. **SPINA** — ухудшеніе вечеромъ съ давленіемъ какъ-бы отъ песку въ глазу; свѣтобоязнь; боли во лбу; горячія, красные и мутные глаза, какъ-будто дно ихъ покрыто пылью. **SOLOSUNTIS**—при чувствѣ сильнаго жженія и рѣзы, распространяющихся и въ голову, съ чувствомъ давленія, натяженія и судорожными болями въ одной половинѣ головы, распространяющихся и въ носъ; большой тоскѣ и безпокойствѣ, такъ что больной нигдѣ не находитъ себѣ мѣста. **DIGITALIS**—при краснотѣ глазъ и соединительной пленки, покалываніяхъ поперегъ глазъ, или ощущеніи присутствія песку въ нихъ; обильное отдѣленіе слезъ, которое усливается при дневномъ свѣтѣ и холодѣ; свѣтобоязнь; залеганіе и сухость въ носу.

DULSAMARA — если малѣйшая простуда вызываетъ болѣе съ давящею болью, преимущественно при чтеніи; при мутности зрѣнія, когда предметы видятся какъ-бы черезъ флеръ; при испугѣ и пламени предъ глазами и ухудшеніи въ покоѣ. **FERRUM** — если глаза становятся тусклыми и мутными послѣ самаго легкаго напряженія, или же дѣлаются красными съ жгучими болями а также при ячменѣ. **GARNITES** — при извивахъ на роговой оболочкѣ, необыкновенной свѣтобоязни, красныхъ и опухшихъ ячменяхъ, съ обильнымъ отдѣленіемъ слези и склеиваніемъ ночью. **LACRIMIS** — при большой сухости глазъ, свѣтобоязни, покалываніяхъ какъ-бы пожамъ, или при чувствѣ сильнаго давленія, какъ-будто глазное яблоко готово выскочить изъ своей орбиты (възвѣженіе роговой оболочки); мутный взглядъ. **NITRI ACIDUM** — при чувствѣ давленія и колотья въ глазахъ, обильномъ отдѣленіи слезъ, преимущественно при чтеніи; когда глаза окружены желтыми кругами; при труднотѣ открывать глаза и преимущественно утромъ; при пятнахъ роговой оболочки, опухолѣ вѣкъ и нагноеніи глазъ. **RETROBUM** — при жженіи, колотья, или давленіи съ болями надъ корнемъ носа и опухолью съ истеченіемъ гноя. **RHUS** — въ случаяхъ, гдѣ слѣдовало назначить **Bry.**, но она осталась безъ желаннаго дѣйствія, и при чувствѣ жженія, колотья и обильномъ отдѣленіи слезъ, склеиваніи вѣкъ ночью, рожевидной опухоли на нихъ и свѣтобоязни. **SERIA** — при *сенной* болѣзни, насморкѣ, склеиваніи вѣкъ ночью, пустулахъ вокругъ глазнаго яблока, сильныхъ давящихъ боляхъ. **SPIGELIA** — при *давящихъ*, *колющихъ*, или *сверлящихъ* боляхъ, распространяющихся въ *глубину* *глазной впадины* и въ голову, съ чувствомъ, какъ-будто глазное яблоко увеличилось въ объемъ, въ особенности при сильныхъ боляхъ, доводящихъ больного до отчаянія. **SULPH-AC.** — при жгучихъ боляхъ, свѣтобоязни, слезотеченіи, преимущественно во время чтенія, и труднотѣ раскрывать вѣки. **VERATRUM** — при *терзающихъ* боляхъ, *лишающихъ* больного сна, и сопровождающихся сильною головою болью, свѣтобоязнью, жаромъ и чувствомъ сухости въ глазу.

§ 7. Наконецъ заслуживаютъ еще вниманія слѣдующія обстоятельства. При *вечернемъ соединеніи*: **Amm.**, **Amm.-m.**, **Asar.**, **Bell.**, **Calc.**, **Carb.-an.**, **Caust.**, **Euphr.** **Hyos.**, **Lach.**, **Lyc.**, **Merc.**,

Natr.-m., Nitr.-ac., Phos., Puls., Sep., Sulph.-ac. — При *ночномъ*: Acon., Arn., Ars., Cham., Chin., Croc., Euphr., Her., Hyos., Ign., Kal., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Sep., Staph., Sulph. — При *утреннемъ*: Acon., Amm.-m., Calc., Carb.-v., Euphr., Graph., Ign., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom. — При ожесточенія *послѣ стола*: Bry., Calc., Caust., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sil., Sulph. — При *намити сосудовъ*: Acon., Ars., Bell., Ign., Lach., Merc., Phosph.-ac., Spig., Sulph. — При *разрыленіи соединительной племъ*: Bell., Sen., Sulph. — При существующей въ то же время *сыпи вокругъ глазъ*: Bell., Euphr., Merc., Nitr.-ac., Sen., Sep., Spong., Staph., Sulph., Thuj. — При *кровоныхъ пятнахъ*, кровотечения изъ *глазъ* и *кровоныхъ выпотѣніяхъ*: Arn., Bell., Calc., Carb.-v., Cham., Crotal., N.-vom., Plumb., Rut., Sen. — При *нагноеніи въ глазу*: Bell., Bry., Caust., Euphr., Graph., Her., Kreos., Merc., Nitr.-ac., Puls., Sulph. — При *частомъ морганіи и подериваніи глазъ и тѣхъ*: Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Croc., Kreos., Lyc., N.-vom., Sulph. — При *ухудшеніи на открытомъ воздухѣ*: Acon., Amm.-m., Bell., Bry., Calc., Caust., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos., Puls., Rut., Sen., Sep., Sil., Staph., Sulph., Sulph.-ac., Thuj. — При *желтизѣ склеротики*: Acon., Ant., Ars., Bell., Cham., Chin., Dig., Ign., Merc., N.-vom., Phos., Puls., Sulph. — При *лчменѣ на вѣкахъ*: Con., Ferr., Graph., Puls., Rhus, Sen., Sep., Staph., Sulph.; — При *опухомъ стращающихъ частей*: Acon., Bell., Bry., Cham., Calc., Dig., Euphr., Guaj., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sen., Sep., Sulph., Thuj. — При *язвкахъ на роговицѣ*: Ars., Calc., Euphr., Her., Lach., Merc., Sil., Sulph. — При *сильномъ жартѣ и жженіи въ глазу*: Acon., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Croc., Euphr., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Phos., Sep., Sulph. — При *сильномъ зудѣ въ глазу*: Acon., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Croc., Euphr., Ign., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sil., Sulph. — При *существующихъ въ то же время судорогахъ глаза*: Bell., Cham., Croc., Her., Hyos., Merc., Natr.-m., Rut., Sil., Staph. — При *сетчатобалтнѣ*: Acon., Alum., Amm., Amm.-m., Ars., Bar., Bell., Bry., Calc., Cham., Croc., Euphr., Graph., Her., Hyos., Ign., Lyc., Merc., N.-vom., Phos., Rhus, Sil., Spig., Sulph. — При *паралитѣ тѣхъ*: Bell., Nitr.-ac., Sep., Spig., Veratr. — При *заворотѣ тѣхъ*: Bell., Merc. — При *судорожномъ смѣнаніи*: Ars., Bell., Cham., Croc., Her., Hyos., Merc., Natr.-m.,

Nitr.-ac., Phos., Rhus, Sep., Staph., Sulph.. — При *сильной красноте* частей: Acon., Ant., Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Cham., Chin., Euphr., Graph., Ign., Lach., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Phos., Sep., Sil., Spig., Spong., Sulph.. — При *ощущении присутствия пыли, песку или другого инородного тела* в глазу: Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Ferr., Graph., Hyos., Ign., Merc., Nitr.-ac., Phos., Puls., Sulph.-ac.. — При *неправильности зрениа*, причемъ вокругъ свѣтящагося тѣла видятся *сѣтви*: Alum., Bell., Calc., Dig., Phos., Puls., Rut., Sep., Staph., Sulph.. — При *обильномъ слезотеченіи*: Acon., Alum., Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Dig., Euphr., Graph., Hep., Ign., Lach., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phos., Puls., Rhus, Rut., Sil., Spig., Staph., Sulph., Thuj.. — При *большой сухости частей*: Acon., Ars., Bar., Bry., Lyc., N.-vom., Puls., Staph., Sulph., Veratr.. — При *венозныхъ расширенияхъ*: Carb.-v., Puls.. — При *суженіи отверстія века*: Agar., Ant., Arn., Canth., Croc.. — При *отвердѣніяхъ*: Bry., Spig., Staph., Thuj.. — При *накопленіи моча въ глазахъ по ночамъ*: Ars., Alum., Bar., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Cham., Dros., Dig., Euphr., Graph., Hep., Ign., Lyc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Rhus, Ruta, Sep., Sil., Spig., Staph., Sulph., Thuj.. — При *пораженіи члѣноу глаза*: Acon., Arn., Bell., Canth., Caust., Cham., Croc., Euphr., Dig., Hep., Ign., Lyc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Rhus, Sep., Spig., Sulph.. — При *пораженіи соединительной оболочки*: Acon., Ars., Bell., Dig., Euphr., Merc., Puls., Sulph.. — При *болезнѣ въ глазницѣ* *спадинахъ*: Bell., Calc., Chin., Euphr., Hyos., Plat., Spig.. — При *пораженіи роговой оболочки*: Ars., Bell., Calc., Chin., Euphr., Hep., Lach., Merc., Nitr.-ac., Rut., Sen., Sep., Sil., Spig.. — При *сопутствующемъ страданіи века*: Acon., Ant., Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Caust., Cham., Croc., Dig., Graph., Hep., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Spig., Sulph.. — При *страданіи преимущественно въ углахъ глаза*: Alum., Aur., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Euphr., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Sep., Sil., Staph., Thuj.. — При *пораженіи наружнаго угла*: Bar., Bry., Calc., Hep., Ign., Natr.-m., N.-vom., Sep., Sulph.; — *внутренняго угла*: Alum., Aur., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Sulph., N.-vom., Petr., Phos., Puls., Rut., Sil., Staph.

Сравн. *Кровоточеніе изъ глаза, Воспаленіе века, Судороги века*.

Параличь языка, Боли языка, Слабость языка, Страданія языка.

Воспаленіе глотки, небной занавѣски и языка. Pharyngitis. — Лучшія средства вообще: 1) Acon., Alum., Bell., Canth., Hyos., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Stram.; 2) Ars., Calc., Dulc., Ign., Veratr. — Если воспаленіе ничѣмъ не осложняется, то чаще всего назначаютъ: Acon., Bell., Canth., Lach., Merc. — При судорожномъ стягиваніи глотки, заслуживаютъ вниманія: 1) Bell., Hyos., Lach., Stram., Veratr.; 2) Alum.; Ars., Cist., Cocc., Ign., Laur., Lyc., Merc., N.-vom., Op. — При ощущеніи присутствія инороднаго тѣла или гвоздя въ глоткѣ, назначаютъ: 1) Ars., Ign., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Bell., Lach., Sulph. — Если въ то же время поражается воспаленіемъ и небная занавѣска, то сдотвѣтствуютъ: Acon., Bell., Coff., Merc., N.-vom. — Противъ воспаленія языка по большей части употребляютъ: 1) Bell., Coff., Merc., N.-vom.; 2) Calc., Seneg., Sulph.

Сравн. *Воспаленіе гортани.*

Воспаленіе головы члена. См. перелой ложный.

Воспаленіе и чахотка гортани, Laryngitis et Phtisis laryngea.

Лучшія средства противъ болѣзни гортани: 1) Acon., Carb.-v., Caust., Dros., Herp., Jod., Phos., Spong.; 2) Arg., Ars., Brom., Lach., N.-vom.; 3) Arg.-n., Bell., Canth., Kreos., Merc., Sambf., Tart., Veratr.; 4) Bry., Calc., Cham., Ipec., Led., Mang., Nitr., Nitr.-ac., Seneg., Stann.

Противъ *острою* воспаленія гортани (Angina laryngea): 1) Acon., Bell., Herp., Phosph., Spong.; 2) Ars., Carb.-v., Cham., Dros., Jod., Ipec., Seneg., Tart.

Противъ *хроническую* воспаленія или чахотки гортанной (Phtisis laryngea) рекомендуютъ преимущественно: 1) Ars., Calc., Carb.-v., Caust., Cist., Jod., Phosph., Sulph.; 2) Herp., Kreos., Led., Mang., Nitr.-ac., Spong.; 3) Arg.-n., Dros., Dulc., Kal.-bi., Lach., Led., Seneg., Sil. — Кромѣ того, при *болѣзненности* гортани: 1) Ars., Calc., Carb.-v., Phosph.; 2) Caust., Dros., Herp., Kreos., Nitr.-ac., Spong.; 3) Arg.,

Arg.-n., Jod., Kal-bichr., Led., Mang., Sulph. — У людей, которые по роду занятій должны много и громко говорить: 1) Calc.; 2) Arg., Lach.

Подробнѣе см. *Охриплость, Кашель, Катарръ, Жаба, Воспаленіе гѣла и гортани.*

Воспаленіе грудныхъ сосковъ и железъ у женщины.
Mammitis.

§ 1. Лучшія средства противъ ссадинъ кожи на соскахъ (excoriatio) Arg., Sulph., Calc., Cham., Ign.

§ 2. СНАМОМІЛЛА прилична тамъ, гдѣ соски очень воспалены, но не изъязвлены, если только больная предваритель-но не употребляла чрезмѣрно ромашки. Въ противномъ случаѣ, лучшія средства: Ign., Puls., а можетъ быть также Merc. или Sil. — Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, гдѣ замѣчается одно простое изъязвление, прежде всѣхъ должно назначать Arg., если же Arg. недостаточна, то Sulph., или Calc. — Дѣйствительнѣйшія средства противъ воспаления молокоотдѣлительной железы у женщинъ: Bell., Bry., Carb.-an., Ner., Merc., Phos., Sil., Sulph.

BELLADONNA показана, когда груди припухли и тверды, съ *помочными* или терзающими болями и рожевидною краснотою, которая расходитса лучеобразно изъ одной точки. (Bell. еще лучше дѣйствуетъ, если она дается попеременно съ Bry.).

BRYONIA — когда груди тверды, плотны и переполнены молокомъ, съ гнетущими или колющими болями въ опухоли и съ жгучимъ жаромъ въ смежныхъ частяхъ, преимущественно когда къ воспаленію железъ присоединяются лихорадочныя движенія, жаръ, возвышенная раздражительность кровеносной системы и т. д. (Если Bry. не приноситъ пользы, то ее выгодно пережѣнить на Bell).

NERA — если воспаление отъ употребления Bell, Bry., Merc. не разрѣшилось, а переходитъ въ нагноеніе.

MERCURIUS — если ни Bell, ни Bry. не успѣли уничтожить рожевидной красноты въ грудяхъ, гдѣ еще замѣчаются твердыя воспаленныя части.

PHOSPHORUS — если Ner., не успѣла предупредить нагноеніе, или когда замѣчаются совершенное изъязвленіе железъ и даже

свищевые ходы съ твердыми, мозолистыми краями; или когда обнаружился изнурительный потъ или поносъ, сопровождаемый подоврительнымъ кашлемъ, лихорадочною дрожью по вечерамъ, ограниченою краснотою щекъ и другими признаками изнурительной лихорадки.

Silicea — если Phosph. оказался недѣйствительнымъ противъ нагноенія грудныхъ сосковъ и при этомъ замѣчаются свищевыя язвы и признаки изнурительной лихорадки.

§ 3. Противъ затвердѣннѣ *грудой железы* и *железакость* въ груди, назначаются: 1) Carb.-an., Cop., Sil.; 2) Clem., Coloc., Graph., Lys., Merc., Nitr.-ac., Ol.-jes., Phos., Puls., Ser., Sulph. — Если отвердѣннѣ происходитъ вслѣдствіе толчка въ грудь, то заслуживаютъ вниманія: Arg., Carb.-an., Cop. — При ощущеніи *растягиванія грудей* полезны: Merc., N.-vom., Ser., Sil. — Противъ *рака груди* заслуживаютъ особеннаго вниманія: 1) Arg., Chel., Sil., можетъ быть также: 2) Bell., Cop., Her., Kreos. — Противъ *уменьшенія грудей* (Atrophia mammae): Cop., Jod., Nitr.-ac., Sass.

Воспаленіе грудобрюшной преграды, Diaphragmitis. — Еще ничего неавѣстно достовѣрнаго объ этой болѣзни. Теоретики предлагаютъ: Acon., Amb., Arg., Cham., Canth., Coccul., Colch., Dros., Laur., N.-vomch., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Spig. Veratr.

Воспаленіе дыхательнаго горла и его вѣтвей, Bronchitis, Tracheitis. — Главныя средства: 1) Acon., Arg., Carb.-v., Caust., Dros., Her., Lach., Merc., Phosph., Spong.; 2) Calc., Cham., Jod., Ipec., Led., Mang., Nitr.-ac., Nitr., Seneg., Stann. Подробности см. *Воспаленіе гортани, Осиплость, Кашель и Катарръ.*

Воспаленіе желудка, Gastritis.

§ 1. Подъ названіемъ воспаленія желудка мы разумѣемъ ту самостоятельную болѣзнь, которая до Бруссе и его антифлогистической школы извѣстна была подъ этимъ же названіемъ; она не состоитъ въ нарушенной дѣятельности этого органа, и не въ слабости его, ил въ такъ называемой диспепсін: она есть страданіе, выражающееся слѣдующими припадками: *постоянно сильною болью въ желудкѣ, которая усиливается при дотроиваніи,*

при движении мышц нижней части живота и при введении в желудок самого незначительного количества пищи, съ большой чувствительностью, вздутостью, жаром или биением в горячей части; рвотой слюны, что только вводится в желудок; сильной тоскою, холодом конечностей, необыкновенным упадком сил; судорогами и другими сочувственными нервами припадками, а в острой формѣ — сильною воспалительною лихорадкою.

Лучшія средства противъ этого воспаления вообще: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Chel., Huob., Ipec., N-vom., Puls., Veratr.; 2) Ant., Canth., Euphr., Ran., Stram.; 3) Aca., Baryt., Camph., Cann., Colch., Coloc., Cupr., Dig., Hell., Nitr., Phosph., Sabad., Sec., Squill.

§ 2. Изъ этихъ средствъ достойны вниманія:

АСОНИТУМЪ — въ началѣ леченія, преимущественно при сильной воспалительной лихорадкѣ, сопровождаемой жестокою болью, или если воспаление произошло вследствие простуды, въ особенности отъ холоднаго нитя при разгоряченіи тѣла.

АНТИМОНІУМЪ — если причину болѣзни составляютъ нечистота желудка, накопленіе нечистотъ въ немъ, и когда дается частая рвота, причемъ языкъ густо обложенъ желтою, или бѣлою слизью.

АВЗЕНІСУМЪ часто употребляется попеременно съ Acon., и особенно тамъ, гдѣ воспаление произошло отъ введенія льда въ желудокъ, или когда обнаруживаются: внезапный упадокъ силъ, блѣдное, инвертированное лице, холодъ конечностей, и если Veratr. оказался неэффективнымъ противъ этого состоянія.

ВЕЛЛАДОННА — если замѣчается пораженіе мозга, сопровождаемое притупленіемъ чувствъ, потерю самосознанія или бредомъ, и если Huob. оказался неэффективнымъ противъ этого состоянія.

ВРУОНІА — послѣ Acon., или Ipec., особенно, когда причина заключается въ томъ, что заболѣвшій напился холоднаго при разгоряченіи тѣла.

НУОСИМУСЪ — при признакахъ водники, или при пораженіи мозга съ притупленіемъ чувствъ, потерю самосознанія, бредомъ.

IRECASAUNA — если преобладает рвота, и преимущественно тамъ, гдѣ причина болѣзни заключается въ накопленіи нечистотъ въ желудкѣ или неисправности его, или также при сильныхъ боляхъ; равно когда болѣзнь есть слѣдствіе простуды отъ холоднаго питья и Асоп., не принесъ пользы.

NUX-VOMICA — когда причина болѣзни заключается въ неисправности желудка или простудѣ отъ холоднаго питья, и если Асоп., Вру, Ирес., Агъ. не принесли пользы.

PULSATILLA — когда причину болѣзни составляютъ накопленіе нечистотъ въ желудкѣ, или простуда отъ употребленія льда, и если въ обоихъ случаяхъ Агъ., Ирес., оказались неэффективными.

VERATRUM — когда при воспаленіи желудка замѣчаемъ: *необыкновенный холодъ конечностей*, быстрый упадокъ силъ, блѣдное, ипнократическое лице.

Ср. *Лихорадка воспалительная, Cholera, Гастрическія страданія*, а при хроническомъ воспаленіи желудка ср. *Слабость желудка и Спазмы его.*

Воспаленіе зѣва, жаба. Angina.

§ 1. Лучшія средства противъ различныхъ видовъ воспаленій глотки вообще суть: 1) Асоп., Bell., Cham., Lach., Merc., N.-vom., Puls; 2) Baryt., Вру., Caps., Chin., Cic., Coccul., Coff., Dulc., Ign., Rhus, Sabad., Ser., Sulph., Veratr.; 3) Alum., Amm., Ars., Calc., Canth., Carb.-v., Lyc., Mang., Nitr.-ac., N.-mosch., Seneg., Staph., Thuj.

§ 2. Для обыкновенныхъ болей глотки, безъ лихорадки, появляющихся послѣ простуды: 1) Bell., Merc.; 2) Cham., N.-vom., Puls., Sulph.

Настоящее воспаленіе горла требуетъ часто употребленія многихъ средствъ, изъ коихъ въ острыхъ случаяхъ главными считаются: 1) Асоп., которое дается до-тѣхъ-поръ, пока не умѣрится лихорадка, если же затѣмъ не послѣдуетъ улучшенія, то даютъ: 2) Bell., Вру., Cham., Coff., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, или также 3) Агъ., Baryt., Canth., Caps., Chin., Dulc., Нер., Lach., Mang., Staph..

При воспаленіи горла *хроническомъ*, длительномъ: 1) Alum., Baryt., Calc., Carb.-v., Herp., Lach., Lyc., Sep., Sulph.; 2) Bell., Chin., Mang., Nitr.-ac., N.-vom., Sabad., Seneg., Staph., Thuj.

§ 3. Смотра по происхожденію жабы, назначаются: при *крупной катарральной или ревматической*: 1) Bell., Cham., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Acon., Carb.-v., Caps., Dulc., Herp., Rhus Seneg.. Въ большей части случаевъ, достигаемъ желанной цѣли употребленіемъ одного или двухъ средствъ, исчисленныхъ въ первомъ ряду; упорнѣе лечится такъ называемая *флегмонозная жаба* сопровождаемая воспалительною опухолью страдающихъ частей. Противъ нея причинами считаются: 1) Acon., Bell., Herp., Ign., Merc. N.-vom., Sulph. или также: 2) Alum., Baryt., Calc., Canth., Coff. Lach., Sep., Thuj. — При *язвистомъ воспаленіи зева* (Inflammatio faucium membranacea), которое авторы называютъ *крупомъ* (Larinitis membranacea) или *злокачественною жабою* (Angina maligna) и которое однако, по моимъ наблюденіямъ, составляетъ самостоятельную форму, не переходящую ни въ омертвѣніе, ни въ крупъ, но у взрослыхъ можетъ угрожать опасностью задушенія главными средствами считаются: Alum., Bell., Chin., Herp., Merc., Puls., Spong. (и Acon., если болѣзнь сопровождается сильною лихорадкою). — При настоящей *язвистой жабы*, заслуживаютъ преимущественно вниманія: Acon., Herp., Spong. — При *гангренозномъ воспаленіи зева*, главныя средства: Amm., Arg., Lach., или также: Con., Euphorb., Kreos., Merc., Sulph..

§ 4. Смотра по *причинамъ*, вслѣдствіе которыхъ развиваются того или другаго рода воспаленія глотки, назначаются: Если болѣзнь произошла послѣ *острыхъ сменъ*, какъ-то: скарлатины, кори, оспы, и т. д.: Arg., Bar.-c., Bell., Carb.-v., Ign., Merc., Puls.; — *вслѣдствіе злоупотребленія ртути*: Arg., Bell., Carb.-v., Herp., Lach., Staph., Sulph.; — *простуды*: Bar.-c., Bell., Bry., Cham., Coff., Dulc., Ign., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; — *сифилиса*: 1) Merc., Nitr.-ac., Thuj.; 2) Carb.-v., Lach., Phosph.; — *пораженія или поврежденія зева* посредствомъ *инородныхъ тѣлъ*, напр. попавшей туда косточки, то по удаленіи механической причины, съ болью, швомъ пользой употребляются: 1) Acon., Bell., Cham., Cic., Ign., Merc.; 2) Carb.-v., Con., Nitr.-ac., Puls., Sulph.-ac.

§ 5. Касательно припадковъ, характеризующихъ различные виды воспаленій горла, нужно имѣть въ виду слѣдующее:

BELLADONA — почти во всѣхъ видахъ воспаленій горла, и преимущественно, когда замѣчаются: *язвенная боль, чувство сухости, жженія или колотья въ гортань, суженіе и судорожное стягиваніе зѣва съ постоянною потребностію мотать; затрудненное или почти невозможное мотаніе; отсутствіе жажды или сильный напѣвъ на питье съ отвращеніемъ отъ него, или невозможность мотать, потому что принятая жидкость выходитъ въ носъ;* яркая, иногда желтоватая краснота пораженныхъ частей, безъ опухоли, или опухоль и воспалительная краснота небной занавѣски, языка и миндалинъ, даже съ нагноеніемъ; *язвы, быстро разрушающія смежныя части; накопленіе вязкой, бѣловатой слизи въ гортань, во рту и на языкъ; слюнотеченіе; опухоль мышцъ и железъ шеи и затылка; сильная лихорадка, сопровождаемая жаромъ, краснотой и отдутловостью лица; сильная боль во лбу; плаксивость и капризы.* (Сравни. Мерс., который приличенъ до или послѣ употребленія Bell.).

СНАМОМІЛЛА — преимущественно дѣтямъ, или когда болѣзнь есть слѣдствіе задержанія или скривленія испаренія, или когда замѣчаются: *опухоль околоушныхъ, миндалевидныхъ и подчелюстныхъ железъ; волючія или жгучія боли, или чувство какъ-бы присутствія инороднаго тѣла въ гортань; темная краснота страждущихъ частей; невозможность глотать плотную пищу, преимущественно въ лежачемъ положеніи; жажда и сухость во рту и гортань; чувство щекотанія въ гортань, отчего возбуждается кашель; жесткость волоса; лихорадка къ вечеру съ перемежнымъ ознобомъ и жаромъ; краснота щекъ, — обѣихъ или одной только; большое безнокойство, метаніе въ разныя стороны, крикъ и плачь.*

LACINERIS назначается почти во всѣхъ случаяхъ, гдѣ Bell. или Мерс. оказались неэффективными и преимущественно, когда замѣчаются: *язвенная боль, жженіе и сухость въ гортань, которая ограничивается или малымъ и определеннымъ мѣстомъ, или же распространяется до слухового органа, на гортань, языкъ, носъ, десны, сопровождается труднымъ дыханіемъ, опасностію задушенія, слюнотеченіемъ и слизистымъ хрипомъ; опухоль, краснота и взъ-*

извѣненіе миндалинъ или небной занавѣски; постоянная потребность глотать, совмѣстная съ судорогами въ гортань, или съ чувствомъ присутствія опухоли, или какъ-бы пробки, которую больной старается пролотить; затрудненное глотаніе съ отвращеніемъ отъ питья, которое иногда попадаетъ въ ноздри; ухудшеніе послѣ полудня или утрамъ, или же послѣ сна, а также отъ малѣйшаго дотроиванія и давленія на горло; облегченіе во время принятія пищи.

MERCURIUS часто назначаются вначалѣ леченія, передъ употребленіемъ Bell., или попеременно съ этимъ средствомъ, особенно, когда замѣчаются: сильная покалыванія въ гортань и миндалины, преимущественно при глотаніи, распространяющіяся и на окологубныя железы, въ уши и нижнечелюстныя железы; жжение въ гортань и извѣнная боль въ немъ; опухоль и сильная воспалительная краснота пораженныхъ частей; удлиненіе язычка; постоянная потребность глотать; затрудненное глотаніе жидкости, которая попадаетъ въ ноздри; дурной вкусъ во рту; обильное слюноотеченіе; опухоль десенъ и языка, нагноеніе миндалинъ или язвы въ гортань, медленно разрушающія смежныя части; ухудшеніе болѣзни въ ночи, или къ вечеру и также на воздухѣ и при разговорѣ; дрожь къ вечеру, или ознобъ, перемежающійся съ жаромъ; потъ, не облегчающій больного; ревматическія, терзающія или натягивающія боли въ головѣ и затылкѣ.

NUX VOMICA показана часто послѣ Cham., равно для сухощавыхъ, желчныхъ и холерическихъ субъектовъ, или же для снѣгвиниковъ, притомъ когда замѣчаются: чувство свербенія и извѣнная боль въ гортань, преимущественно при глотаніи и дыханіи на воздухѣ; боль при глотаніи съ чувствомъ, какъ-будто глотка сжата, или какъ-будто въ гортань стоитъ гвоздь или пробка; покалыванія, распространяющіяся и въ ухо, преимущественно при глотаніи; опухоль язычка, неба и миндалинъ, или только ощущеніе опухоли съ колотьежъ и давленіемъ; сухой кашель, боль головная и боль подъ ребрами во время кашля; небольшія язвы гнилостнаго запаха во рту и въ гортань.

PULSATILLA — преимущественно для женщинъ, или для особъ кроткаго нрава и флегматическаго темперамента, притомъ когда замѣчаются: синеватая краснота зѣва, язычка и миндалинныхъ

железь съ *ощущеніемъ сухости въ этия частиаъ*, или чувство присутствія гвоздя или шишки въ горлѣ, безъ жажды; покальванія въ горлѣ даже и не при глотаніи, съ давленіемъ и гнетеніемъ во время глотанія; *дрожь къ вечеру*, при которой боли въ горлѣ усиливаются; варикозное расширеніе шейныхъ венъ; накопленіе *вязкой слизи на страждующихъ частиаъ*.

§ 6. Изъ прочихъ средствъ достойны вниманія:

АСОНИТУМЪ — при сильной лихорадкѣ, сопровождаемой сухимъ жаромъ, краснотю щекъ, безпокойствомъ, нетерпѣніемъ и отчужденіемъ, при темной краснотѣ пораженныхъ частей, затрудненномъ и болѣзненнымъ глотаніи, жженіи, *свербеніи* и стягиваніи въ горлѣ, болѣзненной чувствительности горла при разговорѣ, гучей жаждѣ.

ВУОНИА — при болѣзненной чувствительности горла къ прикосновенію и поворачиванію головы; затрудненномъ и болѣзненнымъ глотаніи съ чувствомъ присутствія какъ-бы твердаго тѣла въ горлѣ; *покальваніяаъ, язвенной боли и ощущеніи сухости въ юрлѣ*, такъ что черезъ это затрудняется разговоръ; при лихорадкѣ съ жаромъ, или безъ него, или ознобомъ и чувствомъ холода, раздражительнымъ расположеніемъ духа.

САРСИСУМЪ — въ случаяхъ, гдѣ Cham., Bru., Ign., N.-vom. показаны, но остались безъ успѣха, а въ особенности, когда лихорадка продолжается съ ознобомъ, жаждою и послѣдующимъ затѣмъ жаромъ; когда есть давящая боль съ чувствомъ стягиванія горла; отсложка и изъязвленіе во рту и горлѣ; кашель съ болью; постоянное желаніе лежать и спать, съ отвращеніемъ отъ воздуха и холода.

СОГГЕА — если замѣчаются: насморкъ съ раздраженіемъ въ горлѣ, возбуждающимъ кашель преимущественно на воздухѣ; *сонливость, жаръ, тоскливость и постоянная жалоба*; притомъ опухоль небной занавѣски съ удлиненіемъ язычка; *необыкновенная чувствительность пораженныхъ частей* и боли, кажуціяся невыносимыя; сухой, короткій кашель.

ИЕРАУ — часто послѣ Bell. или Merc. и когда замѣчаются: сухость, ощущеніе присутствія какъ-бы гвоздя или покальваніе въ горлѣ, какъ-бы отъ осколковъ, при *момамъ, кашлѣ*, дыханіи и поворачиваніи головы; болѣзненное свербеніе, мѣшающее раз-

говору; затрудненное, или даже совсѣмъ невозможное глотаніе; сильное давленіе въ горлѣ съ опасностію задушенія; твердость или изъязвленіе миндалинъ. (Сравни. Cham., N.-vom., Puls., или также Bel., Merc., Ner., Sulph.).

IGNATIA — красная воспалительная опухоль неба или миндалинныхъ железъ; притомъ *ощущеніе какъ-бы жала въ зорать*, или *калотея до ушей*, не во время глотанія, съ жженіемъ и саднящею болью при глотаніи; жидкости глотать трудно, чѣмъ плотную пищу; миндалины тверды, или изъязвлены. (Сравни. Cham., N.-vom., Puls., а также Bel., Merc., Ner., Sulph.).

RHUS назначается въ случаяхъ, гдѣ Bry. оказалась неудовлетворительною и преимущественно тамъ, гдѣ расположеніе духа болѣе тоскливое, нежели гнѣвное; при чувствѣ давленія и покалыванія во время глотанія; бьющихся боляхъ на днѣ зѣва; *препятствіемъ во время глотанія, какъ-бы отъ суженія зорла*; ощущеніе опухоли въ горлѣ, съ болью какъ-бы при ушибѣ, обнаруживающаея даже при разговорѣ.

SULPHUR — при опухоли горла, миндалинъ и язычка; чувствѣ свербѣнія, *сухости, язвенной боли*, жженія, *калотея въ зѣвъ* во время глотанія, или виѣ его; давленія, происходящемъ *какъ-бы отъ шишки въ горлѣ* или болѣзненномъ *чувствѣ суженія*, съ затрудненнымъ глотаніемъ; опухоль шейныхъ железъ.

§ 7. Изъ остальныхъ средствъ можно употребить:

ALUMINA — при сплошной краснотѣ и припухлости рта и зѣва, съ ощущеніемъ судорожнаго стягиванія, истеченіемъ слюны и невозможностію глотать, или даже раскрывать ротъ, когда притомъ Bel. и Merc. оказались безуспѣшными. BARYTA CARBONICA — если воспаление возвращается отъ малѣйшей простуды, и если миндалины отвердѣли и склонны къ нагноенію. CHINA — противъ опухоли неба и язычка, сопровождаемой покалываніемъ въ горлѣ, преимущественно при глотаніи, или безпокойнымъ ночнымъ сномъ, и если болѣзнь ожесточается отъ самаго незначительнаго сквознаго вѣтра. CICUTA — если отъ попавшаго въ горло инороднаго тѣла оно такъ опухло, что глотаніе рѣшительно невозможно, и если Bel. оказалась противъ этого состоянія безуспѣшною. COCCULUS — если боли занимаютъ глубокое мѣсто (т. е. пищепріемный каналъ) съ сухостію, распространяющаея

и въ грудь; при шумѣ въ горлѣ во время питья. DULCAMAHA—при катарральной жабѣ, если Merc. оказался недействительнымъ и существуетъ обильное отдѣленіе слизи. SABADILLA — противъ упорной жабы съ чувствомъ давленія, жженія, присутствія шишки или стягиванія въ горлѣ во время и внѣ глотанія; сухости, свербеви, шероховатости въ горлѣ, съ постоянною потребностію глотать. SYRIA—противъ язвенной боли и покалываній при глотаніи съ частымъ хрипомъ и обильнымъ накопленіемъ слизи. VERATRUM — при чувствѣ сухости въ горлѣ съ жженіемъ, шероховатостью, почесываніемъ или стягивающею болью, душеніемъ, давленіемъ и судорогами при глотаніи.

§ 8. Кромѣ того, надо обращать вниманіе на слѣдующее:

Если поражена преимущественно *небная заматка*: 1) Acon., Bell., Coff., Lach., Merc., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac.; 2) Arg., Carb.-v., Stram., Sulph.; если *язычекъ* сочувственно пораженъ: 1) Bell., Calc., Carb.-v., Coff., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Caust., Jod., Lys., Natr.-m., Sil., Sulph.; если поражаются преимущественно *миндалевидныя железы*: 1) Bell., Lach., Merc.; 2) Amm., Cham., Ign., N.-vom., Puls., Staph.; 3) Alum., Baryt., Calc., Her., Lys., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sulph., Thuj.; — одновременно и *гортаны*: Acon., Ars., Bell., Bry., Carb.-veg., Dros., Her., Jod., N.-vom., Phos., Spong.; — преимущественно *пищеприемный каналъ*: Amm., Ars., Asa., Canth., Carb.-v., Coccul., Lach., Natr.; — преимущественно *злота*: Alum., Bell., Carb.-v., Ign., Lach., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Sulph.

§ 9. При *болѣзнь жгутичь*: Alum., Ars., Bell., Carb.-v., Lach., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Seneg.; — *давленіемъ*: Alum., Caust., Her., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sep., Sulph.; — *ощущеніи опухоли* или настоящей опухоли: Chin., Lach., Nitr.-ac., Puls., Sulph.; — *шекотаніи и свербеви*: Carb.-v., Lach., Sep.; — *ощущенія почесыванія и шероховатости*: Acon., Amm., Carb.-v., N.-vom., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Alum., Ars., Caust., Con., Graph., Sabad., Sep.; — *присутствіи звездъ, какъ-бы клубка въ горлѣ*: 1) Bell., Cham., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amm., Caust., Nitr.-ac., Sep. — *Притерзающія болѣзнь*: Amm., Ars., Jod., Lys.; — *язвенныя*: Alum., Calc., Carb.-v., Caust., Ign., Lach., Merc., Mur.-ac., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sep.; 2) Amm., Caps., Carb.-an., Graph., Kal., Lys.,

N.-vom., Phos.-ac., Sep., Staph.; — *рыжущие*: Puls., Sep., Stann.; — *комочки*: 1) Acon., Bell., Ign., Merc., Puls.; 2) Calc., Cham., Herp., Lach., Lyc., Natr.-m., Nitr., Sulph., Thuj.; — *чувство как-бы сужения*: 1) Bell., Dros., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Alum., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Natr.-m., Veratr.; — *стлышания и судорожаста тва*: Bell., Ign., N.-vom., Stram., Sulph.; 2) Alum., Ara., Caps., Carc.-v., Coccul., Con., Natr.-m., Sabad., Seneg., Veratr..

§ 10. При *опухахи* страждущих частей: 1) Amm., Bell., Calc., Lach., Merc., N.-vom., Staph.; 2) Alum., Baryt., Cham., Chin., Coff., Graph., Herp., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sabad., Sil., Sulph., Thuj.. — При *нагноенхи* изъ: Bell., Lach., Herp., Merc.. — При *язвах въ горлах*: Alum., Bell., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Thuj.; 2) Borax, Calc., Staph. — При *образованхи ложных оболочек*: 1) Apis, Brom., Spong.; 2) Bor., Herp., Jod., Lach., Lyc., Nitr.-ac., N.-vom., Sulph.-ac.; 3) Alum., Amm., Ara., Bell., Bry., Kaol., Kreos., Phosph., Tart. — При *сильной краснотех страждущих частей*: 1) Acon., Alum., Amm., Bell., Cham., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Baryt., Coff., Herp., Lach., Lyc., Staph. — При *обильном накопленхи слизи въ горлах*: Alum., Bell., Calc., Caps., Caust., Cham., Chin., Con., Ign., Kal., Lach., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls., Seneg., Staph., Sulph. — При *облаженхи страждущих частей слуху*: Bell., Canth., Chin., Merc., Plumb., Puls. — При *обильном слюнотеченхи*: 1) Acon., Bell., Chin., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Alum., Amb., Ant., Arg., Bry., Calc., Cham., Chin., Ign., Lyc., Lach., Natr.-m., Nitr.-ac., Sep., Sil. — При *сильной сухостех во рту и горлах*: Acon., Bell., Bry., Calc., Cham., Ign., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Seneg., Sep., Sil., Sulph. — При *варикозном расширенхи сосудов горлах*: Carb.-v., Puls. — При *отслоех на страждущих частях*: Alum., Amb., Carb.-v., Graph., Kal., Lach., Merc., Mez., Mur.-ac., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sil.

§ 11. *Назонецъ*: при *постоянном побужденхи къ хотанхи*: 1) Bell., Cham., Ign., Lach., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls.; 2) Alum., Calc., Caps., Caust., Chin., Con., Kal., Seneg., Staph., Sulph. — Если хотанхе *причиняет или усиливает боль*: Bell., Bry., Herp., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Staph., Sulph. — Если хотанхе *слуха усиливает боль*: Bry., Coccul., Lach., Herp., Merc.,

N.-vom., Puls, Rhus, Sulph.;—*мотаніе слезъ затруднительно и болезненно*: Alum., Baryt., Bry., Cham., Herp., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Sep., Sulph.;—*мотаніе жидкостей преимущественно затрудняется*: Bell., Canth., Cupr., Ign., Jod., Lach., Merc., Natr.-m, Phosph., Sil.;—*мотаніе вообще очень затруднено, или почти невозможно*: 1) Acon., Bell., Canth., Hyos., Lach., Lyc., Merc., Stram.; 2) Alum., Amm., Arg., Bry., Calc., Canth., Carb.-v., Caust., Cham., Cin., Con., Cupr., Dros., Herp., Ign., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sep. Sil.—*Когда боли не ожесточаются при мотаніи*: 1) Ign.; 2) Alum., Amb., Caps., Graph., Lach., Merc., Mez., N.-vom., Puls., Spong. Stann., Staph..

Сравн. *Воспаленіе рта, Слюнотеченіе, Катарръ дыхательныхъ путей, Насморкъ, Кашель.*

Воспаленіе кишечъ. Enteritis.—Самое лучшее средство противъ воспаленія кишечъ составляетъ Acon., такъ что нѣсколько его приемовъ, даваемыхъ всякія два или три часа, въ состояніи умѣрять воспаленіе, для совершеннаго разрѣшенія котораго достаточными будутъ: Lach., Bell. или Merc..

Въ случаяхъ болѣе запутанныхъ, достойны вниманія: 1) Arg., Bry., Hyos., N.-vom.; 2) Ant., Canth., Cham., Chin., Coloc., Ipec., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus, Sec., Squill., Sulph., смотря по обстоятельствамъ и припадаемъ.

При одновременномъ пораженіи: *грудной перегородки (diaphragma)*: Acon., Bry., Cham., Lyc.;—*брюшнымъ*: Acon., Bell., Bry., Lyc., Merc.—*При преобладающемъ воспаленіи слѣпой кишки (Typhlitis)*: Bell., Lach., Rhus.;—*толстой кишки*: Bell., Merc.—*При угрожающемъ ожертельномъ*: Arg.—*При поверхностномъ воспаленіи съ розовою краснотой*: Acon., Bell., Merc..

См. также *Воспалительная мигорадка, Воспаленіе желудка, Камка, Желудка страданія.*

Воспаленіе колѣннаго сустава, Gonitis.

При *лимфатической и золотушной опухоли* колѣна, назначаются преимущественно: 1) Calc., Sulph.; 2) Arg., Arg., Ferr., Jod., Lyc., Sil.—*Противъ мотаннаго воспаленія* предпочитаютъ: 1) Merc., Sil.; 2) Bell., Herp., Sulph.—*При серозномъ выпотѣніи въ колѣнномъ суставѣ, назначаются*: 1) Sulph.; 2) Calc., Jod., Merc., Sil.; 3) Con., Dig.—*Противъ такъ называемой большой опухоли колѣна*

(Phlegmasia alba dolens): 1) Bry., Lyc; 2) Ant., Ars., Puls., Rhus, Sabin., Sulph.; 3) Bell., Calc., Chin, Jod, Merc., Rhus, Sep., Sil.
См. также: *Домота, Нанноеіе, Опухоль, Водянка, Золотуха.*

Воспаленіе легкихъ, Pneumonia.

§ 1. Лучшія средства: 1) Acon., Bry., Cann., Chin., Phos., Rhus, Squill., Sulph.; 2) Bell., Lach., Merc., Puls., Seneg.; 3) Ars., Canth., Nitr., N.-vom., Op., Phos.-ac., Sabad., Sep., Tart., Veratr..

§ 2. Въ первомъ періодѣ воспаленія легкихъ, главнымъ средствомъ считается Acon., которое употребляется до-тѣхъ-поръ, пока замѣтнымъ образомъ не исчезнутъ лихорадочныя припадки, жаръ и жажда. — Если же лихорадка отъ употребленія Acon., не унялась, то лучшее средство составляетъ Bry., которая дается до-тѣхъ-поръ, пока дыханіе не сдѣлается свободнымъ и изверженіе не получитъ лучшаго вида. Если по употребленіи Bry., здоровье больного до того восстановлено, что онъ можетъ приступить къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ и замѣчается только одна слабость легкихъ, сопровождаемая чувствомъ давленія, тоскливости въ груди и кашлемъ, то часто съ успѣхомъ назначаютъ: Phosph., Sulph., или Chin., Lach., Lyc., Sil..

§ 3. Вслучаѣ перехода воспаленія легкихъ во второй періодъ, въ періодъ *гепатизаціи* (опечененія), прежде чѣмъ успѣли приняться за леченіе, главнымъ средствомъ считается Sulph., хотя Acon. и Bry. также могутъ принести пользу. Часто въ этомъ періодѣ пригодны: Lach., Lyc., Phosph., а во многихъ случаяхъ, даже тамъ, гдѣ Sulph. оказала надлежащій успѣхъ, приходится обратиться въ тому или другому изъ этихъ средствъ, назначая только одинъ приемъ его и ожидая дѣйствія не только нѣсколько дней, но и нѣсколько недѣль. — При ясныхъ признакахъ развивающагося *нанноеія*: 1) Lach., Phosph.; 2) Bell., Sulph.; при *медленномъ и множеств. изверженіи*: Carb.-v., Seneg., Merc.; при пораженія въ особенности *праваго* легкаго, сопровождаемомъ желчными явленіями, замѣчательно успѣшно дѣйствуетъ Tart., если онъ впрочемъ соотвѣтствуетъ и другимъ симптомамъ даннаго случая.

§ 4. Противъ такъ называемаго *атеническаго* воспаленія легкихъ (Pneumonia potha), какъ это встрѣчается у стариковъ, —

которое склонно переходить въ параличь легкихъ, первымъ и главнымъ средствомъ считается Асоп.; если же по употребленіи Асоп. обнаружится ожесточеніе болѣзни, то назначаютъ Мерс. Если Мерс. произвелъ надлежащее дѣйствіе, но не успѣлъ совершенно разрѣшить воспаленія, то имѣетъ мѣсто Bell, даже когда осталось судорожное стягиваніе въ груди съ сухимъ покашливаніемъ; или Cham., если дыханіе будетъ все еще свистающее. (Послѣ Cham. часто умѣстна N.-vom.).

Если Мерс., не произвелъ никакихъ измѣненій, то лучшимъ средствомъ считается Ирес., въ особенности, когда замѣчается дыханіе тоскливое и необыкновенно скорое, или же Vegetr., когда конечности начинаютъ холодѣть и замѣчаются стягиваніе въ груди и большая тоска; или наконецъ Агъ., когда больной болѣе и болѣе слабѣетъ, съ припадками задушенія.

§ 5. Противъ *тифознаго* воспаленія легкихъ, первое и лучшее средство Ор.; за нимъ слѣдуетъ Агп.. По употребленіи этихъ двухъ средствъ, если не замѣчается никакой переменъ, очень полезенъ Vegetr. (2—3 приема), или также Агъ., если безсиліе и хрипъ увеличиваются.—Также будутъ полезны: Вгу. и Rhus, Ирес. и Агъ., или Vegetr. и Агъ., попеременно.—Если улучшеніе не совершенно, то можно дать Sulph. и потомъ опять перейти къ одному изъ вышесказанныхъ средствъ.—Если окажутся *промежны* и *изъявленныя* мѣста начать переходить въ омертвѣніе, то употребить Chin. и Агъ.—Если обнаружится *потемнѣніе зрѣнія*, то назначается преимущественно Bell, а когда силы больного постоянно все падаютъ, то часто съ успѣхомъ назначаютъ Natr.-m..

§ 6. Что касается леченія послѣдствій воспаленія легкихъ, то если замѣчаются признаки начинающейся чахотки, или воспаленіе легкихъ выказываетъ склонность сдѣлаться хроническимъ, или когда начинается развитіе туберкуль: 1) Sulph.; 2) Amm., Lach., Lys., Phosph.; 3) Агъ., Aug., Нер., Kal., Nitr.-ac., Ol.-jes., Stann., Sulph.-ac.. При гнойной мокротѣ изъ легкихъ, послѣ воспаленія: 1) Chin., Ferr., Нер., Lach., Lys., Мерс., Sulph.; 2) Dros., Dulc., Laur., Led., Puls.,

§ 7. Кромѣ сказанныхъ, можно во многихъ случаяхъ употребить еще и слѣдующія средства:

Авгиса, если воспаленіе легкихъ есть слѣдствіе наружнаго

поврежденія.—**Азенисум**, если вонючее и грязное изверженіе изъ легкихъ даетъ поводъ опасаться омертвѣнія легкихъ, и если **Chin.**, или **Lach.** оказались мало дѣйствительными.—**Саннавіс**, когда воспаленіе легкихъ осложняется болѣзнію сердца или большихъ сосудовъ; или когда, кромѣ припадковъ воспаления, замѣчаются еще зеленая ррота и бредь.—**Сарсисум**, когда въ то же время находятся катарръ дыхательныхъ вѣтвей или ихъ воспаление, преимущественно у людей флегматическихъ, лѣнивыхъ, съ недовѣрчивымъ характеромъ.—**Сина** — при значительной потерѣ крови, или вслѣдствіе обильныхъ кровоусканій, или слишкомъ обильнаго кровотеченія изъ легкихъ; или когда имѣются желчныя припадки, даже признаки гангрены легкихъ. **Мевсуріус** — главное средство при осложненіи воспаления легкихъ воспаленіемъ дыхательныхъ вѣтвей, въ особенности у расположенныхъ къ слизетеченіямъ, или при обильномъ изверженіи кровянистой, вязкой слизи. **Нух-вом.** — когда воспаленіе легкихъ осложняется сильнымъ катарромъ, или когда этою болѣзнію поражаются люди, преданные пьянству, или страдающіе геморроемъ. **Риозрновус** — послѣ **Н.вом.**, въ случаяхъ, гдѣ воспаленіе легкихъ сопровождается катарромъ дыхательныхъ вѣтвей и кашлемъ, или при воспаленіи легкихъ, присоединяющемся къ бугорчатой чахоткѣ. (Въ послѣднемъ случаѣ, часто также приносятъ пользу **Кал.** и **Лус**). **Пульсатилла** — когда воспаленіе легкихъ присоединилось къ кори, или развилось вслѣдствіе сильнаго катарра дыхательныхъ вѣтвей, или вслѣдствіе задержанныхъ регулъ. **Сквилла** — если воспаленіе легкихъ сопровождается гастрическими припадками, или если оно было лечимо кровоусканіями и въ послѣднемъ случаѣ **Chin.** оказалась недѣйствительною; равно, когда уже въ самомъ началѣ болѣзни появилось обильное изверженіе слизи.—**Тавтавус** часто показанъ у стариковъ, когда воспаленіе грозитъ перейти въ параличъ и сопровождается значительною спячкою; равнымъ образомъ при преобладаніи желчныхъ явленій и обильномъ изверженіи мокроты одновременно съ усиленнымъ отдѣленіемъ пота.

§ 8. Вообще должно имѣть въ виду: если больной какъ-бы задыхается отъ крови: **Асоп.**, **Squil.**; при значительной трудности дыханія въ первомъ періодѣ вообще: **Tart.**; при напорѣ крови на голову: **Bell.**; при колочкахъ боляхъ: **Агп.**, **Вру.**; при мочковатъ

явленияхъ: Bell., Bry., Hyosc.; при сильномъ изверженіи слизи въ началѣ болѣзни: Squill.; при явленияхъ уметенія мозга вследствие *всасыванія* молока: 1) Rhus; 2) Lach., Sulph.—При полномъ *оплотненіи* легкаго (*Hepatisatio*): Ars., Lach., Phosph., Tart., Nitr.-ac., Sulph.; при *инюномъ* измѣненіи выпота: Carb.-v., Merc., Rhus, Seneg., Sulph.; при *инюной* *милорадкѣ* днемъ: Sulph., Puls.—При появленіи *предварительной* *просовидной* *сыти*: Ars., Hyosc., Vegetr.;—*красной*: Bry.; — *блѣдной*: Ars.—Въ *запущенныхъ* случаяхъ вообще: Ars., Bell., Bry., Carb.-v., Chin., Cop., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil., Sulph.; — при обильномъ *инюномъ* изверженіи: Ars., Bell., Lyc., Phosph.; при изверженіи *жидкою* *молокомъ*: Carb.-v., Cop., Ser., Sil.; при угрожающемъ *параличѣ* *лежако*: Phosph., Tart.; при опасности *ожеротенія*: Ars., Carb.-v..

Сравни. *Примоча крови къ груди, Воспаленіе плевры, Катартъ, Кашель.*

Воспаленіе матки, Metritis.

Средства, чаще всего соответствующія воспаленію матки вообще: 1) Acon., Bell., Cham., Coff., Merc., N.-vom.; 2) Bry., Canth., Chin., Ign., Lach., Plat., Puls., Rhus, Sec..

Асонитумъ имѣетъ мѣсто всегда вначалѣ леченія, при сильной *воспалительной* *милорадкѣ*, именно тамъ, гдѣ причиною воспаленія были искугъ въ послѣродовомъ періодѣ, или во время мѣсячныхъ очищеній, или же злоупотребленіе ромашки.

Велладонна—когда воспаленіе произошло въ родовомъ періодѣ, при задержаніи родильнаго очищенія, или при плотномъ привѣрженіи дѣтскаго мѣста, когда въ то же время замѣчаются тяжесть, натаженіе и давленіе въ подчревной части, какъ-будто все стремится выйти черезъ дѣтородныя части; жгучія покалыванія, боль въ крестцѣ, который кажется разбитымъ, переломаннымъ; колючія боли въ тазобедренномъ сочлененіи, не переносящемъ движенія и прикосновенія.

Силкомилла—преимущественно тамъ, гдѣ воспаленіе развилось вследствие гнѣва или огорченія послѣ родовъ, когда замѣчаются обильныя мѣсячныя очищенія и истеченіе черной, свернувшейся крови. Если же развитію болѣзни способствовало зло-

употребленіе ромашки, то лучшими средствами считаются: *Acon.*, *Ign.*, *N.-vom.*, *Puls.*.

СОГРѢВЪ — если причиною болѣзни была сильная и внезапная радость, въ особенности во время регулъ или родовъ.

МЯСЦИВІУСЪ — когда боли въ маткѣ свойства колючаго, давящаго или сверлящаго, и въ особенности, когда въ то же время замѣчаются обильное отдѣленіе пота, или преобладаніе озноба передъ жаромъ.

ПУХ-ВОМІСА — когда замѣчаются: сильныя давящія боли въ подревной части, ожесточающіяся отъ давленія и прикосновенія; сильныя боли въ поясницѣ; запоръ или твердые испражненія на низъ; задержаніе мочи или болѣзненное, затрудненное моченспусканіе (*Dysuria*); опухоль маточнаго рыльца съ болью, какъ при ушибѣ, въ нижней части живота; ухудшеніе состоянія по утрамъ.

См. также *Родимная мигорадка* и ср. прочія страданія матки при болѣзняхъ этого органа.

Воспаленіе миндалинъ, Жаба, *Amigdalitis*.

Лучшія средства вообще: 1) *Baryt.*, *Bell.*, *Hep.*, *Ign.*, *Lach.*, *Merc.*, *Nitr.ac.*, *N.-vom.*, *Sulph.*; 2) *Calc.*, *Canth.*, *Cham.*, *Lyc.*, *Ser.*, *Thuj.*.

При *нагноеніи* или *изъязвленіи* железъ, предпочитаютъ: *Bar.c.*, *Bell.*, *Ign.*, *Lach.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Nitr.ac.*, *Ser.* — При *затвердѣніи*: *Baryt.*, *Calc.*, *Ign.*, *Sulph.* — При *воспалительной опухоли*, угрожающей переходомъ въ нагноеніе, назначаютъ преимущественно: *Acon.*, *Bell.* вначалѣ, а если они не дѣйствительны, то: 1) *Hep.*, *Lach.*, *Merc.*; 2) *Ign.*, *N.-vom.*, *Sulph.*.

Воспаленіе мозга и его оболочекъ. *Encephalitis et Meningitis*.

§ 1. Для облегченія въ практическомъ отношеніи, мы поставили эти двѣ болѣзни рядомъ, потому что случаи ихъ сходны между собою и часто существуютъ одновременно.

Лучшее средство противъ воспаленій мозга вообще *Bell.*, хо употребленія которой можно назначить *Acon.* Въ особенныхъ слу-

чаять, заслуживаютъ вниманія также: 1) Bry, Hyos., Op., Stram., Sulph.; 2) Camph., Canth., Cin., Coccul., Cupr., Dig., Hell., Hyos., Lach., Merc.

§ 2. При воспаленія мозга у *дѣтей*, кромя Bell, назначается еще: Acon., Cin., Hell., Lach. и Merc. — Воспаленіе мозга вслѣдствіе *солнечнаго жара* (insolatio) лечится посредствомъ Bell. или Camph., а также и Luc. — Если воспаленіе мозга есть слѣдствіе *окоченія отъ сильнаго холода*, или простуды *головы*, то предпочитаютъ: Acon., Arg., Bry., Hyos. — Противъ воспаленія мозга вслѣдствіе *скрывшейся рожки* или другой какой-либо сени, наир. *скарлатины*, употребляются: Bell., Rhiz., или Lach., Merc., Phosph. Если же оно есть слѣдствіе *скрывшейся течи изъ уха*, то предпочитаютъ: Puls. и Sulph. — Когда воспаленіе мозга угрожаетъ переходомъ въ *водянку мозга*, то приличнѣйшія: 1) Bell., Bry., Hell.; 2) Arg., Dig., Cin., Cop., Hyos., Op., Stram. См. *водянка черепная*.

§ 3. Касательно особенныхъ указаній, выводимыхъ изъ *принадковъ*, надо замѣтить слѣдующее:

АСОНИТУМЪ назначается преимущественно являющій болѣзни и при сильной воспалительной лихорадкѣ, сопровождаемой бредомъ, жгучими болями по всему мозгу, а особенно во лбу; краснота и одутливость лица; краснота глазъ.

APIS показанъ въ особенности послѣ скрывшейся скарлатины и др. сыпей.

VELLADONNA: *Большой жаръ* и *сильный шумъ* и *свѣтъ* ухудшаютъ его состояніе; при этомъ: *сильныя, жгучія боли головы*; *красныя, искрившіяся глаза* и *блѣдный взглядъ*; *краснота и одутливость лица*; *дремотный сонъ* съ закатившимися или полуоткрытыми глазами; *сильный жаръ въ голову* и *сильное біеніе шейныхъ артерій*; *распуханіе головныхъ венъ*; *потеря самосознанія и рѣчи*, или *бормотанье* и *сильный бредъ*; *конвульсивныя движенія членовъ*; *судорожное стѣсненіе глотки съ затрудненнымъ глотаніемъ* и *другими признаками водоболзни*; *рвота*, *непроизвольное изверженіе мочи и кала*.

ВУЮНІА — *продолжительный знобъ*, сопровождаемый *краснотой лица*, *жаромъ головы* и *большою жаждою*; *притомъ: слѣчка* и *бредъ*; *внезапныя вскакиванія отъ сна*, *крикъ* и *ходоудный потъ*

количественной, съ тщетнымъ повужденіемъ. (Kal.-carb. приличезъ часто послѣ Dulc.).

Nux vomica — при частомъ позывѣ на мочеиспусканіе, сопровождаемомъ сильными болями во время и послѣ отдѣленія скудной мочи; когда при этомъ замѣчаются: жгучая боль въ мочевомъ каналѣ, пузырь и почкахъ; N. vom., особенно полезна для тѣхъ больныхъ, которые употребляли много спиртныхъ напитковъ, или когда страданіе пузыря сопряжено съ геморроемъ.

Rhus toxic. — при мочеиспусканіи, останавливающемся какъ-бы вслѣдствіе препятствія, съ болью въ нижней части живота при выходненіи послѣднихъ капель; при стягивающей боли въ мочевомъ пузырьѣ или колотыи, распространяющемся отъ шейки мочевого пузыря до задняго прохода.

Pulsatilla — если побужденіе на мочу сопровождается давящими жгучими и рѣжущими болями въ пузырьѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаются жаръ и краснота этихъ частей, а часто и совершенное задержаніе мочи, или же скудное, болѣзненное испусканіе мочи слизистой, или кровянистой съ гнойнымъ осадкомъ.

Sulphur — во многихъ очень упорныхъ случаяхъ, или когда всё вышесказаннаго средства оказались мало полезными, а именно, когда отдѣлявшаяся моча смѣшана со слизью или кровью, мочеиспусканіе сопровождается жженіемъ въ мочевомъ каналѣ. (Послѣ Sulph., часто прилична Calc., особенно если страданіе происходитъ вслѣдствіе закрившагося геморроя, а если Calc. не въ состояніи уничтожить эти жгучія боли, то назначаютъ Arg., или Carb.-v.).

Ср. Кровотеченіе изъ мочеиспускательнаго канала, Мочи задержаніе, Воспаленіе почекъ и боли въ нихъ.

Воспаленіе неба, Inflammatio palati.

Лучшія и дѣйствительнѣйшія средства вообще: 1) Barut., Bar.-m., Bell., Calc., Lach., Merc., N.-vom; 2) Acon., Aug., Chin., Coff., Sil.

Воспаленіе небной занавѣски: Acon., Bell., Coff., Merc., N.-vom. — При воспаленіи самой неба: 1) Calc., Chin., N.-vom.; 2) Bar.-c., Bar.-m., Lach., Merc., или можетъ быть еще: 3) Aug., Bell., Sil. —

При изъязвленіи или даже *костодѣ небной кости*: 1) Aug., Lach., Merc., Sil.; 2) Barut., Calc. (См. *костей болѣзни*). — Если злоупотребленіе *ртути* было причиною болѣзни: 1) Aug., Lach.; 2) Bell., Bar.-m., Calc., Sil..

Ср. *Воспаленіе зѣва и рта*.

Воспаленіе и опухоль наружныхъ частей носа.

§ 1. Лучшія средства вообще: Arg., Ars., Aza., Aug., Bell., Bry., Calc., Her., Merc., Natr.-m., Phosph., Puls., Ser., Sulph., Zinc..

§ 2. Если опухоль есть слѣдствіе удара или *татка, ушиба, паденія* и т. д., то всѣмъ другимъ средствамъ предпочитается Arg.—При опухоли носа вслѣдствіе злоупотребленія *ртути*: Aza., Aug., Bell., Her., Lach., Sulph.—При опухоли носа у *людей, предавшихъ пльстому*: 1) Arg., Calc., Puls., Sulph.; 2) Bell., Her., Lach., Merc.—У *золотухинныхъ*: 1) Aza., Aug., Calc., Her., Merc., Puls., Sulph.; 2) Bry., Lach., Phosph..

§ 3. Если опухоль *красная и болящая*: 1) Bell., Her., Merc.; 2) Alum., Bry., Calc., Phosph., Rhus, Sulph.—Если одинъ только *кончикъ носа красенъ*: Carb.-an., Nitr.-ac., Rhus.—Противъ *красныхъ пятенъ*: Rhus, Sil.—При *жидкой краснотѣ носа*: Arg., Carb.-an., Veratr.; 2) Calc., Cann., Carb.-v., Kreos., Mez., Rhus, Ruta.

§ 4. Если въ то же время имѣются и *черные угри* на носу: 1) Graph., Natr., Selen., Sulph.; 2) Bry., Calc., Natr.-m., Sabin.—Если на кончикѣ носа *образуется струповидная сыпь*: 1) Carb.-v., Natr.-m., Ser., Sil.; 2) Carb.-an., Nitr.-ac.—Если на носу *черныя бородавки*: Canth..

Ср. *Нагноеніе въ носу, Ракъ носа, Сыпь лица, Насморкъ*.

Воспаленіе околоушной железы, Заушница, Parotitis.

Лучшее средство противъ остраго воспаленія околоушной железы Merc., а затѣмъ Aug.—Если же воспаленіе принимаетъ болѣе серьезный характеръ, если оно дѣлается *розжистымъ*, если *переносится на мозгъ*, сопровождаясь исчезаніемъ опухоли железы, оглушеніемъ и бредомъ, то предпочитается Bell. или Huov..

Если больной много принималъ *ртути*, или же Merc. мало оказывалъ пользы, а опухоль начинаетъ переходить въ затвердѣ-

нiе и появляется изнурительная лихорадка, то прилично Carb.-v. Вообще это средство пригодно, когда жаръ въ тѣлѣ возвышается, или когда произойдетъ переносъ воспаления на желудокъ.—Если Carb.-v., мало принесъ пользы противъ изнурительной лихорадки, то Cossul. часто съ большимъ успѣхомъ можетъ замѣнить его.—При переходѣ въ ophthalmia, предпочитаютъ: Puls. или N.-vom.

Кромѣ сказанныхъ средствъ, въ упорныхъ случаяхъ съ успѣхомъ могутъ быть назначаемы: 1) Kal., Rhuz; 1) Amm., Aug., Calc., Cham., Cop.

Ср. Болн съ горлю.

Воспаленiе печени и другiя ея страданiя, Hepatitis.

§ 1. Лучшiя средства противъ болѣзней печени вообще: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Chin., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Aug., Calc., Kal., Lyc., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac.; 3) Alum., Amb., Amm.-c, Cann., Canth., N.-mosh..

§ 2. Противъ *острой* воспаления печени: 1) Acon.; 2) Bell., Merc., N.-vom.; 3) Bry., Cham., Chin., Lach., Puls., Sulph..

АСОНИТУМ — назначается вначалѣ леченiя, при сильной воспалительной лихорадкѣ, съ *колотьемъ* около печени, невыносимыми болями, вздохами, безпокойнымъ метанiемъ въ различныя стороны, тоскою и страхомъ смерти.

ВЕЛЛАВОННА—когда замѣчаются давящiя боли, распространяющiяся на грудь и правое плечо; вздутiе подъ ложечкою; гнетенiе въ желудкѣ; трудное и тоскливое дыханiе; напоръ кромѣ въ головѣ съ потемнѣнiемъ зрѣнiя; головокруженiе съ обмороками; жгучая жажда; тоскливое метанiе въ различныя стороны и бессонница. (Прилично послѣ Acon., попеременно съ Merc., или Lach).

ВКУОНIА: давящiя боли, гнетенiе въ подреберной части, обложенiе желтой сливью языка; *сильная тоскливость въ груди*, сопровождаемая учащеннымъ дыханiемъ, заporомъ, и усиленiе болей при движенiи.

СНАМОМIЛЛА — при тупыхъ давящихъ боляхъ, *которыя не уменьшаются отъ наружнаго давленiя, движенiя, или дыханiя*; когда кромѣ этого замѣчаются: давленiе въ желудкѣ, гнетенiе въ под-

реберной части, тоскливость въ груди; желтизна кожи; желто-обложенный языкъ; горькій вкусъ во рту и приступы тоски.

СНИНА — когда болѣзнь постоянно черезъ день усиливается и сопровождается колющими и давящими болями, опухолью и твердостью печени и желудка; когда, кромѣ этого, замѣчаются: давящая боль головы, горькій вкусъ во рту и обложенный желтою слизью языкъ.

ЛАСНЕВИС часто назначается тамъ, гдѣ Мерс. или Белл. оказали мало пользы, или же назначается попеременно то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ этихъ двухъ средствъ; особенно прилична людямъ, преданнымъ пьянству.

МЕРКУРИУС часто назначается послѣ Белл., оказавшейся мало-дѣйствительною, а именно противъ болей, мѣшающихъ больному спать на правомъ боку; когда притомъ замѣчаются: горькій вкусъ во рту, потеря аппетита и жажда; постоянный ознобъ, желтизна кожи и глазъ. (Послѣ Мерс., часто прилична Ласх.).

НУХЪ ВОМИСА — когда замѣчаются колющія или бьющія боли и необыкновенная чувствительность около печени при прикосновеніи; горькій и кислый вкусъ; склонность ко рвотѣ и настоящая рвота; давленіе въ подреберной части и около желудка и короткое дыханіе; красная моча; давящая боль въ головѣ; головокруженіе и приступы тоски. (Послѣ N.-vom. часто умѣстна Sulph.).

ПУЛСАТИЛЛА — частые приступы тоски, особенно ночью, и частые зеленые и слизистые поносы; склонность ко рвотѣ; горькій вкусъ во рту; обложенный желтою слизью языкъ; тоскливость въ груди; гнетеніе въ подреберной части и надъ желудкомъ.

СУЛФУРЪ часто назначается послѣ N.-vom., когда жгучія боли не прекращаются; или во всѣхъ случаяхъ, когда вышесказанныя средства втеченіе нѣсколькихъ дней не произвели замѣтнаго улучшенія, или когда произведенное ими улучшеніе не подвигается впередъ.

§ 3. Лучшія средства противъ хроническихъ страданій печени:

- 1) N.-vom., Sulph., Chin., Sil.;
- 2) Aur., Lach., Lyc., Magn.-m., Natr.;
- 3) Alum., Amb., Calc., Sil.;
- 4) Chel., Ign., Jod.

Противъ опухолей и затвердѣній печени, предпочитаются: 1) Ars., Calc., Chin., или 2) Caps., Graph., Lyc., Magn.-m., Merc.,

Natr.-m., N.-mosch., Puls.—Противъ *кармозь* печени, назначаются преимущественно: *Lach.* или *Sil.*—Если страданіе печени есть слѣдствіе *злоупотребленія* *лины* при леченіи *перемежающейся лихорадки*, то рекомендуются преимущественно: 1) *N.-vom., Sulph.*; 2) *Calc., Caps., Lach., Natr.-m., Puls.*

Какия средства оказываются полезными противъ *желчныхъ камней*, еще неизвѣстно, по недостатку практическихъ наблюденій по этому предмету. Немногія данныя заставляютъ обратить вниманіе практиковъ на *Calc., Ner., Lach.*, которыя могутъ быть назначаемы въ подобныхъ случаяхъ.

Воспаленіе плевры, Pleuritis.

Главное средство противъ воспаления плевры составляетъ *Acon.*, и во многихъ случаяхъ одного его достаточно для совершеннаго излеченія болѣзни. Въ такомъ случаѣ его даютъ по нѣскольку крупинокъ до-тѣхъ-поръ, пока замѣтнымъ образомъ не уймутся лихорадочныя припадки, жаръ и жажда, и пока кашель не сдѣлается мокротнымъ. Если по уменьшеніи лихорадочныхъ симптомовъ остаются еще сильныя боли въ боку и выздоровленіе идетъ медленно, то съ пользою употребляютъ *Bry.*, которую прописываютъ по три крупинки съ чайною ложкою воды на приемъ, и если чрезъ 36, 48, 72 часовъ не обнаружится ожесточенія болѣзни, то нѣтъ надобности повторять приемы. — Если *Bry.* благотворно подѣйствовала и боли исчезли, но боковыя части сдѣлались чувствительными къ вліянію воздуха и при движеніи, то для уничтоженія даже слѣдовъ болѣзни имѣемъ превосходное средство въ *Sulph.*.

Сверхъ того, нужно имѣть въ виду: *серозное выпотнѣніе*: 1) *Sulph., Ner., Kal., Tart.*; 2) *Arg., Ars., Carb.-v., Dig., Rhus, Squil.*; — *серозно-пластическое*: *Ner., Sulph., Tart.*; — *серозно-кровянистое* съ чрезвычайнымъ затрудненіемъ дыханія: *Arg.*; — *монойное*: *Carb.-v.*; — *малый отекъ легкихъ*: *Sulph., Squil.* — Изъ этихъ средствъ показаны: *Kali-sulf.*, когда послѣ благоприятнаго дѣйствія *Acon.*, сильное колотье, особенно въ *левой* сторонѣ, все еще продолжается, сопровождаясь сухимъ кашлемъ. — *Arn.*, при большомъ безпокойствѣ въ *больной* сторонѣ, при желаніи часто перемѣнить положеніе, когда притомъ воспаленіе болѣе ревматическаго свой-

ства; въ послѣднемъ случаѣ часто помогаетъ также *Beneda* — *Савв.-в.*, когда къ плевриту присоединяется бронхитъ и ни *Вгу.*, ни *Тарт.* не оказали успѣха. — *Н.-вом.*, при осложненіи болѣзни *железными* страданіями, когда *Вгу.* оказалась безуспѣшною. Послѣ *Н.-вом.* въ этихъ случаяхъ часто показана *Магн.-ш.*

Въ нѣкоторыхъ упорныхъ случаяхъ можно обратиться къ *Син.*, *Ласк.*, или къ *Аріс. Ср.* *Воспаленіе легкихъ и Боли грудныя.*

Воспаленіе и боли почекъ, *Nephritis* и *Nephralgia*.

Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленныя противъ этихъ болѣзней: 1) *Bell.*, *Санп.*, *Сант.*, *Н.-вом.*, *Пуль.*; 2) *Алум.*, *Верб.*, *Солс.*, *Нер.*, *Лус.*, *Саззар.*

Вилладонна — при колющихъ боляхъ почекъ, распространяющихся по мочеточникамъ до пузыря, съ періодическимъ послабленіемъ, и сопровождающихся необыкновенною тоскою и коликою; (если *Bell.* дѣйствуетъ неудовлетворительно, то ее замѣняетъ *Нер.*).

Салнавія — при боляхъ натягивающихъ, идущихъ отъ почекъ къ лонному соединенію, сопровождаемыхъ сильною тоскою и нерасположеніемъ духа.

Сантнавія — когда боли свойства колючаго, терзающаго или рѣжущаго, и сопровождаются болѣзненнымъ мочеиспусканіемъ въ видѣ нѣсколькихъ капель, или совершеннымъ задержаніемъ мочи, или примѣсью къ ней крови.

Нух воміса — если причину болѣзни составляетъ закрывшіяся геморрой или напоръ крови къ нижней части живота, и замѣчаются напряженность, вздутость и давленіе около почекъ.

Пульсатилла — когда воспаленіе почекъ сопрягается съ задержаніемъ регуль, или малоколичественнымъ ихъ отдѣленіемъ; для особъ нѣжныхъ, кроткаго и флегматическаго темперамента, или когда замѣчается кровянистая моча съ гнойнымъ осадкомъ.

Сравни. *Воспаленіе мочевого пузыря, Пеноormalность мочеотделения, Кровотеченіе изъ мочеточниковъ, Мочи задержаніе.*

Воспаленіе предстательной железы, *Prostatitis*.

Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленныя: *Пуль.* и *Тунж.* Кромѣ этихъ, достойны вниманія: *Агн.*, *Аур.*, *Санп.*,

Canth., Jod., Merc., Spong., Sulph.. При воспаленіи предстательной железы, зависящемъ отъ перелоа, предпочитаютъ Puls, и Thuj..

Воспаленіе полости рта язвенное, Stomacase.

Лучшія сревства: 1) Merc., N.-vom.; 2) Arg., Borax, Carb., Carb.-v., Dulc., Natr.-m., Nitr.-ac., Staph., Sulph., Sulph.-ac.; 3) Chin., Jod., Serp.

При воспаленіи рта вслѣдствіе злоупотребленія ртути: 1) Carb.-v., Dulc., Нер., Nitr.-ac., Staph., Sulph.; 2) Chin., Jod., Natr.-m.; — чрезмѣрнаго употребленія поваренной соли: Carb.-v., Nitr., Serp.. — Противъ простой молочницы у дѣтей: 1) Borax, Sulph.-ac.; 2) Merc., N.-vom., Sulph..

Анъгисумъ называется, когда совмѣстно съ воспаленіемъ рта существуютъ: изъязвленіе краевъ языка; молочница съ сильными жгучими болями; припухлость и кровоточивость десенъ и шаткость зубовъ; большая слабость и истощеніе.

Воракъ—отъ изъязвленія десенъ, легко кровоточащей молочницы во рту и на языкѣ, присутствія вязкой слизи въ горлѣ; острой и вонючей мочи (преимущественно у дѣтей).

Сарсисумъ — для тучныхъ, полнокровныхъ людей флегматическаго темперамента и ведущиыхъ сидячую жизнь, и когда замѣчаются: жгучіе пузырьки во рту и на языкѣ и припухлость десенъ.

Савво-уегъ.— при изъязвленіи и отслоикѣ, сильной кровоточивости десенъ, отставшихъ отъ зубовъ, шаткости зубовъ, жарѣ во рту, зловоніи язвъ, отслоикѣ и трудной подвижности языка.

Дулсамара — если малѣйшая простуда снова вызываетъ болѣзнь, сопровождающуюся опухолью шейныхъ железъ.

Меркуриусъ — когда замѣчаются: краснота, молочница, изъязвленіе и кровоточивость десенъ, отдѣленныа отъ зубовъ, съ жгучими болями по ночамъ и язвенною болью особенно при дотрогиваніи; кромѣ этого, шаткость зубовъ, воспаленіе, отслоика и изъязвленіе языка и рта, покрытыа молочницею; зловонный запахъ изъ рта и отъ язвъ; обильное отдѣленіе вонючей, иногда кровянистой мочи съ изъязвленіемъ устья слюннаго протока; опухоль, негибкость и твердость языка, или влажность и скопленіе слизи на немъ; блѣдность лица и ознобъ; жгучія, частыя испраженія на низъ.

Натрум мувиатисумъ — припухлость, кровоточивость и чув-

ствительность десенъ въ горячей или сладкой пищѣ; кромѣ того, язвы и пузыри во рту, на языкѣ и деснахъ съ жгучими болями и затрудненною рѣчью; обильное слюнотеченіе, ожеченѣлость и негибкость языка, преимущественно одной половины его.

NITRI ACIDUM — припухлость, блѣдность, кровоточивость десенъ и шаткость зубовъ; отслойка слизистой оболочки рта, сопровождаемая колющими болями; *гнилостный запахъ изо рта*; слюнотеченіе.

NUX VOMICA — преимущественно для людей худощавыхъ, живаго темперамента и ведущихъ сидличую жизнь, а въ особенности, когда замѣчаются: *гнилостная и болящая опухоль десенъ* съ жгучими или бьющими болями; *вонючія язвы и болящія пузырьки во рту, на деснахъ, небѣ или языкѣ*; слюнотеченіе по ночамъ; кровавистая слюна; бѣлый, густою слизью покрытый языкъ; *гнилостный запахъ изо рта*; лицо блѣдное съ впалыми щеками и тусклыми глазами; исхуданіе, запоръ; сердитое, раздражительное расположеніе духа.

STARPUAGRIA — блѣдность, изъязвленіе, чувствительность и припухлость десенъ, *легко кровоточивыхъ*; *притомъ грибовидныя нарости на деснахъ и во рту*; изъязвленные или пузырьками покрытые языкъ и ротъ; дурнаго цвѣта лицо со впалыми щеками, глубоко ввалившимися глазами и синевою подъ ними; опухоль шейныхъ железъ и пузырьки подъ языкомъ.

SULPHUR — кровоточивость, *припухлость десенъ*, отставшихъ отъ зубовъ и *бьющія въ нихъ боли*; *притомъ гнойныя водянистыя пузырьки и молочница во рту и на языкѣ*, съ жженіемъ и явственною болью; *вонючій и кислый запахъ изо рта*; слюнотеченіе, или кровавистая слюна; языкъ, *покрытый густою слизью*; слизистыя, зеленоватныя испраженія, сопровождаемая *натугою*; сыпь, похожая на красуху; *безпокойство ночью*.

SULF.-AC. — при *молочницѣ во рту*; припухшихъ, изъязвленныхъ и легко кровоточивыхъ деснахъ; обильномъ слюнотеченіи. Сравни. *Слюнотеченіе, Балъзни десенъ, Цинга, Ртуть.*

Воспаленіе и другія болѣзни селезенки.

Лучшія средства противъ болѣзни селезенки вообще: 1) *Agn., Agn., Bry., Caps., Chin., Ign., N.-vom.*; 2) *Acon., Jod., Mez.*

Главное средство против *острой воспаления* — Chin.; затѣмъ слѣдуютъ: Acon., Agn., Arg., Bry., N.-vom.. Также Acon. въ самомъ началѣ и при сильной воспалительной лихорадкѣ.

ACONITUM—гдѣ жестокость болѣзни требуетъ устраненія лихорадки съ самаго начала; иногда же можно тутъ употребить и Chin. (См. ниже).

ARNICA—если Chin. оказалась не совсѣмъ достаточною; кромѣ того, при давящихъ, колючихъ боляхъ, захватывающихъ дыханіе, или если появляются тифозные припадки съ расслабленіемъ, равнодушіемъ, притупленіемъ чувствъ.

ARSENICUM—когда есть частый поносъ съ кровянистыми испраженіями, жженіемъ и большою слабостію; или если болѣзнь принимаетъ перемежающійся характеръ, а Chin. оказалась противъ этого недостаточною.

BRYONIA—если припухлость не исчезаетъ послѣ употребленія Chin., Agn., или N.-vom., и если замѣчаются колючія боли около желудка при всякомъ движеніи.

SVINA—большою частію непосредственно послѣ Acon. или также въ самомъ началѣ болѣзни, преимущественно при давящихъ, колючихъ боляхъ, или когда болѣзнь принимаетъ перемежающійся характеръ.

NUX VOMICA—послѣ Chin. или Agn., если то или другое средство произвели облегченіе, но не устранили припухлости селезенки и давящей боли желудка и если общее состояніе больного въ то же время не измѣнилось.

Противъ *западовъ, опухолей и затверднннхъ селезенки* часто оказываются также полезными: Arg., Capr., Chin., Ign., Sulph., или же Jod., Mez..

Воспаленіе суставовъ, Arthrosae.

Противъ воспаления концовъ костей, съ большимъ успѣхомъ употребляютъ: 1) Coloc., Phos.-ac.; 2) Calc., Ner., Sulph.; 3) Puls., Rhus, Zinc..

Воспаленіе и другія болѣзни спиннаго мозга, Myelitis, Irritatio spinalis etc..

Главное средство противъ всѣхъ почти острыхъ случаевъ воспаления спиннаго мозга составляетъ Dulc., которому, при саль-ной лихорадкѣ, долженъ предшествовать Acon., пока не успокоятся нервная и сосудистая системы. Если же Dulc. не окажетъ желаннаго дѣйствія, то, смотря по общимъ симптомамъ, назначаютъ: 1) Bell., Bry., Coccul., N.-vom., Rhus; 2) Ign., Kal., Puls., Veratr.—При *хроническомъ* воспаленіи верхней части спиннаго мозга, съ явно начинающимся размягченіемъ, параличемъ и атрофіею плеча, мнѣ удалось съ отличнымъ успѣхомъ употребить Caut. и Staph., а также: Dulc., Lach.—Кромѣ того, при *страданіяхъ спиннаго мозга вообще*, должно имѣть въ виду: 1) Cocc., N.-vom., Phosph.; 2) Bell., Bry., Dulc., Rhus, Sulph.; 3) Acon., Ars., Calc., Carb.-v., Caus., Chin., Dig., Ign., Lach., Natr., Natr.-m., Phosph.-ac., Puls., Staph., Veratr.;—при *измѣненіи походки*: N.-vom., Phosph.;—при *раздраженіи спиннаго мозга*: Acon., Bry., Calc. Ign., Lyc., N.-vom., Sec.

Воспаленіе уха, Otitis.

§ 1. Противъ остраго внутренняго воспаления уха, въ большей части случаевъ, специфически дѣйствуетъ Puls.. Но если произойдетъ переносъ воспаления на мозгъ и обнаружатся: большая тоска, рвота, холодъ конечностей, бредъ и т. д., то предпочтается Bell.. Если по употребленіи того или другаго изъ этихъ средствъ, остаются нѣкоторыя страданія, противъ которыхъ Puls. или Bell. мало дѣйствуютъ, то лучшими средствами считаются: 1) Merc., N.-vom., Sulph. Затѣмъ 2) Boгах., Bry., Calc., Cham., Magn.-с.

§ 2. Противъ *наружнаго* воспаления уха: 1) Puls.; 2) Bell., Вогах., Calc., Magn.-с., Rhus, Sil., Sulph.. Если притомъ замѣчается *отуханіе ушей*: 1) Вогах., Merc., Puls., Rhus, Sil.; 2) Calc., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Ser.—Если уши *изъязвлены*: Merc., Puls., Ruta, Spong.—Если въ нихъ *сильней зудъ*: Amm., Puls., Rhus, Sulph..

Сравн. *Боли въ ушахъ, Лишай и Течъ изъ ушей.*

Воспаленіе и опухоль яичекъ, Orchitis, Haematocoele, Sarcocoele.

§ 1. Лучшія средства: 1) Arn., Aur., Clem., Nitr.-ac., Puls.; 2) Ars., Con., Lyc., Merc., Natr., N.-vom., Spong., Staph., Zinc..

§ 2. Противъ воспаления яичекъ вслѣдствіе *ушиба, талочка, или удара*: 1) Agn., Puls.; 2) Con., Zinc.. — Вслѣдствіе *скрывающагося перелома*: 1) Merc., Puls.; 2) Aur., Clem., Nitr.-ac.; — вслѣдствіе *переноса воспаления окологрунной железы* на яички: Merc., Puls., N.-vom.

§ 3. *Роженидное воспаление* мошонки, которое встрѣчается у трубочниковъ, лечится посредствомъ Arg. и Merc..

§ 4. *Хроническое затвердніе яичекъ* (Sarcocoele) лечится посредствомъ: Agn., Arg., Aur., Bar.-m., Clem., Con., Graph., Lys., Rhod., Sulph. — При такъ называемыхъ *кроволистныхъ грыжахъ* (Haematocoele), назначаются средства, исчисленныя при воспаленіи вслѣдствіе ушиба. — Противъ такъ называемой *водяной грыжи мошонки* (Hydrocoele): Graph., Puls., Sil., Rhod., Sulph.. — У *золотушныхъ* большую пользу до-сихъ-поръ оказывала Sil.. — Противъ *настоющей мошоночной грыжи* (Orchoecoele, Hernia scrotalis), до-сихъ-поръ съ большимъ успѣхомъ были употребляемы: Magn.-m. и N.-vom.. О другихъ средствахъ см. *Грыжи*.

ВЫКИДЫШЪ, Abortus.

§ 1. Лучшія средства, какъ противъ расположенія къ выкидышу, такъ и противъ его предвѣстниковъ и послѣдствій: 1) Bell., Calc., Carb.-v., Cham., Croc., Ferr., Ipec., Lys., N.-vom., Sabin., Sep., Croc., Sec., Sil., Sulph., Zinc.; 2) Asag., Bry., Cann., Canth., Chin., Cic., Hyos, Millef., N.-jugl., N.-mosch., Plumb., Puls., Ruta, Sang..

§ 2. Противъ расположенія къ выкидышу: 1) Calc., Carb.-v., Ferr., Lys., Sabin., Sep., Sulph., Zinc.; 2) Asag., Cann., Calc., Kreos., N.-mosch., Plumb., Puls., Ruta, Sil..

САЛСАВЕА — назначается женщинамъ *полнокровнымъ*, концы мѣсячныхъ очищенія обильны и рановременны; при расположеніи къ бѣлямъ; когда замѣчаются: чувствительность грудныхъ сосковъ, частыя приливы крови къ головѣ, боли живота, боли поясницы и варикозные узлы.

САВВО-ЧЕГ. — когда мѣсячныя очищенія слишкомъ обильны и рановременны, и замѣчаются варикозные узлы; когда женщина страдаетъ частыми болями головы и поясницы, судорогами нижней части живота.

FEVNUM— преимущественно страдающимъ блѣдною немочью, блѣдами, запоздалыми мѣсячными очищеніями, или же полнокровнымъ, у которыхъ замѣчается возвышенная дѣятельность сосудистой системы, краснота лица, полный и твердый пульсъ, слишкомъ раннія и обильныя мѣсячныя очищенія.

LUCORIDIUM — если мѣсячныя очищенія слишкомъ обильны или слишкомъ продолжительны и сопровождаются зудомъ, жжениемъ, варикозными узлами, большою сухостью маточнаго рукава, склонностью къ унынію, печали и плачу; также когда замѣчаются блѣды, частыя головныя и поясничныя боли и припадки обморока.

SABINA — *полнокровнымъ* женщинамъ, у которыхъ мѣсячныя очищенія слишкомъ обильны и слишкомъ продолжительны, а главнымъ образомъ, когда выкидышъ случается всегда на *третьемъ* мѣсяцѣ беременности.

SERIA—когда замѣчаются блѣды, производящія отслолку кожи или слизистой оболочки; сыпь и зудъ въ дѣтородныхъ частяхъ; слишкомъ слабыя или слишкомъ ранвременныя регулы, сопровождаемыя плачемъ, уныніемъ, болью головы и зубовъ; частыя приступы головной боли (мигрени); *слабое тѣлосложение*; *мелкая и чувствительная кожа*; сѣрый цвѣтъ кожи, темноватые и желтые пятна на лицѣ; *тонкій станъ и высокій ростъ*; нервная слабость и склонность къ поту; частая колика и расположеніе къ насморку и катарру.

SULPHUR—когда имѣются *слишкомъ рано* появляющіяся и *очень обильныя*, или же *многоколичественныя* и слишкомъ поздно появляющіяся мѣсячныя очищенія, сопровождаемыя блѣдами, зудомъ, жжениемъ и отслокою покрововъ на половыхъ частяхъ; сыпь или лишай на кожѣ; расположеніе къ геморрою; склонность къ катаррамъ или другимъ отдѣленіямъ слизи; нервная слабость и потеря аппетита; необыкновенная усталость, преимущественно въ ногахъ; частая головная боль съ чувствомъ давленія и приливами крови.

§ 3. Средства, помощью которыхъ часто удается устранить *предѣстники и примакки* выкидыша: 1) Agr., Bell., Bry., Calc., Cham., Croc., Huos., Ipec., Kal., Luc., N.-vom., Plat., Sabin., Sec.,

Sulph.; 2) Apis., Cannab., Chin., Cin., Cocc., Fer., Plumb., N.-mosch. Plat., Puls., Merc., Rhus, Ruta, Ser..

Амиса назначается преимущественно, когда появляются родовыя потуги съ изліяніемъ крови или водянистой слизи, вслѣдствіе движенія, удара или другихъ наружныхъ поврежденій.

Велладонна — при сильныхъ давящихъ и гнетущихъ боляхъ, занимающихъ весь животъ, сопровождаемыхъ чувствомъ стягиванія или вздутости живота, поясничными болями, съ чувствомъ, какъ-будто поясница разбита, съ давленіемъ и приливами крови въ половныя частямъ, съ изліяніемъ крови, или безъ него.

Вруоніа — при сильныхъ боляхъ, упорномъ запорѣ, приливахъ крови къ головѣ, сухости во рту и жаждѣ; вообще когда N.-vom. мало оказала пользы противъ этого состоянія.

Снамомілла — при сильныхъ рвущихъ боляхъ, идущихъ отъ поясницы къ нижней части живота, сопровождаемыхъ частыми помужденіемъ на мочеиспусканіе или испражненіе низомъ; кровотеченіе изъ предматочника, причемъ отдѣляется свернувшаяся кровь; тяжесть во всемъ животѣ; частая зѣвота, ознобъ и дрожь; сильное безпокойство и конвульсивное движеніе членовъ.

Соссулус — при серозномъ кровотеченіи изъ половыхъ частей, сопровождаемомъ судорогами желудка и болями въ членахъ.

Нювсіамус — при судорогахъ клоническихъ и тетаническихъ попеременно, сопровождающихся потерей самосознанія и изліяніемъ изъ предматочника свѣтлоокрасной крови.

Іресасуална — при судорогахъ, не сопровождающихся потерей самосознанія и преимущественно когда вмѣстѣ съ ними обнаруживаются рвущія боли вокругъ пупка съ чувствомъ давленія на половныя части и кровотеченіемъ. Если Ірес. окажется недостаточно, то бывають полезны Plat. и Cin..

Лусороріи — особенно пригоденъ у полнокровныхъ женщннъ, страдающихъ слабостью желудка.

N.-vomіса — при упорномъ запорѣ, приливѣ крови къ маткѣ и преимущественно тогда, когда больная употребляла много раздражающихъ и разгорячающихъ напитковъ: вина, кофе и проч..

Савіна — если предвѣстники выкидыша появляются уже въ началѣ беременности, или же во всякое другое время и сопро-

воздаются давящими и натягивающими болями отъ поясницы до половых частей; при кровоизліініи изъ предматочника, когда замѣчаются: вздутіи, мягкій и плоскій животъ; постоянное понужденіе на низъ; поносъ или наклонность ко рвотѣ, а также настоящая рвота съ изверженіемъ всей принятой пищи; лихорадка съ дрожью и жаромъ.

Вскалье—преимущественно слабымъ, изнуреннымъ и кахектическимъ женщинамъ, расположеннымъ къ пассивнымъ кровотечениямъ, судорогамъ и т. д.; также при недостаткѣ жизненной силы въ маткѣ, или при органическихъ порокахъ ея.

Кромѣ того: **Менс.**, если одновременно съ признаками наступающаго кровотечения существуетъ также опухоль наружныхъ половых частей, съ выдѣленіемъ изъ нихъ красноватой слизи при надавливаніи. — **N. monchata.**, у женщинъ заблѣхъ и сильно расположенныхъ къ простудѣ. — **Op.**, когда наступленіе внезапной судорожной потуги сильно испугало женщину. — **Puls.**, при отхожденіи черноватой крови съ потужными болями. — **Seria** пригодна въ особенности на 5—7 мѣсяцѣ беременности, при наклонности къ обморокамъ, приливамъ крови къ груди, головѣ и маткѣ, появленіи узловъ и прекращеніи движеній младенца.

Послѣдовательная слабость въ спинѣ и ногахъ, съ частыми потамя и сухимъ кашлемъ, всего лучше уступаетъ употребленію **Kal.-carb.**. — Послѣдовательныя кровотечения по большей части требуютъ: **Bell.**, **Ipec.**, **Plat.**, **Sabin.**, **Cham.**, **Lyc.**, **Sec.**

См. *Кровотеченія изъ матки.*

Вшивость, Phtyriasis.

Лучшее средство отъ обыкновенныхъ вшей въ головѣ, платѣ и на дѣтородныхъ частяхъ составляютъ опрятность и скромная жизнь; но если паразиты заводятся несмотря на это, то отъ вшей на головѣ лучшее средство часто умывать голову чистымъ уксусомъ, или же уксусомъ, смѣшаннымъ съ настоемъ табака, по столовой ложкѣ того и другаго на стаканъ воды.

Отъ вшей на дѣтородныхъ частяхъ лучшее средство табачный сокъ, смѣшанный поровну съ виннымъ спиртомъ, или мазь изъ

нюхательнаго табаку съ свѣжимъ свинымъ жиромъ. Ртутная мазь вредна. Даже укусъ, смѣшанный съ табачнымъ сокомъ, иногда бываетъ очень вреденъ, если нужно его втирать на большое пространство въ животъ, какъ это случилось съ однимъ молодымъ человѣкомъ, у котораго вслѣдствіе такого втиранія появились симптомы холеры, рвота и поносъ. Я мгновенно удалилъ эти припадки посредствомъ Puls.. Это средство можно употребить вездѣ, гдѣ отъ табаку происходятъ сильныя болѣзненные явленія.

Вши изъ пламени выгоняются, если поддержать его нѣкоторое время въ печи, гдѣ недавно пекли хлѣбъ; черное мыло отъ этого нисколько не помогаетъ. Противъ вшей, которые сами собою развиваются (*generatione spontanea*) въ коостъ и жезлакастъ, похожихъ на чярыи, соотвѣтственными средствами могутъ быть: 1) Arg., Chin., Sulph.; 2) Merc..

Газы вредныя, дурныя отъ нихъ послѣдствія.

Лучшія средства, по Герингу: при вдыханіи сѣроводороднаго газа: 1) вспрыскиванію укусною водою, которую также даютъ нюхать; 2) хлоровая вода, при совершенномъ обмиваніи. Когда больной придетъ въ себя, то дадутъ нѣсколько капель этихъ лекарствъ внутрь; 3) *черный кофе*, если больной не можетъ болѣе переносить укусной воды и если онъ ощущаетъ ознобъ; 4) нѣсколько капель хорошаго вина, если появится жаръ и слабость.—Противъ *уара* лучшія средства: 1) укусная вода; а когда самосознаніе возвратилось, 2) нѣсколько приемовъ Op. или Bellad, если Op. оказался неудовлетворительнымъ. — Противъ послѣдствій испаренія *пльсени* на стѣнахъ, Sulph. часто оказываетъ большую пользу. — Противъ *жортыгъ* паровъ: 1) дымъ табачный; 2) водеа или вино; 3) сахаръ.

О прочихъ парахъ см. *Сера, Оливиальная кислота, Ртуть* и другія.

Геморрой, Haemorrhoides.

§ 1. Средства, чаще всѣхъ назначаема при геморрояльныхъ страданіяхъ: 1) Acon., Ant., Arg., Bell., Calc., Carb.-v., Caps., Cham., Ign., Mur.-ac., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Aloë, Amb., Amm.-m., Amm.-s., Anac., Berb., Caust., Chin., Coloc., Graph., Kal., Lach., Nitr.-ac., Petr., Rhus, Sep..

§ 2. Противъ *колочей боли* въ геморроидальныхъ шишкахъ: Carb.-v., Coloc., Lach., N.-vom., Puls., Sulph. — Противъ *жжения* въ нихъ: Arg., Caps., Carb.-v., Ign., Nitr.-ac., N.-vom., Sulph. — Противъ *зуда* въ заднемъ проходѣ: Acon., N.-vom., Sulph. — При *воспаленіи* геморроидальныхъ шишекъ: 1) Acon., Cham., Puls.; 2) Arg., Mur.-ac., N.-vom., Sulph. — При сильномъ *напитіи* шишекъ: Bell. Caps., Kal., Mur.-ac., Phosph.-ac., Thuj. — При *выпячиваніи* шишекъ: Calc., Nitr.-ac., Sulph., Thuj.; — на *подобіе* валика: Calc., Mur.-ac., N.-vom. — При *значительной* *болѣзненности*: Bell., Calc., Graph., Ign., Mur.-ac., Puls., Sulph. — При *отвердннми*: Ser., При *кровотеченіяхъ* изъ задняго прохода: 1) Acon., Bell., Ipec., Phosph., 2) Calc., Chin., Sulph; 3) Amm., Ant., Caps., Ferr., Merc., Millef., Mur.-ac., Nitr.-ac., N.-vom. — *Неправильный* *геморрой* и *страданія* *вслѣдствіе* *скрытія* *привычнаго* *геморроидальнаго* *теченія*: 1) N.-vom., Sulph; 2) Calc., Carb.-v., Puls.; 3) Aloë, Apis. — Противъ *слизистаго* *истеченія* (слизистаго геморроя): 1) Ant., Caps., Carb.-v., Puls., Sulph.; 2) Bogax., Ign., Lach., Merc. — Противъ *предрасположенія* къ *геморрою*: 1) N.-vom., Sulph; 2) Calc., Carb.-v., Caust., Graph., Lach., Petr..

§ 3. По *принадлежн:*

АСОНІТУМЪ назначается при *кровотеченіи* изъ геморроидальныхъ шишекъ, съ *покалываніемъ* и *давленіемъ* въ заднемъ проходѣ, *чувствѣ* *полноты* въ животѣ, *напряженіи*, *давленіи* и *боли*; при *боляхъ* въ *крестцѣ*, какъ-будто *спина* или *крестецъ* *разбиты*.

АНТИМОНІУМЪ — при *обильномъ* *отдѣленіи* *свѣтложелтой* *слизи* съ *жженіемъ*, *свербеніемъ*, *зудомъ* или *даже* *трещинами* въ заднемъ *проходѣ*. (Часто *приличенъ* *поперемѣнно* съ Puls.).

АРВЕНІСУМЪ — когда *истекающая* *кровь* *горяча* и *производитъ* *жженіе*, *жгучія* и *волючія* *боли* въ *геморроидальныхъ* *шишкахъ*; когда *замѣчаются* *жаръ* и *безнокойство*, *жженіе* во *всѣхъ* *жилахъ* или *большая* *слабость* въ *тѣлѣ*. (Умѣстно *поперемѣнно* съ Carb.-v.).

ВЕЛЛАДОННА — противъ *кроваваго* *геморроя*, *сопровождающагося* *болни* въ *крестцѣ* съ *чувствомъ*, какъ-бы *вся* *спина* *переломана*. (Если Bell. *мало* *оказываетъ* *пользы*, то *послѣ* *нея* *часто* *усибишо* *дѣйствуетъ* Her.).

Салсарва— часто послѣ Sulph., или когда больной уже принималъ много сѣры; преимущественно, когда геморроидальныя шишки источаютъ кровь, или когда привычный геморрой скрывается у полнокровныхъ лицъ.

Сарвисум — если шишки очень припухли и зажѣчуются: истечение крови или кровянистой слизи изъ задняго прохода, жгучія въ немъ боли, потягиваніе въ крестцѣ и сфинѣ, рѣзъ въ животѣ.

Савво-ург. — при большой и синеватой опухоли шишекъ, и тогда замѣчаются: колющія боли въ крестцѣ, окоченѣлость сфинны; жжение и терзаніе въ членахъ; запоръ съ жгучими испражнениями и кровотеченіемъ; кромѣ того, частые приливы къ головѣ, кровотечение изъ носу, вѣтры, валость живота; обильное, жгучее отдѣленіе слизи изъ задняго прохода.

Снажомилла — противъ текучаго геморроя съ жгучими болями въ животѣ, частаго позыва на низъ; поноса по временамъ съ жгучими испражнениями, производящими отслолку кожи или слизистой оболочки; терзающихъ болей крестца, появляющихся преимущественно ночью, а также противъ болящихъ и изъязвленныхъ трещинъ въ заднемъ проходѣ.

Игнатія — при сильныхъ покалываніяхъ, распространяющихся до задняго прохода, зудѣ и свербеніи въ немъ, обильномъ кровотеченіи и выпаденіи прямой кишки во время испраженія, или при стагивающей и язвенной боли въ заднемъ проходѣ, съ частымъ, но тщетнымъ понужденіемъ на низъ и истеченіемъ слизи, смѣшанной съ кровавыми струйками.

Муриатис асидум — когда геморроидальныя шишки воспалились, припухли, цвѣта синевато-краснаго, съ опухолью прямой кишки, язвенною болью, сильными покалываніями и большою чувствительностію при ошупываніи.

Нух уоміса — когда есть закрытый или текущій геморрой, или же неправильный, преимущественно у лицъ, ведущихъ сидячую жизнь, или у людей, употреблявшихъ много кофе и спиртныхъ напитковъ, а также у беременныхъ женщинъ, равно происшедшій вслѣдствіе глистной болѣзни; вообще когда обнаруживаются: колотье, жжение или зудъ въ заднемъ проходѣ; покалываніе и толчекъ въ крестцѣ, съ *болышевными чувствами разбитости съ немъ, такъ-что*

большой не въ состояніи держаться прямо; частый запоръ съ тѣснотой позывомъ на низъ и чувствомъ, какъ-будто задній проходъ запертъ или стянута; частые приливы крови къ головѣ и животу, вздутость надчревія и подреберій; тяжесть въ головѣ, неспособность размышлять и головокруженіе; трудное испусканіе мочи (dysuria) и задержаніе ея; истеченіе слизи или крови изъ задняго прохода.

Sulphur—когда замѣчаются такіа явленія, какія вложены при N.-vom., и когда послѣдняя мало принесла пользы, преимущественно же, когда обнаруживаются: запоръ, смѣняющійся частыми и жидкими испраженіями слизи, смѣшанной съ струйками крови; ощущеніе садни въ заднемъ проходѣ съ зудомъ и покалываніемъ; частый напоръ крови къ головѣ; сердцебиеніе; раздражительность сосудистой системы; биеніе по всему животу съ тоскою и давленіемъ послѣ самаго незначительнаго движенія; слабое пищевареніе; затрудненное моченспусканіе; кровотеченіе, жженіе и частое выходеніе геморроидальныхъ шишекъ. Это средство болѣе всего успѣшно послѣ N.-vom.; можно даже достигнуть желаемаго облегченія при хроническихъ геморроидальныхъ страданіяхъ, должно только давать ихъ попеременно и не часто повторяя приемы.

Сравни. *Колика, Запоръ на низъ, Приемъ къ животу.*

Глазъ невралгія, нервныя боли. Neuralgia ocularis.

§ 1. При постоянныхъ нервныхъ боляхъ глазъ: 1) Bell., Chin. Huov., Spig.; 2) Agar., Caust., Guaj., Нер., Раг., Phos.-ac., Plumb., Thuj.

§ 2. Кромѣ того, при боляхъ глазъ, сопровождающихся воспаленіемъ или безъ него, при чувствѣ, какъ-будто глазное яблоко *растянуто* или *увеличено въ объемъ*: Bell., Spig., Agar., Caust., Guaj., Нер., Huov., Natr., Natr.-m., Op., Раг., Phos.-ac., Plumb. Sep., Таг., Thuj.—При боляхъ, *усиливающихся отъ прикосновенія*: Bell., Chin., Нер., Sulph.—При боляхъ, *которые ожесточаются отъ движенія*: Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Cham., Chin., Нер., Led., Magn.-aust., Natr.-m., N.-vom., Rzn., Spig., Sulph.—При *сверлящихъ* боляхъ: Bis., Calc., Kal., Natr.-m., Spig., Thuj.—При *остучихъ*: Acon., Ars., Agar., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Coloc.,

Croc., Euphr., Lach., Lyc., Magn.-m., Merc., N.-vom., Phos., Phos.-ac., Rhus, Serp., Spong., Sulph.—При ухудшеніи отъ *поворачиванія* *лазъ*: Acon., Bry., Caps., Cupr., Lyc., N.-vom., Phos., Phos.-ac., Rhus, Serp., Sil., Spig.—При *давящихъ* боляхъ: Arn., Bar., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Cupr., Graph., Ign., Lach., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Rut., Sabad., Serp., Spig., Staph., Sulph., Veratr., Zinc.—При чувствѣ, какъ-будто *черезъ глаза* *продвигается нитка*: Bry., Ign., Lach., Mur.-ac., Par., Plat., Valer.—При ощущеніи *присутствія инороднаго тѣла* (пыли или песку) въ глазу: Acon., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Chin., Cin., Con., Graph., Ign., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos., Puls., Spig., Sulph., Thuj.—При боляхъ *низдавливающихъ*: Aug., Cann., Hell., Oleand., Par., Puls.—При *выдавливающихъ*: Acon., Avar., Bell., Bry., Cann., Canth., Caust., Con., Dros., Guaj., Ign., Led., Mang.-arct., N.-vom., Par., Puls., Ran., Rhus, Spig., Val.—При боляхъ *выкалывающихъ* Calc., Cocc., Dros., Natr., Sil., Sulph.—При *окалывающихъ*: Arn., Bell., Phos.—При чувствѣ *холода въ глазахъ*: Alum., Amm., Berb., Calc., Con., Kal., Lyc., Magn.-arct., Par., Plat.—При *бьющихъ* боляхъ: Acon., Ars., Bell., Bry., Calc., (Cham., Cocc.), Ign., Magn.-aust., Petr.—При боляхъ *щиплющихъ*: Croc., Nitr.-ac.—При боляхъ *съ масляной слезой*: Aug., Herp., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus, Staph., Sulph.—При боляхъ *терзающихъ* Ars., Bell., Bry., Kal., Led., Lyc., Magn.-c., N.-vom., Sen., Sil., Sulph., Zinc.—При *скоблящихъ*: Ars., Lyc., Puls., Rhus.—При *рзѣ въ глазахъ*: Bell., Calc., Canth., Coloc., Kal., Lyc., Merc., Mur.-ac., Puls., Rhus, Spig., Sulph., Veratr.—При чувствѣ *тяжести въ глазахъ*: Bell., Calc., Natr., Plat., Serp.—При *напряженіи въ нихъ*: Acon., Aug., Calc., Led., Lyc., Natr.-m., Phos., Sulph.-ac.—При боляхъ *колошчатыхъ*: Ars., Bell., Bry., Calc., Coloc., Con., Dig., Sulph., Graph., Herp., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Phos., Puls., Sen., Serp., Spig., Thuj., Val., Veratr.—При боли *какъ-бы отъ раны или трещины*: Alum., Arn., Bar., Bry., Carb.-v., Croc., Euphr., Jod., Kal., Lyc., Magn.-aust., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos., Serp., Sil., Staph., Sulph.—При *болѣзненномъ чувствѣ разбитости*: Arn., Bry., Chin., Cupr., Herp., N.-vom., Rhus, Sulph., Veratr.

См. *Приступы боли и Обстоятельства.*

Глотаніе затрудненное, Dysphagia.

§ 1. Главныя средства: 1) Bell., Canth., Hyos., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Sil., Stram.; 2) Acon., Alum., Amm., Ant., Ars., Aur., Calc., Cham., Cic., Cocc., Cupr., Dros., Ign., Kal., Laur., Lyc., Merc., N.-vom., Op., Rhus.

§ 2. Если причиною затрудненнаго глотанія было воспалительное состояніе: 1) Acon., Bell., Canth., Cham., Ign., Merc., N.-vom., Puls. и другія, показанныя при *воспаленіи зѣва*.—Если оно происходитъ отъ *спазмовъ зѣва*: 1) Bell., Canth., Hyos., Lach., Stram.; 2) Alum., Ars., Cic., Coccul., Cocc., Ign., Laur., Lyc., Merc., N.-vom., Op., Veratr.—Если оно есть слѣдствіе *паралича языка*: 1) Caust., Con., Graph., Lach., Sil.; 2) Ars., Bell., Carb.-v., Cocc., Cupr., Hyos., Ipec., Kal.

См. также *Воспаленіе гортани, Судороги, Параличъ*.

Глухота, тупость, пороки слуха, Dysaesia, Surditas.

§ 1. Весьма трудно составить вѣрныя показанія для выбора средствъ при порокахъ слуха, однакожь можно указать на слѣдующія: 1) Bell., Calc., Caust., Graph., Hyos., Lach., Led., Lyc., Magn., Merc., Nitr.-ac., Op., Petr., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Amm., Anac., Asa., Aur., Coff., Con., Hep., Kal., Magn.-c., Mur.-ac. Natr., Natr.-m., N.-vom., Phos.-ac., Sep., Staph., Veratr.; 3) Amb. Ant., Ars., Carb.-veg., Cic., Coccul., Dros., Jod., Laur., Oleand., Plumb., Rhus, Ruta, Stram..

§ 2. Если притупленіе слуха происходитъ отъ *притока крови къ мозгу*, сопровождаеясь звономъ въ ушахъ (*Surditas s. Dysaesia congestiva*): 1) Aur., Bell., Caust., Graph., Merc., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Anac., Bry., Calc., Lyc., Mur.-ac., N.-vom., Sep., Spig.. — Противъ *нервной глухоты*, происходящей отъ *паралича слуховаго нерва* (*Dysaesia nervosa s. paralytica*): 1) Bell., Caust., Hyos., N.-vom., Petr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sil.; 2) Anac., Calc., Coccul., Con., Graph., Mur.-ac., Nitr.-ac., Op., Veratr.. — Противъ *катаральной или ревматической глухоты*, вслѣдствіе *простуды мозгомъ или всего тѣла*: 1) Acon., Ars., Bell., Cham., Hep., Led., Merc., Puls.; 2) Calc., Caust., Coff., Lach., Nitr.-ac., Sulph.. — Противъ *эретической глухоты*: Camph., Con., Jod., N.-vom., Phosph., Puls..

§ 3. При глухотѣ вслѣдствіе *скрывшія* привычныхъ *лишавей* или другой какой-либо *сыпи*: 1) Sulph., Ant.; 2) Caust. Ся. *Причины, Сыпи скрывшіяся*. — Вслѣдствіе *острой лихорадочной сыпи*, наур. кори, скарлатины и т. д.: Bell., Merc., Mer., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Carb.-veg., Phosph. — Если причину глухоты составляетъ *корь*: Puls. и Carb.-veg.; — *скарлатина*: Bell., Her.; — *оспа*, Merc., Sulph.; — быстро сведенные *лишави* или другія *сыпи*, быстро скрывшіяся при ненадлежащемъ леченіи: 1) Graph., Sulph., Ant.; 2) Caust., Lach. — При глухотѣ вслѣдствіе *скрывающейся перемежающейся лихорадки отъ злоупотребленія хины*: 1) Calc., Puls.; 2) Carb.-veg., Her., N.-vom., Sulph. — Вслѣдствіе *злоупотребленія ртути*: 1) Asa., Nitr.-ac., Staph.; 2) Carb.-veg., Her., N.-vom., Sulph. — Вслѣдствіе часто повторяющейся *воспалительной опухоли миндалинныхъ железъ* и *гипертрофіи* ихъ: Aug., Merc., Nitr.-ac., Staph. — Вслѣдствіе *нервныхъ лихорадокъ* или вообще *нервныхъ недуговъ*: Ant., Phosph., Phos.-ac., Veratr. — Вслѣдствіе *скрывающейся ушной или носовой течи*: 1) Her., Led; 2) Bell., Merc., Puls. — Кроме того: при болѣзненномъ *отдѣленіи слезы*: Cop., Petr. — При *язвахъ* въ ухѣ: Calc., Caust., Graph., Lycor., Merc., Nitr.-ac., Puls., Sulph. — При *шумѣ* въ ушахъ: Arn., Bell., Calc., Caust., Cop., Graph., Lys., Mang., Merc., Petr., Phosph., Rhod. — При *щелканьи* во время чиханія и втягиванія воздуха, съ сильною отдачею въ ухо: Graph. — При пораженіи исключительно *правой стороны*: Calc., Cop., N.-vom., Puls. — У *стариковъ*: Arn., Petr. — У *заотупившихъ*: Calc., Jod., Lys. — Равнымъ образомъ: При *ухудшеніи* глухоты: *отъ дождей*: Bell., N.-vom., Phosph.; — *на открытомъ воздухѣ*: Calc., Cop.; — *отъ чиханія*: Puls.; — *отъ спиртныхъ напитковъ*: Phosph. — При *улучшеніи* глухоты: съ *появленіемъ пота*: Calc.; — *отъ сморканія*: Mang., Merc.; — при *ясной, сухой погодѣ*: Phosph., Puls..

§ 4. ВЕЛЛАДОННА назначается при частыхъ *приливахъ крови къ голове*, сопровождаемыхъ *жужжаніемъ* въ ушахъ, *сверканіемъ* передъ глазами, *выжимающей болью* во лбу, особенно если это встрѣчается у *молодыхъ, полнокровныхъ, тучныхъ субъектовъ*, съ *тонкою, нѣжною кожей*, а также при *глухотѣ послѣ апоплексіи, воспаления мозга, нервной лихорадки* и т. д.

САЛСАВЕЛ — при глухотѣ какъ-бы отъ *затѣзанія ушей*, частомъ

жужжаніи, перекачываніи или звонѣ; пѣніи и музыкальнѣе то-
нахъ въ ушахъ; частомъ біеніи съ жаромъ въ ушахъ; *постоянной*
сухости ушей; *истеченіи* изъ нихъ *мока*; давящей боли во лбу.

CAUSTICUM—при чувствѣ залеганія въ ушахъ, съ ревомъ,
жужжаніемъ и шумомъ въ головѣ; *ощущеніи въ ушахъ яснаго от-*
голоска всѣхъ звуковъ и даже собственной своей рѣчи; ушной течи;
ревматическихъ боляхъ въ ушахъ и членахъ; необыкновенной чув-
ствительности къ холодному вѣтру.

GNARLITES—при *большой сухости въ ушахъ или ушной течи*;
тупости слуха, которая иногда исчезаетъ во время вѣды въ эки-
нажѣ; пѣніи, свистѣ и звонѣ или *шумъ и тромъ* въ ушахъ, осо-
бенно ночью; чувствѣ, какъ-будто воздухъ проникаетъ въ Евста-
хіеву трубу; лишаяхъ и коркахъ вокругъ ушей и на другихъ ча-
стяхъ тѣла.

HYOSCINUM—при тупости слуха, какъ-бы вслѣдствіе оглу-
шенія, преимущественно послѣ апоплексія, если Bell. мало при-
несла пользы.

LACRIMOSUS—при сухости въ ушахъ и небольшомъ *количествѣ*
ушной слезы, которая при этомъ бываетъ или слишкомъ тверда
и блѣдна, или бѣла и похожа на кисель; при этомъ мучительное
біеніе, трескъ или шумъ, грохотъ, трубный звукъ въ ушахъ
и необыкновенно сильный отголосокъ всѣхъ звуковъ; ссадины
и корки вокругъ ушей. (Иногда нуженъ передъ или послѣ
Caust.).

LEBUM—при чувствѣ затыканія ушей съ шумомъ въ нихъ;
чувствѣ сжиманія и одурѣнія головы пораженной стороны; при
ощущенія ожоженности въ головныхъ покровахъ, и вообще послѣ
скрытія ушной течи, насморка или катарра глазъ.

LUCORODIUM—при тупости слуха, шумѣ и жужжаніи въ ушахъ,
трескъ какъ бы отъ лопнушаго воздушнаго пузыря; ощущеніи
напора горячей крови къ ушамъ; кровоточивыхъ струнъяхъ около
ушей или на ушахъ.

MERCURIUS—залеганіе ушей, которое исчезаетъ при глотаніи
или сморканіи; *необыкновенно ясный отголосокъ всѣхъ звуковъ въ*
ушахъ; шумъ, жужжаніе, особливо вечеромъ; чувство холода въ
ушахъ; истеченіе ушной слезы или гноевидной матеріи и изъав-

вление ушей; ревматическая боль въ ушахъ, головѣ или зубахъ; большая склонность къ поту.

MANGANUM — частая ушная боль съ терзаніемъ и колотье-емъ, простирающаяся до барабанной перепонки; звенная боль въ ушахъ; шумъ и журчаніе въ нихъ, преимущественно послѣ нагибанія; *ощущеніе треска въ ушахъ при сморканіи и мотаніи*; туность слуха, какъ-бы отъ залеганія, исчезающая при сморканіи; *улучшеніе и ухудшеніе слуха отъ переменъ погоды*.

NITRI-ACIDUM — при большой сухости въ ушахъ, или *истеченіи ушной сѣры*; залеганіи ушей, ревѣ, біеніи и трескѣ въ нихъ; частой зубной боли и цынготномъ пораженіи десенъ; покалываніи въ зубахъ и ушахъ.

ORISUM — при глухотѣ преимущественно послѣ апоплексіи или припадковъ падучей болѣзни (иногда попеременно съ Bell. и Hyos.).

RETROBUM — при *мучительной сухости внутри уха*, или истеченіи крови и гноя; звонѣ или грохотѣ и шумѣ въ ушахъ; лишаяхъ и ссадинахъ на ушахъ и сосѣднихъ частяхъ; частой зубной боли съ припухlostію щекъ; кровоточивости десенъ, разжимающихъ боляхъ въ затылкѣ. (Часто прилично послѣ Nitr.-ac.).

RHOSRHOCUS — при *туности слуха, особенно на челютческіе звуки, чрезвычайно громкая отдаленъ всѣхъ звуковъ*, и преимущественно словъ, и отраженіи звука даже въ голову; напорѣ крови къ ушамъ, біеніи и стучаніи въ нихъ; чувствѣ сухости или истеченіи ушной сѣры.

RUBRATILLA — когда вытекающая ушная сѣра тверда или слипкомъ жидка, чернаго цвѣта; при колющихъ боляхъ въ ушахъ, истеченіи изъ нихъ крови или гноя; *когда уши какъ-бы заткнуты* и въ нихъ слышатся шумъ, или бѣющее ворчаніе, звонъ, пискъ, особенно у людей кроткаго характера, или у женщинъ, расположенныхъ къ бѣламъ и другимъ беспорядкамъ въ маточной системѣ.

SILISVA — при истеченіи ушной сѣры; ощущеніи какъ-бы паденія передъ ушамъ, которое проходитъ при сморканіи или отъ звука удара; *туность слуха, особенно на звуки челютческаго голоса, безъ*

шума въ ушахъ или съ звономъ и звукомъ какъ-бы отъ вмаха птичьихъ крыльевъ; при усиливаніи глухоты сообразно фазамъ луны, особенно подъ новолуніе или полнолуніе; при глухотѣ, смѣняющейся чрезвычайно чувствительнымъ слухомъ; при отслойкѣ кожи позади ушей.

SULPHUR—при *тупости слуха*, особенно на *человѣческіе звуки*, *залеганіи* и *ощущеніи* частаго паденія передъ ушами; преимущественно; во время *вздыха* и *сморзанія* и при, томъ на одной сторонѣ; *бормотаніи* или *волненіи* въ ушахъ, какъ-бы отъ воды *напорѣ* крови къ головѣ; *расположенія* къ *насморку* и другимъ *слизистымъ отдѣленіямъ*; *ушной течи*.

§ 5. Кромѣ того: при *ощущеніи шума* въ ушахъ: 1) Acon., Bell., Caust., Chin., Con., Graph., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Puls., Sep., Sulph.; 2) Anac., Alum., Amb. Amm., Baryt., Borax., Bry., Calc., Carb.-v., Cham., Croc., Her., Kal., Lach., Natr.-m., Op., Phosph., Plat., Spig., Therid.—При *ощущеніи сорчанія и жужжанія*: Amm., Bell., Caust., Con., Graph., Hyos., Jod. Natr.-m., Puls., Sulph.—При *ощущеніи зрама и зрота*: Amm.-m. Calc., Caust., Graph., Plat.—При *звонѣ и тѣни въ ушахъ*: 1) Bell. Calc., Caust., Chin., Graph., Kal., Lyc., Men., Natr.-m., N.-vom., Puls.; 2) Alum., Baryt., Borax., Chel., Con., Petr., Sil., Sulph.—При *ощущеніи звука, похожаго на порханіе птицъ*: Aug., Bell., Calc., Caust., Graph., Petr., Puls., Sil., Spig., Sulph.—При *звучаніи* въ ушахъ: Amb., Calc., Con., Led., Natr.-m., Sil.—При *ощущеніи шелканія* въ ушахъ во время *жеванія* и *движенія челюстями*: Baryt., Calc., Graph., Kal., Men., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr.—При *частомъ трескѣ* въ ушахъ: Graph., Kal., Magn., Natr., Sil., Staph., Zinc..

§ 6. При *тупости слуха на человѣческіе звуки*: Arg., Phosph., Sil., Sulph.—При *чувствѣ, какъ-будто уши заткнуты*: 1) Bry., Con., Lyc., Mang., Merc., Puls., Sil., Spig.; 2) Calc., Caust., Graph., Kal., Jod., Lach., Men., Nitr.-ac., Petr., Sep., Sulph.—При *ощущеніи, какъ-будто уши заложены*: 1) Calc., Nitr.-ac., Sulph.; 2) Acon., Ant., Carb.-v., Chin., Coccul., Hyos., Led., Men., Phosph., Spig.—При *глухотѣ, сменяющейся по временамъ острымъ слухомъ*: Aug., Bell., Calc., Coff., Lyc., Sep., Spig..

Сравн. *Раздражимость слуха, Силы ушныя, Кровотечение изъ ушей, Ушная течь, Ушная стѣра, Ушная боль.*

Головокруженіе, Vertigo.

§ 1. Головокруженіе большею частію составляетъ только симптомъ, который исчезаетъ вмѣстѣ съ удаленіемъ главной болѣзни, но бывають случаи, гдѣ оно является весьма важнымъ страданіемъ и требуетъ непосредственнаго леченія. Соответствующія средства: 1) Acon., Arn., Bell., Calc., Chin., Con., Her., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Ant., Bryt., Bry., Carb.-an., Cham., Cic., Cocc., Ign., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Sec., Ser., Stram., Veratr., Zinc.

§ 2. Противъ головокруженія, происходящаго отъ *страданія желудка*: Acon. Ant., Arn., Bell., Cham., Merc., N.-vom., Puls., Rhus.—Противъ такъ называемаго *нервнаго головокруженія*, происходящаго вслѣдствіе возвышенной раздражительности или слабости мозга: Arn., Bell., Cham., Chin., Cin., Her., Mosch., N.-vom., Puls., Rhus.—Если причину головокруженія составляетъ *напоръ крови къ мозгу*: Acon., Arn., Bell., Chin., Con., Lach., Merc., N.-vom., Op., Puls., Rhus., Sil., Sulph.; — *скривившаяся застарѣлая язва, или наклоненная сыпь*: 1) Calc., Sulph.; 2) Bell., Bry., Carb.-v. Cham., Her., Ipec., Lach., Phosph., Puls.; — *язва съ экимазою*: 1) Her., Sil.; 2) Cocc., Petr.

§ 3. Сообразно съ припадками:

АСОНИТУМ назначается, когда головокруженіе появляется только при вставаніи, или при нагибаніи, и если въ то же время замѣчаются: тошнота, отрыжка, рвота, или потеря зрѣнія, потеря самознанія и ослѣпленіе.

АНТИМОНІУМ — когда головокруженіе появляется вслѣдствіе несправности желудка, сопровождаясь тошнотою, рвотою, отвращеніемъ отъ пищи и пр..

АВНІСА — когда головокруженіе появляется послѣ *обильнаго стола*, или во время ѣды, сопровождаясь тошнотою, потемнѣніемъ зрѣнія, круженіемъ въ головѣ, краснотою лица.

ВЕЛЛАДОННА — при головокруженіи, *сопровождаясь тоскою, ослушеніемъ или потерей разсудка и потемнѣніемъ зрѣнія*, или

шнностью тѣла, тошнотою, дрожаніемъ рукъ и искрами передъ глазами; особенно же, когда признаки обнаруживаются при *нѣмбѣ* или вставаніи.

СНАМОМІЛЛА—когда головокруженіе обнаруживается преимущественно утромъ при вставаніи, или послѣ стола, въ особенности послѣ кофе, и сопровождается потемнѣніемъ зрѣнія, или даже *припадками обморока*.

СНИЛА—если головокруженіе начинается преимущественно при *выпрямленіи* головы, или (во время движенія) сопровождается слабостью головы, такъ что она клонится.

СОНИУМ—при *вертищемъ головокруженіи*, вслѣдствіе котораго больной падаетъ на сторону, преимущественно когда онъ *охлаждается*; при чувствѣ тяжести и полноты въ головѣ; слабости памяти и забывчивости.

НИРАЯ—при головокруженіи отъ ѣзды въ экипажѣ, или отъ *движенія* головы, равно сопровождающемся тошнотою, оглушеніемъ, признаками обморока и потемнѣніемъ зрѣнія.

ЛАСНЕЗИС—при *головокруженіи*, которое сопровождается блѣдностью лица, обморокомъ, тошнотою, рвотою, кровотеченіемъ изъ носу; въ особенности, когда оно появляется утромъ при *вставаніи*, или если къ нему присоединяются: *потеря самосознанія*, *притупленіе чувствъ*, ошляненіе, оглушеніе и т. д..

МЯКСУВІУС—когда головокруженіе появляется при *вставаніи* или *выпрямленіи*, или же вечеромъ, сопровождается *тошнотою*, потемнѣніемъ зрѣнія, жаромъ, тоскою и необходимостью лечь.

НУХ ВОМІСА—когда головокруженіе начинается во время стола или *послѣ него*, или при *зажденіи* на воздухъ, при нагибаніи, при размысленіи, или же *утромъ* или *вечеромъ* въ постели, а особенно при *лежаніи на спинѣ*, сопровождается круженіемъ и колебаніемъ въ головѣ и опасностью упасть, или же *жужжаніемъ* въ ушахъ, *потемнѣніемъ* зрѣнія; равно *припадками обморока* и *потерю самосознанія*.

ОРИУМ—при головокруженіи вслѣдствіе испуга; въ особенности, когда при этомъ замѣчаются: дрожаніе членовъ, слабость, *оглушеніе*, *жужжаніе въ ушахъ*, потемнѣніе зрѣнія, и когда головокруженіе появляется преимущественно при вставаніи съ кровати и *заставляетъ* больного снова лечь.

PULSATILLA — головокруженіе при поднятіи глаза, или при сидѣчелъ положеніи, или при нагибаніи, а чаще всего вечеромъ въ постели, или послѣ стола; съ чувствомъ тяжести въ голову, шумообразнѣе въ ушахъ, жаромъ или блѣдностью лица; потемнѣніемъ зрѣнія, тошнотою и склонностью ко рвотѣ.

VNIUS — когда головокруженіе чаще всего является вечеромъ и сопровождается боязнію упасть, или умереть.

VALISERA — головокруженіе утромъ, при поднятіи глаза, при падѣ, или нагибаніи, и послѣ всякаго душевнаго потрясенія, съ опасностью упасть, тошнотою и склонностью ко рвотѣ, причѣмъ кажется, будто припадокъ направляется со спинъ въ заднѣкъ и въ голову.

SULPHUR — когда головокруженіе появляется преимущественно въ сидѣчелъ положеніи, при восхожденіи на высоту, или послѣ стола, утромъ, вечеромъ или ночью, съ тошнотою, обморокомъ, кровотеченіемъ изъ носу.

§ 4. Кромѣ того: при головокруженіи съ жоскою: Bell., Caust., Coff., Merc., N.-vomch., Rhod.; — съ отрыжкою: Magn.-c., N.-vomch., Petr., Sass.; — помраченіемъ зрѣнія: Acon., Arn., Bell., Calc., Carb.-an., Cham., Cic., Her., Hyosc., Ign., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Rnd.; — потерей сознанія или чувствъ: Ang., Bar., Bor., Carb.-an., Caust., Chin., Con., Ipec., Lach., Laur., Natr.-m., N.-vom., Op., Phosph., Sulph.; — истрическими страданіями, рвотою, тошнотою: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Cocc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Alum., Calc., Chin., Her., Lyc., Magn.-c., Nitr.-ac., Petr., Phosph.; — блѣдностью лица: Lach., Led., Magn.-c., Petr., Puls.; — сердцебиеніемъ: Plat., Puls.; — головною болью: 1) Acon., Bell., Camph., Cocc., Ign., Lach., N.-vom., Puls., Ser., Sulph.; 2) Arg., Aza, Bor., Calc., Chin., Coff., Con., Lach., Laur., Magn.-c., Phosph., Sec., Sil.; — страданіями оселудка: 1) Ant., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Ambr., Arn., Bell., Cham., Hell., Kal., Merc., Rhus; — обморокомъ: Bry., Cham., Cocc., Her., Lach., Magn.-c., Mosch., N.-vom., Sulph.; — шумомъ въ ушахъ: Chin., N.-vom., Puls., Sang., Ser.; — паденіемъ на затылокъ: 1) Bell.; 2) Chin., Chimin., Kal., Led., Phosph.-ac., Rhus, Sass., Spig., Spong., Stram.; — онемѣнностью: Laur., Phosph., Puls.; — паденіемъ на бокъ: Ашп.-м., Сапп., Can., Drov., Mez., N.-vom., Rhus, Sil., Sulph.; — паденіемъ безразлично: 1) Bell., Cic., Cocc., Con., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Acon.,

Сапа., Chin., Graph., Kal., Kal-bi; Phosph.-ac., Rhod., Sass., Spig., Spong;—*наденіемъ нитъ*: Arn., Cic., Cupr., Ferr., Graph., Magn.-c., Natr.-m., Phosph.-ac., Rhus, Sass., Sil., Sulph.

§ 5. Съ другой стороны, если припадки появляются въ особенности *вечеромъ*: Амт., Arg., Calc., Carb.-an., Graph., Нер., Кал., Мерс., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Phosph.-ac., Plat., Puls.;—*послѣ отхода ко сну, въ постели*: N.-mosch., N.-vom., Petr., Rhod., Staph.;—*при вставаніи*: Acon., Arg., Arg., Baryt., Bell., Bry., Carb.-an., Chin., Cic., Coel., Con., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Puls., Ser.;—*при вставаніи съ постели*: Acon., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Con., Merc., Petr., Phosph.;—*при раскрытіи глазъ*: Acon., Puls., Sang.;—*при закрытіи глазъ*: Arg., Нер., Lach., Petr., Thuj.;—*при наиболюшій*: 1) Baryt., Bell., Bry., Lach., Lyc., N.-vom., Petr., Puls.; 2) Acon., Carb.-v., Mosch.;—*при падѣ*: Амт., Arn., Magn.-c., Magn.-m., Phosph., Sil.;—*послѣ падъ*: Cham., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Ser., Sulph.;—*падѣ текучею водою*: Ang., Brom., Ferr., Sulph.;—*на открытіи воздуха*: Ambr., Calc., Canth., Dros., Kal., N.-vom., Phosph., Ser., Sulph.;—*утромъ*: Agar., Alum., Bell., Carb.-an., Carb.-v., Cham., Con., Lach., N.-vom., Phosph., Phosph.-ac., Puls.;—*при прогулкѣ*: Arn., Arg., Bell., Calc., Ferr., Ipec., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Phosph.-ac.;—*послѣ кофе*: Cham., Mosch., N.-vom.;—*послѣ движеній головою*: Acon., Arg., Calc., Chin., Natr.-m., Sang.;—*при чтеніи*: Амт., Arg.;—*при лежаніи*: Arg., Carb.-an., Con., Lach., Natr., Petr., Phosph., Rhus, Ser., Staph., Thuj.;—*при лежаніи на спинѣ*: Merc., N.-vom.; Sulph.;—*при размышленіи*: Agar., Natr., Puls.;—*ночью*: Амт., Calc., Carb.-an., Caus., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Sass., Sulph.;—*при смотрѣніи внизъ*: Oleand.;—*при разговорѣ*: Cham.;—*при писаніи*: Кал., Мерс., Phosph.-ac., Rhod.;—*при смотрѣніи вверхъ*: Caus., Cupr., Graph., Plumb., Ser.;—*при сидѣніи*: Амт., Caus., Lach., Merc., Nitr.-ac., Puls., Sulph.;—*отъ солнечнаго свѣта*: Agar.;—*при вхожденіи на ступу*: Bor., Calc.;—*послѣ питья*: Mang., Ser.

См. Прилипа къ животу, Кровяной ударъ, Судорож.

ГОЛОДЪ БОЛѢЗНЕННЫЙ, *происорливость* (Fames-sapina, Lycogexis).—§ 1. Лучшія средства противъ страданій, выражающихся этимъ припадкомъ: 1) Calc., Chin., Cin., Jod., Lyc., Petr., Phosph., Sil., Spig., Staph., Sulph., Veratt.; 2) Con., Graph., Нер., Кал.,

Natr.-m., N.-vom., Sabad., Ser.; 3) Bry., Coss., Hyos., Lach., Magn.-m., Merc., Rhus, Squil.

§ 2. Настоящая прожорливость, т. е. желание употребить много пищи, требует преимущественно: 1) Chin., Cin., Lyc., Mag., Petr., Staph.; 2) Calc., Natr.-m., Sil., Sulph., Veratr.

Если прожорливость обнаруживается во время выздоровления от тяжких острых болезней, ослабляющей потерю соков и крови, или других истощающих причин, то можно назначить: 1) Chin., Veratr. и 2) Calc., Natr.-m., Sil., Sulph.—При голодѣ безъ аппетита, показаны въ особенности: 1) Chin., Hell., Natr.-m., Rhus.; 2) Bry., Calc., Ign., N.-vom., Op., Sil.; 3) Arg., Baryt., Dulc., Magn.-m., Sulph.-ac.

§ 3. Настоящій чрезвычайный голодъ т. е. такой, который внезапно поражаетъ больного и при неудовлетвореніи его причиняетъ обморокъ, лечатся: 1) Calc., Chin., Cin., Hyos., Merc., Sabad., Sil., Spig.; 2) Con., Magn.-m., Natr.-m., Nux-vom., Petr., Ser.—Если къ нему присоединяется рвота принятою пищею: 1) Bry., N.-vom., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Calc., Cin., Hyos., Lyc., Natr.-m.—Если принятая пища вскоре по употребленіи голода выходит низомъ (Lycogexis): 1) Chin., Phosph., Veratr.; 2) Bry., Calc., Con., Merc., Sulph.

§ 4. Противъ голода, встрѣчающагося у беременных: Con., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Petr., Ser.—Для особъ, страдающихъ мистами: Hyos., Merc., Sabad., Sil., Spig.

Ср. также: Слабость желудка, Аппетита.

Голоса потеря см. Охриплость.

Гоноррея см. Перелой.

Грибы ядовитые, вредъ отъ нихъ.

При полномъ отравленіи грибами, порошокъ древеснаго угля съ водою и тохаміе хлорную иза; а противъ остающихся недуговъ: 1) Coff., Puls.; 2) Acon., N.-vom.

Грибовидные наросты, Fungi.

Главные средства: 1) Arg., Carb.-an., Carb.-v., Phosph., Ser., Sil., Sulph.; 2) Ant., Bell., Calc., Clem., Con., Kreos., Lach., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Staph.—Изъ нихъ, противъ кровяную гриба (fungus haematodes): 1) Arg., Carb.-an., Phosph., Sil.; 2) Carb.-veg.,

Lach., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Sulph. — Противъ *молочидного рана* (fungus medullaris): Bell., Carb.-v., Phosph., Thuja. — Противъ *грибковой опухоли* (fungus articularum): 1) Ant., Croos., Lach., Sil.; 2) Arg., Jod., Lyc., Phosph., Staph..

Гриппъ, Influenza.

Средства, до-сихъ-поръ большею частію съ успѣхомъ употребленными противъ эпидемическаго бронхіальнаго катарра вообще: 1) Acon., Arg., Bell., Caust., Merc., N -vom.; 2) Arn., Bry., Camph., Chia., Ipec., Phosph., Puls., Sabad., Sen., Sil., Spig., Squill., Veratr..

Асони́тум—гдѣ болѣзнь приняла значительный воспалительный характеръ, сопровождающійся колющемъ въ боку или воспаленіемъ груди, или также тамъ, гдѣ появится сухой, сильный и потрясающій кашель съ чувствомъ сжиманія въ груди или безъ него, иногда съ покалываніемъ въ груди или бокахъ; а также при ревматическихъ страданіяхъ съ бронхіальнымъ катарромъ и болью горла.

Азвѣнису́м—при ревматической, сильной боли головы, сопровождающейся текучимъ насморкомъ и истеченіемъ острой разѣдающей мокроты, или когда замѣчаются: большая слабость и ухудшеніе состоянія по ночамъ, или послѣ стола; судорожный кашель съ позывомъ на рвоту или настоящею рвотою и водянистою слизистою мокротою; гнойничные или даже воспаленные глаза, съ язвками на роговой оболочкѣ и сильною водоболѣзню. (Въ послѣднемъ случаѣ бываютъ умістны Bell. или Lach).

Белладонна—если кашель становится судорожнымъ, или если разговоръ, яркій свѣтъ, ходьба и всякое другое движеніе чрезмѣрно усиливаютъ боль головы, или если пораженіе распространяется и на оболочки мозга, сопровождается сильнымъ жгучимъ жаромъ, безпокойствомъ, бредомъ и конвульсіями.

Саусти́сум—при ревматической боли въ членахъ и озабѣ, ухудшеніи отъ всякаго движенія; *болятъ съ яремная и челюстные кости*; при этомъ: сухой, сильный кашель, еще болѣе усиливающійся по ночамъ, съ жаромъ во всемъ тѣлѣ; *чувство, какъ-будто въ груди жестко или тамъ находятся ссадины*; запоръ, потеря аппетита, съ тошнотою; даже настоящая рвота принятою пищею.

Мерку́ріусъ—при ревматическихъ боляхъ въ ягоди, мизе,

ушища, зубаста, чешуйста и въ юрлик; при этомъ симптомы воспале-
нія плевры или груди, съ сухимъ, сильнымъ, потрясающимъ и
безпрестаннымъ кашлемъ, такъ что больной ни одного слова не
въ состояннн произнести; сухой или *мохучий насморкъ*; частое кро-
вотечение изъ носу; запоръ, или *моносъ слизистый или осмачный*;
ознобъ, или жаръ съ обильнымъ потомъ.

NUX VOMICA — при сильномъ и нустомъ кашлѣ съ слизи-
стымъ крпномъ или слизистомъ мокротомъ; притомъ сильная голов-
ная боль, какъ-будто мозгъ лонается; тяжесть въ головѣ и голо-
вокруженіе; боли въ поясницѣ; заморъ, потеря аппетита, тошнота
и *моносъ на рвоту*, съ жаждою; бессонница или безпокойный
сонъ, съ тягостными видѣніями; *покалыванія*, или чувство шеро-
ховатости въ груди.

Изъ прочихъ средствъ, можно еще имѣть въ виду:

ALBISIA — если гриппъ принимаетъ воспалительный характеръ,
съ *клатьемъ въ болахъ (pleuritis)*, ревматическими болями въ чле-
нахъ, давящею, судорожною головою болью и кровотеченіемъ
изъ носу или *кровохарканьемъ*. — **BYRONIA** — при ревматиче-
скихъ боляхъ въ членахъ и груди, которыя не позволяютъ даже
малѣйшаго движенія. — **SAMBUCA** — при катарральномъ удущи
съ чрезмѣрнымъ накопленіемъ слизи въ бронхіяхъ, припадками
задушенія, сухостию и холодомъ кожи. — **SERA** — при сильномъ
насморкѣ съ обильнымъ отдѣленіемъ слезъ и ухудшеніемъ на от-
крытомъ воздухѣ. — **CHINA** — при слабости вслѣдствіе гриппа,
сопровождающейся потерею аппетита и жаромъ, безъ жажды. —
FRYSASUANA — если приступы кашля сопровождаются силь-
нымъ позывомъ на рвоту и слизистомъ рвотомъ. — **RHOBOROUS**
— если бронхія и гортань до того поражены, что жестокость боли
внѣшается голосъ и дѣлаетъ рѣчь почти невозможною. — **PUL-
VATILLA** — если кашель не даетъ покоя ни днемъ ни ночью и
мучитъ больного преимущественно при лежащемъ положеніи, со-
провождаясь раздраженіемъ слизистой оболочки нервныхъ путей и
испражненіями въ видѣ поноса. — **SABADILLA** — при текучемъ
насморкѣ, *сжиманіи головы*, нечистомъ сѣромъ *квѣтѣ* кожи, *глу-
зомъ кашлѣ* со рвотою или *кровохарканьемъ*, и появляющемся
преимущественно при горизонтальномъ положеніи больного; *ухуд-
шеніи* *возла*: припадкомъ на холодѣ, также къ полудню и еще

больше къ вечеру; красная язва на лицѣ или груди.—**СИНЕГА** — при безпрестанномъ жженіи и щекотаніи въ гортани и горлѣ, и опасности задушенія въ лежащемъ положеніи.—**SILICEA** — противъ расположенія къ насморку вслѣдствіе разъ перенесеннаго гриппа.—**SPHIGLIA** — если гриппъ сопровождается болями лица.—**SQUILLA** — если кашель съ самаго начала коварный, съ обильною мокротою.—**СТАННУМ** — при кашлѣ, вначалѣ сухомъ, послѣ влажномъ, съ обильною мокротою, равно если гриппъ угрожаетъ переходомъ въ слизистую кашочку.—**УИВАТРУМ** — если гриппъ появляется съ признаками септической холеры, и если мало замѣчается катарральныхъ признаковъ, а слабость преобладаетъ.

Ср. *Насморкъ, Катарръ дыхательныхъ путей и Кашель.*

Грыжа, Hernia.

§ 1. Лучшія средства: 1) *Amm.-m., Aug., Coss., Lys., Magn.-c., N.-vom., Sil., Sulph.-ac., Veratr.*; 2) *Cham., Clem., Magn.-arct., Nitr.-ac., Rhus, Sil., Sulph.* — Грыжа у *малышекъ дѣтей* вслѣдствіе сильнаго крика лечится посредствомъ: *Aug., Coss., N.-vom., Nitr.-ac., Veratr.*

§ 2. *Ущемленная грыжа* довольно скоро, безъ хирургической операціи, излечиваютъ посредствомъ: 1) *Acop., N.-vom., Op., Sulph.*; 2) *Arg., Bell., Lach., Veratr.*

АСОНИТУМ обусловливаетъ: *сильное воспаление пораженныхъ частей, сопровождающееся жгучими болями въ животѣ, какъ-бы отъ угольевъ; необыкновенною чувствительностію при легчайшемъ прикосновеніи; тошнотою; горькою желчною рвотою; тоскою и холоднымъ потомъ. Въ большей части случаевъ, облегченіе наступаетъ уже послѣ втораго приема, который, смотря по обстоятельствамъ, дается черезъ часъ послѣ перваго; если же послѣ третьяго приема не послѣдуетъ облегченія, то нужно дать Sulph. (См. выше).*

NUX VOMICA — когда опухоль не такъ болванцевая, не такъ чувствительна при дотрагиваніи и рвота не очень сильна, но когда при этомъ замѣчается очень затрудненное дыханіе; глазами

образомъ тогда, когда выпаденіе и ущемленіе произошли отъ простуды, разгоряченія, огорченія, гнѣва или излишествъ.

Opium — если по прошествіи одного или двухъ часовъ послѣ втораго приѣма N.-vom. не послѣдуетъ исправленія, или если въ самомъ началѣ замѣчались: краснота лица, надутость и твердость живота, гниллая отрыжка или даже рвота каломъ (дается всякую четверть часа до наступленія облегченія). Если при связанной рвотѣ замѣчаются еще холодный потъ и холодъ конечностей, то предпочитается *Veratr.*; если же послѣ втораго приѣма не послѣдуетъ облегченія, то назначаемъ *Bell.*

Sulphur — если черезъ часъ послѣ принятія втораго приѣма *Acop.*, исправленіе гримки было невозможно, или если желчная рвота замѣнилась кислою. Послѣ *Sulph.* надо обождать нѣсколько часовъ и оставить больного въ покоѣ, если онъ заснулъ. Если въ опухоли окажутся признаки омертвенія, то предпочитается *Lach.*, затѣмъ, вслучаѣ неэффективности, — *Arg.*

Д

Дальновзорность, *Presbyopia*.

Большую частію составляетъ только симптомъ другой болѣзни, иногда однакожъ служитъ признакомъ общаго или частнаго паралича мышцъ. Средства, сюда относящіася: 1) *Alum.*, *Anac.*, *Arg.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calc.*, *Caust.*, *Jod.*, *Lach.*, *Merc.*, *Op.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Puls.*, *Sil.*, *Sulph.*; 2) *Carb.-v.*, *Oic.*, *Cocc.*, *Con.*, *Hep.*, *Kal.*, *Magn.-acet.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *Nitr.-ac.*, *N.-vom.*, *Petr.*, *Rhus.*, *Sabad.*, *Sec.*, *Stem.*, *Zinc.*

Десень болѣзни. *Morbi gingivarum*.

§ 1. Вѣрнѣйшія средства противъ болѣзней десенъ вообще: 1) *Amm.*, *Amm.-m.*, *Borax.*, *Carb.-v.*, *Chin.*, *Hep.*, *Merc.*, *Mur.-ac.*, *Natr.-m.*, *Nitr.-ac.*, *N.-vom.*, *Phosph.-ac.*, *Rhus.*, *Staph.*, *Sulph.*; 2) *Arg.*, *Baryt.*, *Calc.*, *Carb.*, *Carb.-an.*, *Caust.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Kreos.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Ruta.*, *Sep.*, *Sulph.-ac.*, *Thu.*

§ 2. Противъ *примуклости и воспаления десенъ*, назначаются преимущественно: 1) *Bell.*, *Calc.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chin.*, *Graph.*,

Нер., Merc., N.-vom., Phosph.-ac., Sep., Staph., Sulph.; 2) Amm., Amm.-m., Baryt., Borax., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Sil. — Противъ кровоточивости десенъ: Ars., Calc., Carb.-v., Cist., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sil., Staph., Sulph.; — *изъязвленія десенъ*: Alum., Calc., Carb.-v., Kal., Lyc., Merc., Natr.-m., Staph., Sulph.-ac.; — *свищей или нарывовъ*: 1) Calc., Sil., Staph., Sulph.; 2) Caust., Lyc., Natr.-m., Petr.; 3) Canth.; — *мясистыхъ наростовъ*: Staph., Thuj.; — *отслаиванія десенъ*: 1) Carb.-v., Cist., Merc., Phos.-ac.; 2) Ant., Natr., Phosph., Rhus, Sep.; — *изноты десенъ*: 1) Саp., Carb.-v., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Staph., Sulph.-ac.; 2) Amm., Amm.-m., Ars., Bry., Caust., Dulc., Kal., Kreos., Mur.-ac., Sep.

§ 3. Противъ страданій десенъ вслѣдствіе злоупотребленія ртуті: 1) Carb.-v., Chin.; 2) Sep., Nitr.-ac., Staph. — Вслѣдствіе неумѣренной употребленія поваренной соли: Carb.-v., или Nitr., Spig. — У ведущихъ *сидячую жизнь*, если они флегматическаго темперамента, тучны: 1) Саp.; 2) Bell., Calc., Merc., Sulph.; если же они худощавы и живаго темперамента, то N.-vom., или Carb.-v., Natr.-m.

Дѣтскія болѣзни, Morbi neonatorum.

§ 1. Въ этой статьѣ будутъ изложены только случаи острыхъ и обыкновеннѣйшихъ болѣзней дѣтей, менѣе же важное объ этомъ предметѣ упомянуто въ другихъ статьяхъ.

§ 2. *Астматическіе припадки* у малыхъ дѣтей, сопровождающіеся судорогами, опасностью задушенія и синеватымъ цвѣтомъ лица, излечиваются посредствомъ Ipec.; если же во время сна замѣчаются: крикъ, сухой, глухой кашель и тоскливость — то посредствомъ Samb. См. также: *Удушье*. — Кроме этого, встрѣчается у дѣтей еще захватываніе дыханія, которое выражается твердостью, напряженностью и вздутостью подреберій и предсердія, короткимъ дыханіемъ, невозможностью дышать, тоскою и безпокойствомъ, причемъ дѣтя мечутся, кричатъ и прыгають ножи къ туловищу. Противъ этого состоянія Гартманъ предложилъ Cham., какъ специфическое средство.

§ 3. Лучшія средства противъ *воспаленій глазъ* у новорожденныхъ: 1) Acon., Cham., Dig., Dula., Merc.; 2) Bell., Bry., Calc., N.-vom., Pulv., Sulph. См. *Воспаленіе глазъ*.

§ 4. При *кровоной опухоли на голову* (Cephaloematoma) у новорожденных: 1) Arn., Rhus.; 2) Merc., Sil..

§ 5. Против *грижи у малых дѣтей*, назначаются преимущественно: Aug., Cham., N.-vom., Sulph., Veratr.. — Против *пупочной грижи*: N.-vom., Sulph.. — Против *паховой грижи* часто оказываютъ отличную пользу: Aug., Cham., N.-vom., Sulph., Veratr.. Всякое изъ этихъ средствъ дается только разъ, въ одномъ приемѣ, или въ большихъ промежуткахъ.

§ 6. При *отвердннм грудныхъ соскахъ*: Cham.. — При *опухомъ грудныхъ сосковъ*: 1) Arn., Cham.; 2) Bell., Bry.; 3) Ser., Sil..

§ 7. *Поносы* у дѣтей вслѣдствіе накопленія кислоты въ пищеварительныхъ путяхъ, сопровождающіеся рвѣзю въ животѣ и крикомъ, излечиваются преимущественно посредствомъ Rhab., въ особенности, если кромѣ этого замѣчается еще натуга при испражненіи, или если дѣтя, не смотря на строгую чистоту, издаетъ кислый запахъ. — Если въ этомъ случаѣ Rhab. окажется мало полезнымъ, если боли въ животѣ будутъ сильны и лицо красно, то предпочитается Cham., но если лицо дитяти блѣдно, то назначается Bell. Напротивъ того, если болей мало, но замѣтны большая слабость тѣла и вздутіе живота, а Bell., Cham. и Rhab. оказались малодѣйствительны, то съ большимъ успѣхомъ употребляется Sulph.. — Поносъ у дѣтей *многою* большею частію устраняется нѣсколькими приемами Ipec., а если Ipec. недостаточна, то N.-vom.. Если, не смотря на сказанныя средства, поносъ возвращается при всякой, нѣсколько жаркой погодѣ, то показаны Bry., или Carb.-v.. — Если же поносъ возвращается всякій разъ, когда *погода становится прохладнѣе*, то лучшее средство Dulc., или же Ant., когда при этомъ языкъ обложенъ бѣлою слизью. Часто весьма полезенъ бываетъ Arg., преимущественно когда дѣтя похудѣло, ослабѣло, сдѣлалось блѣднымъ и безсиленнымъ. Кромѣ сказанныхъ средствъ, рекомендуютъ еще слѣдующія противъ поносовъ дѣтей вообще и новорожденныхъ въ особенности: Ferr., Ner., Jalap., Magn.-c., Merc., N.-vom., Sulph.-ac..

§ 8. Противъ *микорадокъ* у дѣтей, въ большей части случаевъ, назначаются: Acon., Cham. или Coff., а часто оказываются полезными также: Bell., Borax., Ign., Merc., N.-vom..

Асонитум— когда замѣчаются: сильный жаръ, жажда, и преимущественно бессонница или безпокойный сонъ, отъ котораго дѣти пробуждаются и внезапно вскакиваютъ; тоска и безутѣшный плачь.

Снамомилла— когда есть жгучій жаръ и краснота кожи, частый позывъ на питье; при этомъ большое безпокойство, въ особенности ночью; безпокойное метаніе въ различныя стороны, тоскливость, вздоха и стоны; краснота лица и щекъ, въ особенности краснота одной только изъ нихъ; горячій потъ на головѣ; короткое, скорое и тоскливое дыханіе и слизистый хрипъ; короткий, сухой и прерывистый кашель, или конвульсивное подергиваніе членовъ.

Соргеа— когда лихорадка сама по себѣ не очень сильна, но при ней замѣчаются возвышенная нервная раздражительность съ бессонницею, или безпокойный сонъ, отъ котораго дѣти часто пробуждаются и внезапно вскакиваютъ; притомъ переменчивое расположеніе духа, то веселое, то плаксивое.

§ 9. Средство, которое можно всегда употребить противъ такъ называемаго *произвольнаго вытока* дѣтей, есть Merc., а послѣ него Bell.. Оба могутъ быть назначаемы попеременно. Если этими средствами не достигаемъ цѣли, то даемъ Rhus, а послѣ него, смотря по обстоятельствамъ, Calc. или Coloc., или другое какое-либо изъ показанныхъ при ломотѣ тазобедреннаго сустава.

§ 10. *Красуха* у грудныхъ дѣтей въ большей части случаевъ излечивается нѣсколькими приемами Acon., а если онъ окажется недостаточнымъ, то Cham., если же и это средство принесетъ мало пользы, то слѣдуетъ употребить Sulph..

§ 11. Лучшія средства при *гастрическихъ страданіяхъ* у дѣтей: 1) Bell., Cham., Ires., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Bar.-c., Calc., Huov., Luc., Magn.-c., Rhab., Sulph.. — Если представляются признаки присутствія кислоты въ желудкѣ, кислая рвота или кислый поносъ, то: 1) Bell., Cham., Rhab.; 2) Calc, Magn., N.-vom., Puls.. Если гастрическое состояніе есть слѣдствіе переполненія желудка, то лучшія средства противъ рвоты съ поносомъ Ires. и Puls.. При поносѣ безъ рвоты, но состоящемъ изъ непереваренной пищи, или когда дитя ослабло отъ употребленія слабительныхъ, пред-

почтается Chin.. Если же рвота будет вмѣстѣ съ запоромъ, то приличнѣйшее средство N.-vom.. — Хроническая слабость пищева-
ренія у дѣтей, или же слабость желудка, вслѣдствіе
которой малѣйшая погрѣшность въ образѣ жизни причиняетъ
гастрическія страданія, часто устраняется посредствомъ: Bar.-c.,
Calc., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph..

§ 12. *Желтуха* у новорожденныхъ въ большей части случаевъ
совершенно излечивается посредствомъ нѣсколькихъ приемовъ Merc.,
а если онъ окажется мало дѣйствительнымъ, то показана Sulph..

§ 13. *Задержаніе мочи* большею частію устраняется нѣсколь-
кими приемами Camph., Acon. или Puls..

§ 14. Лучшими средствами противъ боли живота и колики у
грудныхъ дѣтей считаются вообще: 1) Borax, Cham., Chin., Ipec.,
Jalap., N.-mosch., Rhab., Senn.; 2) Acon., Bell., Calc., Caust., Cic.,
Coff., Sil., Staph. и другія, показанныя въ статьѣ о боляхъ жи-
вота.

§ 15. *Конвульсіи* у дѣтей требуютъ преимущественно: 1) Bell.,
Cham., Cin., Coff., Ign., Ipec., Merc., Op.; 2) Acon., Caust., Cupr.,
Lach., N.-vom., Stann., Sulph..

BELLADONNA — гдѣ приступы судорогъ смѣняются или окан-
чиваются спячкою, или когда дѣти внезапно вскакиваютъ отъ
сна; глаза принимаютъ дикій видъ; взглядъ дѣлается тоскливымъ
и неподвижнымъ, какъ бы испуганнымъ; при этомъ зрачки
расширены и замѣчаются *тетаническая окоченность* и ледяной
холодъ во всемъ тѣлѣ, жгучій жаръ на рукахъ и на лбу; равно
при непроизвольномъ мочеотдѣленіи у дѣтей ночью.

СНАКОМІЦА — при конвульсивныхъ подергиваніяхъ конеч-
стей съ непроизвольными движеніями головы и слѣдующею за-
тѣмъ спячкою, при которой глаза полуоткрыты и самосознаніе
потеряно; при краснотѣ одной щеки съ блѣдностью другой; вздо-
хахъ и частомъ позывѣ на питье. (Если Cham. не окажетъ пользы
противъ этого состоянія, то даемъ Bell.).

СИНА — для дѣтей, страдающихъ глистами, или испускающихъ
непроизвольно мочу въ постели, если у нихъ замѣчаются: судо-
роги въ груди, конвульсивныя движенія членовъ, вздутости

твердость живота, частый зудъ въ носу, сухой, подобный коклюшу, кашель.

Соргеа — для малыхъ, изнеможенныхъ дѣтей, если онѣ поражаются конвульсіями безъ особенныхъ другихъ припадковъ.

Игнатія — большею частію вначалѣ болѣзни, когда не знаемъ еще хорошо, происходятъ ли конвульсіи отъ болѣзни зубовъ, или отъ глистовъ, или когда конвульсіи повторяются каждый день въ одно и то же время и сопровождаются подергиваніемъ отдѣльныхъ членовъ или мышцъ; если во время приступа или послѣ него появляется жаръ или потъ; когда дѣти спятъ чутко и, пробуждаясь отъ сна, внезапно вскакиваютъ; когда при этомъ онѣ кричатъ и трясутся всемъ тѣломъ. (Послѣ Ign. часто прилична Cham.).

Тресасуанна — когда у дѣтей, въ пароксизма, дыханіе дѣлается короткимъ; появляются: тошнота, склонность ко рвотѣ и настоящая рвота или поносъ; частое вытягиваніе и сокращеніе членовъ.

Меркуріусъ — когда животъ твердъ и вздутъ и замѣчаются: частая отрыжка и слюнотеченіе, или жаръ, потъ и большая слабость послѣ пароксизма.

Оріумъ — когда пароксизмы конвульсій развились вслѣдствіе испуга, или если во время пароксизма появляется дрожаніе всего тѣла, вытягиваніе конечностей и пронзительный крикъ, или же спячка, вздутость живота, запоръ и задержаніе мочи.

§ 16. При *кровавой опухоли на яловъ* см. § 4. — При *слишкомъ большой яловъ*: 1) Calc.; 2) Merc., Sil. — При *медленномъ заращеніи родничковъ*: 1) Calc.; 2) Puls., Sil., Sulph.

§ 17. При мышечной слабости у дѣтей, вслѣдствіе которой они не скоро начинаютъ ходить: Bell., Calc., Sil., Sulph.

§ 18. При *накопленіи кислоты* у дѣтей, лучшее средство противъ рвоты и поноса: 1) Cham., Rhab.; 2) Bell., Calc., Sulph.

§ 19. Противъ *обмирація*, мнимой смерти новорожденныхъ, совокупно съ необходимыми наружными пособіями, отлично помогаетъ Tart., въ растворѣ 1 грана на 8 унцій воды, который употребляется въ видѣ клистира, или внутрь, всякую четверть часа

по нѣскольку капель. Если по прошествіи получаса не произойдетъ благоприятной перемены и лицо дитяти синевато, то назначается Ор., а если оно блѣдно — Chin.. Если дитя начало дышать, или если у него вызваны признаки жизни вообще, лицо было прежде красно или синевато, назначаются Асоп., если же оно было блѣдно, то предпочтается Chin..

§ 20. *Безсонница* у новорожденныхъ устраняется посредствомъ Соф., если только кормилица мало употребляетъ кофе, въ противномъ же случаѣ, или если кофе оказалось недостаточнымъ, даютъ Ор., преимущественно тогда, когда лицо дитяти красно. Если къ безсонницѣ присоединяется рѣзь въ животѣ, крикъ, то съ большимъ успѣхомъ назначаютъ Cham., Jalap. и Rhab.. При безпокойствѣ и лихорадочнымъ жарѣ, когда Соф. оказался недостаточнымъ, — Асоп.. Если безсонница появилась послѣ отнятія отъ груди, или когда дитя постоянно и долго кричать, не закрывая глазъ, и причина этому неизвѣстна, наилучшимъ средствомъ считается Bell..

§ 21. Противъ *сухого насморка* или *залежанія носа*, которымъ часто страдаютъ малыя дѣти, и который мѣшаетъ дыханію при сосаніи, лучшимъ средствомъ считается N.-vom., или же Samb., если первое неудовлетворительно. Часто однакожь можно достигнуть цѣли посредствомъ Cham., именно въ томъ случаѣ, когда залеганіе носа сопровождается водянистымъ истеченіемъ изъ ноздрей, или же посредствомъ Carb.-v., если состояніе больного къ вечеру становится хуже, или наконецъ посредствомъ Dulc., если ухудшеніе замѣтно на открытомъ воздухѣ.

§ 22. Противъ *постояннаго крика новорожденныхъ, безъ очевидной причины*, съ пользою можно употребить Bell. или Cham.. Если же дитя кричать, когда у него болитъ голова или ухо, то прежде дается Cham., а потомъ Bell., если первая была недостаточна. Если у дитяти появляются боли въ животѣ, причемъ оно съжимается, пригибаетъ ноги въ животу и лицо его краснѣетъ, то лучшее средство Cham., или Bell., если лицо блѣдно. — Если въ то же время замѣчается поносъ кислаго запаха и съ катугою, то предпочтается Rhab.. Если ни одно изъ этихъ трехъ средствъ не оказываетъ желанной пользы, то можно употребить Яогал,

Jalap., Ipec., Senn.—Вогак., Ign., или Puls. назначаются въ томъ случаѣ, когда дитя или кормилица употребили много кофе. Если дитя безпокойно и замѣтна при этомъ бессонница и лихорадочный жаръ, то предпочитаютъ Coff. или Acon.

§ 23. Лучшее средство отъ *молочными* Merc., а по прошествіи 6—7 дней—Sulph. Иногда также умѣстны: Вогак. или Sulph.-ac., первое преимущественно тамъ, гдѣ моча очень остра и имѣетъ запахъ кошачьей мочи.

§ 24. Средства, способствующія леченію *заканія у дѣтей*, суть: Bell., Euphr., Merc. и Sulph., при одновременномъ употребленіи механическихъ пособій.

§ 25. Дѣйствительнѣйшія средства *противъ запоровъ у новорожденныхъ*: Вгу, N.-vom., Op.

§ 26. Противъ *опрѣлости или отслойки кожи у дѣтей*, лучшее средство Cham., если только дитя или кормилица прежде не употребляли много ромашки. Въ послѣднемъ случаѣ, предпочитаютъ Вогак., Ign., или Puls. Если Cham. оказывается неудовлетворительною, то послѣ нея умѣстны: Вогак. или Carb.-v., также Merc., когда кожа дѣтяти желта и пораженные части жестки, а *опрѣлость* простирается до самыхъ ушей. Если ни одно изъ сказанныхъ средствъ не помогаетъ, то употребляютъ Sulph., или Sil. Кроме того, рекомендуютъ Caust., Graph., Lys., Ser.

§ 27. Противъ страданій при *прорѣзываніи зубовъ у дѣтей*:
1) Acon., Bell., Вогак., Calc., Cham., Coff., Ign., Merc., Sulph.;
2) Arg., Cin., Ferr., Magn., Magn.-m., N.-vom., Stann.—Противъ *бессонницы*: Coff., Acon., Вогак., Cham.; — *лихорадочныхъ припадковъ*: 1) Acon., Cham., Coff., N.-vom.; 2) Bell., Вогак., Sil.; — *безпокойства и возмущенной нервой раздражительности*: Coff., Acon., Bell., Вогак., Cham.; — *запора*: Вгу., Magn.-m., N.-vom.; — *поноса*: 1) Merc., Sulph.; 2) Arg., Calc., Cham., Coff., Ferr., Ipec., Magn.; — *сухому и судорожному кашлю*: Cham., Cin., N.-vom.; — *судорожъ или конвульсій*: 1) Bell., Cham., Cin., Ign.; 2) Calc., Stann., Sulph.; — *слишкомъ долгомъ прорѣзываніи зубовъ*, въ большей части случаевъ Sulph. и Calc. ускоряютъ дѣло.

Прочіе случаи дѣтскихъ болѣзней изложены въ статьяхъ: *Исхуданіе золотушныхъ дѣтей, Жаба, Эclamпсія, Англійская болѣзнь, Молочные струтья, Золотуха, Гнистая болѣзнь.*

Дурманъ, отравленіе имъ.

При отравленіи большими приемами: 1) черный кофе въ большомъ количествѣ; 2) уксусъ и лимонный сокъ въ достаточномъ количествѣ, и если послѣ этого не появляется рвота, то 3) клистиры изъ табаку. Противъ послѣдовательныхъ недуговъ, большею частію служатъ: 1) N.-vom.; 2) Bell, Hyos..

Ж.

Жаба грудная или сердца, Невралгія сердечнаго силетива, Neuralgia, Angina pectoris, Angina cordis.

Одно изъ главнѣйшихъ средствъ противъ этого состоянія, какъ кажется, Нер.; затѣмъ слѣдуютъ: 2) Aca., Lach., Samb., Veratr.; 3) Acon., Aug., Bell., Caust., Dig., Phosph., Spong., а по Гартману также: August., Ipec., Ser.—Касательно симптомовъ, опредѣляющихъ выборъ лекарствъ, см.: *Удушье, Приливъ къ груди, Судороги грудная, Удушливый катарръ и Сердца болѣзнь.*

Жаба дифтеритическая, дифтеритъ гѣва, Angina exsudatoria, Diphtheritis — Если эта опасная болѣзнь распознана въ самомъ началѣ, то главнымъ средствомъ служатъ Bell. (каждые 2—3 часа по одному приему высокаго дѣленія), которой нерѣдко достаточно вполнѣ для излеченія. Если же, въ исключительныхъ случаяхъ, это средство не принесло облегченія впродолженіе сутокъ, то назначаемъ Apis. Рѣже приходится употреблять здѣсь, тоже полезныя: Bry., Arg., Barut., или же Phosph., Arg.. Послѣдній пригоденъ въ особенности, когда перепончатая выпотѣнія грозятъ переходомъ въ омертвѣніе и у больного замѣтенъ значительный упадокъ силъ.

Жаба перепончатая, Крупъ, Croup, Angina membranae,—Лучшія средства вообще: Acon., Sulph. и Нер.

Асонитум—въ періодъ воспаленія и до тѣхъ поръ, пока замѣчаются: возвышенная раздражительность нервной и сосудистой системъ; жгучій жаръ съ жаждою, сухой и короткій кашель, короткое и скорое, но несвистающее дыханіе.

Spongia — когда сказанные признаки уменьшились послѣ **Acon.**, и остаются только характеристическіе признаки жабы, или когда болѣзнь съ самаго начала представляется подѣ видомъ жабы, сопровождаясь хриплымъ, глухимъ кашлемъ, похожимъ на карканье или лай собаки, или же кашлемъ сухимъ, посредствомъ котораго съ трудомъ извергается немного мокроты; медленнымъ, громкимъ, свистящимъ и шипящимъ дыханіемъ, или признаками задушенія, съ невозможностью дышать, развѣ только держа голову наклоненною внизъ.

Нерав — въ особенности когда кашель, по употребленіи **Spong.**, облегчился и затрудненное дыханіе кажется происходящимъ уже только отъ мокроты, или когда признаки крупа съ самаго начала сопровождаются *мокротною хрипотою*; при кашлѣ *мокротномъ* съ незначительнымъ затрудненіемъ дыханія и незначительнымъ раздраженіемъ нервной и кровеносной системъ.

§ 2. Кромѣ этихъ средствъ, рекомендуютъ еще слѣдующія противъ силлага и глузгаго кашля, который втеченіе нѣсколькихъ дней предшествуетъ крупу: **Cham**, **Chin.**, **Cin.**, **Dros.**, **Hyos.**, **N.-vom**, **Veratr.** — Противъ жабы, сопровождаемой какъ бы *параличемъ легкихъ*: **Tart.** — Противъ осложненія жабы *Милларовымъ удушьемъ* (**Asthma Millari**): **Samb.** или **Mosch.** — Въ отчаянныхъ случаяхъ, гдѣ **Acon.**, **Нер.** и **Spong.** остаются безъ успѣха, назначаемъ: 1) **Mosch.**, **Phosph.**, или также: 2) **Cham.**, **Carb.**, **Lach.**

Противъ *воспаленія гортани, охриплости и катарральныхъ страданій*, которыя остаются послѣ благопріятно окончившагося крупа: 1) **Нер.**, **Phos.**; 2) **Arg.**, **Bell.**, **Carb.-v.**, **Dros.** — Для уничтоженія *предрастоложенія* въ крупу, рекомендуютъ: **Лус.** и **Phosph.**

Жабій ядъ, вредныя отъ него послѣдствія.

Если онъ попалъ въ глазъ, то лучшее средство **Acon.**, а если въ желудокъ, то дается внутрь порошокъ древеснаго угля съ молокомъ или масломъ, а при опасныхъ признакахъ даютъ нюхать хлорный газъ. Противъ послѣдовательныхъ страданій показанъ **Arg.**

Железь болѣзни, **Morbi glandularum.**

§ 1. Средства, до-сихъ-поръ употребляемія противъ страданій железь: 1) **Amm.**, **Arg.**, **Bar.-c.**, **Bell.**, **Calc.**, **Carb.-v.**, **Cham.**, **Cist.**, **Con.**, **Dulc.**, **Нер.**, **Лус.**, **Merc.**, **Nitr.-ac.**, **Sil.**, **Spong.**, **Staph.**

Sulph.; 2) Canth., Carb.-an, Graph., Jod., Kal., Mang., Ol.-jes., Plumb., Sabin.—Изъ нихъ достойны вниманія: АММОНІУМ САВОНІСІУМ при опухоли затылочныхъ и шейныхъ железъ, сопровождаемой зудящею сыпью на лицѣ и тѣлѣ.—АУРИУМ—при опухоли и нагноеніи паховыхъ железъ, вслѣдствіе злоупотребленія ртути или сифилитическаго зараженія.—ВАКУГА—противъ опухоли, воспаленія и затвердѣнія затылочныхъ и шейныхъ железъ, когда въ тоже время находится парша на головѣ и лицѣ.—ВЕЛЛАДОННА—противъ *воспалительной опухоли железъ и лимфатическихъ сосудовъ*, когда послѣдніе образуютъ красныя, блестящія полоски и узловатости, и когда болѣзнь сопровождается жаромъ въ страждущихъ частяхъ, гнетущими и колющими болями; а также *противъ опухоли, нагноенія и затвердѣнія паховыхъ или шейныхъ железъ*, равно какъ и *противъ холодныхъ опухолей*. (Послѣ Bell. очень часто бывають приличны: Dulc, Ner., Merc., Rhus, или Calc., N.-vom. и Sulph.).—ВУОНИА.—Противъ распуханія *подкожныхъ железъ*, вслѣдствіе чего подъ кожей образуются *малыя твердые узлы*.—САЛСАВЕА—противъ *распухшихъ и затвердѣвшихъ подчелюстныхъ, крыльцовыхъ, паховыхъ, шейныхъ, околоушныхъ и млечныхъ железъ* и именно тогда, когда къ этому присоединяются течь изъ ушей и притупленіе слуха. Противъ *холодныхъ опухолей и затвердѣнія брыжжечныхъ железъ*. Вообще Calc. назначается по большей части послѣ Sulph.—САВВОУЕГЕТ.—противъ *затвердѣнія крыльцовыхъ железъ и узловъ на груди*.—СНАМОМІЛЛА—противъ *воспалительной и болючей опухоли подчелюстныхъ и шейныхъ железъ*, а также противъ *затвердѣнія грудныхъ железъ у новорожденныхъ*.—СІСТУС—*опухоль и нагноеніе подчелюстныхъ железъ*, при *костоподѣ челюстныхъ костей*.—СОНИУМ—противъ страданій *железъ вслѣдствіе ушиба*; противъ *раковиднаго затвердѣнія и холодныхъ опухолей*.—ДУЛСАМАВА—противъ *холодной опухоли, воспаленія и затвердѣнія паховыхъ, шейныхъ и затылочныхъ железъ*, сопровождаемыхъ гнетущею болью. Вообще Dulc. очень часто назначается послѣ Bell., или Merc.—ГВАРНИТЕС—противъ *волотушной опухоли шейныхъ железъ*.—НЕРАВ—противъ *нагноенія*, преимущественно *крыльцовыхъ и паховыхъ железъ*, особенно если ему предшествовало *злоупотребленіе ртути*.—ЮДИУМ—преимущественно *противъ затвердѣнія паховыхъ, крыльцовыхъ,*

шейныхъ и затылочныхъ железъ, если оно происходитъ вслѣдствіе золотушнаго предрасположенія, или артритическаго переноса.—**MERCURIUS**—противъ *холодной опухоли, воспаленія, опухоли, нагноенія подчелюстныхъ, крыльцовыхъ, паховыхъ и околушинныхъ железъ* у золотушныхъ дѣтей, или у людей съ *сифилитическимъ предрасположеніемъ*. Послѣ Merc. очень часто биваютъ приличны Dulc., или Bell. и Her., или также Rhus.—**NITRI ACIDUM**—противъ *воспалительной опухоли* и нагноенія *паховыхъ и крыльцовыхъ железъ* вслѣдствіе *злоупотребленія ртути*, или сифилитическаго страданія.—**NUX VOMICA**—противъ *воспаленія лимфатическихъ сосудовъ*, сопровождающагося жаромъ, лоснящеюся краснотой, твердостью и болью. Вообще въ этомъ случаѣ N.-vom. хорошо дѣйствуетъ послѣ Bell.—**SILICEA**—противъ *золотушнаго затвердѣнія и опухоли шейныхъ, затылочныхъ, околушинныхъ, крыльцовыхъ и паховыхъ железъ*, съ воспаленіемъ или безъ него.—**SPONGIA**—противъ *золотушной опухоли и затвердѣнія шейныхъ железъ*—**SULFUR**—противъ *опухоли, затвердѣнія и нагноенія паховыхъ, подчелюстныхъ, шейныхъ, затылочныхъ железъ*, а также и *подкожныхъ всего тѣла*, происходятъ ли онѣ отъ золотушнаго предрасположенія, или отъ другой болѣзни, какъ напримѣръ отъ скарлатинной лихорадки, злоупотребленія ртути или другихъ причинъ.

§ 2. Вообще при страданіяхъ железъ достойны вниманія слѣдующія указанія.—Противъ *воспалительной опухоли*: Bell., Merc., Phosph., Sil.; 2) Acon., Baryt., Camph., Cham., Graph., Her., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Staph., Sulph., Thuj.; 3) Arn., Carb.-an., Carb.-v., Lyc., Rhus.;—*холодной опухоли*: 1) Ars., Bell., Calc., Cocc., Con., Merc.; 2) Asa., Dulc., Lach.—При *твердыхъ припуханіяхъ*: Baryt., Bry., Calc., Con., Phosph., Puls., Rhus., Sulph.—При *болящихъ опухоляхъ*: Aur., Bell., Carb.-an., Chin., Jod., Puls., Sil., Sulph.—При *неболящихъ опухоляхъ*: Calc., Con., Dulc., Phos.-ac., Sep., Sulph.—При *толщахъ железъ*: 1) Bell., Calc., Cist., Her., Merc., Nitr.-ac., Sil., Sulph.; 2) Aur., Lach., Sep.—При *изъязвленнхъ*: 1) Ars., Phosph., Sil.; 2) Bell., Con., Her., Lach., Sulph., Thuj.—При *отвердѣннхъ*: 1) Baryt., Bell., Calc., Carb.-an., Cham., Con., Graph., Lyc., Sulph.; 2) Carb.-v., Cham., Chin., Magn.-m., Rhus., Spong.

Сравни. *Воспаленіе, Опухоль, Нагноеніе, Язва.*

Желтуха, Icterus.

Главное средство Merc., которое одно въ состояніи вылечить больного, если онъ только прежде не употреблялъ его въ изнѣшствѣ. Въ послѣднемъ случаѣ, предпочитается Chin.. Въ упорныхъ случаяхъ, когда болѣзнь, несмотря на употребленіе Merc. и Chin., не уступаетъ, заслуживаютъ вниманія Нер., Sulph. или Lach., которыя вслучаѣ надобности можно замѣнить опять Merc.. Если желтуха развилась вслѣдствіе сильнаго гнѣва, то предпочитаютъ: Cham., N.-vom., или Lach. и Sulph..—Противъ желтухи вслѣдствіе злоупотребленія *химм*: Merc., Bell., Calc., N.-vom.;—*ртутью*: Chin. или Нер., Lach., Sulph.;—*ревемя*: Cham., Merc..

Желудка размягченіе, Gastromalacia.

Еще ничего нѣтъ вѣрнаго о средствахъ противъ этой болѣзни, однакожъ при леченіи ея можно обратить вниманіе на: 1) Calc.; 2) Ant., Barut., Carb.-veg., N.-vom., Puls., Sulph..

Желудка разстройство, Indigestio.

§ 1. Средства противъ различныхъ видовъ разстройства желудка: 1) Ant., Arg., Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Arg., Bry., Carb.-veg., Chin., Coff., Нер., Ign., Natr., Staph..

§ 2. Если разстройство желудка произошло отъ простаго *обремененія* его, то часто бываетъ достаточно чашка черного кофе для устраненія первыхъ неприятныхъ признаковъ. Противъ послѣдовательныхъ страданій: 1) Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Arg., Arg., Bry.—При разстройствѣ желудка *у дѣтей*, кормимыхъ обильною и неудобоваримою пищею: 1) Ipec., Puls.; 2) Chin., N.-vom.—Разстройство желудка вслѣдствіе употребленія *жирной пищи*, свиного мяса, пирожковъ и т. д.: 1) Puls., 2) Carb.-veg.; 3) Ipec.—Вслѣдствіе употребленія *льда*, *фруктовъ* или другихъ веществъ, охлаждающихъ желудокъ: 1) Puls., 2) Arg., 3) Carb.-veg.—Вслѣдствіе неумѣреннаго употребленія *вина*: 1) Carb.-veg., N.-vom.; 2) Ant., Coff., Ipec., Puls.—Послѣ *краснаго вина*: Ant. или Puls.—При разстройствѣ желудка послѣ *вина*, *поджаряемаго сирю*: Puls.—Послѣ *уксуса*, *кислаго мяса* и другихъ *кислотъ*: 1) Acon., Arg., Carb.-veg., Нер.; 2) Lach., Natr., Sulph., Sulph.-ac.—Вслѣдствіе употреб-

ленія испорченнаго мяса или несъедобной рыбы: 1) Chin., 2) Puls., если древесный уголь въ видѣ порошка, смѣшаннаго съ водкою, оказался неудовлетворительнымъ. — *Послѣ соленыхъ веществъ*: 1) Garb.-veg., 2) Arg., 3) Nitr.-sp.

§ 3. При излозной боли вслѣдствіе разстройства желудка: Acon., Ant., Arn., Bry., Carb.-veg., Ipec., Puls.; — *гастрическихъ страданій*: 1) Ant., Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Arg., Ars., Bry.; 3) Alum. Berb., Magn.-c.; — *вспучиванію живота*: Asa, Carb.-veg., Chin., N.-vomch., N.-vom., Puls.; — *коликъ*: 1) N.-vom., Puls.; 2) Arg., Caps. Hep.; — *поносъ*: 1) Ipec., Puls.; 2) Coff., N.-vom.; — *сыни, находящейся на просовидную* или при крапивной сыни: 1) Ipec., Puls., Bry.; — *лихорадка*: 1) Bry., Caps. 2) Ant.

См. *Желудка страданія, Пищеваренія, слабость, Лихорадка гастрическая, Рвота, Боли живота, Поносъ.*

Желудка страданія, Gastritis.

§ 1. Противъ нихъ средства: 1) Acon., Ant., Arn., Ars., Bell., Bry., Cham., Coss., Ipec., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Caps., Carb.-v., Chin., Coff., Coloc., Dig., Hep., Rhab., Rhus, Squil., Tart., Veratr. 3) Asa., Asa., Calc., Cann., Cic., Cin., Colch., Con., Cupr., Daph., Dros., Ign., Lach., Lyc., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Rhab., Sec., Ser., Sil., Stann., Sulph.-ac., Tarax.

§ 2. Противъ гастрическихъ страданій, выражающихся *накопленіемъ кислоты въ желудкѣ* (кислымъ вкусомъ, кислою отрыжкой или рвотою), назначаются: 1) N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Bell., Calc., Caps., Carb.-v., Cham., Chin., Con., Phosph., Ser., Staph., Sulph.-ac. — Противъ *желчныхъ страданій*, выражающихся *горькимъ вкусомъ, отрыжкой или рвотою*: 1) Acon., Bry., Cham., Chin., Coss., Merc., N.-vom., Puls., Ser., Veratr.; 2) Ant., Ars., Asa., Asar., Cann., Coloc., Daph., Dig., Ign., Ipec., Lach., Sec., Staph., Tart. — Противъ *накопленія слизи въ желудкѣ*, выражающагося *слизью обложеннымъ языкомъ, слизистымъ вкусомъ и слизистою рвотою*: 1) Bell., Caps., Chin., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph., Veratr.; 2) Arg., Carb.-v., Cham., Cin., Dulc., Petr., Rhab., Rhus, Spig. — Противъ такъ называемаго *накопленія нечистоты въ желудкѣ* и страданій, отъ нихъ происходящихъ, причѣмъ испорченный вкусъ, отвращеніе отъ пищи и потеря аппетита: 1) Ipec., N.-vom., Puls.;

2) Ant., Aur., Ars., Bell., Bry., Carb.-v., Cham., Coff., Нер., Merc., Tart., Veratr..

§ 3. Противъ гастрическихъ страданій у *дѣтей*: 1) Bell., Cham., Ipec., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Bar.-c., Calc., Hyos., Lyc., Magn.-c., Sulph..—Противъ гастрическихъ страданій вслѣдствіе *обремененія желудка*: 1) Ant., Arn., Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Ars., Bry., Carb.-v., Chin., Coff., Нер., Sulph., Tart.; — вслѣдствіе *чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ*: 1) Carb.-v., N.-vom.; 2) Ant., Coff., Ipec., Puls.; — *кофе*: 1) Coss., Ign., N.-vom.; 2) Cham., Merc., Puls., Rhus, Sulph.; — *табаку*: Coss., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Staph.; — *кислой пици*: 1) Acon., Ars., Carb.-v., Нер.; 2) Lach., Natr.-m., Sulph., Sulph.-ac.; — отъ злоупотребленія *ромашки*: Puls. или N.-vom.; — *ревеня*: Puls.; — *ртуті*: Carb.-v., Chin., Нер., Sulph.; — отъ *разорженія тѣла*: Bry., Sil.; — *простуды*: Ars., Bry., Bell., Chin., Coss., Dulc., Ipec.; — простуды живота припадеиъ внутрь *льда, овощей* и т. д.: Ars.-v., Puls. и Carb.; — вслѣдствіе *наружныхъ поврежденій*, удара по животу или желудку, насады и т. п. 1) Arn., Bry., Rhus; 2) Puls., Ruta; — вслѣдствіе *нервнаго раздраженія*, послѣ постоянныхъ *ночныхъ бдній* или усиленныхъ умственныхъ занятій: 1) Arn., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Carb.-v., Coss., Ipec., Veratr.; — вслѣдствіе *ослабляющей потери соковъ*, какъ-то у женщинъ во время кормленія грудью, послѣ частой рвоты, или поносовъ: 1) Chin., Carb.-v., Ruta; 2) Calc., Lach., N.-vom., Sulph.; — послѣ *душевныхъ потрясеній*, гнѣва, огорченія, печали и т. д.: 1) Cham., Coloc.; 2) Acon., Bry., Chin., N.-vom., Puls..

Сравни. *Причины и Пищеваренія слабость.*

§ 4. При выборѣ средствъ по припадкамъ, надо замѣтить слѣдующее:

Асонитизмъ назначается въ слѣдующихъ случаяхъ: обложеніе языка *желтою корою*, горькій вкусъ во рту отъ *принятой пици* или *питья*, за исключеніемъ воды; необыкновенная тошнота, *юркая отрыжка*; сильное, но тщетное понужденіе на рвоту, или же *рвота юркая, желтоватая или слизистая*; напряженность и вздутость подреберья, болѣзненная чувствительность печени; запоръ или *малоколичественныя частыя испраженія съ натугою*;

бьющая или колючая боль головы, усиливающаяся при разговорѣ.

АНТИМОНІУМ—если вслѣдствіе несправности желудка замѣчаются: частая икота, потеря аппетита, отвращеніе отъ пищи, языкъ *обложенный* или покрытый пузырьками; сухость во рту, или накопленіе слюны или слюны во рту; сильная жажда, преимущественно ночью; тошнота и склонность ко рвотѣ, которая увеличивается отъ употребленія вина; *отрыжка* зловонная, или же съ *запахомъ и вкусомъ принятой пищи*; рвота принятою пищею или слизистыми и желчными веществами; чувствительность желудка при прикосновеніи и болѣзненное чувство полноты въ немъ; тупая боль головы, которая усиливается отъ куренія табаку и вхожденія на лѣстницу (послѣ Ant. часто умѣстна Gru.).

АВНІСА—не только противъ гастрическихъ страданій вслѣдствіе *наружныхъ поврежденій*, но и противъ тѣхъ, которыя происходятъ вслѣдствіе *ночныхъ бдѣній*, усиленныхъ умственныхъ занятій и вообще когда замѣчаются: нервная раздражительность, сухая или желтая борою обложенный языкъ; гнилостный горькій или кислый вкусъ; зловоніе изо рта; позывъ на кислыя вещества; отвращеніе отъ куренія табаку; отрыжка, ивѣющая вкусъ гнилыхъ яицъ; склонность ко рвотѣ, вѣтры и вздутость живота, преимущественно послѣ стола; тяжесть во всемъ тѣлѣ; пригибаніе колѣвъ къ животу; головокруженіе, чувство стигиванія головы съ давящею болью, жаромъ во лбу и оглушеніемъ. (Послѣ Agr. часто умѣстан: N.-vom. Cham.).

АВВЕНІСУМ — ѣдкая, горькая отрыжка; сухость языка съ *сильною жаждою на питье, поемному за-разъ*; *солонный* или горькій вкусъ во рту; *необыкновенная тишина или рвота принятою пищею или темноватыми, желчными, зеленоватыми веществами*; рѣзь въ животѣ; *острый боли въ желудкѣ и нижней части живота*; ознобъ и тоска, или сильное, жгучее давленіе на ограниченномъ, небольшомъ мѣстѣ въ желудкѣ; чувствительность желудка при оцупываніи; большая слабость и желаніе лежать; запоръ, или поносъ водянистыми, зеленоватыми, темноватыми или желтоватыми испражне-

нїямъ съ натугою; возобновленїе рвоты или поноса всякій разъ послѣ питья или движенїя.

VELLADONNA — языкъ, обложенный бѣловатою, желтоватою густою корою; отвращенїе отъ пищи и питья; кислый вкусъ отъ роженаго хлѣба; рвота пищею, или кислыми, юркими или слизистыми веществами, сопровождаемая постоянною тошнотою, сухостью во рту и жаждою; боль въ передней части головы съ чувствомъ, какъ-будто все стремится выйти вонъ черезъ лобъ; пульсація височныхъ артерїй; запоръ, или слизистый поносъ.

VEYONIA — мѣломъ или въ старую и слабую погоду, и когда при этомъ языкъ сухой, или обложенный бѣловатою или желтоватою корою, или покрытый пузырьками; днемъ и ночью постоянная жажда, съ чувствомъ сухости во рту и горлѣ; гнилостный запахъ изо рта; горькій вкусъ, преимущественно при пробужденїи отъ сна, или крахмальныи, травянистыи и гнилостныи; отвращенїе преимущественно отъ плотной пищи съ позывомъ на вино и князыя вещества; частое, но тщетное понужденїе ко рвотѣ, или желчная рвота, преимущественно послѣ питья; напряженность и полнота въ желудкѣ, послѣ стола; запоръ, стягиванїе головы съ головокруженїемъ, или жгучими, давящими или разжимающими болями въ ней; ожесточенїе ихъ послѣ питья; ознобъ и дрожь.

SNAMOMILLA — если при гастрическихъ страданїяхъ: языкъ красный и покрытъ трещинами и желтоватою корою; юркій вкусъ во рту и отъ пищи; зловонїе изо рта; потеря аппетита, тошнота или отвращенїе и зеленоватая, кислая или юркая рвота; большая тоскливость, напряженность и давленїе подъ ложечкою, въ подреберьяхъ и верхней части живота; запоръ или поносъ зеленоватыми испражненїями; поносы кислаго запаха, или изверженїя вала и слизи, проходя на рубленныя яйца; безпокойный сонъ, причемъ больной мечется въ различныя стороны и безпрестанно пробуждается; боль и чувство полноты въ головѣ; красное и горячее лицо; красныя и блестящїе глаза; чувствительное, недовѣрчивое расположенїе духа. (Если больной во зло употреблялъ ромашку, то она замѣняется: *Soss.* или *Puls.*).

COSSULUS: языкъ покрытъ желтою корою; отвращенїе отъ пищи; сухость во рту съ жаждою или безъ нея; вонючая отвращенїе, тошнота и склонность ко рвотѣ, преимущественно при раз-

говорѣ, послѣ стола, во время ѣды, или при движеніи, а въ особености во время ѣды въ экипажѣ; полнота съ болью въ желудкѣ и затрудненное дыханіе; запоръ, или мигкія испражненія съ зудомъ въ заднемъ проходѣ; большая слабость и потъ при маѣльшемъ движеніи; боль во лбу и головокруженіе.

IRESAQUANA — языкъ чистый или покрытый желтоватою слизью, съ сухостью во рту; отвращеніе отъ всякой пищи, а въ особености отъ жирной; позывъ на рвоту; сильное, но тщетное понужденіе ко рвотѣ, или рвота легкая и съ большою быстротою, извергающая принятую пищу или слизистыя вещества; зловоніе изо рта, горькій вкусъ во рту и отъ всякой пищи; сильныя боли, давленіе и полнота въ желудкѣ; рѣвъ въ животѣ и поносъ испражненіями желтоватаго цвѣта и вонючаго, гнилостнаго запаха; ознобъ и дрожь во всемъ тѣлѣ; блѣдный, желтоватый цвѣтъ лица; боль во лбу, или чувство, какъ-будто всѣ кости черепа разбиты.

MERCURIUS — языкъ влажный, покрытый бѣлою или желтоватою корою; сухія и горячія губы; противный, зинлостный или горькій вкусъ; тошнота съ позывомъ на рвоту, или настоящая рвота слизью, или желчью; чувствительность надчревной части и живота, въ особености ночью; тоска и безпокойство; сомнѣность днѣмъ и бессонница ночью; жажда, иногда съ отвращеніемъ отъ питья. (Часто умѣстенъ послѣ Bell).

NUX VOMICA — сухой и бѣлый языкъ, или же у основанія имѣющій желтоватый цвѣтъ; отсутствіе жажды, или жгучая жажда съ изгагою; накопленіе бѣзиковатой слизи или воды во рту; горькій или зинлостный вкусъ во рту; отсутствіе вкуса во всякой пищѣ; горькая отрыжка; постоянная тошнота, въ особености на воздухѣ; наклонность ко рвотѣ и настоящая рвота принятою пищею; давленіи сназмы желудка; болѣзненное давленіе, напряженіе во всемъ надчревьѣ и подреберьяхъ; запоръ съ частымъ, но тщетнымъ понужденіемъ на низъ; тяжесть въ головѣ, особенно въ затылкѣ; звонъ въ ушахъ; ревматическія боли въ зубахъ и членахъ; усталость и изнеможеніе въ тѣлѣ; невозможность размышлять; безпокойное, сварливое расположеніе духа; горячее и красное, или желтоватое и землистогрязнаго цвѣта лицо. (Послѣ N. vom. часто умѣстна Cham.).

PULSATILLA — языкъ, обложенный бѣловатою слизью; зин-

лостный, травянистый, протисный или горькій вкус, преимущественно послѣ глотанья; отрыжка кислая, гнилостная, пѣнящая вкусъ принятой пищи; отсутствіе вкуса во всякой пищѣ; *отвращеніе отъ пищи*, преимущественно отъ теплой (пареной), а также отъ жирной и мяса; позывъ на кислыя вещества и спиртные напитки; накопленіе кислотъ и острыхъ веществъ въ желудкѣ; ослизненіе желудка; *обратное восхожденіе пищи въ ротъ*; *невыносимая тошнота и наклонность ко рвотѣ*, преимущественно послѣ принятія пищи или питья; ухудшеніе къ вечеру; *рвота пищею или слизью, кислая или горькая*, въ особенности ночью; твердый, напряженный животъ съ накопленіемъ вѣтровъ, перекачиваніемъ, и урчаньемъ въ немъ; медленное, натужное испражненіе навизъ; *слизистый или осалчмый поносъ*; терзающія и дергающія боли въ одной половинѣ головы; ознобъ, сопровождаемый усталостью и потяготою; дурное расположеніе духа, молчаливость и склонность сердиться за всякую бездѣлицу, въ особенности у особъ нѣжнаго и кроткаго характера.

§ 5. Изъ прочихъ средствъ, можно еще употреблять: *С а р з і с и м* — флегматическимъ, лѣнивымъ субъектамъ, или же людямъ недовѣрчиваго характера, принимающимъ все въ дурную сторону, если у нихъ замѣчаются слизистыя испражненія, изгара, жженіе въ желудкѣ и ваднемъ проходѣ при всякомъ испражненіи на низъ. — *С а в в о - в е г*. — при потерѣ аппетита, нездоровьѣ или рвотѣ принятою пищею даже послѣ очень умѣреннаго стола, накопленіи кислотъ въ желудкѣ; при боляхъ желудка, давленіи въ предсердїи, большой чувствительности въ *холодной* или *жаркой, сухой* или *влажной* погодѣ; тяжести и усталости головы. — *С н і н а* — когда замѣчаются: потеря аппетита и отвращеніе отъ пищи и питья, какъ-будто вслѣдствіе пресыщенія; частая отрыжка и даже рвота пищею; чувствительность и напряженность живота съ давленіемъ около пупка; частое испусканіе вонючихъ вѣтровъ; лиентерія; ознобъ и дрожь послѣ питья. — *С о р г е а* — если гастрическія страданія сопровождаются раздраженіемъ нервной системы и бессонницею. — *С о л о с у н т н і с* — при спазмахъ желудка, рвотѣ или поносѣ непосредственно послѣ принятія даже умѣреннаго количества

пищи; судорожная колика, судороги въ нѣрахъ.—*Digitalis*—при тошнотѣ, преимущественно по утрамъ, при пробужденіи, и горькомъ вкусѣ во рту; жаждѣ, слизистой рвотѣ, поносѣ и большой слабости.—*Nerv.*—при давящихъ боляхъ желудка съ тошнотою, отрыжкой, наклономъ ко рвотѣ, или слизистой или кислой рвотою и изгаюю; колика и запоръ, или поносъ слизистыми испражнениями.—*Rh. a. v. v. v.*—при противномъ вкусѣ, отвращеніи отъ жирной пищи и кофе, тошнотѣ съ коликою, или поносѣ съ испражненіемъ веществъ кислаго запаха, или веществъ слизистыхъ, темноватаго цвѣта.—*R. n. v.*—если гастрическіе признаки обнаруживаются преимущественно по ночамъ и сопровождаются коликою, давящею болью въ желудкѣ, сухостью и горечью во рту, тошнотою и наклономъ ко рвотѣ.—*Squilla*—когда гастрическія страданія сопровождаются колотьемъ въ бокахъ и когда противъ этого состоянія *Asop.* и *Vru.* оказались мало полезными.—*T. a. t. a. v. u. s.*—при постоянной тошнотѣ и склонности ко рвотѣ, сильной тоскливости, или *сильномъ, но тщетномъ понужденіи на низъ*.—*V. e. v. a. t. u. m.*—когда языкъ покрытъ желтою или темноватою корю и замѣчаются желчныя изверженія низомъ или, рвотою, сопровождаемая большою слабостью и приступами обморока послѣ испражненія на низъ.

См. также: *Аппетитъ, Рвота, Изгана, Желудка слабость, Спазмы желудка, Боли живота, Поносъ, Лихорадка гастрическая.*

Желѣзо и его препараты, вредъ отъ злоупотребленія ихъ.

Въ большей части случаевъ: 1) *Chin., Ner., Puls.*; 2) *Arg., Arg. Bell., Ipec., Merc., Veratr.*

Живота вздутіе и страданія отъ накопленія вътровъ, *Tumpanitis.*

Лучшія средства: 1) *Asa., Chin., N.-vom., Puls., Sulph.*; 2) *B.-ll., Carb.-v., Cham., Cocc.*; 3) *Arg., Calc., Caps., Col. h., Coloc., Ferr., Graph., Lyc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Phosph., Veratr. Zinc.* Если страданіе появляется послѣ употребленія *пучащей пищи*, то назначается *Chin.*; затѣмъ иногда также приличны: *Vru., Calc., Kal., Lyc., Petr., Puls., Sep., Veratr.* Если же оно

обнаруживается *послѣ питья*, то N.-vom., или также Chin., Soss. Ferr., Veratr.. *Послѣ употребленія свиного мяса*, или другой какой-либо *жирной пищи*: 1) Chin., Puls.; 2) Carb.-v., Colch., Natr.-m..

При *накопленіи и частомъ испусканіи вѣтровъ*, назначаются: Agar., Carb.-v., Chin., Graph., Kal., Lach., Lys., Nitr.-ac., N.-vom., Phos., Phos.-ac., Plumb., Staph., Sulph..—При *спираниіи и задержаніи вѣтровъ*, Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Con., Graph., Her., Jod., Kal., Lach., Lys., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Sil., Sulph..—Если боли ожесточаются *по утрамъ*: Alum., Asa., Bar., Carb.-an., Caust., Cham., Magn.-arct., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph..—При *урчаніи, ворчаніи, пережатываніи вѣтровъ*: Agar., Ant., Arg., Bry., Canth., Carb.-v., Caust., Chin., Hell., Ign., Lys., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sæsar., Ser., Sulph., Veratr..—При *испусканіи обильныхъ вѣтровъ*: Agar., Canth., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Graph., Hell., Kal., Lys., Mang., Merc., Nitr.-ac., Oleand., Phos., Plumb., Veratr..—При *испусканіи вѣтровъ безъ всякаго запаха*: Amb., Bell., Carb.-v., Lys..—При *вѣтрахъ очень зловонныхъ*: Arg., Arg., Asa., Calc., Carb.-v., Ign., Oleand., Puls., Sulph..—При *вѣтрахъ съ запахомъ ишимакъ маръ*: Arg., Coff., Sulph., Tart., Teucr..—Если вѣтры *влажны и теплы*: Carb.-v., Chin..—Если они *горьки*: Acon., Cham., Phos., Staph., Zinc..—Если они *холодны*: Con..—Если они *пахнутъ чеснокомъ*: Agar., Asa., Mosch., Phos..—Если *пахнутъ кислотой*: Arg., Calc., Cham., Graph., Her., Magn.-c., Merc., Natr., Natr.-m., Rhab., Ser., Sulph..—Если *отходятъ съ шумомъ*: Lach., Merc., Squil., Teucr., Zinc..

Жировой или колбасный ядъ.

Лучшее средство противъ этого сильнаго яда, который часто развивается въ дурно сохраняемыхъ колбасахъ или другомъ свиномъ мясѣ, по Герингу, составляетъ уксусъ, растворенный въ равномъ количествѣ воды и даваемый внутрь въ видѣ питья и полосканья. Въмѣсто уксуса можно взять лимоннаго соку, а если эта кислота противна больному, то дать ее съ сахаромъ, или замѣняютъ чернымъ кофе, а еще лучше вѣрнее чернымъ чаемъ.

Если послѣ употребленія этихъ средствъ сухость во рту не исчезаетъ, а клястеры изъ слизистыхъ веществъ не могутъ вызвать испражненія на нлзь, то часто оказываетъ помощь Вгу. Страданія, остающіяся послѣ употребленія Вгу., часто устраниются посредствомъ Phos.-ac., а при существующемъ параличѣ или исхуданіи, предпочитаютъ Arg. или Kreos..

3.

Заиканіе, затрудненная рѣчь, нѣмота, Psellusmus, Haesitatio linguae, Mutitas.

§ 1. Средства вообще: 1) Bell., Caust., Con., Dulc., Euphr., Hyos., Lach., Laur., Merc., N.-vom., Op., Stram., Sulph.; 2) Acon., Amm., Apac., Вгу., Calc., Cann., Carb.-an., Carb.-veg., Chin., Cic., Cupr., Нер., Lyc., Mez., Natr.-m., Oleand., Plumb., Ruta., Sec., S.l., Stann., Thuj., Veratr..

§ 2. Изъ нихъ въ частности: Отъ *затрудненной рѣчи*, заиканія, заиканія и т. д.: 1) Bell., Caust., Dulc., Euphr., Graph., Lach., Merc., Natr., N.-vom., Sulph., Stram.; 2) Acon., Arg., Cic., Con., Natr.-m., Op., Ruta, Sec., Stann.; 3) Apac., Arg., Calc., Cann., Carb.-an., Carb.-veg., Нер., Lyc., Oleand., Plumb., Thuj., Veratr.; — противъ *неловкости*, выговора въ носъ: Alum., Bell., Вгу., Lach., Lyc., Phos.-ac., Sil., Staph.; — противъ *совершенной нѣмоты*: 1) Dulc., Euphr., Hyos., Lach., Laur., Merc., Op., Plumb., Stram.; 2) Bell., Caust., Chin., Cic., Con., Cupr., Euphr., Oleand., Ruta, Sec., Veratr..

§ 3. Если это состояніе находится въ связи съ *воспаленіемъ органовъ рѣчи*: 1) Acon., Bell., Cann., Dulc., Lach., Merc., N.-vom., Sulph.; 2) Alum., Arg., Вгу., Calc., Canth., Нер., Lyc., Natr.-m., Sil., Staph. — Если причину порока составляютъ *судороги*: 1) Bell., Canth., Hyos., Op., Stram., Veratr.; 2) Cic., Con., Cupr., Lach., Laur., Ruta, Sec., — если же *параличь*: 1) Bell., Caust., Dulc., Euphr., Graph., Hyos., Lach., Laur., N.-vom., Natr.-m., Stram.; 2) Canth., Carb.-veg., Chin., Stann., Staph., Zinc..

Срвн. *Воспаленіе гортани, Судороги, Параличь.*

Запоръ на низъ, Constipatio alvi.

§ 1. Запоръ на низъ обыкновенно составляетъ симптомъ другой болѣзни и почти никогда надолго не устраняется, если мы не знаемъ настоящей его причины. Но такъ какъ онъ составляетъ припадокъ довольно тягостный, очень часто встрѣчается при болѣзняхъ и иногда даже принимаетъ видъ самостоятельнаго страданія, то онъ при выборѣ средствъ заслуживаетъ особеннаго вниманія врача. Средства вообще: 1) Bry., Calc., Cocc., Lach., Lyc., N.-vom., Op., Plumb., Serp., Sil., Staph., Sulph., Veratr; 2) Alum., Bell., Cann., Canth., Carb.-v., Caust., Cop., Graph., Kal., Kreos. Merc., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Puls., Sassa., Sulph.-ac., Zinc.

§ 2. Противъ запора, *вдругъ явившагося*: 1) Bry., N.-vom., Op.; 2) Cann., Lach., Merc., Plat., Puls., Sulph.-ac., Zinc. — Противъ *расположенія къ запору, или привычнаго запора*: Bry., Calc., Caust., Graph., Lach., Lyc., Serp., Sulph.

§ 3. Противъ запора у ведущихъ *сидячую жизнь*: Bry., N.-vom., Sulph.; 2) Lyc., Op., Plat.; — у *пьяницъ, или людей, предавшихъ употребленію спиртныхъ напитковъ*: Calc., Lach., N.-vom., Op., Sulph.; — вследствие *поносовъ, или употребленія слабительныхъ*: 1) N.-vom., Op.; 2) Ant., Lach., Ruta.; — у *стариковъ, часто смѣняющагося поносомъ*: 1) Ant., Op., Phosph.; 2) Bry., Lach., Rhus, Ruta.; — у *беременныхъ*: 1) N.-vom., Op., Serp; 2) Alum., Bry., Lyc.; — у *роженницъ*: Ant., Bry., N.-vom., Plat.; — у *трудныхъ дѣтей*: 1) Bry., N.-vom., Op.; 2) Alum., Lyc., Sulph., Veratr.; — *вслѣдствіе долгой пѣды въ экипажѣ*: 1) Plat.; 2) Alum., Op., Magn.-arct.; — *вслѣдствіе отравленія свинцомъ*: Alum., Op., Plat.

§ 4. При запорѣ, сопровождающемся частыми *позывами на низъ*: 1) Caps., Cop., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Serp., Sulph; 2) Arn., Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Cocc., Graph., Ign., Kal., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Puls., Sil., Staph., Veratr, Zinc. При совершенномъ *отсутствіи позыва на низъ, какъ-бы вслѣдствіе медлительности кишекъ*: 1) Alum., Chin., Herp., Kal., Natr.-m., N.-vom., Staph., Thuja., Veratr.; 2) Acon., Arn., Bry., Carb.-v., Cocc., Graph., Ign., Lyc., Magn.-m., Natr.-m., N.-mosch., Op., Petr., Rh. d., Ruta, Serp., Sil., Staph., Sulph. — При *чрезмѣрной твердости кала*: 1) Amm., Ant., Bry., Calc., Carb.-v., Guaj., Lach., Magn.-m., Op., Plumb.

Sep., Sil., Sulph.; 2) Alum., Bry., Carb.-an., Caust., Guaj. Kal., Lyc., Magi.-arct., Magn.-c., Merc., N.-vom., Puls., Petr., Rhus, Ruta, Spong., Staph., Sulph.-ac., Thuj. — При испражнении кала въ видѣ *шпичекъ, узлавъ, или похожего на бараний*: 1) Alum., Magn.-m., Merc., Op., Sep., Sil., Sulph.; 2) Amm., Baryt., Carb.-an., Caust., Graph., Kal., Lach., Mang., N.-vom., Petr., Plumb., Stann., Sulph.-ac., Thuj., Verb. — При испражнении кала *чрезвычайно толстой формы*: 1) Bry., Calc., Kal., Magn.-arct., N.-vom.; 2) Aur., Graph., Ign., Magn.-m., Merc., Stann., Sulph.-ac., Thuj., Veratr., Zinc. — При испражнении *очень тонкою кала*: Caust., Graph., Hyos., Merc., Mur.-ss., Natr., Puls., Sep., Staph. — При недостаточномъ или мало-количественномъ испражнении: 1) Alum., Arn., Calc., Graph., Lyc., Magn.-m., Natr., N.-vom., Sep., Sil., Sulph.; 2) Ars., Baryt., Cham., Chin., Lach., Ruta, Stann., Staph., Zinc.

§ 5. По совокупности признаковъ, надо замѣтить:

ВѢТОНІА пригодна преимущественно *лѣтнимъ и особамъ*, расположеннымъ къ ревматизму, или когда запоръ происходитъ отъ несправности желудка и сопровождается *зябкостью, напоромъ крови къ голове и болемъ съ ней*; раздражительнымъ и вообще цыликаго характера особамъ.

ЛАСНЕЗИС — при упорномъ запорѣ, сопровождающемся давлениемъ въ желудкѣ и тщетнымъ позывомъ на отрыжку.

МЕРКУРИУС — когда запоръ сопровождается дурнымъ вкусомъ во рту, болемъ въ деснахъ; причемъ однакожъ аппетита не потерянь. (Если въ этомъ случаѣ Merc. оказался мало дѣйствительнымъ, то Staph.).

НАТРИУМЪ МУРІАТИСУМЪ — при самыхъ упорныхъ запорахъ, когда всѣ употребленные средства остались безъ успѣха, въ особенности когда нѣтъ ни малѣйшаго позыва въ низъ, вслѣдствіе совершенной недѣятельности кишекъ.

НУХЪ УОМІСА — *противъ запора у людей млахондрическихъ, или страдающихъ меланхолическимъ, а также когда запоръ произошелъ вслѣдствіе обильнаго обѣда, расстройства желудка и т. д., а преимущественно, когда къ запору присоединяются: потеря аппетита, тошнота, вздутость и напряженность живота, съ чувствомъ давления и тяжести въ немъ; жаръ въ лицѣ; напоръ крови къ голове и болемъ съ ней; нерасположеніе къ привычнымъ занятіямъ; тревож-*

ный сонъ; тоскливость, давленіе въ животѣ; дурное расположеніе духа; *ощущеніе, какъ-будто задній проходъ запертъ или суженъ и частый, но тщетный позывъ на низъ.*

Opium — противъ *ощущенія суженія задняго прохода*, но не сопровождающагося частымъ позывомъ на низъ; бѣшеніе и тяжесть въ животѣ; давящія слизны желудка, сухость во рту, потеря аппетита, *напоръ крови къ голове и боль въ ней; краснота лица.*

Platina — если, несмотря на напряженія больного, непривожненіе очень скудно; частое понужденіе на низъ; свербеніе въ заднемъ проходѣ послѣ всякаго испражненія; дрожь и слабость въ животѣ; стигивающая боль въ животѣ; давленіе и боль желудка и тщетный позывъ на отрыжку.

Pulsatilla — часто тамъ, гдѣ *N.-vom.* имѣла мѣсто, равно когда запоръ встрѣчается у особъ кроткаго, холоднаго и флегматическаго темперамента, или произошелъ отъ засоренія желудка послѣ употребленія слишкомъ жирной пищи и сопровождается угрюмымъ расположеніемъ духа, скупостью на слова и знобомъ.

Serica — преимущественно женскому полу или лицамъ, подверженнымъ ревматизму, а также въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ *N.-vom.* или *Sulph.* имѣли мѣсто, но остались безъ успѣха.

Sulphur — большею частію при привычномъ запорѣ, преимущественно послѣ *N.-vom.*, у ипохондрикковъ, или людей, страдающихъ геморроемъ, а въ особенности тамъ, гдѣ замѣчаются *частый, но тщетный позывъ на низъ, спрание вѣтровъ, неловкость въ тѣлѣ, вздутость живота, нерасположеніе къ умственнымъ занятіямъ.*

Зобъ, Struma: 1) *Jod., Spong.; 2) Amb., Amm., Calc., Caust., Her., Lyc., Catr.-m., Staph.; 3) Carb.-an., Con., Dig., Kal., Magn.-c. Merc., Petr., Phosph., Plat., Sil., Sulph.*

Золотуха, Scrophulosis.

§ 1) Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленія противъ различныхъ явленій этой болѣзни вообще: 1) *Arg., Asa., Baryt., Bell., Calc., Chin., Cin., Con., Her., Jod., Lyc., Merc., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Aur.-mur., Carb.-an., Carb.-v., Cist., Dulc., Graph., Lach., Kreos., Pin., Staph.; 3) Amb., Amm., Bar.-m., Bry-*

Chin., Calc., Ferr., Ign., Magn.-с., Mez., Mur.-ас., Natr., Natr.-м., Nitr.-ас., N-вом., Phosph., Petr., Puls., Ran., Rhab., Sep., Veratr..

§ 2. *Въ началъ болѣзни, когда дѣти не скоро начинаютъ ходить:* 1) Bell., Calc., Sil., Sulph.; 2) Ars., Chin., Cin., Ferr., Lys., Magn., Pin., Puls., Rhab., Sep.—*Во второмъ періодѣ, когда уже желѣзы поражаются болѣзью:* 1) Baryt., Bell., Calc., Cist., Cop., Dulc., Her., Lys., Merc., Nitr.-ас., Phosph., Phos.-ас., Sil., Staph., Sulph.; 2) Ars., Bry., Carb.-ан., Clem., Graph., Kal., Natr., N-вом., Puls.—*Наружная страданія* (сыпи, лишая, язвы и т. д.) лечатся преимущественно посредствомъ: 1) Aur., Baryt., Calc., Cist., Clem., Cop., Dulc., Her., Lys., Merc., Mur.-ас., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Canth., Kal., Mez., Nitr.-ас., Ol.-жес., Petr., Ran.—*Противъ страданій костей*, главными средствами считаются: 1) Aur., Calc., Cist., Lys., Merc., Phosph., Phos.-ас., Puls., Sil., Sulph.; 2) Asa., Bell., Her., Mez., Nitr.-ас., Rhus, Ruta, Sep., Sulph.—*Противъ увеличеннаго объема живота у золотушныхъ дѣтей:* 1) Sulph.; 2) Ars., Baryt., Bell., Chin., Cin., Lys., N-вом., Puls., Rhus.

§ 3. По припадамъ, назначаются:

ARSENICUM при атрофіи и необыкновенномъ исхуданіи, опухоли шейныхъ и затылочныхъ желѣзъ, твердости и вздутіи живота; одутлость лица; большая слабость и постоянная охота лежать; блѣдная одутлость; лишая, струповидные пузыри и язвы; воспаление глазъ; парша на головѣ; раковидные недуги.

ASA — нарощенія на костяхъ, костоѣда, искривленіе костей, припухлость желѣзъ; истеченіе изъ ушей, воспаление глазъ; язвы въ носу, или воспаление и опухоль носа.

BARYTA — опухоль и затвердѣніе шейныхъ и затылочныхъ желѣзъ; одутлость тѣла и лица; твердый и увеличенный въ объемѣ животъ; *мышечная и умственная слабость*; сухая парша и струпы на головѣ; воспаление глазъ или въѣзъ; лишая на лицѣ; частая боль горла; большая склонность къ простудѣ.

BELLADONNA — твердость, припухлость и изъязвленіе желѣзъ; слабость мышечная, вслѣдствіе которой дѣти поздно начинаютъ ходить; *септиболѣзнь, воспаление глазъ и стѣкъ*; кашель съ слизистымъ хрипомъ; истеченіе изъ ушей; исхуданіе и атрофія; язвы, воспалительная опухоль носа; опухоль губъ; частое кровотеченіе изъ носу; раковидныя страданія; *блѣдная одутлость, частое вос-*

наленіе юрла, сопровождаемое опухолью; астматическія страданія; увеличенный въ объемъ и твердый животъ; неправильное мочеотдѣленіе и *непроизвольное мочеиспусканіе въ постели*; раннее развитіе ума; голубые глаза и бѣлокурные волосы.

СALСАВЕА — увеличенный объемъ черепа, позднее закрываніе родничковъ, искривленіе позвонковъ, или другія *различныя страданія*; лишай, парша на головѣ, корки отъ сыпи на лицѣ; твердая, или гноящаяся *опухоль железъ*, язвы, наросты на костяхъ, или косточка; твердость и увеличенный объемъ живота и *опухоль брюшечныхъ железъ*; сильное исхуданіе и прожорливость; худощавое и старообразное, морщинистое лицо и тусклые глаза; сухая и поблеклая кожа; трудность хожденія; трудное прорѣзываніе зубовъ; воспаленіе вѣкъ; истеченіе изъ ушей; *красная опухоль носа*; припухлость верхней губы; частое кровотеченіе изъ носу; блѣдная одутливость; запоръ, или частый поносъ.

СІНА — *листая болѣзнь*; блѣдность лица, исхуданіе; большая прожорливость и недержаніе мочи.

СОНИУМ — *запалы и затвердѣнія железъ*; лишай, воспаленіе глазъ, *сыпоболѣзнь*; катарръ легкихъ, *сухой кашель*; астматическія страданія; раковидные недуги.

НІРАВ — блѣдная одутливость, сопровождающаяся отвердѣніемъ или нагноеніемъ железъ; атрофія; парша на головѣ; лишай; *воспаленіе мазъ*; *ушная течь*; припухлость носа, или верхней губы; раковидныя язвы; расположеніе къ флегмонозному воспаленію зѣва, насморку и кашлю; расположеніе кожи къ изъязвленію. (Часто умѣстно послѣ или до употребленія: Bell., Sil., Lach. Merc.).

ІОДИУМ — при необыкновенномъ исхуданіи, *опухами и затвердѣніи железъ* и пораженіи всей лимфатической системы; рахитизмъ; воспаленіе глазъ и вѣкъ; воспаленіе и течь изъ ушей; блѣдная одутливость лица; припухлость брюшечныхъ железъ; частый насморкъ.

ЛУСОРОДИУМ — при опухоли и нагноеніи железъ; расположеніи къ насморкамъ, катаррамъ и другимъ слизистымъ отдѣленіямъ; воспаленіи, искривленіи и другихъ страданіяхъ костей; атрофіи; сыпяхъ, похожихъ на лишай, и язвахъ; паршѣ на волосистой части головы; воспаленіи глазъ; воспаленіи ушей и ушной

течи; *блѣдной одутливости лица*; частомъ воспаленіи зѣва; упорномъ запорѣ.

MERCURIUS—при *болѣзненномъ питаніи, болшией слабости душевной и тѣлесной*, расположеніи къ простудѣ, поту, насморку, и другимъ слизистымъ отдѣленіямъ; *блѣдной одутливости лица; опухолю и нагноеніи железъ*; рахитизмѣ, наростахъ на костяхъ, искривленіяхъ, костоѣдѣ и другихъ недугахъ костей; сыняхъ разѣдающихъ, или лишаяхъ, образующихъ корки; паршѣ на головѣ, сухихъ коркахъ на лицѣ, воспаленіи глазъ, вѣкъ, ушей и ушной течи; часто повторяющемся воспаленіи зѣва, *слизистыхъ поносахъ*. (Часто умѣстенъ послѣ или до употребленія Bell., Dulc., Jod., Rhus).

RHUS—при опухолю железъ; паршѣ на головѣ; лишаяхъ на лицѣ и другихъ гнойныхъ и корки образующихъ сыняхъ; исхуданіи, твердости и вздутости живота; частыхъ насморкахъ; воспаленіи глазъ; ушной течи; частыхъ поносахъ. (Часто умѣстенъ послѣ Merc.).

SILICEA—*противъ опухолю и нагноенія железъ*; наростовъ на костяхъ; искривленія и другихъ недуговъ костей; *блѣдной одутливости*; раковидныхъ недуговъ; расположенія кожи къ язвѣ; опухоли носа или верхней губы; парши на волосистой части головы; ушной течи. (Часто прилично послѣ Lys., Ner. или Sulph.).

SULPHUR—почти во всѣхъ случаяхъ вначалѣ леченія, когда при этомъ замѣчаются: *сыни, лишая, припухлость или отвердненіе железъ*; расположеніе къ простудѣ, поносамъ и коликамъ, или къ запору, а также къ насморку и другимъ слизистымъ отдѣленіямъ; легко возбуждаемнй и обильный потъ; трудное привыканіе ходить; *воспаленіе глазъ и вѣкъ; ушная течь; блѣдная одутливость лица*. (Если это средство не было употреблено въ самомъ началѣ, то оно прилично послѣ Bell., Merc., Jod., Rhus).

§ 4. Изъ прочихъ средствъ, съ успѣхомъ употребляемы были также:

AURUM MURIATICUM—противъ корокъ и язвъ на носу и губахъ. — **CALVO AN. ET VEG.**—противъ опухоли и затвердненія железъ. — **CISTUS**—противъ опухоли и нагноенія железъ, наривовъ, течи изъ ушей, костоѣды челюсти. — **DULCAMAHA**—про-

тивъ опухоли, отвердѣнія и нагноенія железъ. — **Guarrites** — противъ лишаявъ, воспаленія глазъ, язвъ, опухоли, затвердѣнія и нагноенія железъ. — **Квасцотум** — противъ опухоли железъ, воспаленія глазъ, лишаявъ. — **Ласкевис** — противъ опухоли железъ, воспаленія глазъ, воспаления и опухоли зѣва; язвъ. — **Нух жуеланс** — особенно при страданіи кожи и железъ. — **Рікус** — противъ слабости сочлененій, вслѣдствіе котораго дитя поздно начинаетъ ходить. — **Старпусагвіа** — противъ опухоли, затвердѣнія или нагноенія железъ; частаго насморка и изъязвленія ноздрей; расположенія кожи къ изъязвленію; увеличеннаго объема живота у золотушныхъ дѣтей; исхуданія.

Сравн. *Атрофія, Болѣзнь костей, Рахитизмъ, Воспаленіе глазъ, Ушная течь, Лишай, Язва.*

Зрѣнія слабость, Amblyopia, уменьшеніе зрительной способности и болѣзненные ея измѣненія.

§ 1. Слабость зрительной способности, начиная отъ неясности зрѣнія до совершенной слѣпоты, происходитъ отъ многоразличныхъ внѣшнихъ вліяній и бываетъ въ связи со многими безпорядками въ цѣломъ организмѣ; поэтому нѣтъ ни одного средства, которое не оказалось бы полезнымъ противъ этого недуга въ различныхъ данныхъ случаяхъ. Мы ограничились изложеніемъ однихъ только дѣйствительнѣйшихъ и существеннѣйшихъ средствъ, причемъ изложены и показанія для нихъ, такъ что во всякомъ данномъ случаѣ легко найти вѣрную точку опоры для выбора.

Лучшія средства противъ различныхъ случаевъ слабости зрѣнія вообще: 1) *Aug., Bell., Calc., Caust., Chin., Cic., Cin., Dros., Hyos., Merc., Nat.-m., N.-vom., Phos., Puls., Ruta, Sep., Sil., Sulph., Veratr.*; 2) *Agar., Cann., Caps., Con., Croc., Dig., Dulc., Euphr., Guaj., Kal., Lach., Lyc., Magu., Natr., Nitr.-ac., Op., Plumb., Rhus, Sec., Spig., Tart., Zinc.* — Противъ *амблиопіи* (слабой зрительной способности), по сдѣланнымъ опытамъ, считаются главными средствами: 1) *Anac., Bell., Calc., Caps., Cin., Croc., Hyos., Lyc., Magu. Puls., Ruta, Sep., Sulph.*; 2) *Cann., Caust., Natr., Natr.-m., Phos., Plumb.* — Противъ *амблиопіи амавротической* (начинающейся темной воды): *Aug., Bell., Calc., Caps., Caust., Chin., Cic., Con., Dros.,*

Dulc., Hyos., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Op., Phos., Puls., Rhus, Sec., Sep., Sil., Sulph., Veratr.; 2) Agar., Caps., Cin., Dig., Euphr., Guaj., Kal., Lach, Lyc., Plumb., Zinc.. — Противъ той степени амаврозы, при которой извлечение еще возможно, употребляются тѣ же средства, какія вычислены при амблиопи амавротической, причемъ однако выборъ ихъ опредѣляется не степенью недуга, но совокупностію симптомовъ. Если особенныхъ второстепенныхъ симптомовъ не имѣется, то слѣдуетъ обратиться къ болѣе испытаннымъ противъ этого недуга средствамъ, какъ напр.: Bell., Calc., Merc., Phos., Sep., и Sulph.. Во всякомъ случаѣ, не увлекаясь, нужно тотчасъ замѣнить ихъ другими средствами, какъ скоро этого будетъ требовать общее состояніе больного. — Противъ эретической амаврозы: Bell., Calc., Cin., Cop., Hyos., Merc., Nitr.-ac., Op., Phos., Sep., Sulph.. — Противъ тортидной: Aug., Caps., Caust., Chin., Dros., Dulc., Natr., Natr.-m., Op., Phos.-ac., Plumb., Sec., Veratr..

§ 2. Относительно наружныхъ причинъ, уменьшающихъ зрительную способность, должно замѣтить, что, если слабость зрѣнія произошла отъ занятій *мелкою работою*, то предпочитаютъ: 1) Bell., Rut., Carb.-veg., Calc., Spig.; 2) Если причиною служила *ослабляющая потеря соковъ, чрезмерное удовлетвореніе половой похоти*: 1) Chin.; 2) Anac., Calc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Sulph. 3) Phos.-ac. — У лицъ, предавшихся *пьянству*: Chin., Calc., Lach.; N.-vom., Op., Sulph.. — Послѣ *простуды глазами или слезъ*: 1) Bell., Dulc.; 2) Cham., Euphr., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.. — Если причину составляли *наружныя поврежденія*, напр. ударъ по *головѣ*, сильное сотрясеніе: 1) Arn.; 2) Cop., Euphr., Rhus, Rut., Staph.. — У людей *пожилыхъ*: Aug., Bar., Cop., Op., Phos., Sec.. — У *золотушника субъектовъ*: 1) Bell., Calc., Chin., Cin., Dulc., Merc., Sulph.; 2) Aug., Euphr., Her., N.-vom., Puls.. — Если причину составлялъ *ревматизмъ*: 1) Cham., Euphr., Lyc., Merc., N.-v., Puls., Rhus, Spig., Sulph.; 2) Caust., Her., Lach.. — При *артритическомъ переносѣ*: Ant., Bell., Merc., Puls., Rhus, Spig., Sulph.. — Послѣ *скрытія какого бы то ни было нагноенія или слезоотдѣленія*: Chin., Euphr., Her., Lyc., Puls., Sil., Sulph.. — Вслѣдствіе *скрытія привичнаго кровотечения*, напр. геморроидальнаго, мѣсячнаго и т. д.: Bell., Calc., Lyc., N.-vom., Phos., Puls., Sep., Sulph.. — Вслѣдствіе

скрытія *острой мигорачной или безмигорачной слепоты*: Bell., Calc., Caust., Lach., Lyc., Merc., Sil., Stram., Sulph. — Вслѣдствіе *злоупотребленія ртути* или вообще *металлическихъ веществъ*: 1) Sulph.; 2) Нер., Nitr.-ас., Sil.; 3) Aug., Bell., Carb.-veg., Chin., Lach., Op., Puls..

§ 3. Относительно сопряженія слабости зрѣнія съ побочными педугами, надобно замѣтить, что при сопряженія ея съ *нервною мозговою болью*, преимущественно достойны вниманія: Aug., Bell., Bry., Calc., Нер., Nitr.-ас., N.-vom., Phos., Puls., Ser., Sulph. — *Оъ напоромъ крови къ мозгу*: Aug., Bell., Calc., Chin., Hyos., N.-vom., Op., Phos., Sil., Sulph. — При сочувственномъ *страданіи слуха* или *слуховою органа*: Cic., Nitr.-ас., Petr., Phos., Puls. — При *тожевременныхъ застрическихъ припадкахъ* и страданіи нижней части живота: Ant., Calc., Carb., Chin., Coss., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Sulph. — При *тождевременныхъ безпорядкахъ въ маточной системѣ*: Aug., Bell., Cin., Coss., Cop., Magn., Natr.-m., N.-vom., Plat., Phos., Puls., Rhus, Ser., Stram., Sulph. — При *страданіи легкихъ*: Calc., Canp., Нер., Lach., Lyc., Natr.-m., Phos., Sil., Sulph. — При *болѣзняхъ сердца*: Aug., Calc., Canp., Dig., Lach., Phos., Puls., Ser., Spig. — При *припадкахъ судорожныхъ, эпилепсін и т. д.*: Bell., Lach., Caust., Cic., Ign., Hyos., Lach., Op., Sil., Stram., Sulph.

§ 4. Соображаясь съ припадками, нужно обращать вниманіе не только на тѣ, которые относятся собственно къ страдающему глазу или зрѣнію, но и на всѣ болѣзненные явленія въ организмѣ. По многочисленности этихъ явленій, мы ограничимся только указаніемъ тѣхъ средствъ, которыя прямо относятся къ болѣзнямъ глазъ.

АУРИУМ — при черныхъ пятнахъ или искрахъ и пламени предъ глазами, неуровниности зрѣнія, при которой всѣ предметы видятся въ половину, въ горизонтальномъ ихъ разрѣзѣ; при *напрягающей боли въ глазу*.

BELLADONNA — при *расширенныаъ и нечувствительныаъ зрачкахъ*; *сетчатоболѣзи*; *судорожномъ движеніи глазъ* и *вѣзъ* отъ вліянія на нихъ свѣта; *пламени, искрахъ или туманѣ*, *черныхъ пятнааъ и точкааъ*, *пестрыхъ или серебрянаго цвѣта пятнааъ* передъ глазами; *куриной слѣпотѣ*;

двоезрѣніи, или неправильности зрѣнія, при которомъ предметы кажутся *окрашенными въ красный цвѣтъ* и въ обратномъ видѣ; *покалываніяхъ въ глазахъ, или давящихъ и растягивающихъ боляхъ, простирающихся въ глазныя ямки и лобъ; краснотѣ лица.*

СALCAREА — противъ мутнаго зрѣнія, когда предметы представляются какъ-бы въ туманѣ или особенно, когда при чтеніи или послѣ обѣда представляются черныя точки передъ глазами; чрезвычайная *свѣтобоязнь*, съ ослѣпленіемъ отъ слишкомъ яркаго свѣта; зрачки сильно расширены; гнетеніе и чувство холода въ глазахъ.

CAUSTICUM — при внезапной и частой потерѣ зрѣнія, сопровождающейся чувствомъ, какъ-будто плева растянута передъ глазами, или неясности зрѣнія, представляющаго предметы какъ-бы чрезъ покрывало или туманъ; когда передъ глазами представляются черныя летучія нити, или искры и блескъ, при свѣтобоязни.

СНІА — при слабости зрѣнія, такъ что больной видитъ только очеркъ очень близко лежащихъ предметовъ, или когда при чтеніи буквы какъ-бы мѣшаются, кажутся бѣлыми и какъ-бы окруженными бѣлыми краями, когда зрачки представляются расширенными и малочувствительными; при тусклости роговой оболочки, какъ будто-бы дымъ стелется предъ глазами, или черныхъ летучихъ точкахъ; улучшеніи состоянія послѣ сна.

СІСУТА — при частомъ *исчезаніи зрѣнія, какъ-бы отъ потери самосознанія* и головокруженіи на ходьбѣ; колебанія предметовъ передъ глазами и подвижности буквъ во время чтенія; двоезрѣніи; частомъ *потемнѣніи зрѣнія, смѣняющемся тупостью слуха*; синевѣ вокругъ глазъ; свѣтобоязни и жженіи въ глазахъ; давящей головной боли надъ глазными ямками.

СІНА — при неясности зрѣнія во время чтенія, исчезающей отъ протиранія глазъ; расширенныхъ зрачкахъ; свѣтобоязни; давленіи въ глазу, какъ-бы отъ присутствія въ немъ песку, что замѣчается особенно во время чтенія.

ДВОЗРѢА — при частомъ *исчезаніи зрѣнія во время чтенія*, когда буквы мѣшаются и принимаютъ бѣлый цвѣтъ; свѣтобоязни и ослѣпленія зрѣнія отъ яркаго дневнаго свѣта и огня; большой сухости глазъ; сухости и залеганія носа; покалыванія въ глазахъ.

HYOSCYAMUS — при расширенныхъ зрачкахъ, частыхъ судорогахъ глазъ и вѣкъ; косоглазїи; двойномъ зрѣніи; куриной слѣпотѣ; обманахъ зрѣнія, при которыхъ всѣ предметы кажутся красными, или въ большемъ противъ обыкновеннаго объемѣ; давящихъ и одуряющихъ боляхъ надъ глазами.

MERCURIUS — при мутности зрѣнія, какъ-бы сѣвось туманъ; частой кратковременной потерѣ зрѣнія, черныхъ точкахъ, летучихъ пятнахъ, блескѣ и искрахъ передъ глазами; кратковременныхъ приступовъ *тезанной слѣпоты*, подвижности буквъ при чтенїи; необыкновенной чувствительности глазъ къ дневному свѣту и огню; рѣжущихъ, колючихъ, или давящихъ боляхъ въ глазахъ при всякомъ напряженїи зрѣнія; расширенныхъ, или же нечувствительныхъ и неровныхъ зрачкахъ.

NATRUM MURIATICUM — при частомъ потемнѣніи зрѣнія при нагибанїи, ходьбѣ, чтенїи, писанїи; неясности зрѣнія, какъ-бы чрезъ флёръ; подвижности буквъ при чтенїи; двоезрѣніи; неправильности зрѣнія, при которомъ глазъ видитъ только половину предмета; черныхъ точкахъ, блестящихъ полосахъ и искрахъ передъ глазами.

NUX VOMICA — когда передъ глазами представляются сверканїе, черныя или сѣрыя точки, или искры какъ-бы отъ молнїи; необыкновенная чувствительность глазъ къ дневному свѣту, преимущественно по утрамъ; давленїе въ глазахъ послѣ малѣйшаго ихъ напряженїи; краснота лица, расширенныя зрачки, чувство тяжести въ нихъ и частое морганїе.

RHOZOPHUS — когда замѣчаются: *внезапные приступы слѣпоты* днемъ или потемнѣніе зрѣнія; *когда все по видимому покрыто пылью покрываломъ*; большая чувствительность глазъ къ дневному свѣту и пламени свѣчи и ослѣпленїе отъ яркаго свѣта; темное сіяніе, или искры и черная пятна передъ глазами; давящая боль въ глазахъ, глазныхъ впадинахъ и во лбу; обильное слезотеченїе, особенно на воздухѣ и вѣтрѣ.

PULSATILLA — когда замѣчаются: частая потеря зрѣнія и неясность его; *блѣдность лица и наклонность ко рвотѣ*; слѣпота въ сумеркахъ и чувство какъ-будто глаза покрыты повязкою; мутность зрѣнія, какъ-будто сквозь туманъ или пелену, особенно на воздухѣ, также *по вечерамъ*, или по утрамъ при вставанїи

двозрабніе или зрбніе, при которомъ предметы кажутся блбдными; блестящіе или пламенбющіе круги предъ глазами; *сеттоболанъ* и покалываніе въ глазу, когда на него падаетъ свбтъ; *частое, обильное слезотеченіе*, особенно на воздухъ, вбтрб и при яркомъ дневномъ свбтб; *суженіе зрачковъ*.

RUTA — при туманномъ зрбніи и совершенной невозможности видбть отдаленные предметы; черныхъ летучихъ точекъ передъ глазами; давящихъ или жгучихъ боляхъ въ глазу при всякомъ его напряженіи, особенно при чтеніи; слезотеченіе на воздухъ.

SERIA — при мутности зрбніа, преимущественно во время чтенія или письма; суженіе зрачковъ, когда передъ глазами представляются *покрывало, черная ятма, блестящія точки и полосы; свбтобоязнь* днемъ; давящая боль надъ глазами; *дблокомъ*.

SILICIA — когда неясность зрбніа происходитъ какъ-бы отъ сброй завбсы передъ глазами; при *начальныхъ приступахъ слепоты* днемъ; подвижности и измбненіи буквъ въ бблми цвбтъ при чтеніи; *когда передъ глазами представляются искры и черная ятма; при сеттоболанн и ослбпленіи* отъ дневнаго свбта; *частомъ слезотеченіи*, особенно на воздухъ; *покалываніяхъ* во лбу, *пронизывающихъ* чрезъ глаза.

SULPHUR — когда замбчаются: туманное зрбніе, происходящее отъ того, что предъ глазами находится какъ-бы черное покрывало; частое помраченіе зрбніа, преимущественно при чтеніи; свбтобоязнь, особенно отъ дбствія солнечнаго свбта, при теплой и знойной погодб и ослбпленіи отъ дневнаго свбта; *приступы начальной слепоты* днемъ; сверканіе бблмхъ мушекъ или черныхъ точекъ и пятна передъ глазами; *терзающія жгучія боли* въ головб и глазахъ; *обильное слезотеченіе*, особенно на воздухъ, или *значительная сухость* глазъ, преимущественно въ комнатахъ; *неравнобрность, нечувствительность, или расширение зрачковъ*.

UVALTRUM — при куриной слбпотб; *искрахъ или черныхъ пятнахъ* передъ глазами, преимущественно при вставаніи; *обильномъ слезотеченіи, жженіи, рбзи и чувствб* сухости въ глазахъ, при свбтобоязни.

§ 5. Наконецъ, по сходству симптомовъ, можно еще предложить: при неправильности зрбніа, когда всб предметы кажутся *бблыми*: Drog., Petr., Sil.; если они кажутся *синими*: Bell., Lys.,

Stram., Stront., Sulph., Zinc. — При *ослаблении* глазъ отъ яркаго свѣта: Bar., Calc., Caust., Cic., Dros., Euphr., Graph., Kal., Merc., N.-vom., Phos., Phos.-ac., Ser., Sil. — При периодическихъ приступахъ печальной, *внезапной слепоты*: Calc., Chel., Chin., Dig., Euphr., Huos., Natr.-m., N.-vom., Phos., Puls., Ser., Sil., Sulph. — При *слепотѣ дня*: 1) Phos., Sil., Sulph.; 2) Acon., Merc.; 3) Con., Nitr., N.-vom., Phos., Stram. — При *слепотѣ въ сумерки* (куриной слѣпотѣ): Bell., Huos., Merc., Puls., Stram., Veratr. — При совершенной *постоянной слепотѣ*: Bell., Calc., Sil., Stram., Sulph. — При тождественной необходимости часто *примуривать* глаза: Croc., Euphr., Her., Petr., Phos.-ac., Plat., Staph. — При *двоосрѣтнѣ*: Bell., Cic., Daph., Dig., Euphr., Huos., Lys., Natr., Nitr.-ac., Oleand., Puls., Sec., Stram., Sulph., Veratr. — При *исчезаніи зрѣнія* (т. е. когда въ глазахъ становится темно): Agar., Aug., Bell., Bry., Calc., Caust., Cic., Con., Dig., Dros., Ferr., Graph., Her., Huos., Lys., Mang., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Oleand., Phos., Puls., Sil., Sulph. — Если въ глазахъ темнѣетъ какъ-бы отъ *страха* или *чернаго покрывала*: Agar., Anac., Aug., Baryt., Calc., Caust., Chin., Chinin., Con., Euphr., Magn.-c., Merc., Natr., Natr.-m., Phos., Ser., Sil. — Когда предметы кажутся *отдаленными*: Anac., Cic., Natr.-m., N.-mosch., Phos., Stand., Stram., Sulph. — Когда предъ глазами представляются *цѣльные образы*: Aug., Bell., Bor., Camph., Huos., Kal., N.-vom., Puls., Spig., Veratr. — Когда передъ глазами представляются *перья*: Calc., Lys., Natr., Natr.-m., Sulph. — При *огненныхъ видѣніяхъ* (искры, пламя): Aug., Bell., Bry., Caust., Croc., Huos., Kal., Lys., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Spig., Zinc. — Когда передъ глазами представляются *черная и темная янтма*: Amm.-m., Anac., Aug., Bar., Bell., Calc., Caust., Chin., Chinin., Kal., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos., Ser., Sil. — Когда передъ глазами представляются *мелькающія янтма*: Acon., Agar., Amm.-m., Bell., Calc., Chin., Con., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil., Stram. — Когда передъ глазами видится *сверканіе*: Amm., Caust., Cham., Graph. — Когда глаза какъ-бы покрыты *туманомъ* или *блорожью*: Bell., Calc., Caust., Chinin., Croc., Dros., Ign., Kreos., Lys., Merc., Natr.-m., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rut., Ser., Sulph. — Когда предметы кажутся *окрашенными въ желтый цвѣтъ*: Bell., Camph., Chin., Dig., Merc., Ser.; — въ *серой цвѣтъ*: Nitr.-ac.,

N.-vom., Phos., Sil., Stram.; — кажутся увеличенными: Euphr., Hyos., Natr.-m., Phos.; — окрашенными въ зеленый цвѣтъ: Dig., Merc., Phos., Rut., Ser., Sulph., Zinc..—Когда глаза видятъ только *половину предмета*: Aug., Calc., Caust., Lys., Mur.-ac., Natr.-m., Ser..— Когда передъ глазами представляются яркія краски и видныя: Amm., Bell., Bor., Calc., Camph., Hyos., Kal., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sil., Spig., Valer. — При *близорукости*: Amm., Calc., Chin., Con., Cycl. Euphr., Hyos., Lach., Lys., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Rut., Sulph.-ac., Tart., Valer.— При *дальзорукости*: Calc., Coff., Con., Dros., Hyos., Lys., Merph., Natr., Natr.-m., N.-vom., Petr., Ser., Sil., Sulph.— При *расширеніи зрачковъ*: Acon., Bell., Calc., Caps., Chin., Cic., Cin., Coss., Con., Croc., Cycl., Guaj., Her., Hyos., Ign., Ipec., Led., Lys., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Ser., Spig., Squill., Stram., Staph., Zinc.— При *суженіи зрачковъ*: Anac., Arn., Bell., Camph., Cham., Chel., Chin., Cic., Coss., Dig., Ign., Led., Mez., Mur.-ac., Phos., Puls., Rut., Ser., Sil., Squil., Sulph., Thuj., Veratr., Zinc.. — Когда передъ глазами представляются *радужные пятна*: Bell., Cic., Kal., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Stram., Sulph..— Когда предметы кажутся *окрашенными съ красной цвѣтъ*: Bell., Con., Croc., Dig., Her., Hyos., Spig., Stront., Sulph.. — Когда передъ глазами *видится тьма*: Sen.— Когда передъ глазами представляются предметы въ *черныхъ краскахъ*: Bell., Calc., Chin., Euphr., Kal., Magn.-c., Phos., Ser., Sil., Stram.— Когда видятся *полосы*: Amm., Bell., Con., Natr.-m., Puls., Ser..— При *мутности зрѣнія вообще*: Amb., Con., Euphr., Her., Ign., Kreos., Lys., Merc., Phos., Puls., Rut., Ser., Sil., Sulph..— Если *предметы представляются съ обратною видн.*: Bell.. — При постоянной потребности *протирать глаза*: Carb.-an., Croc., Lys., Natr., Phos., Puls.. — При *слияній буквъ во время чтенія*: Bell., Bry., Chin., Darh., Dros., Graph., Hyos., Lys., Natr.-m., Sen., Sil., Stram., Viol.-od..

Зудъ въ заднемъ проходѣ.

Большую частію составляетъ только симптомъ, но иногда, не сопровождаясь другими признаками, бываетъ самостоятеленъ и такъ упоренъ, что трудно найти противъ него приличное средство; однакожъ очень часто большую пользу здѣсь приносятъ

Асоп. Затѣмъ слѣдуютъ: 1) Merc., Nitr.-ас., Seria, Sulph., Thuj.; 2) Baryt., Calc., Zinc., даваемые съ большими промежутками и по одному только разу, очень хорошо дѣйствуютъ въ хроническихъ случаяхъ. См. также: *Лишай, Зудъ накожный, Геморрой и Глистная больница.*

Зудъ накожный, Pruritus.

§ 1. Зудъ во всей кожѣ или въ отдѣльныхъ частяхъ можетъ зависѣть отъ столь многихъ причинъ, что трудно найти противъ него приличное средство. Здѣсь упомянемъ о двухъ видахъ зуда: одинъ, который обуславливается *простымъ раздраженіемъ кожи*, напримеръ, вслѣдствіе ѣдкаго пота; другой происходитъ отъ особенной такъ называемой *остроты*, обнаруживающейся въ видѣ очень мелкой пузыристой сыпи.

§ 2. Противъ *простого* зуда, который большею частію возникаетъ по вечерамъ при раздѣваніи, или послѣ разгорячающихъ тѣло движеній и смѣны платья, и бываетъ иногда такъ обременителенъ, что больные чешутъ себѣ тѣло до крови, главными средствами считаются: 1) Bry., N.-vom., Op., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Sossul., Oleand.—Противъ такъ называемой *остроты*, производящей зудъ, какъ это замѣчается большею частію въ заднемъ проходѣ, на половыхъ частяхъ (prurigo), лучшими средствами считаются: 1) Calc., Merc., Nitr.-ас., Ser., Sulph.; 2) Carb.-v., Con., Natr.-m., Sil.; 3) Alum., Amb., Amm., Baryt., Caust., Soss., Graph., Lyc., Phosph., Rhus, Thuj..

§ 3. Противъ зуда *заднего прохода*: 1) Alum., Amm., Carb.-v., Caust., Lyc., Nitr.-ас., Petr., Sulph.; 2) Baryt., Kal., Phosph., Sil., Thuj., Zinc. — Противъ зуда *мошонки*: 1) Nitr.-ас., Petr., Sulph.; 2) Amb., Carb.-v., Caust., Soss., Graph., Lyc., Thuj.. — Противъ зуда *большихъ губъ у женщинъ*: 1) Calc., Carb.-v., Con., Natr.-m., Ser., Sil., Sulph.; 2) Alum., Amb., Amm., Merc., Nitr.-ас., Rhus.
Ср. *Сыпь, Лишай.*

Зѣвота судорожная, Hiatus spasmodicus.

Зѣвота обыкновенно служитъ признакомъ сонливости, голода или скуки, и тогда она мало заслуживаетъ вниманія, но зѣвота наследственная, судорожная требуетъ: 1) Ign., Magn.-arct., Natr.-m.,

Plat., Rhus, Sulph; 2) Amm., Caust., Cham., Coss., Croc., Euphr., Lach., Magn.-c., Nitr.-ac., Tart., Veratr..

Зябкость, недостатокъ жизненной теплоты.

§ 1. Это состояніе въ сущности составляетъ только симптомъ, который однако часто очень важенъ при выборѣ средствъ. Главныя средства противъ различныхъ видовъ этого состоянія вообще:

1) Ars., Bry., Camph., Carb.-veg., Con., Dulc., Ipec., Lyc., Natr., Natr.-m., Puls., Ran., Rhus, Veratr.; 2) Acon., Alum., Ang., Calc., Caps., Caust., Chel., Chin., Euphorb., Ferr., Led., Merc., Natr., Natr. m., Nitr.-ac., N.-vom., Oleand., Op., Phosph., Sabad., Sassap., Sep., Staph., Stram., Sulph. Thuj.; 3) Aur., Baryt., Bell., Carb.-an., Cir., Graph., Hell., Hyos., Kal., Magn.-arct., Sec., Squill., Tart., Staph.

§ 2. Изъ нихъ: *при недостаткѣ жизненной теплоты вообще:*

1) Ars., Chel., Con., Phosph., Puls., Ran., Rhus, Sep., Veratr.; 2) Acon., Alum., Ang., Calc., Camph., Caps., Caust., Chel., Chin., Euphorb., Ferr., Ipec., Led., Lyc., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Oleand., Op., Sabad., Sassap., Staph., Stram., Sulph. Tart., Thuj.—При большой чувствительности къ *холодному воздуху:*

1) Amm., Calc., Caps., Carb.-an., Caust., Cham., Coss., Coff., Mez., Natr., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Aggr., Alum., Anac., Aur., Bell., Cycl., Dulc., Lach., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Rhod.—

При *необыкновенной зябкости* даже въ комнатѣ: 1) Ars., Bry. Carb.-veg., Caust., Chin., Magn.-arct., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., S.l., Sulph.; 2) Agn., Alum., Anac., Asar., Calc., Cham., Coss., Her., Ipec., Kreos., Mez., Natr., Nitr.-ac., N.-mosch., Petr., Ran., Rhus, Sabad., Sep., Spig., Veratr.—При частомъ появленіи *дрожжи:* 1) Acon., Ars., Bell., Chin., Coss., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Staph.; 2) Aur., Bry., Calc., Caust., Clem., Coff. Her., Kal., Magn.-aust., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Phosph., Plat., Rhab., Sabad., Sabin., Spig., Sulph., Thuj., Veratr..

§ 3. При мѣстномъ только холодѣ или ощущеніи холода и въ особенности при *наружномъ холодѣ:* 1) Arg., Ign., Merc., Mosch., N.-vom., Phosph., Plat., Rhus, Sec., Veratr.; 2) Calc., Caust., Chin. Lyc., Men., Mur.-ac., Puls., Rhod., Sabad., Sec., Staph., Sulph.— При ощущеніи *внутренне холода:* 1) Arg., Calc., Chin., Laur.,

Лyc., N.-vom., Puls, Sep.; 2) Agn., Alum., Amb., Bell., Bry., Chin., Colch., Ign., Men., Merc., Mez., Phosph., Spig., Sulph., Veratr. — При чувствѣ *холода въ одной половинѣ тѣла*: 1) Caust., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Baryt., Bell., Bry., Verb., Veratr. — При *постоянномъ холодѣ или зябкости головы*: 1) Bell., Calc., Phosph., Sep., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Arn., Dulc., Mosch. — При *постоянномъ ощущеніи холода въ спинѣ*: 1) Bell., Calc., Caps., Chin., Lach., Natr.-m., N.-vom., Sep., Sil., Stann., Sulph.; 2) Amm.-m., Camph., Croc., Dig., Dulc., Her., Lys., Phosph., Rhus, Sec., Staph., Thuj. — При *постоянномъ ощущеніи холода въ ногахъ*: 1) Amm., Amm.-m., Calc., Caust., Con., Graph., Kal., Lach., Lys., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Petr., Phosph., Plat., Sil., Sulph., Veratr.; 2) Amb., Ars., Carb.-an., Carb.-veg., Ferr., Her., Hyos., Ign., Kreos., Merc., Nitr.-ac., Oleand., Sep., Stram., Zinc.

И.

Изгага, отрыжка, кислоты желудочныя восхождение пищи въ неперевааренномъ видѣ, восхождение содержимаго въ желудкѣ и т. д. Pyrosis, Ructus.

§ 1. Мы здѣсь говоримъ обо всѣхъ этихъ состояніяхъ вмѣстѣ для избѣжанія повторенія, а также потому, что всякое изъ нихъ составляетъ только симптомъ и указываетъ на болѣзненную раздражительность желудка. Главныя средства здѣсь: 1) Agn., Bry., Calc. Carb.-v., Con., Ign., Lys., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Rhus, Sep., Sulph., Veratr.; 2) Amm., Arn., Carb.-an., Caust., Cocc., Graph., Natr., Sil., Staph., Tart., Val.

§ 2. Изъ нихъ, при частой отрыжкѣ, если она ничѣмъ не *нахмѣтъ* (пустая отрыжка): Agn., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Cocc., Con., Her., Kal., Lach., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Ruta, Sep., Staph., Sulph., Veratr.; 2) Alum., Amb., Amm.-m., Petr., Sabad., Sassaп., Sil., Spong., Stann., Sulph.-ac., Thuj., Val., Verb. — При *отрыжкѣ причиняющей боль*: Coccul., N vom., Petr., Phosph., Sep. — При *тщательномъ помятѣ на отрыжку*: Amb., Carb.-an., N.-vom., Phosph., Plumb., Puls., Rhus, Sulph., Zinc. — При *от-*

рыжась, ильтошей вкусъ принятой пищи: Amb., Amm., Ant., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Con., Lyc., Natr.-m., Phosph., Puls., Sil.

§ 3. При *восхожденіи содержиماю въ желудкѣ:* 1) Arn., Bry., Carb.-v., Graph., N.-vom., Phosph., Puls., Sassar., Sulph., Sulph.-ac., Tart.; 2) Ant., Bell., Calc., Cann., Con., Dros., Her., Ign., Lyc., Merc., Natr.-m., Plumb., Staph., Veratr., Zinc. — Если принятая пища, *еще не переваренная, восходитъ къ зѣву* (Ruminatio): 1) Bry., Cham., Con., Ign., Lach., Phosph.; 2) Amm.-m., Camph., Magn.-m., Mez., Sulph.

§ 4. При *кислой отрыжкѣ, или восхожденіи желудочной кислоты:* 1) Calc., Cham., Chin., Lyc., N.-vom., Phosph.; 2) Amm., Arg., Bell., Caust., Ferr., Graph., Ign., Ipec., Kal., Natr.-m., Phos.-ac., Puls., Sassar., Stann., Thuja., Veratr. — При *изжогахъ* (Pyrosis): 1) Amm., Calc., Chin., Con., Croc., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Caps., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Dulc., Graph., Her., Ign., Jod., Kal., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sabad., Sep., Sil., Staph., Sulph.-ac. — При *восхожденіи кислой воднистой жидкости, желудочныхъ кислотъ:* 1) Ars., Calc., Carb.-v., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Sep., Sulph.; 2) Baryt., Bell., Caust., Cupr., Dros., Graph., Her., Ipec., Led., Natr., Petr., Rhus, Sabad., Sil., Staph., Veratr.

См. также: *Желудка разстройство.*

Икота, Singultus.

Составляетъ симптомъ, сопровождающій другія болѣзни. Часто однакожь она принимается видъ самостоятельнаго страданія, не сопровождаясь замѣтнымъ пораженіемъ какого-либо органа, или же бываетъ такъ сильна, что при выборѣ средствъ требуетъ особеннаго вниманія. Въ этомъ случаѣ можно назначать: 1) Acon., Amm.-m., Bell., Bry., Caps., Hyos., Ign., Magn.-m., N.-vomch., N.-vom., Puls., Stram., Sulph.; 2) Agar., Arg., Baryt., Borax, Calc., Carb.-v., Coc., Coff., Cupr., Graph., Lach., Led., Lyc., Merc., Nur.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., Ruta, Sep., Sil., Spong., Staph., Veratr.

Ипохондрія, Hypochondriasis.

§ 1. Средства противъ этого душевнаго недуга вообще: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Calc., Chin., Natr.; 3) Anac., Aug., Con., Grat., Lach., Mosch., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac., Ser., Staph. Если ипохондрія есть слѣдствіе *чрезмѣрнаю удовольствованія головою похоти и потери соковъ или другихъ ослабляющихъ причинъ*: 1) Calc., Chin., N.-vom., Sulph.; 2) Anac., Con., Natr.-m., Phos.-ac., Ser., Staph. — Если она есть слѣдствіе *неправильной дѣятельности органовъ нижней части живота, какъ это замѣчается у людей, ведущимъ сидячую жизнь, или сильно занимающихся умственными работами*: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Aug., Calc., Lach., Natr., Sil.

§ 2. Симптомы, опредѣляющіе выборъ средствъ при ипохондріи, такъ запутаны, что трудно ихъ привести порядокъ для составленія указаній. Впрочемъ можно руководствоваться слѣдующимъ:

САЛСАВЕА — уныніе, печаль и расположеніе къ молчанію; приступы тоски; волненіе крови, сердцебиеніе и ощущеніе толчковъ въ подсердечной янкѣ; *отчаяніе объ упадкѣ своего здоровья* и страхъ передъ мыслью о заболѣваніи, о пораженіи несчастіемъ, испытываніи непріятностей, лишеніи разсудка или зараженіи приличными болѣзнями; страхъ передъ мыслью о смерти; возвышенная чувствительность всѣхъ органовъ; *нерасположеніе и неохота къ занятіямъ; невозможность размышлять или заниматься какою-либо умственною работою* (Сравн. Sulph.).

СНИЛА — необыкновенное расслабленіе, имерція души или возвышенная дѣятельность всѣхъ органовъ; *глубокая торестная задумчивость; упадокъ духа; постоянная идея больного, что онъ несчастливъ и что враги его вѣчно преслѣдуютъ; давящая боль юломъ, или сверленіе въ тѣмени; слабость пищеваренія и вздутость живота; дурное расположеніе духа, вялость и лѣнь послѣ стола; бессонница, происходящая отъ напора мыслей или безпокойный, несостояющій сонъ, наполненный мучительными видѣніями, которыя тревожатъ больного даже послѣ пробужденія.*

НАТРИУМ — упадокъ духа, поносъ и чрезмѣрная заботливость

о будущемъ, *желаніе избѣгать людей и общества*; чувство тягости жизни, дурное расположеніе духа и угрюмость; чрезмѣрная склонность гнѣваться или увлекаться гнѣвомъ; *невозможность заниматься умственной работою*; давящая боль головы; потеря аппетита и *слабость пищеваженія*; дурное расположеніе духа и появленіе многихъ тѣлесныхъ и душевныхъ страданій послѣ стола, а преимущественно при малѣйшемъ отступленіи отъ привычнаго образа жизни.

Nux vomica — дурное расположеніе духа и угрюмость; отчаяніе и отвращеніе къ жизни; большая склонность къ гнѣву; лѣнь и *неохота ко всякаю рода движенію и работѣ*; *невозможность заниматься умственною работою* и непоимѣрная усталость головы послѣ самаго незначительнаго напряженія ума; неосвѣжающій сонъ; *раннее пробужденіе и ухудшеніе состоянія большаю къ утру*; чувство стѣсненія въ животѣ и давящая боль въ немъ, или же чувство, какъ-будто *извоздь сидитъ въ мозгу*; *неохота къ свободному воздуху*; потребность лежать постоянно и большая усталость послѣ самой незначительной прогулки; *болѣзненная чувствительность въ подреберьяхъ, надчревной части и подъ ложечкою*; запоръ и *недѣятельность внутренней нижней части живота*; расположеніе къ геморрою. (Sulph., часто умѣстна послѣ N. vom.).

Sulphur — уныніе, *глубокая горестная задумчивость*; непоимѣрная заботливость о своихъ домашнихъ обстоятельствахъ, о состояніи здоровья и о спасеніи души; постоянныя идеи; приступы тоски; нетерпѣливость, безпокойство и склонность къ гнѣву, вялость души и тѣла; разсѣянность и перѣшительность; *чувство стѣсненія въ животѣ*; *невозможность заниматься умственною работою* и большая усталость послѣ малѣйшаго напряженія ума; давящая боль головы, преимущественно въ макушкѣ; чувство тошноты и давленія въ желудкѣ и подъ ложечкою; запоръ, расположеніе къ геморрою; *постоянная мысль большаю о томъ, что онъ чрезвычайно несчастливъ*. (Сравн. Calc., которая часто умѣстна послѣ Sulph.).

§ 3. Изъ остальныхъ средствъ достойны вниманія:

Arsenicum — уныніе, боязнь людей, страхъ будущности, упадокъ духа и отчаяніе, забота и страхъ смерти. — **Alum** — сильное безпо-

войство, страхъ смерти, или плаксивость, мучительное и тягостное расположеніе духа; невозможность размышлять; боль головы послѣ малѣйшаго напряженія ума; ощущеніе, какъ-будто мозгъ разбитъ.—**Сониум**—равнодушіе и любобазнь со, страхомъ уединенія, плаксивость.—**Гвагіола**—угрюмое, мрачное расположеніе духа, запоръ, давленіе въ желудкѣ послѣ стола.—**Ласнезіс**—непомѣрная душевная скорбь, заботливость и *безпокойство о своемъ здоровьи*; постоянная идея, что преслѣдуютъ, презираютъ или не уважаютъ; нерасположеніе къ занятіямъ и необыкновенная усталость.—**Мосхус**—когда большой жалуется на чрезмѣрно сильныя страданія, не будучи въ состояніи опредѣлить настоящаго ихъ мѣста; тоска и сердцебіеніе.—**Натрумъ муриатисумъ** назначается тамъ, гдѣ *Natr.* имѣлъ мѣсто, но былъ недостаточенъ.—**Рнозрновус**—печаль, сопровождающаяся плачемъ и веселостію попеременно; безпокойство о состояніи своего здоровья и исходѣ болѣзни; приступы тоски, преимущественно въ уединеніи.—**Рнозрновіасіс**—при сильной заботливости о будущности, мрачномъ углубленіи въ свою болѣзнь, неохотѣ къ разговору.—**Серіа**—при чрезмѣрномъ безпокойствѣ больнаго о своей болѣзни; равнодушія ко всему, даже къ роднымъ; неохотѣ къ дѣламъ, упадкѣ духа и тягости жизни.—**Старнусагвіа**—при непомѣрномъ равнодушіи, уныніи, и страхѣ передъ будущностью, *мачь и печальныя мысля о своей болѣзни*; отвращенія отъ работы тѣлесной и душевной; *невозможности размышлять*.

Сравни. *Умопомышательство, Меланхолія, Истерика и Болѣзни душевныя вообще.*

Истерика.

§ 1. Лучшія средства отъ истерическихъ недуговъ вообще:
1) *Agn., Aur., Bell., Calc., Caust., Cic., Cocc., Con., Graph., Ign., Lach., Mosch., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sep., Sil., Stram., Sulph., Veratr.*; 2) *Anac., Apis, Ars., Asa., Bry., Cham., Chin., Jod., Natr.-m., Nitr.-ac., Stann., Staph., Stram., Valer., Viol.-od.*

§ 2 Въ частности, нужно имѣть въ виду: При *общихъ судорогахъ*: 1) *Bell., Cic., Cocc., Ign., Ipec., Mosch., Stram., Veratr.*; 2) *Aur., Cham., Stann.*; 3) *Bry., Calc., Caus., Coff., Con., Cupr., Magn.-c., Magn.-m., Plat., Puls., Sec., Sep., Sulph.*—При *душевныхъ*

разстройствъхъ: 1) Aur., Calc., Con., Ign., N.-mosch., N.-vom. Phosph. Plat., Puls.; 2) Anac., Asa., Caust., Grat., Sep., Sil., Sulph., Viol.-od.—*При головныхъ боляхъ*: 1) Aur., Ign., Plat., Mosch., Sep.; 2) Bell., Cocc., Sep., Magn.-с., Magn.-т., Valer., Veratr.; 3) Bry., Nitr.-ас. Phosph.—*При судорогахъ глотки или шеи*: Con., Lyc., Magn.-т. Plumb., Sulph.—*При страданіяхъ желудка*: 1) Ign.; 2) Cham.; Cocc Magn.-с., N.-vom. — *При судорогахъ живота*: 1) Ign. 2) Cocc., Ipec., N.-vom.; 3) Magn.-т., Mosch., Stan., Valer.; 4) Ars., Bell., Stram., Sulph., Veratr.—*При судорогахъ мочевого пузыря*: Asa., Puls., Sep.—*При страданіяхъ матки или разстройствъ мѣсячныхъ*: 1) Cocc., Ign.; 2) Cic., Con., Magn.-т., N.-vom., Puls.; 3) Hyosc., Natr.-т., Plat., Sep., Stann.—*При трудныхъ спазмахъ и трудности дыханія*: 1) Ign., Mosch., N.-vom.; 2) Acom., Bell., coff., N.-mosch., Puls., Stram.; 3) Aur., Con., Cupr., Ipec., Phosph., Stann.

Сравн. *Инахондрія, Душевная больши вообще, Боль головы, живота, Обморокъ.*

Исхуданіе составляетъ по большей части припадокъ другихъ болѣзней, почему надлежащій выборъ средства здѣсь особенно важенъ. Преимущественно пригодными для этого средствами оказываются: 1) Ars., Calc., Chin., Graph., Lycor., Natr.-т., Stann., Staph.; 2) Ambr., Baryt., Bry., Cham., Clem., Coccul., Cupr., Ferr., Guaj., Ignat., Jod., Ipec., Lach., Nitr.-ас., N.-vom., Petr., Phosph., Phos.-ас., Plumb., Puls., Sec., Sil., Veratr..

Въ случаяхъ, гдѣ исхуданіе развивается безъ всякихъ признаковъ какого-либо органическаго страданія, даже безъ явленій, анэміи или дѣвичьей немочи, въ особенности оказались полезными: Ars., Sulph., Calc., Kal.-hydr., Jod.—Сравн. *Атрофія, Чажотка и Сухотка.*

И.

Іодъ. Послѣдствія злоупотребленія его.—Главныя средства противъ *отравленія* болышими порціями іода, по Герингу: 1) Крахмаль, смѣшанный съ водою. 2) Пшеничная мука; 3) Сливястое питье. Противъ *послѣдствій* злоупотребленія іода, даваемыхъ

го, какъ врачебное средство: 1) Bell., и потомъ Phosph., или 2) Arg., Chin., Coff., Her., Spong., Sulph..

К.

Камни почечные, Lithiasis, Calculi renales.

§ 1. Главныя средства: 1) Lyc., Sassap.; 2) Ant., Calc., N.-vom., Phosph., Puls., Ruta, Ser., Sil., Zinc.; 3) Alum., Amm., Amb., Arg., Canth., Chin., Lach., Natr.-m., Thuj., Uva.

§ 2. Изъ нихъ до сихъ поръ употребляли съ успѣхомъ: противъ *камней мочевого пузыря* Canth., Sassap., Uv., а противъ *камней почечныхъ*: 1) Lyc., Sassap.; 2) Ant., Calc., Phosph., Ruta, Sil., Zinc. Тѣ же средства применимы и при *почечномъ пескѣ*. При недостаточномъ и болѣзненномъ выхожденіи послѣдняго, наилучшимъ средствомъ служить Puls., а также Canth..

Сравн. *Мочеподтленіе болѣзненное.*

Камфора, Camphora, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія ея.—При *отравленіи* большими приемами: черной кофе, даваемый до наступленія рвоты, потомъ Opium.

Карбункулъ злокачественный, Anthrax.

Дѣйствительнѣйшее средство противъ карбункула, который развивается вслѣдствіе *зараженія отъ розатаго скота*, пораженнаго имъ, составляетъ Arg., исключая тѣ случаи, гдѣ симптомы требуютъ другихъ средствъ, какъ напримѣръ: Chin., Sil., Rhus, Puls. Такъ называемый *злокачественный прыщъ, сибирская язва (pustula maligna)*, уступаетъ дѣйствію: Arg., Bell., Rhus, Silic., а можетъ быть также: Chin., Huos., Mur.-ac.; Sec., Ser.. Такъ называемый *злокачественный чирей (carbunculus fungiculus malignus)*, который развивается произвольно, безъ зараженія, и обыкновенно образуется между лопатками, въ большей части случаевъ требуетъ Silic., или также: Huos., Lyc. или Nitr.-ac.. Часто Arg. оказываетъ отличную помощь въ началѣ, когда чирей только что началъ образоваться, а остатки болѣзни удаляются посредствомъ N.-vom.—

Другой видъ карбункула, который вмѣсто гноя содержитъ нѣкоторый *родъ вишей*, требуетъ: Arg. и Chin.

Каталепсія, снохожденіе и ясновидѣніе, Catalepsis, Nictobasis, Somnambulismus. Всѣ эти болѣзни мы помѣстили вмѣстѣ, потому что сущность ихъ одна и та же. Въ гомеопатіи еще мало сдѣлано наблюденій по этому предмету. Главныя средства, до сихъ поръ употребленныя противъ *каталепсіи*: 1) Cham., Ipec., Plat., Stram; 2) Acon., Agar., Bell., Cic., Hyos., Mosch., Veratr.; 3) Asa., Camph., Coloc., Dros., Ign., Merc., Op., Petr.. — Противъ *снохожденія*: 1) Bry., Natr.-m., Sil., Sulph.; 2) Petr., Phosph., Rhab.. Противъ такъ называемаго *естественнаго ясновидѣнія, естественнаго снохожденія, или естественнаго магнетическаго сна*, безъ помощи магнетизма, до-сихъ-поръ оказывался полезнымъ Phosph.. Кромѣ того, предоставляется подвергнуть испытанію: 1) Acon., Bry., Cic., Hyos., Magn.-arct.; 2) Asar., Mosch., Natr.-m., Sil., Sulph., Veratr..

Судороги, Болѣзни душевныя и Сновидѣнія.

Катарръ бронхіальный, воспаление бронхій, Catarrhus bronchialis, bronchitis.

§ 1. Средства, чаще всего имѣющія здѣсь мѣсто: 1) Acon., Bel., Bry., Cham., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Arn., Arg., Calc., Caps., Carb.-v., Caust., Chin., Cin., Dros., Dulc., Euphr., Hyos., Ign., Ipec., Lach., Phosph., Phos.-ac., Sep., Sil., Spig. Squill., Stann., Staph., Veratr., Verb.; 3) Bar.-c., Cann., Con., Ferr., Hep., Lyc., Magn., Mang., Natr., Natr.-m., Petr., Sabad., Sep., Spong., Squill., Stram., Tart..

§ 2. При *обыкновенномъ катаррѣ*, выражающемся легкимъ кашлемъ и лихорадкою: Cham., Merc., N.-vom., Puls.. При частомъ и *сухомъ* кашлѣ: Bell., Bry., Cham., Ign., N.-vom., Sulph.; 2) Acon., Caps., Cin., Dros., Hep., Hyos., Lach., Lyc., Merc., Natr.-m., Phosph., Rhus, Spong..—При *судорожномъ* кашлѣ: Bell., Bry., Carb.-v., Cin., Dros., Hep., Hyos., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph..—При кашлѣ съ *обильнымъ изверженіемъ мокроты*: 1) Bry., Carb.-v., Dulc., Euphr., Merc., Puls., Sulph., Tart.; 2) Calc., Caust., Lyc., Seneg., Sep., Sil., Stann.. — При катаррѣ съ *охриплостію*: 1) Cham., Dulc., Merc.,

N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Sulph.; 2) Ars., Calc., Carb.-v., Dros. Mang., Natr., Phosph., Tart.—При *мокромъ насморкѣ*: Ars., Dulc., Euphr., Ign., Lach., Merc., Puls., Sulph..

§ 3. Если болѣзнь принимаетъ рѣзкій *воспалительный характеръ* (Bronchitis acuta въ тѣсномъ смыслѣ): 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Dros., Phosph., Spong.; 2) Ars., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Squill., Sulph.—При *эпидемическомъ катаррѣ или гриппѣ*: 1) Acon., Ars., Bell., Caust., Merc., N.-vom.; 2) Ars., Bry., Camph., Chin., Ipec., Phosph., Puls., Sabad., Seneg., Sil., Spig., Squill., Veratrum.—Противъ *удушливаго катарра*: Ars., Carb.-v., Chin., Ipec., Lach., Op.; 2) Bar.-c., Camph., Graph., Puls., Samb. Tart.—При *хроническомъ катаррѣ*: Ars., Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Dulc., Jod., Lach., Lyc., Mang., Natr.-m., Petr., Phosph., Phos.-ac., Sil., Stann., Staph., Sulph.—Катарральныя страданія вслѣдствіе *кори* обыкновенно требуютъ: Bry., Carb.-v., Cham., Dros., Hyos., Ign., N.-vom.; 2) Acon., Bell., Chin., Coff., Dulc., Ser.—Катарральныя страданія у людей *пожилыхъ* требуютъ: Baryt., Carb.-v., Cop., Hyos., Kreos., Phosph., Stann., Sulph.—У *дѣтей*: Acon., Bell., Cham., Cin., Coff., Dros., Ign., Ipec., Sulph.—У *золотушникахъ* дѣтей: Bell., Calc.—У очень *жирныхъ* дѣтей: Ipec. или Calc..

§ 4. По принадлежкамъ, назначаются:

АСОНИТУМЪ—когда замѣчаются: жгучій, лихорадочный жаръ и полный воспалительный пульсъ; осиплый и охрипый голосъ; болѣзненная чувствительность страждущихъ частей; ухудшеніе боли при дыханіи, кашлѣ и разговорѣ; *сухой короткій кашель* и постоянное раздраженіе на кашель вслѣдствіе неприятнаго щекотанія въ бронхіяхъ или гортани; стѣсненное дыханіе, сопровождающееся напряженіемъ, болью, какъ бы отъ ссадинъ, или покалываніями въ груди при кашлѣ и дыханіи; сильный, жесткій и густой кашель по ночамъ, а днемъ короткий, прерывистый; жажда, бессонница или безпокойный сонъ, во время коего больной мечется въ разныя стороны; жгучая боль головы, краснота глазъ и лица; конвульсивный кашель съ изверженіемъ бѣловатой и кровавистой слизи.

BELLADONNA—сухой кашель, воспаленіе зѣва, насморкъ, сильная лихорадка послѣ полудня и вечеромъ, сухая и жгучая кожа и частый позывъ на холодное питье, причѣмъ однакожъ

больной немного шеть заразы; своеисравіе и злость у дѣтей и очень скорое дыханіе у нихъ во время сна; когда также замѣчаются: *судорожный кашель, не оставляющій времени для дыханія*; сильный потрясающій кашель, сопровождаемый невыносимымъ щекотаніемъ въ гортани, какъ-будто тамъ находится инородное тѣло или пыль; сухой, короткій, пустой кашель, похожій на лай собаки; появленіе кашля ночью, или послѣ полудня, или *вечеромъ* въ кровати, или даже во время сна, и возобновленіе его при малѣйшемъ движеніи; болѣзненное чувство разбитости въ затылкѣ при коликѣ, или раздавливающая боль головы, какъ-будто лобъ трескается; ревматическія страданія въ груди, покалыванія въ грудной кости или подреберьяхъ; слизистый хрипъ въ груди; краснота лица и боль головы; охриплость и накопленіе слизи въ груди; частое чиханіе преимущественно къ концу пристува кашля.

ВуОпіа—сухой или мокротный кашель, возбуждаемый щекотаніемъ въ горлѣ; когда также замѣчаются: *судорожный, удушливый кашель*, преимущественно послѣ полуночи, или по употребленіи пищи или питья, и рвота принятою пищею; кашель съ изверженіемъ желтаго или нечистаго красноватаго цвѣта, или же кровавистой слизи; покалыванія въ боку при кашлѣ, или боли въ груди и головѣ, какъ-будто овѣ домятся; большое разположеніе къ поту; охриплость, слизистый хрипъ и болѣзненность гортани, которыя усиливаются отъ куренія табаку.

Сп а м о м і л л а—накопленіе всякой слизи въ горлѣ; *сухой кашель, возбуждаемый щекотаніемъ въ гортани и груди*, который усиливается при разговорѣ, или кашель по вечерамъ и утрамъ, или *ночью въ постель* и даже во время сна, и иногда сопровождаемый приступами удушья; изверженіе малаго количества горькой слизи по утрамъ, преимущественно, когда кашель вызывается огорченіемъ, а также у непокорныхъ дѣтей послѣ крика или плача, или когда появляются: охриплость и насморкъ, сухость и жженіе въ горлѣ и жажда; лихорадка къ вечеру; дурное расположеніе духа; молчаливость, скупость на слова, склонность къ гнѣву.

М е р с у р і у с—жестокость и охриплость, жженіе и щекотаніе въ гортани, расположеніе къ поту, за которымъ не слѣдуетъ облегченія; усиленіе отъ малѣйшаго сквознаго вѣтра, или когда замѣчаются: сухой, потрясающій и обезсиляющій кашель, появ-

ляющійся преимущественно ночью и возбуждаемый щекотаніемъ или чувствомъ сухости въ горлѣ; кашель съ колючею болью въ груди, или же сопровождающійся тошнотою, рвотою, кровотеченіемъ изъ носу, болями въ головѣ и груди, какъ-будто онѣ лопаются, кровохарканіемъ, влаготочивымъ насморкомъ, охрипlostью и слизистымъ поносомъ.

Них-чоміса—жестокій, сухой и глубокий кашель, вызываемый сухостію въ гортани; напряженность и боль въ ней, *охрипlostь и бользменное чувство шероховатости въ горлѣ*, преимущественно по утрамъ, или вечеромъ въ постели; накопленіе вязкой слизи въ горлѣ, которая не разжижается; залеганіе носа, сухость рта, жаръ и краснота щекъ, дрожь или ознобъ и попеременный жаръ, запоръ, чувство тяжести во лбу, дурное расположеніе духа, своенравіе и злость; или когда замѣчаются: конвульсивный, обезсиляющій, потрясающій кашель, возбуждаемый щекотаніемъ въ горлѣ, преимущественно по утрамъ и ночамъ въ кровати, или послѣ стола, и вызываемый ѣдою, размышленіемъ и чтеніемъ; притомъ тоскливость ночью, или *боль головы, какъ-будто черепъ лопается, боль какъ при ушибѣ въ надчревной части или боли въ подреберьяхъ при кашлѣ*; кашель, со рвотою или кровотеченіемъ изъ носу, или рта.

Pulsatilla—охрипlostь до того, что едва слышны звуки голоса; насморкъ съ истеченіемъ желтоватой, зеленоватой вонючей матеріи; мокротный кашель и боль въ груди; отсутствіе жажды; сначала сухой, потомъ мокрый кашель, при которомъ въ обильномъ количествѣ извергается соленая, горькая, желтоватая, или бѣловатая, или даже кровавистая слизь; *потрясающій кашель*, появляющійся преимущественно по вечерамъ и ночью въ кровати и *усиливающійся въ лежачемъ положеніи*; наклонность ко рвотѣ, настоящая рвота; *чувство задушенія*, происходящее какъ бы отъ сѣрныхъ паровъ; слизистый хрипъ, болѣзненность живота при кашлѣ съ чувствомъ, какъ-будто онъ разбитъ, или ощущеніе болѣзненныхъ толчковъ въ рукѣ, лопаткѣ и въ спинѣ; непроизвольное мочеиспусканіе.

Rhus—охрипlostь, жесткость, отслойка слизистой оболочки горла, частое чиханье, большое накопленіе слизи въ носу безъ насморка, причемъ однакожь дыханіе затруднено; сухой и ко-

роткій кашель ночью, возбуждаемый щеботаніемъ въ бронхіяхъ, сопровождающійся безпокойствомъ и короткимъ дыханіемъ, преимущественно по вечерамъ и передъ полночью; боль, причиняющая чувство толчковъ въ груди; напряженіе и колотье въ груди; боль въ желудкѣ; покаливанія въ поясницѣ; преимущественно, когда кашель усиливается на холодномъ воздухѣ и уменьшается въ теплѣ и при движеніи, или когда ояъ появляется утромъ при пробужденіи или вечеромъ, и сопровождается горечью во рту, или рвотою, пищевыми веществами.

SULPHUR—охрипость до того, что едва слышны звуки голоса; жесткость и почесываніе въ горлѣ, накопленіе слизи въ бронхіяхъ, мокротный насморкъ, кашель и ознобъ, ухудшеніе состоянія при холодной и влажной погодѣ, или обезсиляющей, потрясающей, *сухой кашель*; склонность ко рвотѣ, настоящая рвота и судорожное стягиваніе груди, преимущественно по вечерамъ и ночамъ въ лежащемъ положеніи, а также по утрамъ или послѣ стога; *влажный кашель и обильное отдѣленіе густой бѣлой или желтой слизи* днемъ и сухой кашель ночью; упорный сухой кашель, возбуждаемый щеботаніемъ въ горлѣ; покаливанія въ груди, въ головѣ при кашлѣ; отуманеніе и потемнѣніе зрѣніи; чувство тошноты въ груди; тоскливость, слизистый хрипъ, сердцебиеніе и припадки удушья.

§ 5. Изъ остальныхъ средствъ:

ANISUM—сухой или мокротный кашель, возбуждаемый щеботаніемъ въ горлѣ и появляющійся преимущественно по утрамъ, во время сна, съ плачемъ и крикомъ; кашель у дѣтей, плачущихъ и кричащихъ; мокротный кашель, при которомъ больной не въ состояніи извергнуть скопившуюся въ груди мокроту; преимущественно, когда ко всему этому присоединяются: давящая и судорожная боль головы, какъ-будто мозгъ сжимается; покаливанія въ груди; боль въ поясницѣ и ревматическая боль въ членахъ; частое кровотеченіе изъ носу или рта.

ASPERGNUM—мокротный кашель и затрудненное изверженіе мокроты; накопленіе *вязкой слизи въ юртани и бронхіяхъ*; сухой, потрясающій или обезсиляющій кашель, появляющійся преимущественно по вечерамъ, или по ночамъ, и вызываемый дѣтьемъ, свѣжимъ и холоднымъ воздухомъ; необыкновенная тос-

кшность въ груди, даже припадкн задушенія, преимущественно вечеромъ; необыкновенная усталость и слабость; *охриплость* и *насморкъ*; *изверженіе острой, разпадающей слизи*; ревматизмъ въ головѣ и сильные боли въ ней; ухудшеніе общаго состоянія днемъ и послѣ стола.

САЛСАРРА — часто повторяющаяся и упорная охриплость; накопленіе вязкой слизи въ гортани и бронхіяхъ; сухой, сильный кашель, возбуждаемый щекотаніемъ въ горлѣ, которое происходитъ какъ-бы отъ присутствія пыли въ горлѣ, преимущественно вечеромъ или ночью, во время сна, мокрый кашель и слизистый хрипъ, или кашель съ изверженіемъ густой, желтоватой и вонючей мокроты; боли и покалыванія въ боку и груди; необыкновенная усталость и заботливость о своемъ здоровьѣ.

САРСИСУМ — охриплость и сухой кашель, усиливающийся по вечерамъ и ночамъ; иногда наклонность ко рвотѣ, *блуждающія ревматическія боли*; боли головы, какъ-будто черепъ лопается; притомъ давленіе въ горлѣ и ухѣ, покалыванія въ груди или спинѣ, или чувство давленія на мочевой пузырь и покалыванія въ немъ; насморкъ, залеганіе носа и щекотаніе или свербеніе въ ноздряхъ.

САВОВОКВЕНТАВИЛІС. — *упорная охриплость* и жесткость голоса преимущественно утромъ или вечеромъ, ухудшающіяся отъ долгаго разговора или холодной и сырой погоды; судорожный кашель, появляющійся впродолженіе всего дня въ видѣ нѣсколькихъ приступовъ, или только вечеромъ; кашель съ изверженіемъ зеленоватой слизи; ревматическія боли въ груди и членахъ; *азевная боль*, или свербеніе, почесываніе и щекотаніе въ гортани.

САУСТИСУМ — *сильный, потрясающій кашель*, особенно ночью, и боль въ горлѣ и головѣ; *охриплость, жесткость и слабость голоса*; слизистый хрипъ; боль въ гортани и груди, какъ-будто на нихъ произошла отслойка или они отъслались шероховатыми; мокротный насморкъ и боль головы; притомъ слабый аппетитъ, тошнота и рвота принятою пищею; ревматическія боли въ членахъ и костяхъ лица; ознобъ при всякомъ движеніи; жаръ ночью и сердцебіеніе; большая усталость въ ногахъ; ухудшеніе состоянія на воздухѣ; непроизвольное мочеиспусканіе при кашлѣ.

СНИНА — охриплость, неясность рѣчи и низкій голосъ, замѣ-

сящие отъ крѣпко приставшей слизи въ гортани; притомъ сухой кашель, происходящій какъ бы вслѣдствіе вдыханія сѣрныхъ паровъ; судорожный удушливый кашель, въ ночное время; желчная рвота и затрудненное изверженіе клейкой, или бѣловатой, или даже кровянистой слизи; смѣхъ, разговоръ, дыханіе, даже пища и питье, вызываютъ кашель.

Сина — преимущественно дѣтямъ, при кашлѣ сухомъ, при изверженіи малоколичественной рвоты, внезапномъ вскакиваніи отъ сна, недостаточномъ дыханіи, вздохахъ и стenanіяхъ, блѣдности лица; покалываніи по вечерамъ, особенно если дѣти страдаютъ глистами; мокротный насморкъ, жгучій жаръ въ ноздрахъ и сильное чиханіе съ болью, доводящею больного до крика.

Дювьева — охриплость, низкій и глухой голосъ; сухость, жесткость и чесаніе въ гортани и накопленіе желтоватой, сѣрой или зеленоватой слизи; притомъ *сухой, судорожный, обезсиливающій и потрясающій* кашель, преимущественно ночью или вечеромъ въ кровати, сопровождающійся частю наклонностію ко рвотѣ или настоящею рвотою, съ изверженіемъ принятой пищи, кровотеченіемъ изъ носу или рта; приступы удушья или кашля, который возбуждается смѣхомъ или плачемъ, душевнымъ потрясеніемъ, пѣніемъ, куреніемъ табаку и питьемъ.

Дулсамава — противъ мокротнаго кашля, преимущественно послѣ простуды, охриплости и изверженія крови ртомъ, прерывистаго кашля, похожаго на лай собаки или коклюшь, и вызываемаго глубокимъ дыханіемъ.

Еуривазіа — противъ кашля съ сильнымъ насморкомъ, который въ то же время поражаетъ и глаза; кашель, который появляется только днемъ, сопровождаясь затрудненнымъ изверженіемъ мокроты, или только утромъ, и сопровождается *обильною мокротою* и стѣсненнымъ дыханіемъ.

Нубсіамус — сухой кашель усиливается ночью, особливо въ лежачемъ положеніи, а при вставаніи уменьшается; кашель съ щекотаніемъ въ гортани или бронхіяхъ, или *судорожный* кашель; краснота лица и слизистая рвота.

Ігнатіа — кашель сухой и жесткій, мокротный насморкъ, боль головы и слабый голосъ, или короткій кашель, происходящій какъ-бы отъ присутствія нити въ горлѣ и мало-по-малу стано-

ващійся потрясающимъ и судорожнымъ; кашель у субъектовъ, предающихся печали; ухудшеніе катаррального состоянія послѣ стола, вечеромъ ложась спать и утромъ при вставаніи.

IRRSASUANA — преимущественно дѣтямъ; накопленіе слизи въ груди, препятствующее больному дышать и слизистый хрипъ; судорожный, удушливый кашель; синеватость лица, судорожная конечность тѣла; стягиваніе и чесаніе въ гортани; сухой кашель, или кашель съ изверженіемъ небольшого количества слизи противнаго вкуса; склонность ко рвотѣ и настоящая рвота бѣловатой слизью или кровотеченіе изъ носу и рта.

LACRISIS — катарральный кашель съ насморкомъ, колюція боли въ головѣ, охоченность затылка и страданіе груди; при этомъ *постоянная охриплость съ чувствомъ накопленія слизи, плотно прилипнувшей къ гортани*; кашель, появляющійся особенно ночью во время сна и возбуждаемый щекотаніемъ въ гортани или *самымъ легкимъ давленіемъ* на шею; кашель, усиливающійся послѣ стола, или при вставаніи; боли въ горлѣ, глазахъ, ушахъ и въ головѣ при кашлѣ.

RHOZINOÏS — охриплость и кашель, лихорадка и упадокъ силъ; жесткость и потеря голоса; болѣзненная чувствительность гортани; *сухой* кашель вслѣдствіе щекотанія въ горлѣ; покалыванія въ гортани и боль, какъ при отслоякѣ въ груди; побужденіе къ кашлю при смѣхѣ, питьѣ, громкомъ чтеніи или хожденіи на открытомъ воздухѣ; сухой кашель и изверженіе клейкой или кровянистой слизи.

RHOZINOÏ ACIDUM — необыкновенная охриплость; мокротный кашель вслѣдствіе щекотанія подъ ложечкою и въ предсердіи; сухой вечерній кашель, сопровождающійся мокротою бѣловатую, желтоватую, или даже гноевидною; давяція боли въ груди.

BERIA — кашель съ обильною, болѣею частію имлюстною, или соленою слизистою мокротою цвѣта желтаго, зеленоватаго, гноевиднаго или кровянистаго, появляющійся часто утромъ, или вечеромъ; слизистый хрипъ, слабость и боль, какъ при отслоякѣ въ груди; кашель сухой, судорожный, похожій на коклюшъ, появляющійся ночью или *вечеромъ* къ постели; тоскливость въ груди; тошнота, склонность ко рвотѣ и желчная рвота; кашель преимущественно у людей золотушныхъ, страдающихъ лишаями.

SILICEA — упорный кашель съ обильнымъ, прозрачнымъ или гноевиднымъ изверженіемъ; потрясающій кашель съ болью въ горлѣ и животѣ; удушающій кашель ночью.

SQUILLA — упорный кашель съ обильною прозрачною, гноевидною мокротою, или потрясающій кашель; воспаление зѣва и боли живота, или удушливый кашель ночью.

STANNUM — обильное отдѣленіе слизи *зеленоватою* или *желтоватою цвѣта*, *сладковатою* или *солонюватою вкуса*; сухой, сильный потрясающій кашель, преимущественно вечеромъ въ постели, и продолжающійся до полуночи, или усиливающійся къ утру и иногда сопровождающійся наклонностію ко рвотѣ и настоящею рвотою съ изверженіемъ принятой пищи.

STARPUAGVIA — кашель съ мокротою желтоватою, клейкою или гноевидною; ночью язвенная боль въ груди, или даже изверженіе крови ртомъ.

VELETRIUM — сухой и глубокій кашель, какъ-будто происходящій изъ крайнихъ развѣтвленій бронхій или изъ живота; рѣзь въ животѣ; слюнотеченіе; синеватое лицо; непроизвольное отдѣленіе мочи; сильныя боли въ боку, затрудненное дыханіе и необыкновенная слабость, или покалыванія вокругъ брюшнаго кольца, какъ-будто-бы начинается выпаденіе внутренностей.

VEVASCUM — преимущественно дѣтямъ при сухомъ и жесткомъ кашлѣ, который появляется по вечерамъ и ночамъ, во время сна, не пробуждая больного.

§ 6. Кромѣ вышеупомянутыхъ средствъ, для нѣкоторыхъ случаевъ пригодны могутъ быть слѣдующія: **SUPRUM**, при сильномъ судорожномъ кашлѣ, съ остановкою дыханія и потерей самосознанія во время приступовъ; или при рвотѣ послѣ приступовъ и слизистомъ хрипѣ въ груди вѣтъ приступовъ, сопровождаемомъ свистящимъ дыханіемъ. — **НЕРВА**, при сильномъ, одышливомъ, или сухомъ, хрипломъ кашлѣ, съ перехватами дыханія или болью въ кадыкѣ и съ чиханіемъ или слезами послѣ приступовъ, когда притомъ кашель возобновляется послѣ каждого питья. — **JODIUM**, когда кашель вызывается невмносимымъ щекотаніемъ въ воздухоносныхъ путяхъ, сопровождаясь неровнымъ дыханіемъ во время приступовъ и тоскою; значительное утомленіе послѣ приступовъ и исхуданіе. — **КАЛІСАВВОНІСУМ** иногда показанъ при судо-

рожномъ кашлѣ, отъ котораго больного давить и рветъ слезью, особенно при появленіи приступовъ утромъ (4—5 часовъ), или ночью среди сна. Во многихъ случаяхъ пригоденъ послѣ Carb.-v., или попеременно съ этимъ средствомъ. — *LASTUSA*, при очень сильномъ судорожномъ кашлѣ, съ рвотою при каждомъ приступѣ, особенно когда кашель вызывается каждою переменною погодою или измѣненіемъ температуры. — *SABADILLA*, при одновременномъ насморкѣ, съ тяжестью головы, блѣдностью лица, когда глухой кашель сопровождаютъ рвота или кровохарканіе и особенно когда онъ появляется при горизонтальномъ положеніи больного; ухудшеніе приступовъ отъ холода, около полудня и въ особенности къ вечеру. — *SENEGA*, при жженіи и щелотаніи въ гадкѣ и глоткѣ, съ опасностью задушенія при горизонтальномъ положеніи. — *SPICEWIA*, когда катарръ сопровождается сильными болями лица и когда Вгу. и N.-vom. не привнесли пользы. — *TARTARUS*, когда кашель сопровождается шумными слизистыми хрипами въ дыхательныхъ путяхъ; возобновленіе приступовъ отъ гнѣва; частое чиханіе; тошнота и рвота пищею съ большимъ количествомъ слези; во время приступовъ потъ на головѣ, при горячихъ и влажныхъ ладоняхъ.

Сравни. *Насморкъ, Воспаленіе гортани, Воспаленіе легкихъ, Воспаленіе плевры, Лечочная чихотка, Удушье, Жаба, Коклюшъ, Гриппъ, Кашель, Охриплость.*

Катарръ мочевого пузыря.

Лучшія средства: 1) Dulc., Puls., Sulph.; 2) Ant., Calc., Con., Кал., N.-vom., Phosph. См. также: *Воспаленіе мочевого пузыря и Мочеспусканіе болѣзненное.*

Катарръ удушливый, Orthopnoea paralytica, Catarrhus suffocativus.

Лучшія средства: 1) Ars., Carb.-v., Chin., Ipec., Lach., Op.; 2) Barut., Camph., Graph., Puls., Samb.—Если болѣзнь происходитъ отъ катарральной состоянія, сопровождающагося накопленіемъ слези въ бронхіяхъ (Catarrhus suffocativus), то лучшія средства: 1) Ars., Camph., Chin., Ipec., Tart.; 2) Carb.-v., Graph., Puls., Samb. Если же болѣзнь находится въ связи съ паралическимъ со-

столниемъ лезикъ (Orthopnea paralytica): Barut.-c., Graph., Lach., Op.; 2) Arg., Aur., Carb.-v., Chin. — При удушливомъ катаррѣ у дѣтей Acon., Ipec., Samb., Tart. — У стариковъ: 1) Barut., Lach., Op.; 2) Arg., Aur., Bar.-c., Carb.-v., Chin., Con.

См. Удушье.

Кашель.

§ 1. Онъ составляетъ всегда симптомъ другихъ страданій, поэтому всѣ средства, могущія удалить главную болѣзнь, могутъ быть назначены и противъ кашля, такъ что нельзя составить подробныхъ указаній при леченіи этого припада. Мы изложимъ въ этой статьѣ только общія замѣчанія о выборѣ средствъ противъ различныхъ видовъ кашля, потому что всегда нужно сообразить симптомы органовъ, страдающихъ сочувственно, прежде нежели рѣшимся на выборъ какого-либо средства. Такимъ образомъ главные средства противъ различныхъ видовъ кашля суть: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Her., Ipec., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Stann., Sulph.; 2) Cham., Chin., Cin., Con., Dros., Dulc., Her., Hyos., Ign., Kal., Led., Lach., Lyc., Rhus., Sil.; 3) Arg., Caps., Caust., Euphr., Op., Phos.-ac., Squill., Stann., Staph., Veratr., Verb..

§ 2. Изъ этихъ средствъ, въ особенности достойны вниманія:

Противъ *катарральнаго* кашля: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Merc., N.-vom., Puls., Rhus., Sulph.; 2) Arn., Arg., Calc., Caps. Caust., Chin., Dros., Dulc., Euphr., Hyos., Ign., Ipec., Lach. Phosph., Phos.-ac., Sep., Sil., Spig., Squill., Stann., Veratr., Verb. — Противъ *гастрическаго* или такъ называемаго *желудочнаго* кашля 1) Bry., Carb.-v., Dros., Ferr., Lep., Ipec., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Calc., Chin., Kreos., Natr.-m., Sep., Sil.; 3) Lach., Phos.-ac., Rhus., Sabad., Tart., Veratr. — Противъ *нервнаго* и *судорожнаго* кашля: 1) Bell., Bry., Carb.-veg., Cin., Cupr., Dros., Her., Hyos., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amb., Chin., Con., Ferr., Jod., Lach., Nitr.-ac., Sil., Magn.-arct. — Если такой кашель сопровождается *рвотою*, или склонностию къ ней: Bry., Carb.-v., Dros., Ferr., Ipec., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Sep., Sulph., Tart., Veratr. — Если при кашлѣ замѣчаются и припадки *здушенія*: Bry., Cham., Chin., Dros., Her., Ipec., Lach., Op., Samb., Spig., Sulph., Tart., Magn.-arct.

§ 3. Вообще особенно должно имѣть въ виду:

При *сухомъ кашлѣ* (безъ мокроты): 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Coff., Her., Hyos., Ign., Ipec., Lach., N.-vom., Petr., Phosph., Sep., Spong., Sulph.; 2) Ant., Arn., Ars., Calc., Carb.-v., Caust., Chin., Cin., Coff., Cupr., Dros., Her., Jod., Kreos., Lach., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-mosch., Plat., Puls., Rhus., Seneg., Spig., Squill., Stann., Staph. — При *кашлѣ съ мокротою*: 1) Ars., Bry., Calc., Chin., Jod., Lyc., Phosph., Puls., Seneg., Sep., Sil., Squill., Stann., Sulph.; 2) Acon., Alum., Anac., Dros., Ferr., Kal., Phos.-ac., Ruta., Spong., Staph., Thuj., Veratr. — Если мокрота отдѣляется только *днемъ*, а ночью кашлемъ *сухой*: Ars., Calc., Cham., Graph., N.-vom., Puls., Sabad., Sil., Sulph. — Когда мокрота отдѣляется только *утромъ*: 1) Alum., Amm., Bry., Calc., Carb.-v., Ferr., Her., Magn.-c., Magn., Natr.-m., Phosph., Puls., Sep., Squill., Sulph.-ac.; 2) Bell., Kal., Led., Lyc., Mur.-ac., Natr., Nitr.-ac., Phos.-ac., Sil. — Только *вечеромъ*: 1) Arn., Cin., Graph.; 2) Calc., Kal., Lyc., Mur.-ac., Nitr., N.-vom., Phosp., Ruta., Sep., Stann. — Преимущественно *ночью*: Bell., Calc., Caust., Her., Led., Lyc., Sep. — *Не можетъ быть извернута*: Amb., Arn., Caust., Kal., Sep.

§ 4. Если мокрота *кроволистая*: 1) Acon., Arn., Bry., Calc., Ferr., Ipec., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sulph.; 2) Ars., Bell., Chin., Con., Dros., Dulc., Her., Hyos., Lach., Laur., Led., Merc., Nitr., Rhus., Sabin., Sec., Sep., Sil., Squill., Sulph.-ac. — Содержитъ *струйки кровянистая* или слезь, смѣшанную съ кровью: 1) Ars., Bry., Chin., Ferr., Phosph., Sabin., Sep.; 2) Acon., Arn., Bell., Borax., Jod., Ipec., Lyc., Magn.-c., Op., Sulph.-ac., Zinc. — *Гноевидна*: 1) Carb.-v., Chin., Con., Kal., Lyc., Natr., Nitr., Phosph., Sep., Sil., Staph., Sulph.; 2) Ars., Bell., Carb.-ac., Dros., Ferr., Her., Nitr.-ac., Phos.-ac., Puls., Rhus., Stann. — При *холодной* мокротѣ: Merc., Rhus. — *Студениста*, въ видѣ варенаго крахмала: Arg., Baryt., Chin., Dig., Ferr., Laur. — *Пылиста*: Ars., Ferr., Op., Phosph., Puls., Sec., Sil. — *Слизиста*: 1) Ars., Bry., Calc., Chin., Lyc., Phosph., Puls., Stann., Sulph.; 2) Amm., Baryt., Bell., Carb.-v., Chin., Cin., Dulc., Jod., Kreos., Lach., Magn.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Ruta., Staph., Thuj. — *Зловонна, вонюча*: 1) Calc., Natr., Sil., Sulph.; 2) Ars., Con., Graph., Guaj., Lyc., Magn.-m., Nitr.-ac., Phos.-ac., Sep., Stann. — *Водянисто-слизиста*: Arg., Carb.-v., Cham.,

Chin, Ferr., Graph., Lach., Lyc., Magn.-с., Merc., Stann, Sulph.—
Вязка: 1) Ant., Ars., Bell., Bar., Carb.-v., Seneg., Sil.; 2) Alum.,
 Anac., Cann., Cham., Chin., Dulc., Ferr., Jod., Kal., Magn.-с.,
 Magn.-m., Lach., Merc., Mez, Phos.-ac., Rhus, Spong., Zinc.

§ 5. Если мокрота *ненормальная цвѣта*: 1) Bry., Calc., Carb.-v.,
 Dros., Kreos., Phosph., Puls., Stann., Staph., Thuj.; 2) Acon.,
 Amm.-m., Arg., Lyc., Magn., Merc., Natr., Nitr.-ac., Ruta, Ser.,
 Spong.; — *сѣраго цвѣта*: 1) Amb., Ars., Lyc., Ser.; 2) Anac., Arg.,
 Chin., Kreos., Lach., Magn.-m., N.-vom., Thuj.; — *зеленоватого*:
 1) Ars., Carb.-v., Magn.-с., Lyc., Puls., Stann.; 2) Borax, Colch.,
 Led., Mang., Natr., Phosph., Sil., Thuj.; — *красноватая, но не*
кровавистая: Bry., Squill.; — *черноватая*: Chin., Lyc., N.-vom.,
 Rhus; — *бѣловатая*: 1) Arg., Carb.-v., Kreos., Lyc., Phosph., Ser.,
 Sulph.; 2) Acon., Amm., Carb.-an., Chin., Cin., Cupr., Ferr., Rhus,
 Sil.

§ 6. При мокротѣ, имѣющей *горькій вкус*: 1) Ars., Cham.,
 Merc., N.-vom., Puls.; 2) Arn., Bry., Canth., Dros., Nitr.-ac.,
 Ser.; — *мыльный*: Arn., Bell., Carb.-v., Cham., Con., Cupr., Ferr.,
 Puls., Ser., Stann.; — *солонный*: 1) Ars., Lyc., Natr., Phosph., Puls.,
 Ser.; 2) Alum., Amb., Baryt., Calc., Chin., Dros., Graph., Magn.-с.,
 Merc., N.-vom., Samb., Sil., Sulph.; — *кислый*: 1) Calc., N.-vom.,
 Phosph.; 2) Bell., Cham., Chin., Her., Kal., Mag.-m., Plumb., Puls.,
 Sulph.; — *вкус плесени*: Borax; — *сладковатый*: 1) Calc., Phosph.;
 2) Kreos., Kal., Lach., Magn.-с., N.-vom., Puls., Samb., Squill.,
 Stann., Sulph.; — *вкус табачнаго сока*: Puls.; — *противнаго, опера-*
тивного вкуса: 1) Ars., Dros., Merc., Puls.; 2) Calc., Ferr.,
 Ipec., Lach., Natr.-m., Ser.

§ 7. Кромѣ связанныхъ, достойны вниманія еще слѣдующія
 обстоятельства:

При *обезсмысливающемъ, потрясающемъ камлѣ*: Lach., Merc., N.-
 vom., Puls., Stann., Sulph.; 2) Anac., Carb.-veg., Hyos., Ign., Lyc.,
 Sil. — При *удушливомъ*: 1) Ars., Cupr., Ipec., Op., Sil., Tart.; 2)
 Carb.-an., Carb.-v., Caust., Cin., Coss., Her., Lach., Magn.-arct.,
 N.-mosch., N.-vom., Puls., Ser., Spig.; — *пустомъ, похожемъ на*
лай собаки: 1) Acon., Bell., Bry., Dros., Her., Nitr.-ac., Spong.; 2)
 Caust., Cin., Ign., Kreos., Phosph., Samb., Spig.; — *сильномъ, жесткомъ,*
глубокомъ: 1) Carb.-v., Cin., Her., Ign., Merc., N.-vom., Stann.;

2) Acon., Amb., Ars., Carb.-an., Caust., Нер., Kreos., Lyc., Nitr.-ac., Samb., Veratr. — *Прерывистомъ свистящемъ*: 1) Cin., Dros.; 2) Bell., Carb.-v., Con., Cupr., Dulc., Hyos., Ipec., Phosph., Puls., Spong., Veratr. — *При кашлѣ, возбуждаемомъ икотаніемъ въ гортанѣ*: 1) Acon., Arn., Ars., Cham., Jod., Ipec., Lach., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Staph; 2) Amm., Bell., Carb.-an., Caust., Con., Nitr., Sil., Spong., Stann., Veratr.; — *судорожнаго*: 1) Amb., Bry., Carb.-v., Cin., Ferr., Hyos., Ipec., Magn.-arct., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Bell., Calc., Chin., Con., Dros., Ign., Kal., Kreos., Merc., Natr.-m., Sep., Sil.; — *короткомъ, стривистомъ*: 1) Acon., Ars., Coff., Lach., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Alum., Bry., Caust., Chin., Graph., Нер., Ign., Kreos., Lyc., Nitr., Nitr.-ac., Rhus, Sep., Spong., Squill, Stann., Sulph.-ac.; — *происходящемъ какъ-бы отъ вдыханія стирнаго паровъ или отъ присутствія пыли въ горлѣ*: 1) Ars., Chin., Ign., Puls.; 2) Amm., Calc., Cin., Teucr.

§ 8. Если приступы кашля появляются *вечеромъ*: 1) Ars., Calc., Caps., Carb.-an., Carb.-v., Dros., Нер., Kreos., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Puls., Stann.; 2) Amm., Con., Kal., Lach., Lyc.; — *преимущественно ночью, въ постели*: 1) Acon., Amm., Ars., Baryt., Bell., Calc., Caps., Cham., Dros., Graph., Hyos., Kal., Merc., Natr.-m., N.-vom., Petr., Puls., Sep., Sil.; 2) Anac., Arn., Carb.-an., Carb.-v., Caust., Chin., Coccul., Coff., Colch., Нер., Ipec., Kreos., Lyc., Magn.-arct., Magn.-m., Phosph., Puls., Sulph.; — *по утрамъ*: Alum., Ars., Bry., Caust., Chin., Jod., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; — *послѣ стола*: Ars., Bry., Calc., Carb.-v., Chin., Нер., Lach., N.-vom., Puls., Phosph., Sil., Staph.; — *отъ нитя*: Acon., Ars., Bry., Chin., Dros., Нер., Lach., Phosph., Squill; — *отъ вѣздужа*: 1) Ars., Phosph., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Alum., Ipec., Magn.-arct., Rhus, Seneg.; — *холода, холодной вѣздужа или нитя*: 1) Amm., Caust., Нер., Phosph., Sil., Squill; 2) Carb.-v., Dulc., Nitr.-ac., Sabad., Sep.; — *тѣлодвиженія*: 1) Ars., Bry., Chin., Dros., Ferr., Lach., N.-vom., Phosph., Sil., Stann.; 2) Нер., Natr.-m.; — *движенія рруди* (смѣха, разговора, пѣнія, чтенія): 1) Chin., Lach., N.-vom., Phosph., Stann.; 2) Anac., Baryt., Caust., Dros., Mang., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Sil.; — *ожесточаются только въ лежачемъ положеніи, а при вставаніи облегчаются*: 1) Hyos., Mez., Puls., Sabad., Sulph.; 2) Con., Ipec., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sil.

§ 9. Наконецъ, если кашель причиняетъ: *боль в горле*: 1) Bell., Bry., Calc., Caust., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Alum., Amb., Anac., Caps., Carb.-v., Her., Lach., Lyc., Merc., Phosph., Sep., Squill.; — *сильную боль въ горле*: 1) Acon., Carb.-v., Her., Kal., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Spong.; 2) Ars., Calc., Caust., Chin., Lyc., Nitr.-ac.; — *боль въ груди*: 1) Acon., Bell., Bry., Lyc., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Amm., Arg., Ars., Borax., Calc., Carb.-v., Caust., Dros., Kal., Mang., Merc., Nitr.-ac., Petr., Sep., Squill.; — *одновременно боль въ сторону желудка и подреберьяхъ*: 1) Bry., Dros., Lach., N.-vom., Phosph.; 2) Amb., Amm., Arg., Her., Lyc., Nitr.-ac., Sep., Sulph.; — *боли въ бокахъ*: 1) Acon., Bry., Squill., Phosph., Sulph.; 2) Amb., Chin., Veratr.; — *давление брюшныхъ внутренностей на мочевой пузырь и непроизвольное мочеиспускание*: 1) Caust., Natr.-m., Phosph., Squill., Zinc.; 2) Ant., Caps., Colch., Kreos., Puls., Staph., Sulph.; — *рвоту или удушье*: 1) Bry., Carb.-v., Dros., Her., Ipec., Lach., N.-vom., Rhus, Sulph., Tart.; 2) Calc., Chin., Kreos., Natr.-m., Rhus, Sep., Sil.; — *затрудненіе или остановку дыханія*: 1) Ars., Cupr., Ipec., Op., Sil., Tart.; 2) Acon., Bell., Carb.-an., Carb.-v., Cin., Con., Her., Kreos., Lach., Magn.-acet., Natr., N.-mosch., N.-vom., Puls., Sep., Sil., Spig.; — *сильное движеніе на брюшное кольцо, какъ-бы отъ выпаденія кишки*: 1) Magn.-acet., N.-vom., Sulph.; 2) Cocc., Natr.-m., Sil., Veratr.; — *красноту или синеватость лица при кашлѣ*: Acon., Bell., Cin., Con., Cupr., Ipec., Kal., N.-vom., Op., Sil. — *Когда приступы сильно дѣйствуютъ на расположеніе духа, напр. сильно сердята*: 1) Ars., Bell.; 2) Arg., Cham., Tart.; *вызываютъ слезы*: 1) Arg., Bell., Cin., Her.; 2) Samb., Tart..

Сравн. *Удушье, Жаба, Воспаленіе легкаго, Воспаленіе плевры, Коклюшъ, Гриппъ, Катарръ, Воспаленіе дыхательныхъ путей, Чашотка легочная.*

Квасцы, Alumen. Отравленіе и страданія отъ злоупотребленія квасцовъ. — При отравленія большими приемами квасцовъ: мыльная или сахарная вода до наступленія рвоты; потомъ, противъ послѣдовательныхъ страданій, Puls. или Veratr., смотря по существующимъ симптомамъ.

Кишечъ заворотъ, Pons, Miverere.

Этотъ недугъ выражается тѣмъ, что больной извергаетъ рвотю калъ и мочу. Если болѣзнь развилась вслѣдствіе *судорожнаго спутыванія* или *стягиванія* кишечъ, то показаны: 1) Op., Plum., Thuj.; 2) Coss., N.-vom., Sulph.—Если же причину составляетъ *воспаленіе* или *внутренняя опухоль*, то главныя средства: Bry., Sulph., а если присоединяется *сильная мигорадка*, то Acon.. Можетъ быть, найдутся умѣстными также: Bell., Lach., Mercs.

См. *Воспаленіе кишекъ и Грыжа.*

Кожа болѣзненная.—Лучшія средства противъ расположенія кожи, при незначительныхъ поврежденіяхъ, къ нагноенію и упорному изъязвленію: 1) Cham., Her., Lach., Petr., Sil., Sulph.; 2) Alum., Baryt., Borax, Calc., Graph., Lyc., Mang., Nitr.-ac., Staph..

Кожи моволитость, Callositas cutis.

Средства: 1) Arg., Graph., Rhus, Sep.; 2) Chin., Dulc., Lach., Ran., Sil.—При *твердыхъ мозоляхъ*, предпочитаютъ: 1) Ant., Clem., Graph., Ran., Sep., Sil.; 2) Dulc., Lach., Rhus, Sulph., Thuj.—При *розовидныхъ* отвердѣніяхъ: Ant., Graph., Ran., Sulph.—Если отолстѣвшая кожа отдѣляется или *отслаивается*: 1) Graph., Natr., Sep.; 2) Amm., Ant., Borax, Clem., Ran., Sil., Sulph.

Кожи сухость, недостатокъ испаринны.

Собственно составляетъ только симптомъ другія болѣзни, однакожь играетъ немаловажную роль при выборѣ средствъ противъ различныхъ недуговъ. Средства: 1) Acon., Bell., Calc., Cham., Chin., Colch., Dulc., Graph., Kal., Lyc., Led., N.-mosch., Phos., Ran., Sil., Sulph.; 2) Amm., Arg., Ars., Cann., Caust., Coff., Her., Hyos., Jod., Ipec., Lach., Magn.-c., Mur.-ac., Natr., Nitr.-ac., Phos.-ac., Plat., Puls., Rhus, Sabad., Sec., Sep., Staph., Verb., Viol.-od.

Кожлющъ, Tussis convulsiva epidemica.

§ 1. Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленныя противъ этой болѣзни вообще: 1) Acon., Arg., Bell., Carb.-v., Cin., Cypr., Dulc., Her., Ipec., Mercs., N.-vom., Puls., Veratr.; 2) Bry.,

Снам., Соп., Јод., Лаш., Лед., Сер., Sulph, Tart., а можетъ быть также: 3) Анас., Агъ., Ферр., Лаш., Nitr-ac., Samb..

§ 2. Въ *первомъ периодѣ* или въ *периодѣ раздраженія*, съ самаго начала иногда уничтожаютъ болѣзнь: Асон., Carb.-v., Dulc., Ipec., N.-vom., Пулс.

Асонитумъ—гдѣ съ самаго начала болѣзни кашель сухой и свистящій и замѣчается лихорадка, или когда дѣти при этомъ жалуются на жгучія боли въ глоткѣ или въ дыхательныхъ путяхъ.

Савво-убо.—когда болѣзнь угрожаетъ переходомъ во второй периодъ или когда кашель съ самаго начала былъ конвульсивнаго свойства и появился преимущественно вечеромъ или предъ полночью; также когда замѣчаются: краснота горла, боль въ глоткѣ при глотаніи; глаза, наполненные слезами, или покашливанія въ головѣ; боли въ груди и глоткѣ; или же сыпь на головѣ и животѣ.

Дулсамава—если кашель съ самаго начала былъ мокротный съ легко пввергающеюся мокротой и охриплостью, и если онъ обнаружился вслѣдствіе простуды.

Иресасуанна—если кашель съ самаго начала сопровождается сильною тоскою, опасностью задушенія и синеватымъ цвѣтомъ лица; преимущественно, когда N.-vom. противъ этого состоянія оказалась недостаточною.

Нух vomіса—когда кашель бываетъ сухой и посылается преимущественно послѣ полночи до утра, сопровождаясь рвотою, тоскою, припадками задушенія, синеватымъ цвѣтомъ лица и кровотеченіемъ изъ рта и носа.

Пульсатилла—когда кашель сначала бываетъ мокротный сопровождается рвотою, состоящею изъ слюны, или принятой пищи, или когда при этомъ бываетъ слизистый поносъ.

§ 3. Во *второмъ периодѣ*, или *периодѣ судорожнаго кашля*, сопровождающагося рвотою и кровотеченіемъ изъ рта и носа, лучшія средства: 1) Сип., Сирг., Дроз., Vegetr.; 2) Bell., Merc..

Сина имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ дѣти, во время паровсизма, коченѣютъ. Это средство дѣйствуетъ специфически у дѣтей, когда замѣчаются признаки присутствія глистовъ, частая рвѣ въ животѣ, зудъ въ заднемъ проходѣ и потребность часто тереть се-

бѣ носъ или ковырять его пальцами. Въ этомъ случаѣ также полезенъ и Мерс..

Суррум—если во время пароксизма появляется окованность тѣла, прекращается дыханіе и теряется самосознаніе; кромѣ того, рвота послѣ приступа и слизистый хрипъ въ груди виѣ главныхъ приступовъ.

Дрозка—если къ симптомамъ этого періода присоединяются необыкновенно сильныя пароксизмы; если очень ясно слышится свистящій тонъ кашля; когда не замѣчается лихорадки, или же она развилась въ очень сильной степени, съ ознобомъ и жаромъ. Когда замѣчаются жажда послѣ дрожа, притомъ потъ, болѣе холодный, нежели горячій, появляющійся только въ ночное время; ухудшеніе состоянія при покоѣ, улучшеніе при движеніи. Это средство всегда предпочитается тамъ, гдѣ коклюшъ виолнѣ развился и сопровождается рвотою, которою извергается или пища, или слизистыя вещества, кровотеченіемъ изъ рта и носа. (Послѣ Дроз., часто умѣство *Veratr.*)

Увватрум—если Дроз., или Сурр. не виолнѣ оказались достаточными противъ пароксизмовъ судорожнаго періода, или же прежде этихъ средствъ, если дѣти чрезвычайно слабы и замѣчается родъ медленной лихорадки, сопровождающейся холоднымъ потомъ, преимущественно на лбу; также когда замѣчаются малый, слабый и ускоренный пульсъ; сильная жажда или неправильное испраженіе мочи во время пароксизма; боли въ груди и нахахъ, свѣчечное отуманеніе въ промежуткахъ пароксизмовъ; необыкновенная слабость затѣла до того, что больной едва въ состояніи держать голову прямо; сонъ, похожая на красуху на всемъ тѣлѣ, или только на лицѣ и рукахъ.

§ 4. Конвульсивная форма коклюша не всегда виолнѣ развивается. Часто въ эпидеміяхъ дѣти поражаются судорожнымъ кашлемъ, имѣющимъ не всѣ характеристическіе симптомы кашля, т. е. одна и таже по сущности своей болѣзнь принимаетъ форму болѣе или менѣе отличную отъ обыкновенной. Средства, имѣющія мѣсто въ такихъ случаяхъ, суть: *Bell., Bry., Jod., Merc., Sulph., Tart.*

Билладонна—когда замѣчаются: сочувственное пораженіе мозга, мучительное чувство въ сторонѣ желудка, кровотеченія изъ рта и носа при кашлѣ, или кровяныя подтеки въ глазахъ,

или другія судорожныя страданія, какъ напр. столбнякъ, конвульсивное удушье; пароксизмы, обанчивающіеся чиханьемъ.

ВуѲоніа—приступы удушливаго кашля преимущественно вечеромъ или ночью, или всякій разъ послѣ принятія пищи или питья, сопровождающіеся отсутствіемъ дыханія и рвотою, когору извергается принятая пища.

Юдіумъ—если кашель возбуждается невыносимымъ щекотаньемъ въ бронхіяхъ, вдыханіе дѣлается волнообразнымъ, во время пароксизма, замѣчается необыкновенная слабость, усталость и исхуданіе.

Ластиса—если кашель очень силенъ и послѣ всякаго приступа его наступаетъ рвота, но при этомъ отсутствуютъ всѣ другія характеристическіе симптомы коклюша.

Мивсубіусъ—когда кашель появляется только ночью, или днемъ, или когда онъ обнаруживается въ двухъ пароксизмахъ, слѣдующихъ вскорѣ одинъ за другимъ и отдѣляющихся отъ новыхъ двухъ большимъ промежуткомъ времени; или же при *настолящемъ коклюшѣ*, когда у дѣтей, во время рвоты, начинается сильное кровотеченіе, выступаетъ сильный потъ ночью и обнаруживается возвышенная нервная раздражительность; преимущественно у дѣтей, страдающихъ глистами. (Послѣ Мерс., въ послѣднемъ случаѣ, прилично Carb.-v.).

Сульфуръ—когда пароксизмы кашля сопровождаются рвотою и не уступаютъ ни одному изъ сказанныхъ средствъ.

Тавтавіусъ—преимущественно тамъ, гдѣ признаки тошноты сопровождаются поносомъ и замѣчается необыкновенная слабость и упадокъ жизненныхъ силъ, или когда дѣти ночью извергаютъ ужныя рвоты.

§ 5. Если конвульсивный періодъ коклюша уже прошелъ и болѣзнь приближается къ концу, то назначаютъ тѣ средства, которыя употребляются противъ остающагося катарральнаго состоянія: *Ап.*, *Сarb.-veg.*, *Dulc.*, *Нер.*, *Puls.*.

Авніса имѣетъ мѣсто, если дѣти послѣ кашля сильно плачутъ, или когда приступы кашля начинаются крикомъ и плачемъ, или же вызываются ими.

Саввоуег.—когда катарральныи кашель измѣнился въ су-

обросшей, или когда прочіе симптомы коклюша отсутствуют, но рвота все еще продолжается.

DULSAMARA—когда катаральный кашель сопровождается отдѣленіемъ обильной мокроты.

HEPRA—когда кашель хотя уменьшился, но жестокъ, густъ и сухъ; при этомъ наклонность ко рвотѣ послѣ приступовъ и плачь.

PULSATILLA—при мокротномъ кашлѣ съ легко отдѣляющеюся свороточною слизью.

§ 6. Не должно думать, чтобы каждое изъ исчисленныхъ средствъ соотвѣствовало только симптомамъ того исключительно періода, для котораго оно здѣсь назначено, оставаясь неумѣстнымъ для симптомовъ другаго періода. Иногда оказывается приличнымъ, смотря по тѣлосложенію, индивидуальности и различнымъ формамъ болѣзни, такое средство противъ настоящаго коклюша, которое здѣсь назначается противъ его предвѣстниковъ, или противъ кашля, похожаго на коклюшъ. Названіе болѣзни никогда не рѣшаетъ выбора средствъ. Только общность существующихъ симптомовъ должна служить основаніемъ выбора.

См. Катарръ, Жаба, Воспаленіе гортани, Кашель.

Болтуны, *Pilae polonicae*. — Средства противъ этого болѣзненнаго состоянія волюсь: *Vinc., Borax., Lyc., Natr. m.*

Кормленіе грудью.

§ 1. Средства, употребляемая противъ различныхъ страданій, съ коими иногда сопрягается кормленіе грудью, вообще слѣдующія: 1) *Bell., Calc., Cham., Merc., Puls., Sep., Sil.*; 2) *Acon., Bry., Carb.-v., Chin., Con., Dulc., Kal., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhab., Rhus, Staph., Zinc.*; 3) *Arg., Borax, Carb-an, Ciz., Graph., Ign., Ipec., Lach., Lyc., Natr.-m., Samb., Stann.*

§ 2. Изъ нихъ рекомендуютъ: *противъ недостатка молока*: 1) *Agn., Calc., Caust., Dulc., Puls., Rhus, Zinc.*; 2) *Acon., Bell., Cham., Chin., Cocc., Jod., Merc., N.-mosch., Sep., Sulph.* — Если недостатокъ молока происходитъ отъ недостатка жизнеспособности (въ грудяхъ или цѣломъ организмѣ): *Calc., Caust., Puls., Rhus.* — Если отдѣленіе молока воспрепятствовано слишкомъ возмущенною

замедлительностию и замѣчаются напряженность, краснота, бѣшеніе въ пораженныхъ частяхъ и сильная молочная лихорадка: 1) Асоп., Вгу., Cham.; 2) Bell., или Merc. — При *инициальн. на груди*: 1) Dulc.; 2) Агн., Bell., Cham., Rhus. — При *отсутствіи видимой причины*: 1) Dulc.; 2) Агн., Calc., Zinc.

§ 3. При молочной лихорадкѣ, когда она требуетъ медицинской помощи, назначаются преимущественно Асоп., одинъ или попеременно съ Сoff. — Если же оба эти средства окажутся недостаточными, то часто бываютъ уместны: Bell., Вгу., Rhus. — При одновременномъ поврежденіи дѣтородныхъ частей вслѣдствіе тяжелыхъ родовъ, пригодна Агн.

§ 4. Противъ скривія молока, рекомендуются: Bell., Вгу. Dulc., Puls.; 2) Асоп., Calc., Cham., Сoff, Merc., Rhus, Sulph. — Если ово произошло вслѣдствіе *сильнаго душевнаго потрясенія*: 1) Вгу., Cham., Сoff.; 2) Асоп., Bell.; — *простуды*: 1) Bell., Cham., Dulc., Puls.; 2) Асоп., Merc., Sulph. — При *переносѣ молока на органы тазовой части живота*: Bell., Вгу., Puls., Rhus. — *Хроническія послѣдствія* отъ скривія молока часто требуютъ Rhus, или Calc., Dulc., Lach., Merc., Puls., Sulph.

§ 5. Если *молоко дурно*, слишкомъ жидко, или если дѣтя не хочетъ его принимать, то матери назначаютъ: 1) Cham., Cin., Merc., Sil; 2) Вогах, Carb.-an., Lach., N.-vom., Puls., Rhab. Samb.

Вогах — если молоко легко свертывается, причемъ если Вогах окажется недостаточнымъ, то — Lach. — **Silicon** — когда у ребенка, послѣ сосанія, подвѣдается рвота и когда онъ затѣмъ не принимаетъ груди.

§ 6. Наконецъ: Puls. есть лучшее средство для прекращенія отдѣленія молока *при отнятіи отъ груди*, или противъ страданій, слѣдующихъ иногда за отнятіемъ. Кромѣ того, также полезны: Bell., Вгу., Calc. — Противъ *истеченія молока отъ періода кормленія грудью*, лучшее средство Calc., особенно если груди всегда переполнены молокомъ. Кромѣ того, рекомендуются еще: Bell., Вогах, Вгу., Rhus, Chin., Соп., Phosph., Puls., Stram.

См. *Груды асенскія*.

Боръ, Morbilli.

§ 1. Главныя средства: 1) Acon., Puls.; 2) Bell., Bry., Chin., Phosph., Sulph.

§ 2. Для облегченія высыпанія и сокращенія періода предвѣстниковъ, съ большимъ успѣхомъ употребляется Acon., или Puls., или даже Coff., если больной очень безпокоенъ, томится бессонницею, выходитъ изъ себя, мечется и стонетъ. *Септоболезнь*, которая иногда появляется, уничтожается посредствомъ Bell., если Acon. или Puls. оказались недостаточными; показаны также Phosph. и Sulph.. *Кашель* иногда требуетъ Coff. или Нер. послѣ употребленія Acon.. При *легочномъ катаррѣ*, или при *воспаленіи легкихъ*, надо прибѣгнуть къ Bry..

§ 3. Въ случаѣ *скрытія силъ*, главныя средства: 1) Bry., Puls., Phosph.; 2) Arg., Bell., Caust., Bell., Sulph.. — Противъ *страданій мозга*, преимущественно полезны: 1) Bell. или Stram.; 2) Arg., Bell., Puls.. — *Страданія легкихъ* требуютъ: Bry., Phosph., Sulph.. — Признаки *загара*: 1) Phosph., Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-veg., Mur.-ac., Phos.-ac., Sulph.-ac..

§ 4. Противъ *страданій*, появляющихся послѣ исчезенія главной болѣзни, считаются умѣстными: Bry., Carb.-veg., Cham., Chin., Dros., Dulc., Hyos., Ign., N.-vom., Rhus, Ser., Stram., Sulph.. — *Катарральныя страданія*, какъ-то: *кашель, охриплость, воспаленіе гѣла*, требуютъ, смотря по обстоятельствамъ: Bry., Carb.-v., Cham., Con., Dros., Dulc., Hyos., Ign., N.-vom., Ser., Sulph.. — Если кашель *сухой и пустой*: Cham., Ign., N.-vom.. — Если онъ характера *судорожнаго*: 1) Bell., Cin., Hyos.; 2) Carb.-v., Dros., Canth., Cupr., Dig., Ipec.. — *Слизистые поносы* часто требуютъ: Chin., Merc., Puls., Sulph.. — *Воспаленіе уха или течь изъ ушей*: 1) Puls.; 2) Carb.-v., Colch., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Sulph.. — *Воспаленіе окологубной железы*: Arg., Rhus.

§ 5. По принадлежамъ, назначаются:

АСОНИТУМЪ—*головокруженіе, красные, болящіе глаза и септоболезнь*; *воспаленіе гѣла и охриплость*; притомъ *сухой, короткий, пустой кашель*; *покалыванія въ боку и груди*; *бессонница, или непродолжительный сонъ, наполненный живыми видѣніями*, и часто *внезапное вскакиваніе съ постели*; *сухой, общій жаръ*; *красное и горячее, или*

же одутловое лицо; кровотечение изъ носу; частый позывъ на испусканіе мочи; рвота или колика, иногда съ поносомъ.

BELLADONNA — значительная опухоль окологлазныхъ железъ и слюнотечение; притомъ воспаление зѣва съ затрудненіемъ глотаніемъ и болѣзненными покалываніями при глотаніи; охриплость и сухой кашель, который надрываетъ грудь; тоскливость и припадки задушенія; сухой жаръ и сильная боль во лбу; бредъ и конвульсивное подергиваніе членовъ; сильная жажда; большая тоска, безпокойство и возвышенная нервная раздражительность; бессонница.

ВУОНИА — при *ревматическихъ* боляхъ въ членахъ, сухомъ кашлѣ и покалываніяхъ въ груди во время дыханія и кашля.

СНИА — при сильной коликѣ и неутолимой жаждѣ.

РИОСРНОВУС — при тифозныхъ припадкахъ съ потерей самосознанія; *воднистыми поносами*; когда языкъ покрытъ нечистою, толстою корою; когда замѣчаются: *черный цветъ губъ*; большая слабость, или же сухой кашель и склонность ко рвотѣ и настоящая рвота.

PULSATILLA — почти во всѣхъ періодахъ болѣзни и въ большей части случаевъ, даже очень трудныхъ, гдѣ замѣчаются симптомы гнилостнаго, тифознаго состоянія; преимущественно, когда въ то же время существуютъ: воспаление наружнаго или внутренняго уха, сопровождаемое течью изъ ушей, или безъ нея; сухость языка съ отсутствіемъ жажды; короткий, сухой кашель и покалыванія въ груди.

СТРАМОНІУМ — при бредѣ съ *тупающими видѣніями*, отъ которыхъ больной желаетъ спрятаться; причемъ въ глотѣ судороги и глотаніе затруднено.

SULPHUR — преимущественно при *сильномъ воспаленіи* глазъ и сини мало развитой; если при этомъ еще замѣтны: *сильная боль въ ушахъ*, съ гнойнымъ истеченіемъ изъ нихъ; притупленіе слуха, терзаніе и біеніе въ головѣ; тифозные симптомы, мокротный кашель и мокрота, состоящая изъ гноевидной слизи.

§ 6. Наконецъ еще можно употребить:

АНВЕНІСУМ — при *скрытой сини*; поблекломъ, землистомъ цвѣтѣ лица съ голубыми или темно-зеленоватыми полосками; когда замѣчаются корки, струнья вокругъ рта; *вздутость лица* и блѣд-

ность или краснота его; *жучья, бычья бова съ масломъ и свѣто-
боянь; тифозные симптомы; рвота, поносъ.*—**ВЕРУОНІА** отлично
полезна послѣ Асоп. при воспалительной корн, сопровождающейся
воспаленіемъ глазъ, запоромъ, воспаленіемъ груди или колотьемъ
въ боку; употребляется для ускоренія развитія или возобновленія
скрывшейся снпн. — **СНІРА**—при страданіяхъ нижней части жи-
вота и частыхъ испражненіяхъ на мязь, исхуданіи, блѣдности лица,
большой потерѣ силъ и отсутствіи лихорадки. — **ІРЕСАСУАННА**
отлично полезна при истрическихъ припадкахъ, сопровождающихся
сильною лихорадкою, короткимъ и сухимъ кашлемъ, ускореннымъ
дыханіемъ, обложеннымъ языкомъ, тоинотомъ, рвотомъ и душевнымъ
безпокойствомъ. — **PULSATILLA**—при особенномъ расположеніи къ
катарральнымъ страданіямъ слизистой оболочки рта и дыхатель-
ныхъ путей; облегчаетъ также развитіе снпн.

См. *Лихорадка воспалительная, Снпн, Скарлатина.*

Косоглавіе подвижное, Strabismus.

Средства, преимущественно противъ этого предлагаемы: Bell.,
Нуос. и Alum.

Костей болѣзни, Osteitis, Exostosis, Caries, Necrosis и
другія страданія.

§ 1 Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленія про-
тивъ болѣзни костей вообще: 1) Ang., Aza., Aug., Bell., Calc.,
Dulc., Lys., Merc., Mez., Phosph., Ruta, Ser., Sil., Sulph.; 2) Chin.,
Нер., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhuz, Staph.

§ 2. Изъ этихъ средствъ, больше другихъ достойны вниманія
слѣдующія: **ANGUSTURA** при *костодѣ*, в преимущественно для
особь, въ большомъ количествѣ употребляемыхъ кобъ, или имѣю-
щихъ болѣзненный позывъ на него. — **АЭЖ**—противъ *наращеній на*
костяхъ, костодѣ и омертвѣнія костей, преимущественно ко-
нечностей, а также противъ размягченія костей.—**АУРИУМ**—про-
тивъ *наращеній и другихъ болѣзней костей вслѣдствіе злоупо-*
требленія ртути, а въ особенности противъ костодѣ несомыхъ
костей.—**ВИЛЛАДОННА**—противъ *наращеній на лбу, соврвож-*
даемыхъ костодѣю небной кости, а также противъ искривленій
позвоночного столба.—**САЛСАВЕА**—противъ *искривленій позво-*

почнаго столба и длинныхъ костей въ членахъ, опухоли сочленений, размягченія костей; когда роднички у дѣтей медленно закрываются, по причинѣ чрезмѣрнаго объема черепа; противъ нарращеній на костяхъ конечностей; противъ омертвѣнія костей. — **DULCAMARA**—противъ костныхъ нарращеній, причежъ замѣчаются язви на рукѣ, вслѣдствіе скрывшейся чесотки. — **FLUORIS ACIDUM**—при опухоли и изъязвленія костей, въ особенности сифилитическаго свойства. — **LUCORODIUM**—противъ нарращеній, воспаления костей и костоѣды у золотушникъ. — **MERCURIUS**—противъ нарращеній, костоѣды, болей въ костяхъ, которыя кажутся какъ-бы жерелемашини. — **MIELEVINUM**—противъ нарращеній на костяхъ конечностей у золотушникъ. — **OL. JESORIS AZELLI** служитъ главнымъ средствомъ при всякаго рода золотушникъ страданіяхъ костей. (Вълая опухоль, костоѣда и др.). — **RHOZORNOUS**—противъ нарращеній на черепѣ съ терзающими, сверлящими болями и опухолью ключицы. — **RHOZORNOI ACIDUM**, въ особенности при бѣлой опухоли (воспаленіи сочлененій) у дѣтей. — **PULSATILLA**—противъ искривленія позвоночнаго столба съ позднимъ закрытіемъ родничковъ. — **RUTA**—противъ болей въ костяхъ; пораженія надкостной плези или даже костоѣды, вслѣдствіе наружнаго поврежденія. — **SERIA**—противъ нарращеній и костоѣды въ костяхъ конечностей. — **SILICIA**—противъ нарращеній, костоѣды, омертвѣнія, медленнаго закрыванія родничковъ и почти противъ всѣхъ болѣзней костей. Она также, какъ и Calc., составляетъ дѣйствительнѣйшее средство при страданіи костей. — **STARPUZANVIA** очень полезна при бѣлой опухоли стоны (*Pedarthrocace*). — **SULPHUR**—противъ искривленій, опухоли, размягченія, костоѣды и другихъ болѣзней костей. Это средство было съ успѣхомъ употребляемо до Calc. при началѣ болѣзни.

§ 3. Вообще, при различныхъ видахъ страданія костей, можно пользоваться слѣдующими указаніями:

При *разрѣзченіи* костей: 1) Asa., Lyc., Mez., Sil.; 2) Calc., Mez., Phosph.-ac., Sulph.. — При *омертвѣніи* ихъ (necrosis): Asa., Arg., Calc., Phosp., Sil., Sulph., Sabin., Sec.. — При *воспаленіи* (osteitis): 1) Mez., Sil., Staph., Sulph.; 2) Asa., Aur., Calc., Chin., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Puls.. — *Размѣченіи*: 1) Asa., Calc., Mez., Sil., Sulph.; 2) Нер., Lyc., Mez., Nitr.-ac., Phosph., Puls.,

Ruta, Serp., Staph.—Противъ *отухлой*: 1) Asa., Calc., Lyc., Merc., Phos.-ac., Puls., Sil., Staph., Sulph.; 2) Aur., Clem. Daph., Guaj., Nitr.-ac., Phosph., Rhus, Ruta.—Для *сращенія переломаго*: Asa., Calc., Lyc., Nitr.-ac., Ruta, Sil., Sulph., Symphitum officinale.—Противъ *исхудаленій*: 1) Asa., Calc., Lyc., Merc., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Bell., Нер., Nitr.-ac., Phosph., Serp., Staph.—Вообще при *золотушиномъ* страданіи костей: 1) Calc., Con, Lyc., Ol.-jес., Merc., Phosph.-ac., Staph., Sil., Sulph.; 2) Bell.—При *меркуриальномъ*: Asa., Aur., Fluor.-ac., Kal.-hydr., Mez., Phosph.-ac., Staphur.—При *сифилитическомъ*: Aur., Fluor.-ac., Kal.-hydr., Merc., Phosph.-ac..

§ 4. При *страданіяхъ костей черепа*: 1) Aur., Calc., Daphn., Merc., Phos., Phos.-ac., Puls.—При *позднемъ* закрытіи *родничковъ* и *большомъ* объемъ черепа у *новорожденнаго*: Calc., Puls., Sil.—При *пораженіи небныхъ* костей: Aur., Merc., Mez., Sil.—*нижней челюстной кости*: Cist., Merc., Sil.—*Носовыхъ* костей: Aur., Calc. Merc.—*Трубчатыхъ* костей: 1) Asa., Calc., Merc., Phos.-ac., Sil. Sulph.; 2) Clem., Daphn., Guaj., Nitr.-ac., Phos., Puls., Rhus, Ruta.—При *страданіи сочлененій*: Calc., Phosph.-ac., Staph, Sulph.—При *боляхъ въ костяхъ* вообще: 1) Asa., Chin., Lach., Merc., Phosph., Phos.-ac., Puls., Ruta, Sabin., Sil., Staph.; 2) Ars, Aur., Calc., Coccul., Cupr., Cycl., Ferr., Kreos., Lyc., Mang., Merc., Mez., Mur.-ac., Nitr.-ac., Serp., Sulph.—При *сверлящихъ* боляхъ: Bell., Calc., Merc., Puls., Serp., Sil., Spig.—*Жучихъ*: Asa., Carb.-v., Phosph., Phosph.-ac., Rhus, Ruta, Sulph.—*Давящихъ*: 1) Arg., Bell., Cupr., Sabin., Staph.; 2) Aur., Bell., Cycl., Daph., Guaj., Нер., Igu, Kal., Merc., Mez., Oleand., Puls., Rhus.—При *ощущеніи, какъ будто мягкія части отделяются отъ костей*: Bry., Dros., Igu., Kreos., Nitr.-ac., N.-vom., Rhus, Sulph., Thuj.—При *чувствъ бѣшенія и пульсаціи*: Asa., Calc., Lyc., Merc., Mez., Nitr., Sabad., Sil., Sulph.—При *чувствъ свербенія*: Cham., Plumb., Rhus, Sec.—При *ощущеніи ирженія*: Amm.-m., Canth., Con., Dros, Lyc., Magn., Phos., Phos.-ac., Ruta, Staph.—При *терзающихъ* боляхъ: 1) Arg., Baryt., Carb.-v., Chin., Kal., Merc., Sabin., Spig., Staph.; 2) Agar., Aur., Bell., Bry., Caust., Coccul., Cupr., Kal., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr., Phosph.-ac., Ruta, Zinc.—При *чувствъ скобленія и чесанія*: Asa., Chin., Puls., Rhus, Sabad., Spig.—При *ржакущихъ* боляхъ: Anac., Dig., Sabad.—При *колючихъ* боляхъ: Bell., Calc., Caust.

Dros., Coq., Heil., Merc., Puls., Sassa., Ser.; 2) Ars., Asa., Aur., Chin., Lach., Mez., Phosph., Ruta.—При *язвенной боли*: Con., Graph., Her., Ign., Merc., Phosph.-ac. — *Боли какъ отъ перелома*: Coccul., Cupr., Her., Magn.-m., Natr.-m., Puls., Ruta, Samb., Ser., Veratr.—При *дерматомныхъ боляхъ*: Asa., Calc., Chin., Colch., Lyc., Natr.-m., Puls., Rhus.

Костей черепа болѣзни.

Главные средства противъ костныхъ *наращеній*: Aur., Darph., Merc., Mez., Phos.-ac. — Противъ *меркуриальныхъ наращеній*: Aur., Darph., Phosph., Phosph.-ac., Mez.—При *сифилитическихъ*: Aur., Merc., Mez.—При *увеличенномъ объемѣ яловы и медленномъ заращеніи родничковъ у золотушныхъ дѣтей*: Calc., Sil..

См. *Костей болѣзни*.

Кофе, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія его. Лучшие средства вообще: 1) Cham., Cocc., Ign., N.-vom.; 2) Bell., Canth., Carb.-v., Her., Ipec., Lyc., Merc., Puls., Rhus, Sulph..

Изъ этихъ средствъ преимущественно употребляются:

СНАМОМІЛЛА — противъ боли головной или зубной; необыкновенной чувствительности во всякой боли, сопровождаемой крикомъ и плачемъ; *болей желудка, которыя на нѣкоторое время утихаютъ послѣ употребленія кофе*; сильной колики, чрезмѣрной тоскливости подъ ложечкою и чувства, какъ-будто сердце издавливается.

СОССУЛУС — противъ слабости и пота при всякомъ движеніи, и дрожаніи членовъ; внезапнаго вскакиванія во снѣ; летучаго жара, зубной боли во время стола; чувства пустоты въ головѣ; *болей живота*; сильной печали и тоски; усиленія всѣхъ этихъ страданій на открытомъ воздухѣ, при движеніи, при принятіи пищи и питья, отъ сна и куренія табаку.

ИГНАТІА — противъ *болей головы съ чувствомъ присутствія гвоздя въ мозгу, или какъ-будто лобъ раздается въ стороны*, равно противъ *біенія во всей головѣ, которое уменьшается при нагибаніи*; чувства пустоты подъ ложечкою; судорожной *колики*; бо-

дѣвственности, или оцѣмѣлости членовъ; перемѣчиваго расположенія духа, то веселаго, то тоскливаго.

Nux vomica — противъ бессонницы, сердцебиенія, *сезонной* чувствительности *осей* нервной системы, болей въ одной половинѣ головы, или чувства присутствія гвоздя въ носу, усиленія болей при нагибаніи или хожденія, а также и на воздухѣ; зубной боли; болей живота, *которыя усилеваются отъ употребленія кофе*; необыкновенной чувствительности въ воздуху; при жеваніи и холерическомъ темпераментѣ.

Хроническіе недуги отъ неумѣреннаго употребленія кофе часто удаляются посредствомъ: Merc., или Sulph., если Cham., N.vom., и Ign., оказались недостаточными.

Браснуха, Rubeculae.

Браснуха занимаетъ средину между скарлатиною и корью, такъ что, если симптомы слизистыхъ оболочекъ при ней будутъ такіе же, какъ въ скарлатинѣ, то сама сыпь будетъ похожа на корь и обратно. Средства отъ этой болѣзни, смотря по обстоятельствамъ: Acon., Bell. N.vom. и Puls..

См. также *Острыя сыпи, Корь и Скарлатина.*

Броваяя рвота, Haematemesis.

Она составляетъ важный симптомъ и заслуживаетъ полнаго вниманія при выборѣ средствъ: 1) Acon., Arn., Ferr., Huos., Ipec., N.vom., Phosph.; 2) Amm., Bell., Bry., Canth., Carb.-veg., Caust., Chin., Lach., Lyc., Merc., Plumb., Puls., Sulph., Veratr..

При *механическомъ раздраженіи желудка* Arn., Arg., Ipec.—Послѣ *страха* N.vom., Acon.—Послѣ *простуды желудка*: Puls., Huos.—При *одновременномъ приливѣ къ волосамъ*: Arg., N.vom., Huos., Phosph.—При *другихъ гастрическихъ страданіяхъ*: Arg., Huos., Ipec., Natr.-m., N.vom., Phosph.—При *страданіи селезенки*: Arg., N.vom., Phosph.—При *пораженіи печени*: Arg., Huos., N.vom.—При *красномъ лицѣ*: Bell., Lycos.—При *блѣдности лица*: Arg., Carb.-v., Ipec., Natr.-m., N.vom., Sec.—При *одновремен-*

ночь черное испражнение на язык: Arg., Bell, Ipec., Natr.-m., N.-vom.—При маломъ, слабомъ пульсѣ: Arg., Carb.-v., Ipec., Secal.— При асцитомѣ, помножъ пульсѣ: N.-vom., Acon.

Крoвавый поносъ, Dysentaria.

§ 1. Средства: 1) Acon., Arg., Merc., Rhus, Sulph.; 2) Bry., Carb.-veg., Cham., Chin., Coloc., Ipec., N.-vom., Puls.; 3) Bell., Carb. Colch., Dulc., Graf., Her., Kreos., Lach., Nitr.-ac., N.-mosch. Staph..

§ 2. Изъ этихъ средствъ можно имѣть въ виду:

Асонитумъ — если кровавый поносъ является при теплой погодѣ днемъ, или холодной по ночамъ, и сопровождается ревматическими болями въ головѣ, затылкѣ и лопаткахъ, или сильною дрожью, сильнымъ жаромъ и жаждою. (Если Acon. оказывается недостаточнымъ, то часто очень умѣстны: Cham., Merc., N.-vom., Puls.).

Азекнисумъ — когда испражненія дѣлаются гнилостными и непроизвольными, причемъ замѣчаются: *большая слабость*, вонючая моча, зловоніе изо рта и состояніе отуманенія чувствъ; красныя или синія пятна на тѣлѣ. (Если оказывается неудовлетворительнымъ, то послѣ него умѣстенъ Carb.-veg., или же N.-vom., если послѣ употребленія Arg., состояніе больного ухудшилось).

Вуонія — часто назначается послѣ Acon., преимущественно лѣтомъ, и если кровавый поносъ произошелъ вслѣдствіе простуды отъ холоднаго вѣтя.

Савво-вегетавілісъ — если Arg. оказался неудовлетворительнымъ противъ гнилостнаго состоянія, и преимущественно, когда у больного замѣчается холодное дыханіе и онъ жалуется на жгучія боли. (Если послѣ употребленія Carb.-v. не прекратится дурной запахъ испражненій, то заслуживаетъ вниманія Chin.).

Снамомілла назначается часто послѣ Acon., преимущественно когда замѣчаются: сильный жаръ и жажда, ревматическія боли въ головѣ и большое безпокойство.

Сніна — если Arg. и Carb.-veg., оказались неудовлетворительными противъ гнилостнаго состоянія, или же противъ кроваваго поноса, появляющагося въ *болотистыхъ массахъ*, въ особенности, когда онъ представляетъ перемежающійся характеръ.

Colocynthis составляет, послѣ *Merc.*, одно изъ главныхъ средствъ противъ кроваваго поноса и употребляется, когда существуютъ: судорожная колика, при которой больной пригибаетъ ногу въ туловищу; сильное безпокойство; испражненіе кровянистою слизью; полнота и давленіе въ животѣ, вздутость его какъ при *tympanitide*; дрожь, которая исходитъ изъ живота; языкъ, обложенный бѣлою корою.

Iresacuanna одно изъ сильнѣйшихъ средствъ при кровавыхъ поносахъ осеннихъ, если прежде употребленъ былъ *Asop.*, или если при нихъ бываютъ: сильное понужденіе на низъ, колика, испражненія сперва желчными веществами, а потомъ кровянистою слизью. (Если *Ires.* окажется неудовлетворительною, то имѣетъ мѣсто *Coloc.*).

Mercurius во многихъ случаяхъ дѣйствуетъ специфически, а въ особенности, когда замѣчаются: сильное понужденіе на низъ передъ или послѣ испражненія, съ чувствомъ, какъ-будто внутренности выдавливаются наружу, и затѣмъ испражненіе чистой кровью, или кровянистыя слизистыя испражненія, имѣющія видъ рубленыхъ яицъ; притомъ крикъ во время испражненій (у дѣтей), сильная колика, *тошнота*, отрыжка; *ознобъ и дрожь*; холодный потъ на лбу, сильное истощеніе и дрожаніе членовъ.

Nux vomica — преимущественно при частыхъ, малоколичественныхъ испражненіяхъ, съ натугами и *измеренными кровянистою слизью*; сильной рвѣю въ животѣ возлѣ пупка, большомъ жарѣ и жадѣ; назначается послѣ *Asop.*, или *Vgu.*, противъ лѣтнихъ поносовъ, или при испражненіяхъ гнилостнаго запаха, и когда *Ag.* еще ухудшаетъ это состояніе.

Pulsatilla — преимущественно, когда испражненія содержатъ одну слизь, сибѣшанную съ кровавыми струйками; при этомъ противный вкусъ во рту; языкъ, обложенный бѣлою корою; *наклонность ко рвотѣ или настоящая слизистая рвота*; частая *дрожь* ввечеру, затрудненное дыханіе и плаксивость.

Rhus — когда, при довольно развитой уже болѣзни, появляются ночью непроизвольныя испражненія, безъ колики и натугъ.

Sulphur — назначается часто въ упорныхъ случаяхъ, гдѣ ни одно изъ сказанныхъ средствъ не оказало удовлетворительныхъ

и преимущественно, когда замѣчаются: затрудненное дыханіе, испраженія слизистыя, смѣшанныя съ кровавыми струйками; сильное помураженіе на нѣзъ, почку, равно у субъектовъ, страдающихъ геморроемъ.

См. Поносъ.

Брови волненіе.

Волненіе крови составляетъ обильнованный припадокъ у полнокровныхъ молодыхъ людей, или же у особъ слабыхъ, хондрическихъ, истерическихъ и нервныхъ. Лучшими средствами считаются: 1) Acon., Aug., Calc., Her., Kal., Kreos., Lyc., Phosph., Ser., Sulph.; 2) Amb., Amm., Arg., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Croc., Chin., Ferr., Jod., Natr.-m., N.-vom., Op., Petr., Phos.-az., Rhus, Samb., Sassa., Senn., Sil., Stann., Thuj.

При частыхъ волненіяхъ крови у полнокровныхъ: 1) Acon., Aug., Bell., Calc., Lyc., Phos., Ser., Sulph.; 2) Arg., Bry., Chin., Ferr., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Thuj.—При волненіи крови у нервныхъ и очень раздражительныхъ особъ: 1) Acon., Arg., Bell. Chin., N.-vom. 2) Amb., Aug., Calc., Ferr., Lyc., Petr., Samb.

Кровотеченія, Haemorrhagiae.

§ 1. Средства противъ кровотеченія вообще: 1) Acon., Arg., Bell., Calc., Cham., Croc., Ferr., Ipec., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sabin., Ser., Sulph.; 2) Ant., Arg., Cann., Caps., Carb.-an., Carb.-v., Cham., Cupr., Dros., Hyos., Jod., Kal., Lach., Led., Lyc., Nitr., Plumb., Puls., Rhus, Sec., Sil., Stram.; Sulph.-ac., Zinc.

§ 2. При такъ называемыхъ *активныхъ* кровотеченияхъ, у людей молодыхъ, крѣпкихъ, полнокровныхъ: 1) Acon., Bell.; 2) Croc., Ferr., Hyos., Puls.; 3) Arg., Calc., Cham., Chin., Ipec., Kal., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phos., Rhus, Ser., Sabin., Stram., Sulph.—При такъ называемыхъ *пассивныхъ* кровотеченияхъ у людей пожилыхъ, ослабленныхъ потерей крови и соковъ, или у привнесшихъ въ періодическимъ кровопусканіемъ, главное средство Chin. въ очень малыхъ приемахъ. Крімъ того, заслуживаютъ вниманія: Arg., Carb.-veg., Ferr., Ipec., Phosph.-ac., Puls., Rhus, Sec., Ser., Starb., Sulph.

§ 3. При истеченіяхъ крови артериальной, артеріальной: 1) Acon.,

Bell., Dulc., Hyos., Sabin.; 2) Arn., Calc., Carb.-veg., Ferr., Ipec., Led., Magn.-aust., Merc., Phosph., Rhus, Sec.—Если же течетъ темно-красная, вепная кровь: 1) Cham., Croc., N.-vom., Puls., Ser.; 2) Amm., Ant., Arg., Lach., Magn.-c., Nitr.-ac., N.-mosch., Phos.-ac., Sulph.

§ 4. Если вытекающая кровь цвѣта кофейнаго: 1) Bry., Carb.-v.; 2) Calc., Con., Puls., Rhus.—При истечении крови острою кислотою: 1) Canth., Kal., Nitr., Sil.; 2) Amm., Arg., Carb.-v., Kal., Rhus, Sulph., Sulph.-ac., Zinc.—Если кровь отходить въ видѣ сгустковъ: 1) Bell., Cham., Plat., Rhus; 2) Arn., Chin., Croc., Ferr., Hyos., Ign., Ipec., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Sec., Ser., Stram.—Если кровь дурнаго запаха: 1) Bell., Bry., Carb.-an., Sabin.; 2) Caust., Cham., Chin., Croc., Ign., Kal., Merc., Phos., Plat., Sec., Sil., Suph.—Если она вязкая, клейкая: Croc., Cupr., Magn.-c., Sec.

См. Кровотеченія отдельныхъ органовъ и ихъ болѣзни въ данныхъ случаяхъ.

Кровотеченіе изъ глазъ.

Средства противъ кровотеченія изъ глазъ: 1) Bell., Carb.-v.; Cham., N.-vom.; 2) Arn., Calc., Crotal., Euphr., Ruta, Seneg.—При кровянистыхъ выпотыніахъ: Bell., Calc., N.-vom., Seneg.—При кровяныхъ подтекахъ: 1) Arn., Bell., Calc., N.-vom., Seneg. 2) Cham., Crotal., Plumb., Ruta.

Кровотеченіе изъ задняго прохода.

О кровотеченіи, происходящемъ отъ геморроя см. Геморрой. Но если оно происходитъ отъ поврежденія прямой или другой какой-либо кишки, то назначаются общія средства, изложенныя въ статьѣ: Кровотеченія, изъ коихъ чаще здѣсь имѣютъ мѣсто: Aeon., Arn., Chin., Croc., Phosph., Sulph.-ac.

Кровотеченіе изъ легкихъ и кровохарканіе, Haemorrhagia pulmonum et Haemoptysis.

§ 1. Средства противъ различныхъ видовъ кровохарканія: 1) Aeon., Arn., Chin., Ferr., Ipec., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Arg., Bell., Carb.-veg., Dros., Dulc., Hyos., Ign., N.-vom., Op.,

Rhus; 3) Amm., Bry., Coss., Coff., Con., Cros., Curg., Kal., Kreos., Lach., Led., Lyc., Merc., Mill., Sep., Sulph.-ac..

§ 2. Когда при кашлѣ кровь извергается *въ маломъ только количествѣ* (кровохарканье): 1) Arn., Bell., Bry., Carb.-v., Chin., Dulc. Lach., Merc., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sil., Staph., Sulph.; 2) Amm., Arg., Bry., Con., Curg., Kal., Led., Lyc., Nitr.ac., Sep., Sulph., Sulph.-ac..—Если же кровь *льется сильно* (Hæmorrhagia pulmonum), 1) Acon., Arn., Bell., Carb.-v., Chin., Dulc., Ferr., Hyos., Ipec., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Rhus; 2) Arg., Cros., Ign., Led., Mill., Sulph., Sulph.-ac..—Въ очень трудныхъ случаяхъ и при видимой опасности жизни: Acon., Chin., Ipec., Op..—Противъ болевъ *послѣ кровотечения изъ легкихъ*: 1) Carb.-veg., Chin.; 2) Arg., Coff., Ign., Sulph.—Для предупрежденія *возвратки*: Arg., N.-vom., Sulph., попеременно по одному приему и съ продолжительными промежутками.

§ 3. Кровь того: у *омалии*: Carb.-v., Chin., Ferr., N.-vom., Phosph., Sulph.;—у *чахотки*: Acon., Arn., Arg., Cham., Chin., Dros., Ferr., Lach., Millef., Phosph., Puls., Sulph., Sulph.-ac., Sep., Stann.;—при *прекращеніи рвоты*: 1) Puls.; 2) Acon., Bell., Bry., Con., Ferr., Sep., Sulph.;—у *роженки*: Acon., Arg., Chin., Hyosc., Ipec. Puls., Sulph.;—при *сильномъemorраліи*: Carb.-v., Led., Lyc., N.-vom., Phosph., Sulph.;—послѣ *сильныхъ физическихъ трудовъ*: Acon., Arg. Ferr., Puls., Rhus;—послѣ *большихъ потерь крови* кровохарканіемъ: Arg., Chin., Ferr.;—у *пьяницъ*: 1) N.-vom., Op.; 2) Arg., Hyosc..

§ 4. По *признакамъ* назначаются:

Асоитимъ — если до приступа еще замѣчаются: воспаление въ груди, ощущение полноты и жгучая боль; сердцебіеніе, тоска и безпокойство; ухудшеніе въ лежачемъ положеніи; блѣдность и страдальческое выраженіе лица; по временамъ обильное кровотеченіе, возбуждаемое легкимъ покашливаніемъ. (Послѣ Acon. часто приличны Arg. и Ipec.).

Агнуса — если кровотеченіе произошло вслѣдствіе *механическаго посредствѣ, паденія, удара* по груди или спинѣ, или когда замѣчаются: легкое изверженіе черной, свернувшейся крови, тяжелое дыханіе, колотье, жженіе и стегиваніе въ груди, сердцебіеніе, сильный жаръ во всемъ тѣлѣ и признаки обморока; изверженіе ярко красной, ивнистой крови, смѣшанной со слизью и кровавыми сгустками; цветотаніе нодъ грудною; колотье въ головѣ

и болѣзненное ощущение разбитости ребръ при кашлѣ. (При травматическомъ кровотеченіи, передъ употребленіемъ Ага., приходится иногда дать приѣмъ Асов., или употребить ихъ конеректѣнно).

АГВЕНИСУМ — во многихъ случаяхъ, гдѣ Асов. имѣло мѣсто, но оказался неудовлетворительнымъ, и кромѣ того, когда замѣчаются: сильная тоска, сердцебиеніе, сонливость; сухой, жгучій жаръ и беспокойство, не дающее больному лежать въ постелѣ; сильное изверженіе крови, а также послѣ Нус., при кровохарканіи у пьятицъ. (Послѣ Ага. часто приличны: Ірес., N.-vom. или Ваіра., въ особенности при хроническомъ кровохарканіи).

ВЕЛЛАДОННА — когда замѣчаются: постоянное щекотаніе въ горлѣ, потребность часто кашлять и усиленіе кровотеченія отъ кашля; ощущеніе, какъ-будто грудь наполнена кровью; давящія или колющія боли, которыя усиливаются при движеніи.

САВВО ЧЕВСТАВІІВ — при сильной, жгучей боли въ груди, которая еще продолжается послѣ кровотеченія; вообще при кровотеченіи у особъ очень чувствительныхъ ко всякой переувѣцѣ погоды, или у страдающихъ послѣдовательными болѣзнями отъ злоупотребленія ртути.

СНІНА — если кровотеченіе поывается при сильномъ кашлѣ, который прежде былъ пустъ, болѣзненъ и сухъ, и при этомъ ощущается вкусъ крови во рту, именно: если обнаруживается дрожь, смѣняющаяся летучимъ жаромъ; при большой слабости и потребности постоянно лежать; также, когда замѣчаются: частый потъ; дрожаніе членовъ; потемнѣніе зрѣнія, или ощущеніе сжатія въ головѣ; когда уже больной потерялъ много крови, блѣднѣеть, холодѣетъ и падаетъ въ обморокъ; конвульсивное подергиваніе рукъ и мышцъ лица. (Послѣ Сип., особенно въ послѣднемъ случаѣ, приличны Фагг., или Ага.).

ДУЛСАМАВА — при постоянномъ щекотаніи въ гортани и потребности часто кашлять; изверженіи яркочерной крови и ухудшеніи при покое, или если кровотеченіе обнаружилось вслѣдствіе простуды, или когда у больного прежде замѣчался продолжительный кашель.

ФЕВВУМ — когда кровотеченіе имѣло мѣсто при легкомъ покашливаніи и когда кровь извергается въ маломъ только количествѣ, совершенно яркочернаго цвѣта, и появляются: бо-

ли въ лопаткахъ, тяжелое дыханіе ночью; невозможность сидѣть; улучшеніе при движеніи; частая потребность лежать и большая слабость послѣ разговора. (Прилично для худощавыхъ людей съ желтоватымъ цвѣтомъ кожи).

HYOSCIAMINUS — если кровотеченію предшествуетъ сухой кашель, который появляется ночью и не даетъ покоя; когда при этомъ замѣчается частое вскакиваніе отъ сна; равно при кровотеченіи у пьяницъ, въ особенности когда *Op.* или *N.-vom.* оказались неудовлетворительными.

HEMATIA — если послѣ выздоровленія отъ кровотечения больной еще слабъ и раздражителенъ.

IRISASUANA — часто послѣ *Asop.*, который хотя помогъ, но еще остались: вкусъ крови во рту, частое покашливаніе съ слизистой мокротой, смѣшанной съ кровавыми струйками, тошнота и слабость; или послѣ *Ag.*, когда хорошее его дѣйствіе было непродолжительнымъ и прежній недугъ опять возобновился.

NUX VOMICA — послѣ *Ires.* или *Ag.*, или у пьяницъ, и когда замѣчаются: сильное щекотаніе въ груди; кашель, который причиняетъ боль головы; ухудшеніе состоянія по утрамъ, особенно у людей живаго и холерическаго темперамента, или когда кровотеченіе обнаруживается вслѣдствіе скрытія геморроидальнаго встеченія, гнѣва и простуды. (Въ послѣднемъ случаѣ, часто послѣ *N.-vom.* прилична *Sulph.*; у пьяницъ же приличенъ *Hyos.* или *Ag.*).

ORIUM — часто въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, именно у людей, предавшихся спиртнымъ напоямъ, и когда при этомъ замѣчаются: изверженіе густой и пѣнистой крови; ухудшеніе кашля послѣ всякаго глотанія; тоскливость въ груди, или тяжелое дыханіе и тоска; жженіе около сердца, дрожаніе, а иногда слабость голоса, тоскливый сонъ и частое пробужденіе; холодъ особенно конечностей, или жаръ, преимущественно въ груди и другихъ частей туловища. (Послѣ *Op.* часто прилична *N.-vom.*).

RULVATILLA — въ упорныхъ случаяхъ, когда извергается черная и свернувшаяся кровь; когда при этомъ замѣчаются: тоска и дрожь, преимущественно по вечерамъ и ночамъ; чувство большой слабости, боль въ нижнихъ частяхъ груди; чувство мягкости и пустоты въ желудкѣ; преимущественно при кровотеченіи у людей

боязливыхъ, флегматическихъ и склонныхъ къ плавчу, или когда оно помалывается вслѣдствіе скрывшихся регуль.

В н и з — когда кровь яркочерскаго цвѣта, изудшеніе наступить при всякомъ огорченіи, или при малѣйшемъ движеніи тѣла; склонность къ гнѣву, безпокойное и боязливое настроеніе духа; частый зудъ или свербеніе въ груди.

SULPHUR—часто послѣ *N.-vom.*, у людей, страдающихъ геморроемъ, или послѣ *Ars.*, для отклоненія возврата.

См. Кровотеченіе, Воспаленіе легкиъ, Чихотка легочная и Кошмя.

Кровотеченіе изъ матки, маточное кровотеченіе и обильныя мѣсячныя очищенія, *Metrorrhagia* и *Menorrhagia*.

§ 1. Средства противъ слишкомъ обильныхъ мѣсячныхъ очищеній, а также кровотеченій изъ матки вѣкъ регуль вообще: 1) *Arn.*, *Bell.*, *Bry.*, *Cham.*, *Chin.*, *Cinn.*, *Croc.*, *Ferr.*, *Hyos.*, *Ipec.*, *Plat.*, *Puls.*, *Sabin.*, *Sec.*, *Ser.*; 2) *Acon.*, *Calc.*, *Carb.-an.*, *Ign.*, *Magn.-m.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Sil.*, *Sulph.*.

§ 2. Если это страданіе будетъ у женщинъ кривыхъ и полнокровныхъ: 1) *Acon.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calc.*, *Cham.*, *Ferr.*, *N.-vom.*, *Plat.*, *Sabin.*, *Sulph.*; 2) *Arn.*, *Croc.*, *Hyos.*, *Ign.*, *Ipec.*, *Phosph.*, *Sil.*, *Veratr.*—У лицъ слабыхъ, истощенныхъ, кахектическихъ: 1) *Chin.*, *Croc.*, *Puls.*, *Sec.*, *Ser.*, *Sulph.*; 2) *Carb.-v.*, *N.-vom.*, *Ipec.*, *Phosph.*, *Veratr.*—Если кровотеченіе изъ матки помалывается только во время мѣсячныхъ очищеній (*Menorrhagia*): 1) *Acon.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calc.*, *Cham.*, *Ign.*, *Ipec.*, *Magn.-m.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Sec.*, *Ser.*, *Sil.*, *Sulph.*, *Veratr.*—Противъ маточнаго кровотеченія во время беременности, или послѣ родовъ, или эмбрыи: 1) *Bell.*, *Cham.*, *Croc.*, *Bell.*, *Plat.*, *Sabin.* 2) *Ars.*, *Bry.*, *Cinnam.*, *Hyos.*, *Ipec.*—Противъ маточнаго кровотеченія въ переходную пору: 1) *Puls.*; 2) *Bell.*, *Lach.*; 3) *Plat.*, *Sec.*, *Ser.*—Кровотеченія послѣ злоупотребленія ромашки требуютъ *Ign.*, *Puls.*.

§ 3. По припадкамъ, назначаются:

А В Н И С А — когда кровотеченіе произошло вслѣдствіе острымъ, подымтія жажесты, или послѣ другаго какаго-либо науряженія, преимущественно, если это случается съ беременными и если *Cin.* оказалась неудовлетворительною.

VILLADONNA — когда кровь бывает не очень свѣтла, но и не темна, кровотеченіе сопровождается сильными, давящими, напругающими болями въ животѣ, съ чувствомъ стягиванія или сжиманія, при мучительномъ давленіи на половныя части, также при боляхъ поясницы, какъ-будто весь крестецъ разбитъ.

VIGNONIA — послѣ Стос., когда послѣдній принесъ несовершенную пользу, или когда замѣчаются: обильное истеченіе темно-красной крови, и сильныя давящія боли въ поясницѣ, распирающія боли въ вискахъ, сильное давленіе въ животѣ, тошнота, головокруженіе и признаки обморока.

SNAMOMILLA — при темнокрасной или черной, вонючей и въ видѣ сгустковъ крови, истекающей толчками, при потужныхъ боляхъ живота; сильной жадѣ, холодѣ конечностей, блѣдности лица, большой слабости и даже признакахъ обморока, съ потемнѣніемъ зрѣнія и жужжаніемъ въ ушахъ.

SNINA — когда кровь истекаетъ толчками и сопровождается судорожными болями въ маткѣ, рѣзью въ животѣ, частымъ позывомъ на низъ и мучительнымъ напряженіемъ живота; а также при кровотеченіи у особъ, потерявшихъ уже много крови, и даже въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, гдѣ замѣчаются: тяжесть головы, головокруженіе, сильное притупленіе чувствъ, спячка, приступы обморока, холодъ конечностей, блѣдность лица, или синеватый цвѣтъ лица и рукъ, и конвульсивныя толчки, ощущаемыя поперекъ живота.

СИННАМОМ — при кровотеченіи у беременныхъ или роженицъ, когда потеря крови произошла вслѣдствіе *надсады* или остуши, или другаго какого-либо непомѣрнаго напряженія силъ. Если *Синнам.* окажется неудовлетворительною, то даютъ *Агр.*

СЛОСУС — когда кровь чернаго цвѣта, клейкая, перемѣшанная съ сгустками, и когда *Снам.*, *Син.*, *Ферт.* не оказали никакой пользы, или же при *ощущеніи*, какъ-будто шаръ, или что-то живое *примаетъ или вертится въ животѣ*; при желтоватомъ, землистомъ, поблекломъ цвѣтѣ лица, большой слабости и головокруженіи; мутномъ взглядѣ и приступахъ обморока; ушніи, сильной тоскѣ и безпокойствѣ.

НУСОСІАМУС — при боляхъ, похожихъ на родовыя потуги; потягиваніи въ поясницѣ, почкахъ и членахъ; жарѣ по всему жи-

воту, скоромъ и полномъ пульсѣ, раздутіи венъ въ рукахъ или лицѣ и сильномъ безпокойствѣ; возвышенной жизнедѣятельности, дрожаніи по всему животу, или оцѣмѣлости членовъ; притупленія чувствъ, потемнѣнія зрѣнія, бредъ, подергиваніи сухихъ жилъ или конвульсивномъ подергиваніи членовъ, смѣняющемся тетаническою окоченѣлостью послѣднихъ.

Fervor — при истеченіи крови жидкой, или черной и свернувшейся, съ болями поясницы и потужною коликою; при сильной раздражительности кровеносной системы, выражающейся болями головы, головокруженіемъ, жаромъ, яркою краснотою лица, полнымъ и твердымъ пульсомъ.

Irresolubilis — при кровотеченіи у беременныхъ или роженицъ, когда кровь истекаетъ обильно и непрерывно, жидка и яркочернаго цвѣта; при этомъ рѣзъ около пупка, сильное давленіе на матку и прямую кишку, дрожь и ознобъ, жаръ въ головѣ, большая слабость, блѣдность лица, тошнота и постоянная потребность лежать.

Platina — когда кровь густа и темнаго цвѣта, безъ сгустковъ, и при этомъ: потягивающія боли поясницы, простирающіяся въ пахъ и производящія ощущеніе, какъ-будто всѣ внутренности оттягиваются внизъ; большая раздражительность половыхъ частей и чрезмѣрное побужденіе къ совокуленію.

Pulsatilla — когда кровотеченіе прекращается на короткое время и потомъ обнаруживается съ большею противъ прежняго силою, или когда кровь бываетъ чернаго цвѣта, смѣшанная съ большимъ количествомъ сгустковъ и замѣчаются потужныя боли; при кровотеченіи въ особенности у беременныхъ или у женщинъ въ переходной порѣ, или послѣ родовъ, при крѣпко приросшемъ дѣтскомъ мѣстѣ.

Savina — въ особенности послѣ родовъ, или послѣ выкидыша, при истеченіи черной, темной, свернувшейся крови, когда при этомъ замѣчаются: боли живота и поясницы, похожіи на родовыя потуги, большая слабость и *реватическія боли въ колѣнѣ и членахъ*.

Sesale — въ особенности послѣ родовъ или выкидыша, или при кровотеченіи у *осеницынь слабыхъ, истощенныхъ, катехимическихъ*, когда при этомъ замѣчаются: холодъ конечностей, блѣдность или

землистый, поблеклый цвѣтъ лица, малый или почти угнетенный пульсъ, душевное безпокойство и страхъ смерти.

СЕРІА — когда замѣчается отвердѣніе маточной шейки и кровотеченіе сопровождается судорожною коликою, давленіемъ на лонныя части и блуждающими покалываніями въ нихъ.

Кровотеченіе изъ мочеиспускательнаго канала, Кровавая моча, Haematuria.

§ 1. Средства: 1) Arn., Arg., Cann., Canth., Chin., Ipec., Lyc., Merc., Mez., Puls; 2) Calc., Carb., Cop., N.-vom., Phosph., Sec., Ser., Zinc..

§ 2. Если кровотеченіе будетъ слѣдствіемъ дурно лечимаго перелома: Cann., Canth., Puls.—При кровотеченіи вслѣдствіе скривленія мышечной или чешоточной спинк: Arg., Calc., Cop., Sulph.— Если оно развилось вслѣдствіе наружныхъ насильій и поврежденій: Arn., Cop., Puls., Rhus.— Если въ то же время страдаютъ и почки: Canth., Lyc., Puls., Sulph..

Сравни. *Бользни мочевого органа, Переломъ, Кровотеченія, Воспаленіе почки, Воспаленіе мочевого пузыря.*

Кровотеченіе изъ носу, Epistaxis.

§ 1. Средства: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Chin., Croc., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Amb., Cann., Carb.-veg., Cin., Ferr., Kreoz., Led., Sabin., Sec., Ser., Sil.— При сильномъ кровотеченіи (Haemorrhagia nasalis): 1) Acon., Chin.; 2) Arn., Bell., Chin. Merc., Puls., Rhus, Sec..

§ 2. Если кровотеченіе есть слѣдствіе напора крови къ голоду 1) Acon., Bell., Chin., Croc., Cop.; 2) Alum., Cham., Graph., Rhus.— Если оно появляется при насморкѣ: Arg., Puls.— При кровотеченіи у детей, страдающихъ лихорадками: Cin., Merc.— У женщинъ, если ихъ мышечная очистенія слишкомъ студны: Puls., Sec., Ser.— Если же онѣ слишкомъ обильны: Acon., Calc., Croc., Sabin., — а если наконецъ ихъ вовсе нѣтъ (Amenorrhoea): Bry., Puls., Ser.— При кровотеченіи у людей слабыхъ и истощенныхъ, вслѣдствіе ослабляющей потери соковъ, кровопусканій и т. д.: 1) Chin., Sec.; 2) Carb.-v., Cin., Ferr.— Если оно вызвано разорженіемъ явля отъ неумѣреннаго употребленія горячихъ напитковъ: N.-vom., Acon.,

Bell., Bry. — чрезмѣрныя телесныя напряженія: Bhus, Agn., Bry., Calc., Puls., Sulph.; — ушибамъ или удоромъ: Arn.

§ 3. Противъ расположенія къ новому кровотеченію при малѣйшемъ къ тому поводѣ: Calc., Carb.-v., Ser., Sil., Sulph.

Сравн. Кровотеченія, Приливъ крови къ головь, Насморкъ, Страданія отъ месячныхъ очищеній, Слабость, Солнечный жаръ.

Кровотеченіе изъ полости рта, Haemorrhagia buccalis. Главныя средства: Agn., Bell., Chin., Drov., Ferr., Kreos., Lys. Выборъ во всякомъ данномъ случаѣ обусловливается обстоятельствами, внѣшними и внутренними причинами. Сравн. Кровотеченія, Кровотеченія изъ носу.

Кровяной грибокъ, Fungus haematodes.

До-сихъ-поръ дѣйствительнѣйшими средствами противъ кровянаго гриба оказались: 1) Arg., Calc., Carb.-an., Phosph., Sil.; 2) Carb.-veg., Lach., Lys., Merc., Nitr.-ac., Sulph.; 3) Bell., Clem., Kreos., N.-vom., Rhus, Ser., Staph., Thuj. — При *сосудистыхъ спячкахъ* (Naevi vasculares): 1) Carb.-v., Caust., Lys., Plat., Thuj.; 2) Crotal., Natr.-m., Ser., Sulph. — При *родимыхъ пятнахъ* (Vegetationes vasculares): 1) Phos.-ac., Ser., Thuj.; 2) Lys., Merc., Nitr.-ac., N.-vom. Staph., Sulph. — При собственно *сосудистыхъ опухоляхъ* (Tumores melanotici, v. erectiles): 1) Ars., Calc., Carb.-an., Phosph., Sil.; 2) Carb.-v., Lach., Lys., Merc., Nitr.-ac., Sulph.

Кровяныя подтеки и пятна, Ecchimosi, Sugillatio.

Средства вообще: 1) Agn., Bry., Con., Lach., N.-vom., Rhus, Rut., Sulph.-ac.; 2) Ars., Verb., Calc., Cham., Chin., Dulc., Ferr., Laur., Plumb., Sec., Sulph. Если эти подтеки происходятъ вслѣдствіе *наружныхъ поврежденій* (ушиба, толчка и т. д.): 1) Agn.; 2) Bry., Con., Rhus, Rut., Sulph.-ac. — При *кровоныхъ пятнахъ*, похожихъ на покусъ блохъ, или при ветехіяхъ, образующихся въ нервной лихорадкѣ: Arg., Bry., Rhus. — При такъ называемыхъ *мертвыхъ пятнахъ* (Todtenflecken) у стариковъ: 1) Con.; 2) Arg., Bar., Lach., Op.

Противъ *Morbus maculosus Werlhofii*, во многихъ, случаяхъ я нашелъ совершенно удовлетворительнымъ Bry.. Впрочемъ предлагаются еще слѣдующія: Arg., Bell., Verb., Hyos., Lach., Led., N.-vom., Phos., Rut., Sec., Sil., Stram., Sulph.-ac.. — Противъ *реуматическихъ* кровавыхъ пятенъ (*Peliosis rheumatica*): 1) Acon., Bry., N.-vom.; 2) Arg., Ars., Bell., Chin., Lach., Rhus. — Противъ *скорбутныхъ*: 1) Ars., Carb.-a., Carb.-v., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Sulph.-ac.; 2) Bell., Bry., Calc., Chin., Cop., Phosph., Phosph.-ac., Rhus, Staph., Sulph.. — Противъ такъ называемыхъ *смертныхъ пятенъ* (*Purpura senilis*): 1) Cop.; 2) Ars., Bry., Rhus, Sec.; 3) Lach., Sulph.-ac..

Крыловидная плева на глазу, Pterygion. — Наилучшими средствами служатъ: Chrom., Lach., Op., Plumb.

Нуриная слѣпота, Hemeralopia.

Противъ этого рода слѣпоты, которая начинается въ сумерки: 1) Bell., Veratr. 2) Merc., Hyos., Puls., Stram..

См. *Зрѣнья слабость.*

Л.

Лихорадка воспалительная и лихорадочныя воспаления, Синохальная лихорадка, Febris inflammatoria, Synocha, Synochus, Inflammatio febrilis etc.

§ 1. Средства какъ при лихорадкахъ съ воспалительнымъ характеромъ, такъ и при мѣстныхъ воспаленияхъ съ синохальною лихорадкою: 1) Acon., Bell., Bry., Hyos., Merc., N.-vom., Phosph. Puls., Rhus; 2) Ars., Cann., Cham., Kal., Lyc., Nitr., Sulph., Veratr..

§ 2. При простой воспалительной лихорадкѣ, безъ явнаго пораженія опредѣляемаго органа: 1) Acon.; 2) Bell., Bry.; 3) Ars., Cham., Hyos., Merc., Puls., Rhus, Sulph.. Если такая лихорадка принимаетъ *нервный характеръ*, съ признаками болѣзненного

раздраженія мозга: 1) Bell., Bry., Huon., Op., Rhus.; 2) Cham. Coccul., N.-vom., Phos.-ac., Stram..

§ 3. Если къ воспалительной лихорадкѣ присоединяются и другіе недуги, напр. замѣтное *воспаленіе мозга, воспаленіе плевры, припадки воспаленія легкихъ, сильные боли въ желудкѣ, симптомы воспаленія кишокъ или другихъ органовъ, острый назожильный сыпь, рвота, поносъ*, то назначаются средства, показанныя при страданіяхъ этихъ органовъ.

Противъ *мѣстныхъ* воспаленій, какое бы названіе они ни носили, всегда главное средство составляетъ Асон., который назначается при *сильной воспалительной лихорадкѣ, выражающейся жаждою, сухимъ жгучимъ жаромъ и твердымъ (полнымъ или неполнымъ) пульсомъ, и употребляется до-тѣхъ-поръ, пока не ослабѣетъ лихорадка, или не покажутся симптомы, требующіе другаго средства. Въ случаяхъ, когда больной очень раздраженъ, полезны Асон. и Соф., попеременно.*

§ 4. По припадкамъ, назначаются:

Асонитумъ — когда есть *жгучій жаръ*, которому иногда предшествуетъ дрожь; притомъ: *жгучая жажда; большею частію сухая и жгучая кожа, одутливое, горячее и красное лицо, или красная пятна на щекахъ, или краснота его сменяющаяся блѣдностью, когда больной встаетъ съ постели; красные, воспаленные, болящие глаза; бессонница; сильное безпокойство и тревожное метаніе въ различныхъ стороны; при этомъ иногда тоска, страхъ смерти, или крики и вздохи; полный и твердый, или унетенный пульсъ; сильная, колющія, давящія или бьющія боли головы; головокруженіе при вставаніи; ночной бредъ; сухость губъ и рта; чистый и влажный языкъ; очень скорая, занеживая рѣчь; темнокрасная моча; тоскливость въ груди и короткое, тоскливое и ускоренное дыханіе; покалыванія въ груди или бокахъ; короткій кашель; сердцебиеніе; боль въ членахъ.* (Срав. Bell., Bry., Cham.).

Велладонна — *внутренній и наружный жаръ, темнокрасное лицо и глаза; при этомъ жгучая жажда и отвращеніе отъ питья, или постоянный позывъ на питье, при невозможности пить; влажная и клейкая кожа; сонливость днемъ и бессонница ночью, или*

безпокойный сонъ и внезапное вскакиваніе отъ сна; подергиваніе членовъ, потеря самосознанія, бормотанье, крикъ и конвульсін; неустойчивый бредъ, страшная видѣнія и желаніе убѣжать съ постели; своенравіе и злоба; жаръ головы; сильныя головныя боли, преимущественно во лбу, какъ-будто все въ нея стремится выйти вонъ; расширеніе зрачка; бѣшенный и блуждающій взоръ; свѣтобоязнь; сухость губъ и рта; изъязвленіе угловъ рта; слышкомъ скорая и неясная рѣчь; боль въ горлѣ и затрудненное глотаніе; кашель и при этомъ головная боль и краснота лица; скудная, желтая моча; колюція боли въ членахъ; появленіе красноты пятны на кожѣ. (Срав. Acon., Cham., Merc.).

ВУЮНІА — сильный жаръ или дрожь и стучаніе зубовъ, и въ обоихъ случаяхъ краснота и жаръ головы и лица; ночной потъ, преимущественно къ утру; неутолимая жажда, за которою иногда слѣдуетъ рвота; сонливость и внезапное вскакиваніе съ постели, потомъ крикъ и бредъ, какъ скоро больной откроетъ глаза; бредъ днемъ и ночью; раздражительное расположеніе духа или заботливость объ исходѣ болѣзни и страхъ смерти; молчаливость; безпокойство, метаніе въ разныя стороны; необыкновенная общая слабость; твердый, полный и ускоренный пульсъ; олушающая боль головы; головокруженіе при вставаніи; притупленіе слуха и зрѣнія; сухость губъ и боль подъ ложечкою; покалываніе въ груди или бокахъ; терзающія или колюція боли въ членахъ. (Срав. Acon., Bell., Cham., N.-vom.).

СНАМОМІЛЛА — внутренній и наружный жаръ, которому иногда предшествуетъ дрожь, или жаръ въ лицѣ и глазахъ; при этомъ краснота обѣихъ, или одной щеки; жгучая жажда и жженіе во рту, простирающееся до желудка; бессонница, безпокойство и метаніе въ разныя стороны, или сонъ съ тягостными видѣніями и внезапнымъ вскакиваніемъ; большое безпокойство и тоска, боль въ одной половинѣ головы; головокруженіе при вставаніи, ирради или искры предъ глазами и припадки обморока; красный и открытый трещинами языкъ; горькій вкусъ во рту и отъ тѣла, какалъ бы она ни была; кислая, или горькая отрыжка и рвота; большая тоска, напряженіе и давленіе въ сторону желудка и подреберья; боль живота и поносъ; горячая, жгучая моча; терзаніе въ чле-

вякъ, лицѣ и въ головѣ; зловонное, затрудненное дыханіе. (См. Асop., Bell., N.-vom.).

MEVUSIVUS — *дрожь, сжимающаяся жаромъ; краснота кожи; жгучая жажда, иногда совмѣстная съ отвращеніемъ отъ питья; учащенный, полный пульсъ; колючія и давящія боли головы; красное, одутловое лицо; головокруженіе при вставаніи; сухія и жгучія губы; языкъ влажный, покрытый бѣлою или желтоватою корою; болѣзненная чувствительность въ сторону подреберій, надчревной части и пупка; сильная тоска, безнокойство и метаніе въ разныя стороны, преимущественно ночью; бессонница, сонливость днемъ; угрюмое, гнѣвливое расположеніе духа.* (См. Bell.).

NUX VOMICA — жаръ, особенно въ лицѣ, причемъ иногда волосы становятся дыбомъ; сухая, жгучая кожа, твердый и частый пульсъ; *большая слабость и припадки обморока; сильная тоска, сердцебіеніе и страхъ смерти; возвышенная раздражительность всей нервной системы; бессонница или дремотный сонъ; давящая боль во лобѣ, усильвающаяся при нагибаніи; головокруженіе при нагибаніи; горячее, красное лицо, иногда при холодномъ тѣлѣ; тусклые, мутные и красные глаза; сухой и бѣлый языкъ; жажда и жженіе въ горлѣ; давящая боль въ сторонѣ желудка и въ самомъ желудкѣ; запоръ; болѣзненное чувство разбитости въ членахъ; гнѣвливое и раздражительное расположеніе духа.* (Срав. Вгу. и Cham.).

§ 5. Изъ остальныхъ:

ARVENICUM — при жгучемъ жарѣ по ночамъ и жженіи въ жилахъ; бессонницѣ, большомъ безнокойствѣ и метаніи въ различныя стороны; необыкновенной тоскѣ, отчаяніи и страхѣ смерти; большой слабости и потребности лежать. — **SPINA** — при жарѣ, сопровождающемся сухостью рта, сухостью и жженіемъ губъ, краснотой лица, бредомъ, дрожью, какъ скоро больной хотъ немного раскроется, большою слабостью и болью въ членахъ. — **SORFUA** — преимущественно для дѣтей, когда обнаруживаются: большое безнокойство и тревожное метаніе въ разныя стороны; возвышенная раздражительность всей нервной системы, крикъ и плачь. — **NUOVSAMUS** — при сильномъ бредѣ, бессонницѣ вслѣдствіе возвышенной нервной раздражительности, подергиваніи сухихъ жилъ; краснотѣ и жарѣ лица; краснотѣ, неподвижнѣ и

искривленіи глазахъ.—Lусородіум—при ограниченной краснотѣ щекъ, возвышенной раздражительности мозга, большой слабости, сухости и краснотѣ языка, запорѣ, дурномъ расположеніи духа послѣ сна, крикѣ, раздражительности.—Pulsatilla—при сухомъ жарѣ по почамъ, преимущественно въ лицѣ; жарѣ и краснотѣ одной щеки; бредѣ; плаксивости; совершенномъ отсутствіи жажды, или при неутолимой жаждѣ; къ этому присоединяются: обложенный бѣлою слизью языкъ; боль въ предсердіи, горькій вкусъ и слизистыя испраженія въ видѣ поноса.—Rhus—при сильномъ жарѣ, тоскѣ, сухости кожи, одуряющей боли головы, бредѣ и желаніи убѣжать; когда лицо красное, ягучее, языкъ красный, сухой, жесткій; большая слабость.—Sulphur—во многихъ упорныхъ случаяхъ воспалительной лихорадки, противъ страданій, остающихся послѣ употребленія Acon., Bell. и Bry..

Сравни. *Лихорадка гастрическая, желчная, изнурительная, нервная*, и мѣстныя воспаления.

Лихорадка гастрическая и желчная, Febris gastrica et biliosa.

§ 1. Средства вообще: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Cocc., Ipec., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Ant., Coloc., Dig., Rhus, Spuill., Tart., Veratr..

§ 2. Если преобладаютъ *гастрическія* страданія (febris gastrica): 1) Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Ant., Bry., Cham., Cocc., Dig., Rhus, Sulph., Tart., Veratr.. — Если преобладаютъ *желчныя* привадки (febris biliosa): 1) Acon., Bry., Cham., Chin., Cocc., N.-vom., Puls.; 2) Ars., Coloc., Daph., Dig., Ipec., Sulph.. — Если преобладаетъ *отделение и извержение* слизи (febris mucosa): 1) Bell., Chin., Dig., Merc., Puls., Rhus; 2) Ars., Cham., Cin., Dulc., Ipec., N.-vom., Rhab., Spig., Sulph.. — Если преобладаютъ *мышечныя* страданія (febris verminosa): Cic, Cin., Merc., Sil., Spig., Sulph.; 2) Acon., Dig., Hyos., N.-vom., Sabad., Stann., Stram., Teucr., Val..

§ 3. По различію характера, который принимаютъ эти лихорадки, нужно замѣтить:

При симптомахъ *воспаленія* (febris gastrica inflammatoria): 1) Bell., Bry., Cham., Merc., Puls.; 2) Tart., Acon.. — Если лихорадка принимаетъ характеръ *нервной* (febris gastrica nervosa): 1) Bell.,

Вгу., Сосс., Rhus, Veratr.; 2) Агъ., Carb.-veg., Chin., Нусс.— При гастрической лихорадкѣ съ симптомами *интестинаго разложения соковъ* (febris gastrica putrida): Arg., Carb.-veg., Chin., Merc., Mг.-ас., Phos.-ас., Rhus, Sulph., Sulph.-ас..

См. *Воспалительная и Нервная лихорадка.*

§ 4. Смотря по вѣншимъ причинамъ, производящимъ тотъ или другой видъ лихорадки: При гастрической лихорадкѣ вслѣдствіе *испорченнаго пищеваенія* (dyspepsia): 1) Ipec., Puls.; 2) Ant., Вгу., N.-vom., Sulph., Tart.; — *простуды*: Acon., Bell., Вгу., Cham., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; — *простуды желудка отъ холодной воды, льда и кислоты*: 1) Агъ., Puls.; 2) Lach, Natr.-ш, Sulph., Sulph.-ас.; — *отрченія или инва*: 1) Cham., Coloc.; 2) Acon., Вгу., Chin., N.-vom., Staph.. — Если больной употребляетъ уже много ромашки, или ѣлъ тотчасъ послѣ гнѣва, то предпочитается Puls..

§ 5. По принадлежамъ назначаются:

АСОНИТУМ — съ началъ болѣзни и когда преобладаютъ желчныя привады, т. е. когда представляется: *языкъ, обложенный желтою слизью, горькій вкусъ во рту и отъ всякой пищи и питья, за исключеніемъ воды; жгучая жажда; горькая отрыжка и горькая зеленоватая или слизистая рвота круглыми глистами; напряженіе и вздутіе подреберій; боль въ сторонѣ печени, колотье и давленіе въ ней; запоръ, или обильныя, частыя испраженія наизъ съ натугою; красная и скудная моча, сухой жаръ кожи и полный, частый пульсъ; бессонница и безнохойство; расположеніе духа, при которомъ больной постоянно жалуется и сердится.* (Сравн. Вгу., Cham.).

ВЕЛЛАДОННА — языкъ, густо обложенный желтою или бѣловатою корою; отвращеніе отъ пищи и питья; *кислый вкусъ во рту и отъ расканнаго жмба; рвота кислоты, горькими или слизистыми веществами; слизистый поносъ; сухой жаръ, преимущественно въ головѣ; жажда или жаръ, смѣняющіеся ознобомъ; тоска; безнохойство, дурное настроеніе духа и недовѣрчивость; сильная спирающая боль по лому; сухость во рту; затрудненное глотаніе; стлчка днемъ и бессонница ночью.* (Сравн. Cham. и Merc.).

ВГУОНИА — сухой, темножелтою слизью обложенный языкъ; гнилостный запахъ изо рта; горькій вкусъ, преимущественно по-

слѣ сна, или противный и отвратительный, гнилостный вкусъ; сильный позывъ на вино, кислое питье или кофе и *отвращеніе* отъ мясной пищи; тошнота, ослзненіе желудка; частая склонность ко рвотѣ, или настоящая рвота, особенно послѣ питья; колотье въ головѣ, въ предсердіи, въ боку или въ членахъ, особенно при кашлѣ и хожденіи; давленіе и напряженіе подъ ложечкою, преимущественно послѣ стола; *заморь*; водянистая, свѣтлая или желтоватая моча, образующая желтоватый осадокъ; *осмытый жаръ*, *острая жажда*, или *ознобъ* и *дрожь во всемъ тѣлѣ*; краснота лица, гнѣвливое расположеніе духа; *большая слабость*; чувство сжатія въ головѣ и головокруженіе. (Сравни. Асов., Сһап., N.-vom.).

СНАМОМІЛЛА—языкъ красный, растресканный, покрытый желтоватою корою; *горькій вкусъ во рту* и отъ пищи; *зловонный запахъ* изо рта; потеря аппетита; *горькая или кислая отрыжка* и рвота; *сильная тоска*, *напряженность* и *давленіе* въ сторонѣ желудка, подреберьяхъ и подъ ложечкою; *вѣтренная колѣна* съ терзающими болями и вздутостью живота; *запоръ*, или *зеленоватая испражненія* въ видѣ поноса, или же издающія кислый запахъ, смѣшанныя со слезью, похожія на *рубленныя яйца*; желтоватая моча съ осадкомъ въ видѣ хлопьевъ; боль одной половины головы; боль въ членахъ; *большая раздражительность*, *безпокойство* и *вздохи*, или *гнѣвливое настроеніе духа*; астматическія страданія; *жаръ*, особенно *съ мигрью* и *глазахъ*, *краснота* (часто одной только) *щекъ*; *бессонница* и *безпокойство*, или *безпокойный сонъ* съ тягостными видѣніями и внезапнымъ вскакиваніемъ. (Сравни. Асов., Bell., N.-vom., Puls.).

СОССУЛУС—языкъ, покрытый желтоватою корою; *отвращеніе* отъ пищи; *сухость во рту*, иногда *жажда*; *вонючая отрыжка* и *склонность ко рвотѣ*; *полнота живота*, причиняющая боль и *жженіе* въ заднемъ проходѣ; *большая слабость* и *потъ* при самомъ незначительномъ движеніи; боль головы, особенно во лбу, и *головокруженіе*. Это средство прилично также тамъ, гдѣ было злоупотребленіе ромашамъ.

ТРЕСАСУАННА — языкъ обложенъ толстымъ слоемъ желтоватой слизи и *сухость во рту*; *отвращеніе* отъ всякой пищи, преимущественно отъ жирныхъ веществъ, и *склонность ко рвотѣ*; *злого-*

нѣ извѣ рта; горькій вкусъ во рту отъ всякой пищи; тошнота, отрыжка и рвота непереваренною пищею; давленіе и полнота живота, причиняющія боль подъ ложечкою; рѣзь въ животѣ; испражненія въ видѣ поноса, желтоватыя или очень зловонныя, гнилостнаго запаха; *блѣдный, желтоватый цвѣтъ кожи*; головная боль, особенно во лбу; лихорадочный жаръ и жажда или дрожь. (Сравн. N. vom., и Puls.).

MERCURIUS — влажный и *блѣлый* или *желтоватого* цвета открытый языкъ; притомъ сухость и жаръ губъ; *отвратительный, тупой или зорькій* вкусъ во рту; тошнота и склонность ко рвотѣ; рвота слизью или горькими веществами; *болѣзненная чувствительность въ подреберьяхъ, подъ ложечкою, въ сторонѣ желудка* или вокругъ пупка, преимущественно ночью; тоска и безпокойство; *сонливость днемъ и бессонница* ночью; угрюмое, раздражительное расположеніе духа; дрожь, снѣняющаяся жаромъ; жгучая жажда; иногда отвращеніе отъ пищи (Сравн. Bell.).

NUX-VOMICA — сухой, *блѣдый* или желтоватого цвета обложенный языкъ, преимущественно ближе къ корню; жгучая жажда и жженіе въ гортѣ; горькій или гнилостный вкусъ; *зоркая отрыжка, постоянная тошнота*, особенно на открытомъ воздухѣ; спазмы и давящая боль въ желудкѣ; *болѣзненное давленіе и напряженіе во всей сторонѣ желудка и подреберьяхъ*; судорожная колика, щипаніе и стучаніе въ сторонѣ пупка; ваноръ и частый, но *тихій* поносъ на низѣ, или малоколичественныя, частыя, слизистыя или водянистыя испражненія; *давящая боль во лбу* и головокруженіе; раздражительное, угрюмое и ипохондрическое расположеніе духа; значительная слабость и усталость; *красное и зорькое, или желтоватое и землисто-поблѣлое* лицо; жаръ, снѣняющійся дрожью; болѣзненное чувство разбитости въ членахъ; ухудшеніе страданія по утрамъ. (Сравн. Acon., Bry., Cham., Ipec., и Puls.).

PULSATILLA — *блѣватая* кожа на языкѣ; *безкусій, протиснутый, травянистый, зорькій* вкусъ во рту, особенно послѣ проглатыванія; отрыжка, имѣющая вкусъ принятой пищи, или же горькая; *отвращеніе отъ пищи, именно отъ жира и мяса, и поносъ на кисломъ* питъе или слизистые напитки; *кислоты въ желудкѣ*; *отрыжка*; *нежелательность ко рвотѣ и нежелательная натура на рвоту*; рвота

слизистыми и блѣватыми, горькими или зеленоватыми веществами, или же кислыми; рвота непереваренною пищею; давленіе подъ ложечкою и затрудненное дыханіе; запоръ или бѣлая слизистая, или желчная и зеленоватая, частая испражненія, нахожденіе на рубленыхъ лица; боль въ одной половинѣ головы; частая дрожь и отсутствіе жажды; сухой жаръ и жажда; попеременно, то блѣдное, то красное лицо, или краснота одной щеки при блѣдности другой; смутное настроеніе духа, плавсивость, вздохи и безпокойство. (Сравн. Cham., Ires., N.-vom.).

§ 6. Изъ остальныхъ:

АНТИМОНІУМ — при гастрической лихорадкѣ вслѣдствіе испорченнаго пищеваренія, когда замѣчаются: совершенная потеря аппетита и отвращеніе отъ пищи, тошнота и наклонность ко рвотѣ, и когда эти страданія не удаляются ни посредствомъ Ires., ни Pulv. — **СОЛОСУНТІИВ** — если вслѣдствіе испорченнаго пищеваренія обнаруживаются: желчная лихорадка и *спазмы желудка*; судорожная комка и частыя испражненія, которыя возобновляются всякій разъ послѣ принятія пищи; сведеніе жеръ; если притомъ Cham., Vgu., N.-vom., или Pulv., не успѣли уничтожить этихъ явленій. — **ДИГИТАЛИС** — тошнота по утрамъ, при вставаніи, горькій вкусъ во рту, жажда, слизистая рвота, частыя испражненія и слабость. — **РЯБУС** — при большой слабости, бредѣ, гнилостномъ поносѣ, сухости языка, жадѣ и признакахъ тифа. — **СКВИЛЛА**, если болѣзнь осложняется колющемъ въ боку и если Acon. и Vgu. оказались неудовлетворительными. — **ТАВТАВУС** — преимущественно для дѣтей, а главнымъ образомъ, если въ то же время появляются катарральные припадки, мокротный кашель, обильное отдѣленіе слизи и затрудненное дыханіе. — **ВИАТІВУМ** — при большой слабости послѣ всякаго испражненія низомъ и припадкахъ обморока; желтоватомъ цвѣтѣ кожи, сухомъ и желтою или темною корою покрытомъ языкѣ.

См. *Гастрическія страданія, Лихорадки воспалительная, перемежающаяся и катарральная.*

Лихорадка ивнурительная, Febris hectica, F. lenta.

§ 1. Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленія противъ различныхъ видовъ этой лихорадки вообще: 1) Агг., Сакс.,

Chin., Coss., Ires., Phosph., Phos.-ac., Sil., Sulph., а также заслуживают вниманія: 2) Bell., Con., Cupr., Dig., Her., Ign., Jod., Kal., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Pulv., Ser., Stann., Staph., Vegetr., Zinc.

§ 2. Противъ *нервной изнурительной лихорадки* (медленной нервной лихорадки, F. nervosa lenta): Arg., Chin., Coss., Merc., Mosch., N.-vom., Phos.-ac., Staph. и Vegetr.. — Изнурительная лихорадка, сопровождающаяся *местными страданіями* отдельных органовъ, напр. хроническимъ воспаленіемъ, нагноеніемъ и т. д. (изнурительная лихорадка въ болѣе тѣсномъ смыслѣ), требуетъ всегда средствъ, приличныхъ мѣстному страданію, между которыми почти всегда оказываются полезными: 1) Arg., Calc., Chin., Coss., Ires., Phosph., Sil., Sulph.; 2) Bell., Caust., Her., Lyc., Merc., Pulv.. — Изнурительная лихорадка вследствие *душевныхъ потрясеній*, продолжительной печали, тоски по родицѣ и т. д., требуетъ преимущественно: Phos.-ac., Staph., или также: Ign., Lach., Merc., и даже Arg., или Graph.. Если же она составляетъ слѣдствіе *ослабляющей потери сокозъ* (потери крови, чрезвѣрнаго удовлетворенія половому побужденію, обильныхъ потовъ и т. д.): 1) Chin., N.-vom., Phos.-ac., Sulph.; 2) Calc., Cin., Lach., Staph.. — Если она есть слѣдствіе *тѣлесной боли* (какъ напр. нервной горячки, холеры и т. д.): 1) Coss., Her., Hyos., Phos.-ac.; 2) Arg., Chin., Vegetr.. — Изнурительная лихорадка можетъ также развиться и отъ дискразій (сифилитической, золотушной), а также отъ *злоупотребленія врачебными средствами* или медленнаго отравленія, и въ такомъ случаѣ употребляются средства, соответствующія этимъ причинамъ.

§ 3. По *припадамъ* назначаются:

АВЕНІСІУМЪ — когда замѣчаются: необыкновенное искуданіе, слабость и сердцебиеніе; *ночные поты*, а днемъ кожа сухая и жгучая; жажда, *заставляющая больного часто пить*; не охлаждающій, безпокойный сонъ, отъ котораго больной часто вскакиваетъ и пугается; постоянная охота лежать; раздражительное и странное расположеніе духа; *потеря аппетита* и дурное пищевареніе.

САЛСАВЕЛА — постоянный жаръ и несильная жажда, или *присутствіе скоро проходящаго жара*, сопровождающіеся тоскою, сердцебиеніемъ или постоянной дрожью, преимущественно вечеромъ,

и краснотою щежъ; поблекшая, сухая кожа; сильное искуданіе; необыкновенная слабость и равнодушіе; сухой, короткій кашель; *ожота манистизироваться*; расслабленіе послѣ разговора; легко возбуждаемый потъ; *сильное безтокойство о состояніи своего здоровья*; медленное, слабое пищевареніе; ночные поты.

СНІНА—блѣдный цвѣтъ лица, впалыя щеки и глаза, большое изнеможеніе и равнодушіе; сухая и вялая кожа; бессонница, или *сонъ неостыжающій, безтокойный, наполненный тлостными видѣніями*; потеря аппетита и позывъ на лакомства; или сильный голодъ и прожорливость, совмѣстныя съ слабостью пищеваренія; дурное расположеніе духа; неловкость въ глѣзѣ, вздутость живота и многія другія страданія послѣ стола; обильный потъ, особенно ночью; обильные поносы, даже неперевавленными веществами.

СОССУЛУС—большая потеря силъ, необыкновенная усталость и дрожаніе членовъ послѣ самаго незначительнаго напряженія; часто появляющійся летучій жаръ, преимущественно въ лицѣ; синіе круги подъ глазами; сухость во рту; потеря аппетита; тоскливость въ груди, волненіе крови и тоска; чрезмѣрная печаль; внезапное вскакиваніе отъ сна и тягостныя сновидѣнія; часто появляющаяся тошнота, легко появляющійся потъ при движеніи; кроткій и флегматическій темпераментъ.

ТРЕСАЦИАННА—сухой и весьма тягостный жаръ, преимущественно вечеромъ, съ жаждою; сильное безтокойство, чувство жженія въ язвахъ и ночной потъ; кожа, похожая на пергаментъ; *позывъ на одню лакомства*; большое расслабленіе и равнодушіе; одышка при малѣйшемъ движеніи.

РНОВРНОУС—сухой кашель; короткое и тоскливое дыханіе ознобъ въ вечеру, смѣняющійся сухимъ жаромъ; поносъ, *ослабляющій болыаю; изнурительный, клейкій ночной потъ*; непомѣрное искуданіе; озабоченное расположеніе духа.

РНОВРНОУІ-АСІД—смутное, озабоченное состояніе духа; молчаливость, скудость на слова и равнодушіе; сѣдѣніе волосъ; лихорадочный жаръ по вечерамъ, сопровождающійся тоскою и ускореннымъ пульсомъ; ослабляющій потъ по утрамъ.

СІЛІСА—блѣдный, землястый, поблеклый цвѣтъ лица; сухой и короткій кашель; чрезмѣрное искуданіе; потеря аппетита,

одышка, большая слабость, особенно въ сочлененіяхъ; лихорадочный жаръ по вечерамъ или утрамъ.

SULPHUR—лихорадочный жаръ, преимущественно въ вечеру, *рѣзко ограниченная краснота щекъ* (преимущественно лѣвой); сухость кожи и жажда; сухое, блѣдное лице; сухія или въ видѣ *поноса слизистыя испраженія на языкъ*; короткое, тоскливое дыханіе; сердцебиеніе; ночной потъ, появляющійся подь утро; потеря силъ и усталость, преимущественно въ ногахъ, съ чувствомъ тяжести въ нихъ; сухой кашель.

Сравни. *Чажотка леючная, Чажотка торпанная, Буюрки.*

Лихорадка перемежающаяся, Febris intermittens.

§ 1. Средства вообще: 1) Chin., Ign., Ipec., Lach., Natr.-m., N-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Ant., Arn., Bell., Bry., Calc., Caps., Carb.-veg., Cham., Cin., Ferr., Op., Veratr.; 3) Canth., Cocc., Coff., Dros., Her., Hyos., Men., Merc., Mez., N-mosch Sabad., Samb., Ser., Staph., Rhus, Val.

§ 2. Противъ лихорадки въ *болотистыхъ мѣстахъ*: 1) Arg. Chin., Ipec.; 2) Arn., Carb.-veg., Cin., Ferr., Natr.-m., Rhus, Sulph., Veratr.; — господствующихъ въ *сырые и холодные годы*: Calc., Carb.-veg., Chin., Lach., N-mosch., Puls., Rhus, Sulph., Veratr.; — весеннихъ и лѣтнихъ или вообще появляющихся въ *жаркое время*: 1) Arg., Bell., Calc., Caps., Cin., Ipec., Lach., Sulph., Veratr.; 2) Ant., Bry., Carb.-veg., Natr.-m., N-vom., Puls., Thuj.— Противъ *осеннихъ*: Bry., Chin., N-vom., Rhus, Veratr.; — *неправильно или дурно лечимыхъ зимою и скрыватыхъ лихорадокъ*: 1) Arn., Arg., Bell., Ferr., Ipec., Lach., Veratr.; 2) Calc., Caps., Carb.-veg., Cin., Merc., Natr.-m., N-mosch., N-vom., Ser., Sulph..

§ 3. Въ отношеніи къ *типу*, назначаются: при лихорадкахъ съ простимъ *типомъ*: 1) Arn., Arg., Bell., Bry., Carb.-veg., Chin., Hyos., Ipec., Ign., Natr.-m., N-vom., Puls., Rhus, Sulph., Veratr.; 2) Acon., Ant., Calc., Caps., Cham., Cocc., Coff., Dros., Ferr., Her., Men., Merc., Mez., N-mosch., Op., Sabad., Samb., Ser., Staph., Thuj., Val.. — При лихорадкахъ съ *двойнымъ типомъ*: Arg., Bell., Chin., Dulc., Graph., N-mosch., Puls., Rhus, Stram.. — При *ежедневной лихорадкѣ*: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Caps., Carb.-veg., Chin., Cic., Ign., Ipec., Lach., Lyc., Natr.-m., N-vom., Puls., Rhus,

Stram., Sulph., Veratr.; 2) Alum., Calc., Con., Graph., Petr., Sabad., Staph., Veratr.;—*трехдневная*: 1) Arg., Bell., Bry., Canth., Carb.-veg., Chin., Ipec., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Ant., Arn., Calc. Caps., Cham., Cic., Dros., Dule., Lyc., Mez., Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Rhus, Sabad., Staph., Veratr.;—*четырёхдневная*: 1) Arg., Puls., Veratr.; 2) Acon., Arn., Carb.-veg., Clem., Hyos., Ign., Jod., Lyc., N.-mosch., Puls., Sabad.;—*четырнадцатидневная*: Arg.;—*ежедневная*: Arg., Carb.-veg., Lach.

§ 4. Въ отношеніи въ *временіи* появления пароксизма лихорадки заслуживаютъ вниманія: при *осеченномъ* пароксизмѣ: 1) Arn., Arg. Bell., Bry., Carb.-veg., Lach., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Alum., Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Dulc., Graph., Ign., Ipec., Led., Lyc., Merc., N.-vom., Petr., Sabad., Sep., Staph.;—*ночной*: 1) Bell. Carb.-veg., Cham., Merc., N.-vom., Rhus, Veratr.; 2) Acon., Arg., Baryt., Borax., Calc., Caps., Carb.-an., Caust., Squill., Staph., Stram., Sulph., Thuj.;—*утренней*: 1) Arn., Bell., Bry., Calc., Cham., Lach., Natr.-m., N.-vom., Sabad., Staph., Veratr.; 2) Arg., Carb.-veg., Chin., Graph., Guaj., Her., Lyc., Merc., Nitr.-ac. Sep., Sil., Spig., Spong., Sulph., Zinc.

§ 5. Въ отношеніи къ *частямъ* пароксизма нужно замѣтить, что если онъ состоитъ только изъ *одного озноба* и незамѣтнаго почти пота, или если ознобъ преобладаетъ, то назначаются: 1) Bry., Canth., Caps., Chin., N.-vom., Puls., Sabad., Veratr.; 2) Coff., Hyos., Ipec., Petr., Phosph., Ruta, Staph.. — Если онъ состоитъ изъ *озноба и жара, безъ пота*: 1) Arn., Arg., Bell., Bry., Carb.-veg., Cham., Dulc., Ign., Ipec., Nitr.-ac., N.-vom., Rhus, Sulph. 2) Acon., Caps., Carb.-an., Hell., Lyc., Merc., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sabad., Sep., Spig., Sulph., Tart., Val.. — Если онъ состоитъ изъ *озноба и пота* только: 1) Caust., Magn.-aust., Puls., Rhus, Veratr.; 2) Amm.-m., Arg., Bry., Carb.-an., Lyc., Sabad., Sulph., Thuj.. Если онъ состоитъ изъ *одного жара*, а холодъ и потъ вовсе не замѣчаются, или мало замѣтны, а жаръ преобладаетъ: 1) Acon., Bell., Bry., Ipec., N.-vom.; Sabad., Sil., Val.; 2) Arg., Calc., Coff., Coloc., Dulc., Lach., Lyc., Op., Phosph., Puls., Staph., Sulph.. Если онъ состоитъ изъ *одного жара и пота*, безъ озноба: 1) Arg., Caps., Carb.-veg., Cham., Coff., Led., N.-vom., Op., Phosph., Rhus, Stram.; 2) Acon., Amm., Bell., Bry., Carb.-an., Chin.,

Cin., Hell., Her., Ign., Ipec., Puls., Sabad., Spig., Staph., Tart., Val., Veratr.. Если *потъ преобладаетъ*: 1) Bell., Bry., Calc., Chin., Her., Merc., Rhus, Samb., Ser., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Arg., Carb.-veg., Graph., Natr.-m., Puls.. Если *овнобъ, жаръ и потъ въ однократной сменѣ*: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Caps., Cham., Graph., Ign., Ipec., Rhus, Sabad., Spong., Veratr.; 2) Chin., Cin., Hell., Her., Lyc., Maga.-aust., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sabin., Staph., Sulph..

§ 6. Въ отношеніи къ *последовательности и связи частой пароксизма*, нужно обратить вниманіе на слѣдующее: если прежде начинается *холодъ*, а потомъ слѣдуетъ *жаръ*: 1) Acon., Arg., Bell., Cin., Her., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Spig., Sulph.; 2) Bry., Caps., Carb.-veg., Chin., Dros., Hyos., Ign., Ipec., Nitr., Petr., Phos., Phosph.-ac., Sabad., Veratr.. — Если прежде начинается *жаръ*, а потомъ слѣдуетъ *ознобъ*: 1) Bry., Calc., Caps., N.-vom., Sulph.; 2) Bell., Lyc., Puls., Ser., Staph.. — Если *жаръ и ознобъ сменяются* одинъ другимъ: 1) Arg., Bry., Calc., Chin., Merc., N.-vom.; 2) Agar., Baryt., Bell., Cocc., Lyc., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sil., Spig., Sulph., Veratr.. — Если *въ одно и то же время замѣчаются холодъ и жаръ*: 1) Acon., Arg., Bell., Calc., Cham., Hell., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Ser.; 2) Anac., Agar., Bry., Chin., Ipec., Lyc., Nitr.-ac., Oleand., Rhab., Sabad., Spig., Sulph., Veratr., и если при этомъ *жаръ будетъ наружнымъ а холодъ внутреннимъ*: Acon., Arg., Bell., Calc., Coff., Ign., Lach., Ign., Mea., Nitr., N.-vom., Phosph., Ser., Sil., Squil., Sulph.. — Если же будетъ *на оборотъ*: Arg., Bry., Chin., Hell., Merc., Mosch., Phos.-ac., Puls., Rhus, Sabad., Spong., Staph., Veratr.. — Если *потъ* появляется *вмѣстѣ съ ознобомъ*: 1) Lyc., Puls., Sabad., Sulph.; 2) Arg., Calc., Led., N.-vom., Thuj. Если *потъ безъ предшествующаго жара прямо слѣдуетъ за ознобомъ*: 1) Carb.-an., Caust., Lyc., Rhus, Thuj., Veratr.; 2) Bry., Caps., Lyc., Mag.-aust., Sabad.. — Если *жаръ сопровождается потомъ*: 1) Bell., Caps., Cham., Her., N.-vom., Op., Rhus; 2) Acon., Bry., Chin., Cin., Hell., Ign., Ipec., Merc., Phosph., Sabad., Spig., Staph., Val., Veratr.. — Если *потъ появляется послѣ жара*: 1) Arg., Cham., Ign., Ipec., Rhus, Veratr.; 2) Bry., Carb.-veg., Chin., Cin., Coff., Graph., Her., Lyc., Nitr.-ac., Op., Puls., Spong., Staph., Sulph..

§ 7. Въ отношеніи къ *жазвѣ*, нужно замѣтить: Если *жазвѣ* предшествуетъ пароксизму: Arn., Chin., Puls.; *является во время пароксизма*: 1) Acon., Bry., Caps., Carb.-veg., Cham., Cin., Ign., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Veratr.; 2) Ant., Arg., Arg., Calc., Chin., Her., Ipec., Kal., Natr., Sulph.;—*послѣ самоѣ* или *передъ жаромъ*: Arg., Chin., Droa., Puls., Sabad., Thuj.;—*послѣ пасты* *алтей* съ *жаромъ*: 1) Acon., Bell., Bry Calc., Cham., Her., Hyos., Lach., Merc., Natr.-m., Rhus, Sec., Sulph.; 2) Caps., Chin., N.-vom., Puls., Sil., Val., Veratr.. — Если во время *жара* не замѣчается *жазвѣ*: Arg., Camph., Caps., Carb.-veg., Chel., Chin., Hell., Ign., Ipec., Merc., N.-mosch., Sabad.; 2) Bell., Lach., N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Sep., Spig., Sulph., Veratr..—Если она *является послѣ жара*: Amm.-m., Chin., N.-vom., Op., Puls., Tart.. Если она *сопровождаетъ потъ*: Arg., Cham., Chin., Her., Merc., Natr., Natr.-m., Puls., Rhus, Stram., Veratr.; если *является послѣ пота*: Lyc., N.-vom., Sabad..

§ 8. Въ отношеніи къ *сопровождающимъ страданіямъ*, нужно замѣтить: если при *лихорадкѣ* замѣчаются *боязнь* съ *чужаки*: Arg., Chin., Hell., Ign., Natr.-m., N.-vom., Rhod., Rhus, Veratr.;—*усталость* и *слабость*: Arg., Chin., Ferr., Hyos., Lach., Lyc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phos.-ac., Rhus;—*признаки идротическіе*: Arg., Chin., Ferr., Hell., Stram.;—*сонливость* и *спячка*: Bell., Carb.-veg. Hell., Hyos., Lach., Op., Puls., Rhus, Tart.;—*чрезмѣрное возбужденіе*, *душевное* и *нервное*: Acon., Arg., Bell., Bry., Cham., Coff., Ign., Lyc., N.-vom., Puls.;—*наторъ крови* къ *голове* (*головокруженіе*, *бредъ*, *огуманеніе*): Acon., Bell., Bry., Camph., Carb.-veg., Coloc., Hyos., Lach., N.-vom., Op., Puls., Rhus, Stram., Val.;—*сильныя золотыя бляхи*: Arn., Arg., Bell., Chin., Ign., Lach., Lyc., Mez., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhod., Rhus, Sep., Spig.;—*истрическія страданія*: Ant., Arg., Asar., Bell., Bry., Cham., Chin., Dig., Ign., Ipec., Natr.-m., N.-vom., Puls., Stram., Sulph., Tart.;—*носохъ*: Arn., Arg., Cham., Chin., Coloc., Ipec., Phosph., Phos.-ac., Puls., Rhus, Veratr.;—*затаръ*: Arg., Bry., Calc., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Veratr.;—*страданія печени*: Arg., Chin., Merc., N.-vom.;—*страданія селезенки*: Arg., Caps., Cham., Chin., Mez., N.-vom.;—*страданія катарральныя* (*кашель* и т. д.): Acon., Bell., Bry., Chin., Con., Her., Kreos., Lach., Merc., N.-vom., Puls.; Rhus, Sabad., Spig.,

Sulph.;—*тошнота въ груди и затрудненное дыханіе*: Acon., Ant., Arn., Arg., Bry., Chin., Ferr., Her., Ipec., Lach., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Sulph.—Если *побочныя страданія преимущественно пароксизму*: 1) Arn., Arg., Carb.-veg., Chin., Ipec., Natr.-m., Puls., Rhus; 2) Bell., Calc., Cin., Her., Ign., N.-vom., Phosph., Spong., Sulph.—Если они *появляются преимущественно во время озноба*: 1) Ars., Bry., Sars., Chin., Her., Ign., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Veratr.; 2) Arn., Calc., Carb.-veg., Cin., Hell., Ipec., Lach., Merc., Mez., N.-mosch., Sabad., Ser.—Если *страданія появляются преимущественно во время жара*: 1) Acon., Arg., Bell., Carb.-veg., Cham., Ign., Natr.-m., N.-vom., Op., Puls., Rhus; 2) Bry., Calc., Caps., Chin., Coff., Dros., Hyos., Ipec., Lach., Merc., Ser., Sil., Sulph., Veratr.—Если *страданія появляются преимущественно во время пота*: Acon., Arg., Bry., Cham., Lach., Merc., Natr., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sulph., Veratr., Zinc.—Если *побочныя страданія являются послѣ пароксизма*: Ars., Bry., Carb.-veg., Cic., Coff., Ign., Lach., Lyc., N.-vom., Plumb., Puls., Rhus, Sabad., Sil.

§ 9. Въ отношеніи къ *пульсу*, который непостояненъ и потому рѣдко можетъ служить показаніемъ для выбора средствъ, скажемъ здѣсь только самое необходимое: при *перемежающемся пульсѣ*: Arg., Chin., Dig., Lach., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Phos.-ac.,¹ Ser.;—*незакитномъ, исчезающемъ*: Acon., Arg., Carb.-veg., Con., Cupr., Hyos., Op., Sec., Sil., Stram., Tart., Veratr.;—*твердомъ*: Acon., Bell., Bry., Cantb., Hyos., Lach., Laur., Merc., Op., Phosph., Plumb., Puls., Rhod., Samb., Sec., Veratr.;—*маломъ*: Acon., Arg., Bell., Camph., Canth., Clem., Cupr., Dig., Hyos., Lach., Laur., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Plumb., Sec., Sil., Stram., Veratr.;—*ускоренномъ*: Acon., Ars., Bell., Bry., Coloc., Hyos., Merc., Phosph., Puls., Sec., Sil., Spong. Sulph.;—*неровномъ, неправильномъ*: Acon., Ant., Ars., Bry., Chin., Dig., Her., Kal., Lach., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus, Sec., Spig., Stram., Val.;—*полномъ*: Acon., Bell., Bry., Camph., Coloc., Ferr., Hyos., Lach., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Samb., Sec., Ser., Spong., Stram., Sulph., Tart.;—*милкомъ*: Carb.-veg., Chin., Cupr., Jod., Plumb., Stram., Veratr.;—*дрожащемъ*: Ars., Cic., Con., Merc., Rhus, Spig., Stram., Tart.

§ 10. По совокупности признаковъ, назначаются:

А В В Е Н И С У М—когда ознобъ и жаръ появляются вмѣстѣ, или когда ознобъ будетъ внутренній, а жаръ наружный, или *обратно*; также, когда при этомъ замѣчаются: *летучій жаръ*, какъ-будто кипятилокъ течетъ по жиламъ; отсутствіе пота, или потъ, нескоро появляющійся послѣ жара, а преимущественно вначалѣ сна; или жаръ и ознобъ мало замѣтны, или если вмѣстѣ съ ознобомъ появляются: боль въ членахъ, тоска, безпокойство, летучій жаръ, какъ скоро больной заговоритъ или начнетъ двигаться; тоскливость въ груди, спазмы въ легкяхъ, головная боль и т. д., а во время жара: безпокойство, давленіе во лбу, головокруженіе или даже бредъ во время пота; жужжаніе въ ушахъ; послѣ же или во время пароксизма: большая слабость, головокруженіе, болѣзненность печени или селезенки; тошнота и склонность ко рвотѣ, *сильная боль въ желудкѣ*; изъязвленіе угловъ рта, горечь во рту, трясеніе, большая сердечная тоска, параличъ членовъ или *сильная въ мѣхъ боли*, расположеніе къ гидроническимъ страданіямъ. (Срав. Chin., Ferr., Ipec., Vegetr.).

С Н И А — тошнота, чрезвычайный голодъ, головная боль, тоска, сердцебиеніе или другія страданія, появляющіяся передъ пароксизмомъ; *жажда, обыкновенно передъ или послѣ озноба и жара*, или въ періодѣ пота, или во все продолженіе пароксизма, или въ перемежкѣ его; ознобъ, смѣняющійся жаромъ, или продолжительный промежутокъ между холодомъ и жаромъ; отсутствіе жажды; напоръ крови къ головѣ и *головная боль и блѣдность лица во время озноба*; *сухость и жжение во рту и губахъ*; краснота лица и чрезвычайный голодъ *во время жара*; большая слабость во время или послѣ пароксизма; безпокойный сонъ, *желтоватый цвѣтъ кожи*; сонливость послѣ стола, боль въ печени или селезенкѣ; припадки желчные, или гидронические; болѣзненность или припухлость печени или селезенки.

И Г Н А Т И А—если жажда появляется только въ періодѣ озноба; *если голодъ уменьшается отъ дѣйствія наружной теплоты и становится тоскою*, когда жаръ будетъ наружный; *внутренняя дрожь, блѣдность кожи, боль въ спинѣ во время озноба*; отсутствіе жажды; головная боль, головокруженіе, *блѣднее или попеременно красное и блѣдное лицо, или краснота одной только щетки; во время*

жара боль мозговая, боль подъ ложечкою; необыкновенная усталость, глубокий, трапильный сонъ во время или послѣ пароксизма вообще; слѣзъ на губахъ или углахъ рта.

IRECASAUNA—сильный ознобъ и слабый жаръ, или наоборотъ; *когда ознобъ усиливается отъ вліянія наружной теплоты; отсутствіе или по крайней мѣрѣ незначительная жажда во время озноба и сильная во время жара; тошнота, рвота и другіе гастрическіе симптомы, появляющіеся до, во время или въ промежуткѣ пароксизмовъ; языкъ при этомъ чистый или обложенный, и тоскливость въ груди.* Это средство тѣмъ хорошо, что если оно въ данномъ случаѣ не принесетъ большой пользы, то послѣ него по крайней мѣрѣ успѣшнѣе дѣйствуютъ: *Arg., Chin., Igu., N.-вош., или Arg., Carb.-veg., Cin.*

LASNEVIS—ознобъ послѣ стола или послѣ полудня, сопровождаемый иногда столь сильными болями въ членахъ и въ боку, что больной не находитъ покоя; при этомъ тоскливость въ груди и конвульсивныя подергиванія; *во время жара сильная мозговая боль, болтливый бредъ, краснота лица, жгучая жажда, сильное безновоество и движеніе, или внутренній холодъ во время жара; землистооблечный сѣрожелтоватый цвѣтъ лица; головная боль, большая слабость и быстрый упадокъ силъ въ пароксизма; жаръ преимущественно ночью или вечеромъ; потъ послѣ жара къ утру и преимущественно, когда пароксизмы вновь появляются отъ употребленія вислой пищи.*

NATVUM MURIATICUM—продолжительный холодъ; жаръ, сопровождающійся потемнѣніемъ зрѣнія, отуманеніемъ, головокруженіемъ и краснотой лица; притомъ *сильная мозговая боль во время жара; боль въ костяхъ, желтоватый цвѣтъ кожи, большая слабость, изъясненіе угловъ рта; сильная жажда даже въ періодѣ озноба, преимущественно же въ періодѣ жара; сухость языка; болѣзненная чувствительность подъ ложечкою при дотрогиваніи; горькій вкусъ во рту и потеря аппетита.*

NUX TOMICA—большая слабость и потеря силъ въ началѣ пароксизма, загѣмъ ознобъ, перемежаемый жаромъ, или жаръ, предшествующій холоду, или наружный жаръ, совмѣстный съ внутреннимъ ознобомъ или на оборотъ; притомъ постоянная потребность вадутиваться даже во время жара и пота; *желедъ и озно-*

жгучій цвѣтъ кожи, *конечностей, ногтей и лица въ періодъ озноба*, или *покалыванія въ бокахъ, колючая боль живота, боль въ спинѣ и крестцѣ, или потягиваніе въ членахъ*; въ *періодѣ жара, боль головная и жужжаніе въ ушахъ*; *кромѣ того, боль въ груди; жаръ съ холодомъ и мигль и краснота щекъ* (часто *вознвъ на пиво*) во *время озноба и жара*; *гастрическія или желчныя страданія, головокруженіе, тоска и запоръ на пиво*. (Часто *прилична послѣ* Ирес.). Срав. Arg., Bry., Chin., Ign. и Puls..

PULSATILLA — *отсутствіе жажды во все продолженіе пароксизма, или жажда только въ періодѣ жара; жаръ вмѣстѣ съ ознобомъ и жаждою; узгудченіе носомъ полуночи или къ вечеру; давящая головная боль, тоска въ груди во время озноба; краснота и одутловость лица, потъ на лицѣ; дрожь, какъ скоро больной раскрывается, или краснота однихъ только щекъ въ періодѣ жара; гастрическія или желчныя страданія во время или въ промежуткахъ пароксизмовъ; горечь во рту; слизистая, желчная или кислая рвота, поносъ или запоръ; влажный кашель и боль головы*. (Часто *прилична послѣ* Lach., равно въ *случаяхъ, гдѣ наибѣешее обремененіе желудка вызываетъ вновь болѣзнь*).

Вnus. Ознобъ и жаръ перемежаются одинъ съ другимъ; пароксизмы обыкновенно *появляются по вечерамъ или ночамъ, а потъ послѣ полуночи или къ утру*; во *время озноба появляются: боль въ членахъ, боль головная, головокруженіе, боль зубовъ во время или въ промежуткахъ приступовъ; конвульсивное подергиваніе членовъ, крапивная сыпь; колика, поносъ и другія гастрическія страданія; желтуха, бессонница и безпокойное метаніе въ разныя стороны; жажда ночью, сердцебиеніе, тоска и давленіе подъ ложечкою*. (Срав. Arg., Ign., N.-vom., Puls.).

§ 11. Изъ прочихъ средствъ:

Асситум — *если ознобъ или жаръ очень сильны, или когда замѣчаются: жаръ, особенно головы и лица, и краснота щекъ; тоска, сердцебиеніе, колотье въ бокахъ; плаксивое, раздражительное расположеніе духа, или печальныя мысли, отчаяніе и страхъ смерти*. Антимоніумъ — *при маловажѣткой жадѣ; толсто обложенномъ языкѣ, горькомъ вкусѣ во рту, отрыжкѣ, тошнотѣ, рвотѣ и другіхъ гастрическихъ страданіяхъ; рѣзи въ животѣ, напряженіи и*

давленіи въ сторонѣ желудка, запорѣ и поносѣ. АГНИСА — если ознобъ появляется всегда вечеромъ; притомъ жажда, даже до наступленія озноба; боль въ костяхъ до пароксизма; во время пароксизма постоянная потребность переменить положеніе; равнодушіе ко всему или притупленіе чувствъ; боль живота, потеря аппетита, отвращеніе отъ мясной пищи въ перемежку; желтоватый цвѣтъ кожи, горькій вкусъ, необыкновенное равнодушіе. (Часто прилична послѣ Ирес.). — ВЕЛЛАДОННА — при сильныхъ головныхъ боляхъ и одурѣніи, также когда замѣчаются: сильный ознобъ и умѣренный жаръ, или наоборотъ; ознобъ и холодъ съ одной частію, а жаръ въ другихъ; жаръ и краснота лица и біеніе шейныхъ артерій; совершенное отсутствіе жажды или сильная жажда; большая раздражительность и плаксивое расположеніе духа. ВУЮНІА — преобладаніе озноба и холода; краснота щекъ; жаръ въ головѣ и зѣвота, или преобладаніе жара и затѣмъ наступающій ознобъ, колотье съ боку, головная боль и головокруженіе въ періодѣ жара или передъ ознобомъ; языкъ, обложенный густымъ слоемъ слизи; горькій вкусъ; отвращеніе отъ пищи, тошнота, склонность ко рвотѣ и настоящая рвота; необходимо сильная жажда; запоръ или поносъ. САЛСАВВА — когда послѣ жара въ лицѣ наступаетъ ознобъ, или холодъ рукъ; ознобъ, сѣвняющійся жаромъ, или наружный ознобъ и внутренній жаръ; головокруженіе; тяжесть въ головѣ и членахъ; чувство вытягиванія или какъ-бы вывиха; боль въ крестцѣ, безпокойство. САРСІСІУМ — когда замѣчаются: жажда только во время дрожи или во все продолженіе пароксизма; преобладаніе холода, за которымъ слѣдуетъ необмолвенный, жестокій, жгучій жаръ; обильное выделеніе слюны во рту, въ горлѣ и желудкѣ; поносъ слизистыми и жгучими испраженіями; дурное расположеніе духа, тоска и одурѣніе, которое усиливается въ періодѣ озноба. САВВО-УЕГЕНТ. — когда ознобъ всегда появляется вечеромъ или ночью, при жадѣ только въ періодѣ озноба; когда имѣются обильный потъ и затѣмъ слѣдующій ознобъ; ревматическія боли зубовъ и членовъ передъ наступленіемъ или во время пароксизма; головокруженіе, тошнота и краснота лица въ періодѣ жара. СНАМОМІЛЛА — при чувствѣ давленія подъ ложечкою, жарячемъ потѣ на лбу, при жестокихъ пароксизмахъ до того, что больной выходитъ изъ себя и мечется въ

разныя стороны; желчная рвота, поносъ и рвѣзъ въ животѣ; сильная жажда; преобладающій жаръ и потъ. *Signa* — когда замѣчаются: рвота и чрезвычайный голодъ до, во время, или послѣ пароксизма; жажда только во время озноба, или только въ періодъ жара, при блѣдности лица во время пароксизма; щекотаніе въ носу, вслѣдствіе чего больной часто его чешетъ; расширенныя зрачки; искуданіе. *Fevrum* — когда замѣчаются: ознобъ съ жаждою и головою болью, волненіе крови и вздутіе подкожныхъ венъ; притомъ напоръ крови въ головѣ, отечная опухоль лица, особенно вокругъ глазъ; рвота послѣ стола; короткое дыханіе, большая слабость, доходящая почти до паралича. *Orium* — сонъ въ періодъ жара, или даже уже во время озноба; храпѣніе съ открытымъ ртомъ; конвульсивныя подергиванія; теплый потъ; задержанныя отдѣленія. (Примуществомъ для дѣтей). — *Veratrum* — при наружномъ холодѣ и холодномъ потѣ, или внутреннемъ жарѣ, темнокрасной мочѣ, бредѣ и краснотѣ лица, или при дрожи и тошнотѣ, головокруженіи; боли въ крестцѣ и спинѣ, или при дрожи, снѣняющейся жаромъ; запорѣ, или рвотѣ и поносѣ; жаждѣ въ періодъ озноба и жара.

§ 12. Наконецъ изъ остальныхъ:

Sanctavis — если поражены въ то же время и мочевые пути. *Osculus* — при возвышенной раздражительности, судорожныхъ страданіяхъ, преимущественно при спазмахъ желудка и запорѣ. *Corrua* — при необыкновенной чувствительности и сильномъ возбужденіи, хотя пароксизмы сами по себѣ не такъ сильны; или при одномъ жарѣ съ жаждою; краснотѣ лица и живости духа; общемъ потѣ съ жаждою; мягкія испраженія или поносъ; безновойство и метаніе въ разныя стороны. *Drosiera* — при сильномъ ознобѣ и холодѣ лица; при ледяномъ холодѣ конечностей; наклонности ко рвотѣ и настоящей желчной рвотѣ; сильной головной боли и судорожномъ кашлѣ во время жара; гастрическихъ страданіяхъ въ перемежку. *Nigrav* — при лихорадкѣ, сопровождаемой насморкомъ, кашлемъ и страданіемъ груди; при ознобѣ съ жаждою, второму предшествуетъ горькій вкусъ, и за которымъ слѣдуетъ жаръ и сонъ. *Hyoscyamus* — когда преобладаетъ дрожь или жаръ; при кашлѣ ночью, мѣшающемъ больному спать, или когда являються приступы эпилептическихъ конвульсій. *Menyan-*

тнев—при преобладаніи холода; взъерошиваніи волосъ и холодѣ въ нижней части живота. Меркуриус — при жарѣ, смѣняющемся холодомъ; жарѣ съ жаждою и тоскою; обильномъ кесломъ или вонючемъ потѣ и сердцебіеніи. Меркуриум — при жарѣ, особенно рукъ и ногъ, или при сильномъ жарѣ во всемъ тѣлѣ; также, когда замѣчаются: *необыкновенно сильная жажда*, боль головы, блѣдность лица, болѣзненность, припухлость и отвердѣніе около селезенки; слабость и большая чувствительность къ холодному воздуху. Нух-моснатта — при умѣренной жаждѣ во время жара, *склонности ко сну*, бѣломъ языкѣ, хрипѣніи и мокротѣ, окрашенной кровью. Саварилла — при *преобладаніи озноба*; умѣренной жаждѣ, или совершенномъ отсутствіи ея; сухомъ, судорожномъ кашлѣ, терзающихъ боляхъ въ костяхъ конечностей во время жара. Самбусус — при преобладаніи пота, или при сильномъ жарѣ безъ жажды. Серія — при холодѣ съ жаждою, боляхъ въ членихъ, ледяномъ холодѣ рукъ и ногъ и омертвѣніи пальцевъ. Старпувагрія — когда пароксизмъ начинается вечеромъ и преобладаетъ холодъ, также, когда замѣчаются скорбутическія страданія и ночной жаръ. Сульфур — если лихорадка появляется вслѣдствіе скрившейся чесотки и когда вечеромъ начинается ознобъ, ночной жаръ и потъ утромъ; при лихорадкѣ, сопровождающейся сердцебіеніемъ и сильною жаждою, даже предъ наступленіемъ озноба. Триза⁴ — когда пароксизмъ начинается ознобомъ, наружною и внутреннею дрожью съ жаждою или безъ нея; затѣмъ наступаетъ потъ безъ предшествовавшаго жара. Валериана — при отсутствіи холода, сильномъ жарѣ съ жаждою и чувствомъ сжатія въ головѣ.

Лихорадка простудная или катарральная, и ревматическая, Febris catarrhalis et rheumatica.

§ 1. Оба эти вида лихорадки мы ставимъ вмѣстѣ на томъ основаніи, что, во-первыхъ, они происходятъ отъ одной и той же причины (простуды, задержанія испарини и т. д.), и во-вторыхъ потому, что во многихъ случаяхъ они такъ бывають сходны, что часто смѣшиваются между собою. Дѣйствительнѣйшія средства противъ того и другаго вида лихорадки: 1) Асоп., Агъ., Белл., Вру., Сауст., Cham., Chin., Dulc., Мерс., N.-vom., Puls., Sulph.; 2)

Arg., Camph., Coff., Ipec., Phosph., Sabad., Sang., Sil., Spig., Squill., Stann., Veratr.

§ 2. Если лихорадка *сильная* и если она приближается къ воспалительной: 1) Acon., Bell., Bry., Cham.; 2) Arg., Coff., Ign., Merc., Puls., Rhus, Squill.—Если лихорадка *слабая*, или она ослабѣла послѣ вышесказанныхъ средствъ: 1) Chin., Dulc., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Arg., Ipec., Phosph., Seneg., Veratr.—При *весьма обильномъ потѣ*, не приносимъ однако облегченія: Bry., Chin. Merc., Sulph.—При *весьма сильномъ болязнь*: 1) Acon., Arg., Cham., Coff., Ign.; 2) Merc., Puls., Sulph.

§ 3. При *катарральныхъ* страданіяхъ, оставшихся послѣ удаленія лихорадки: 1) Sulph. или Phosph., Seneg., Stann.; 2) Arg., Bry., Dulc., Merc., Puls., Sil., Squill.—При *ревматическихъ* страданіяхъ, оставшихся послѣ лихорадки: 1) Caust., Chin., Phosph., Sil., Sulph.; 2) Her., Lach.

См. *Катарръ и Ревматизмъ, Боль юрла, мочеви, Воспаленіе глаза, Капиль, Боль зубная* и т. д., и все, что сказано о катарральныхъ и ревматическихъ страданіяхъ.

Лихорадка родильна. Febris puerperalis.

Средства вообще: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Coff., Coloc., N.-vom., Rhus; 2) Arg., Arg., Hyos., Ipec., Merc., Plat., Puls., Sec., Stram., Veratr.. Изъ этихъ средствъ имѣють мѣсто:

Асонитум — при сильной лихорадкѣ, сопровождающейся сухимъ и жгучимъ жаромъ; сильною, жгучею жаждою и позывомъ на холодное питье; притомъ, когда замѣчаются: красное и горячее лицо; короткое, затрудненное дыханіе со вдохами, вздутость живота, большая чувствительность его при ошущиваніи и періодическая рѣзь по всему животу; малоколичественный и вонючій родильный очищенія. (Послѣ Acon. часто всего приличнѣе Bell. или Bry.).

Велладонна — когда замѣчаются: вздутость живота, какъ отъ снѣртого воздуха, и колючія, бурлящія боли; сильная, судорожная комиса, какъ будто часть ступренностей наполнена косями, или ошущеніе болѣзненного издавленія на дѣтородныя части, какъ-будто все оттуда сваливается; болшая чувствительность живота при ошущиваніи; холодъ въ однихъ частяхъ, совмѣстный

съ жаромъ въ другихъ, или жгучій жаръ въ головѣ и лицѣ; краснота лица и глазъ; давящая головная боль во лбу и бікіе шейныхъ артерій; сухость во рту, краснота языка и жажда; затрудненное глотаніе и спазмы глотки; бессонница и безпокойное метаніе въ разныя стороны, или сопорозное состояніе, векстовный бредъ или другіе церебральныя симптомы; *малоколичественныя*, водянистыя или слизистыя *родильныя* очищенія; или сильное маточное кровотеченіе, причеиъ истекаетъ свернувшаяся и вонючая кровь; груди припухшія и воспаленныя, или вялыя и лишенные молока; запоръ или поносъ слизистыми испражненіями. (Если Bell. окажется неудовлетворительною, то для соответственныхъ ей случаевъ часто употребляютъ НУОС.).

ВУОПІА — если животъ очень вздутъ и очень чувствителенъ при ошупываніи и малѣйшемъ движеніи и притомъ есть запоръ; при колючихъ боляхъ въ животѣ, которыя усаливаются отъ давленія; сильной лихорадкѣ, сопровождающейся жгучимъ жаромъ во всемъ тѣлѣ, жаждою и позывомъ на холодное питье; раздражительности и склонности къ гнѣву, или же заботѣ и страху передъ будущимъ и сильнымъ безпокойствомъ объ исходѣ болѣзни.

СНАМОПІЛА — когда груди вялы и пусты и оказался переносъ молока на органы нижней части живота, притомъ поносъ съ бѣловатыми испражненіями; когда замѣчаются: *не очень обильныя* *родильныя* очищенія, вздутость и чувствительность живота при ошупываніи; боли живота, похожія на потуги; общій жаръ, краснота лица и жажда; *ухудшеніе* ночью, за которымъ слѣдуетъ потъ; *большое* безпокойство, нетерпѣніе и возмущенная нервая раздражительность.

СОФФА — при возвышенномъ нервномъ раздраженіи и большой чувствительности къ малѣйшей боли.

СОЛОСУПТНІС — когда Снат. не успѣла устранить совершенно болѣзни, и когда послѣдняя развилаь отъ сильнаго огорченія или досады, а преимущественно, когда при этомъ замѣчаются: бредъ, смѣняющійся сопорознымъ состояніемъ, жаръ въ головѣ, краснота лица, блестящіе глаза, сухой жаръ; твердый, полный и ускоренный пульсъ.

НУХ ВОПІСА — когда замѣчаются: *меланхолическое* задержаніе *родиль-*

нать *очащенной*, чувство тяжести и жжения въ дѣтородныхъ частяхъ и животѣ, или слишкомъ обильныя очищенія, сопровождающіяся болями въ крестцѣ, затрудненнымъ мочеспусканіемъ (*dysuria*) и жженіемъ при испусканіи мочи; *запоръ*; тошнота; *наклонность ко рвотѣ* или *настоящая рвота*; краснота лица; ревматическія или судорожныя боли въ ладоняхъ и голеняхъ и онѣмѣлость этихъ частей; притомъ чувство сжатія головы, или же *давленіе* и бѣненіе въ головѣ, *малокровженіе*, потемнѣніе глазъ, *звонъ въ ушахъ* и *припадки обморока*.

Рнус показанъ въ особенности, если въ самомъ началѣ болѣзни нервная система сильно поражена; если малѣйшее противорѣчіе ухудшаетъ симптомы и если бѣлыя очищенія опять дѣлаются кровавыми и истекаетъ кровь въ видѣ сгустковъ.

См. *Воспаленія брюшины, матки, Лигорадки воспалительная, нервая и Роды*.

Лица цвѣтъ и видъ, болѣзненно измѣненныя.

Цвѣтъ и видъ лица всегда составляютъ симптомы другихъ болѣзней, но иногда до того важный, что при выборѣ средствъ онъ заслуживаетъ полного вниманія.

§ 1: Относительно *цвѣта лица* нужно замѣтить: При *блѣдности лица*: 1) Arg., Bry., Calc., Carb.-veg., Chin., Ferr., Ipec., Lach., Phosph., Puls., Sep., Spig., Stann., Tart., Veratr.; 2) Alum., Arg., Camph., Cin., Hell., Nitr.-ac., N.-mosch., Phos.-ac., Rhus, Samb., Sec., — *краснотъ*: 1) Acon., Arg., Bell., Cham., Chin., Coccul., Herp., Hyos., Ign., Jod., Merc., N.-mosch., Op., Rhus, Stram., Sulph.; 2) Chin., Dulc., Hyos., Lach., Puls., Squill., Tart., Veratr.; — *краснотъ на одной половинѣ лица, одной щеки, съ блѣдностію другою*: Acon., Coloc., Ign., N.-vom., Veratr.; — *краснотъ щеки*: 1) Acon., Caps., Cham., Chin., Ferr., Merc., N.-vom., Phosph., Puls. Stann., Sulph.; 2) Bry., Dros., Dulc., Jod., Stram.; — *оранжевой краснотъ*: 1) Acon., Chin., Lyc., Phos.; 2) Bry., Calc., Dros., Dulc., Jod., Kal., Kreos., Lach., Led., Puls., Samb., Sep., Stann., Stram., Sulph.; — *частой перемѣнчивости цвѣта, то въ красный, то въ блѣдный*: 1) Acon., Bell., Cham., Cin., Croc., Ign., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Veratr.; 2) Alum., Aur., Caps., Carb.-an., Chin., Ferr., Graph., Hyos., Magn.-c., Spig., Squill., Sulph.-ac.; —

синеватою цветом лица: 1) Acon., Ang., Cham., Cupr., Lach., Puls.; 2) Ars., Aur., Bell., Bry., Camph., Con., Her., Hyos., Ign., Ipec., Merc., Samb., Spong., Veratr.; — *синею цветом вообще*: 1) Ars., Bell., Hyos., Op., Veratr.; 2) Acon., Ang., Aur., Bry., Camph., Cin., Con., Cupr., Her., Lach., Lyc., Samb., Spong., Staph., Tart.; — *коричневокрасною*: 1) Bry., Hyos., Jod., Nitr.-ac., Op., Ser., Staph., Stram., Sulph.; 2) Carb.-veg., Kreos., Puls., Sec.; — *землистоохлажденною, сѣрожелтою*: 1) Ars., Chin., Ferr., Ipec., Lach., Lyc., Merc., N.-vom.; 2) Bry., Carb.-veg., Croc., Kreos., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Samb., Ser., Sil.; — *сырою*: Carb.-veg., Kreos., Lach., Laur.; — *зеленою*: Ars., Carb.-veg., Veratr.

§ 2. Относительно *цвета* различныхъ частей лица, нужно замѣтить: при *синевѣ* вокругъ глазъ: 1) Ars., Chin., Ipec., Lyc., N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Sec., Staph., Veratr.; 2) Anac., Coccul., Cupr., Ferr., Her., Ign., Phosph., Ser., Sulph.; — *желтизною*: Nitr.-ac., N.-vom., Spig.; — *зеленою* цветомъ вокругъ глазъ: Ars., Veratr. — При *округленности* носа съ желтымъ на немъ *налетомъ* N.-vom., Ser. — Если замѣчается *целитная дуга* подъ носомъ и щелами: Ser. — При *желтизну* вокругъ носа и рта: N.-vom., Ser. — При *желтизну* висковъ: Caust. — При *синеватомъ* налетѣ вокругъ рта: Cin., Cupr., Ferr., Stann.; — *пятнахъ на лицѣ*: 1) Ars., Ferr., Rhus, Sabad., Sil.; 2) Calc., Carb.-an., Colch., Lyc., Natr., Samb., Sulph., Veratr.; — *синихъ* пятнахъ: 1) Ferr.; 2) Cin., Cupr., Stann.; — *желтыхъ*: 1) Colch., Ferr., Natr., Ser.; 2) Caust., Nitr.-ac., N.-vom.; — *красныхъ*: Calc., Lyc., Rhus, Sabad., Samb., Sil., Sulph.; — *черныхъ* точкахъ: 1) Dros., Graph., Natr., Nitr.-ac., Selen., Sulph.; 2) Bell., Bry., Calc., Dig., Her., Natr.-m., Sabad., Sabin.; — *жирномъ* лоскѣ лица: 1) Mag.-c., Natr.-m., Plumb., Selen; 2) Bry., Chin., Merc., Rhus, Stram.

§ 3. Относительно *вида* лица, нужно замѣтить: При *столомъ* лицѣ: 1) Ars., Chin., Lach., N.-vom., Sec., Ser., Stann., Veratr.; 2) Anac., Camph., Cic., Coloc., Cupr., Dros., Ferr., Lyc., Phosph., Phos.-ac., Staph., Sulph.; — *столости* вокругъ глазъ, лицѣ со впадинами глазами: 1) Ars., Camph., Chin., Ferr., Lach., Phosph., Phos.-ac., Sec., Staph., Sulph., Veratr.; 2) Anac., Cic., Coloc., Cupr., Cycl., Dros., Jod., Kal., Nitr.-ac., Oleand., Puls., Spong., Stann.; — *заостренномъ* носѣ: Ars., Chin., N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Staph., Ve-

ratr.; — *мимократическомъ*, кадаверозномъ видѣ лица: 1) Ars., Chin., Phosph., Phosph.-ac., Lyc., Veratr.; 2) Canth., Carb.-veg., Cupr., N.-vom.; — *искаженіи*, вмѣненіи чертъ лица: 1) Ars., Camph., Chin., Op., Phos.-ac., Rhus, Spig., Stram., Veratr.; 2) Bell., Canth., Caust., Cham., Colch., Graph., Hell., Lyc., Oleand., Sec.; — *одутлости*: 1) Acon., Ars., Bry., Cham., Chin., Hyos., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Samb., Spong., Stram., Sulph.; 2) Arn., Ars., Bell., Ferr., Her., Ipec., Kal., Lach., Rhus, Ser., Sil., Spig., Stann., Veratr.; — *отекъ* вокругъ глазъ: Ars., Ferr., Phosph., Puls., Rhab.; — *подъ глазами*: 1) Ars., Chin., N.-vom., Phosph., Veratr.; 2) Bry., Calc., Ser.; — *около переносыя*: Kal.; — *вокругъ носа*: Calc.; — *большенномъ*, страдальческомъ видѣ лица: 1) Chin., N.-vom., Phosph., Sulph.; 2) Cin., Clem., Lach., Puls.; — *морщинахъ*: Calc., Lyc., Ser., Stram.; — *при морщинахъ*, складкахъ на лбу: 1) Cham., Her., Lyc., Ser., Stram., Sulph.; 2) Amm., Bry., Graph., N.-vom., Rhab., Rhus; — *искривленіи* лица: 1) Ars., Bell., Caust., Cham., Graph., Hyos., Ign., Ipec., Lach., N.-vom., Op., Sec., Stram., Veratr.; 2) Ang., Camph., Cic., Coccul., Cupr., Hyos., Lyc., Merc., Plat., Puls., Rhus, Sil., Spig., Spong., Squill.

Сравни.: Сыпи, Опухоль лица, Болѣзнь носа, Ракъ носа.

Лишай маркій или пузырный, Rupia.

§ 1. Названія болѣзней нигдѣ такъ не сбивчивы, какъ въ терапіи кожныхъ болѣзней; въ этомъ мы убѣждаемся ошибочными терапевтическими названіями различныхъ видовъ Negres, (лишаевъ) и Impetigo. Тоже можно сказать и о Rupia, которая имѣетъ различное опредѣленіе у различныхъ авторовъ. Такъ Samuel Plumbe и Шенлейнъ смѣшиваютъ ее cum esthuma; Hebra въ Вѣнѣ означаетъ именемъ Rupia сифилитическіе лишай съ пирамидальными корочками; Bateman, который первый ввелъ это названіе въ науку, отличаетъ два вида Rupiae.: R. simplex et R. proeminens, и разумѣетъ подъ нею форму сыпи, похожей на эктиму, между тѣмъ какъ другіе авторы смѣшиваютъ ее съ эктимой, а въ высшемъ ея развитіи, она причисляется ими къ *разъедающимъ* язвамъ. Первоначальная форма Rupiae, по Bateman'у, есть пузырекъ, а не пустула, какъ при эктимѣ, но болѣе развитыя формы той и другой сыпи трудно различаются между собой, развѣ

только тѣмъ, что корка у *Rupia* шире и не такъ крѣпко сидятъ, какъ корки эктимы. Но Геброва *Rupia* сифилитическая тоже самое, что *Rupia proeminens* Batemani, а *Rupia simplex* одинакова съ *Bulla phagedaenica* Hahnemannii и съ фагаденическими язвами древнихъ авторовъ.

§ 2. Противъ *Rupia simplex* Шенлейна нельзя представить вѣрныхъ средствъ, потому что онъ эту сыпь смѣшиваетъ съ эктимой; по этому здѣсь будутъ годиться средства, исключенныя при эктимѣ. — Противъ *Rupia simplex* Батемана (*Ulcus phagedaenicum* aliq. auct., s. *Bulla phagedaenica* Hahnemannii) преимущественно: 1) Ars., Cham., Graph., Petr., Sil.; 2) Borax., Calc., Clem., Her., Natr., Nitr.-ас., Rhus, Sep., Squill., Staph.. — Противъ *Rupia* Гебры (*Rupia syphilitica* s. *Rupia proeminens* Batemani) назначается Merc. Но ртуть не всегда оказывается удовлетворительною, какъ это я видѣлъ на одной старухѣ, гдѣ послѣ ртути, которая только сначала хорошо дѣйствовала, нужно было употребить: Alum., Clem., Nitr.-ас., Thuj., Sassaп.; эти средства подвинули лечение впередъ и послѣ Sulph. одинъ приемъ Merc. произвелъ окончательное излечение и оставилъ на кожѣ здоровый рубецъ.

Лышай мокрый, Herpes.

§ 1. Средства противъ различныхъ видовъ лышайной сыпи: 1) Ars., Bor., Calc., Clem., Con., Dulc., Graph., Lyc., Merc., Oleand., Rhus, Sassaп., Sep., Sil., Sulph.; 2) Bry., Carb.-veg., Caust., Cic., Her., Kreos., Led., Natr.-м., Petr., Ran., Staph., Zinc..

§ 2. Отдѣльными видами соответствуютъ: *Пузырчатый лышай* (*Herpes phlyctaenoides* s. *miliaris*): 1) Acon., Bell., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Arn., Bar., Calc., Lyc., Merc., Sep.; — *разъедающій* (*Herpes exedens* s. *phagedaenicus*, *Impetigo rodens*, *Lupus*): 1) Ars., Graph., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Alum., Calc., Cic., Clem., Con., Merc., Sep.; — *съ видъ трубой* (*Herpes furfuraceus* s. *farinosus*): 1) Ara., Bry., Calc., Kreos., Sil., Sulph.; 2) Dulc., Graph., Lyc., Sep., Sulph.; 3) Anac., Cic., Lach., Led., Merc., Natr.-м., Thuj.; — *съ видъ корокъ парши* (*Herpes crustaceus*, *Impetigo*): 1) Calc., Lyc., Sulph.; 2) Con., Graph., Rhus.; 3) Ars., Cic., Dulc., Lach., Merc., Sep., Sulph.; — *комчатый* (*Herpes circinnatus*): 1) Sep.; 2) Natr., Natr.-м;

— *чешуйчатые* (Psoriasis, Herpes squamosus): 1) Ars., Clem., Dulc., Led., Magn.-с., Merc., Phosph., Rhus, Sep., Sulph; 2) Calc., Caust., Lyc., Graph.; — *съ трещинами* (Psoriasis inveterata): 1) Graph., Lyc., Sep., Sulph; 2) Calc., Her., Merc., Puls., Rhus, Sil.

§ 3 Если у того или другого вида замѣчаются:

Желтые въ сыпи: 1) Ars., Carb.-veget., Caust., Merc., Rhus, Sulph; 2) Calc., Her., Lyc., Puls., Sep., Staph.; — *зудъ*: 1) Ars., Calc., Caust., Clem., Merc., Rhus, Sep., Sulph; 2) Bor., Con., Graph., Nitr.-ac., Oleand., Ran., Sil., — *кажущая или терзающая боль*: Calc., Clem., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sep., S.I., Sulph.; — *при желтоватыхъ, темножелтыхъ лишаяхъ*: Merc., Lyc., Natr., Sep.; — *красныхъ*: Cic., Clem., Dulc., Lyc., Magn.-с., Merc., Staph.; — *блѣватыхъ*: Ars., Bry., Graph., Lyc., Zinc.

§ 4. При *сухихъ* лишаяхъ: 1) Dulc., Led., Merc., Phosph., Sep., Sil., Veratr.; 2) Baryt., Bor., Calc., Clem., Kreos., Phos.-ac., Staph., Sulph.; — *мокнувшихъ* (Impetigo): 1) Calc., Dulc., Graph., Kreos., Lyc., Merc., Rhus, Sep; 2) Alum., Bor., Carb.-veg., Caust., Phos.-ac., Staph., Sulph.; — *моющихся*: 1) Cic., Clem., Merc., Rhus, Sep.; 2) Dulc., Lyc., Nitr., Sulph.; — *легко кровоточивыхъ*: Ars., Carb.-veg., Lyc., Merc., Phosph., Phos.-ac., Sil., Sulph.

§ 5. О лишаяхъ на разныхъ частяхъ тѣла въ отдѣльности, см. статьи: *Лишай лица, губъ, подбородка, Лишай на половыхъ частяхъ* и др. статьи.

Лишай сухой, Lichen.

Средства вообще: 1) Cic., Coss., Dulc., Lyc., Sulph.; 2) Acon., Bry., Mur.-ac., Natr.-m.; 3) Calc., Graph., Rhus. — Противъ *простыхъ лишаяевъ* (Lichen simplex): 1) Cossul., Dulc.; 2) Acon., Bry., Puls. — Противъ такъ называемаго *Lichen agrinus*: Cic., Graph., Lyc., Mur.-ac., Sulph. — Противъ *Lichen strofulus*: 1) Caust., Cham., Cic.; 2) Merc., Sulph., Graph., Rhus.

Лишай на половыхъ частяхъ, зудъ этихъ частей, Herpes praeruptialis.

§ 1. Противъ настоящихъ лишаяевъ *крайней плоти* (Herpes praeruptialis): 1) Aur., Her., Nitr.-ac., Phos.-ac.; 2) Dulc., Sep., Sulph.; — *зуда въ дѣтородныхъ женскихъ губахъ*: 1) Calc., Carb.-veg., Con.,

Kal., Lyc., Natr.-m., Sep., Sil., Sulph.; 2) Amm., Graph., Kreos., Magn.-с., Nitr.-ас.;—зуда и миаля на мошонкѣ: 1) Dulc., Petr., Natr.-m., Nitr.-ас., Sulph.; 2) Amb., Coccul., Rhod., Thuj.;—зуда и свербенія въ заднемъ проходѣ: 1) Merc., Nitr.-ас., Sep., Sulph.-ас., Thuj.; 2) Bar., Calc., Zinc.,

См. также: Лишай. Опухоль половыхъ частей.

Лишай пузырьчатый, эктима, Ecthyma.

Эктиму не должно смѣшивать съ Rupia, потому что первичную форму эктимы составляютъ пустулы, между тѣмъ какъ въ Rupia эта форма — пузырьки. Пустулы у своего основанія сильнѣе воспалены, тверже и крѣпче сидятъ, нежели пузырьки въ Rupia. Впрочемъ во многихъ случаяхъ средства могутъ быть одни и тѣ же. Въ особенности рекомендуютъ: 1) Arg., Merc., Rhus, Sulph.; 2) Borax., Cham., Staph..

Лишай струповидный, Парша лишайная, Impetigo.

§ 1. Средства противъ различныхъ видовъ этой сыпи вообще: 1) Lyc., Sulph.; 2) Alum., Arg., Baryt., Calc., Cic., Clem., Dulc., Graph., Herp., Lach., Merc., Oleand., Rhus, Sil., Staph..

§ 2. Противъ Impetigo scabida: Lyc., Sulph.;—разсыпчатыхъ струповъ (imp. sparsa): Cic., Lach., Sulph.;—разъедающихъ (imp. rodens): Arg., Calc., Cic., Rhus, Sep., Sulph..

§ 3. Отъ струповъ на мазахъ: 1) Ars., Herp., Merc., Sulph.; 2) Calc., Oleand., Petr., Sil., Staph.;—вокругъ рта: 1) Arg., Calc., Graph., Kreos., Rhus, Sep., Sil., Staph.;—на грудныхъ соскахъ: Arg., Cham., Herp., Graph., Lyc., Sulph..

Лишай чешуйчатый, Psoriasis, Herpes squamosus.

§ 1. Средства: 1) Arg., Calc., Cic., Clem., Dulc., Led., Lyc., Merc., Sep., Sulph.; 2) Bry., Caust., Graph., Mur.-ас., Nitr.-ас., Oleand., Petr., Phosph., Rhus, Thuj., Zinc.

§ 2. Противъ Psoriasis infantilis: Calc., Cic., Lyc., Merc., Sulph.—Противъ Psoriasis inveterata: 1) Clem., Sulph.; 2) Calc., Merc., Petr., Rhus, Sep.—Противъ Psoriasis syphilitica: 1) Merc.; 2) если же больной много принялъ ртути, или леченіе это не оказываетъ

успѣха: 1) Clem., Sassa., Sulph.; 2) Lyc., N.-jugl., Nitr.-ac., Thuj..

§ 3. Противъ *Psoriasis labialis*, на губахъ възвѣвленныхъ и рас- тресканныхъ: 1) Merc., Natr.-m.; 2) Calc., Graph., Mez., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil.—Противъ *Psoriasis facialis*: 1) Calc., Sulph.; 2) Graph., Lyc., Ser.; 3) Cic., Led., Merc., Oleand.—Противъ *Psoriasis palmaris*: 1) Mur.-ac., Solph.-ac., Zinc.; 2) Aur., Calc., Graph., Hep., Merc., Petr., Sassa., Sil., Sulph.—Противъ *Psoriasis scrotalis* Petr., Nitr.-ac., Thuj..

Сравн. *Лишай*.

Ломота, артритизмъ, Arthritis.

§ 1. Дѣйствительнѣйшія средства противъ артритическихъ страданій вообще: 1) Acon. Ant., Bell., Calc., Caust., Chin., Coss., Coloc., Ferr., Guaj., Hep., Jod., Led., Magn., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Rhod., Sabin., Sassa., Sulph.; 2) Canth., Chel., Cic., Colch., Con., Daph., Dulc., Men., Merc., Stann., Tart., Thuj.; 3) Arn., Cin., Ran.-bulb., Ran.-sc., Staph..

§ 2. При *острой ломотѣ* преимущественно рекомендуютъ: 1) Acon., Ant., Ars., Bell., Bry., Chin., Ferr., Hep., N.-vom., Puls.; 2) Arn., Arg., Coss., Ferr., Kreos., Sulph.;—съ *историческими страданіями*: Ant.; съ *жестокими болями въ рукахъ и ногахъ*: Coss.

При *хронической ломотѣ* успѣшно дѣйствуютъ 1) Benz., Caust., Kalm., Lach., Sil.; 2) Calc., Coloc., Guaj., Jod., Mang., Phosph.-ac., Rhod., Sassa., Sulph. — При *летучей ломотѣ* приличны: 1) Arn., Magn., N.-mosh., N.-vom., Puls., или также; 2) Asa., Daph., Plumb. и Rhod. — При ломотѣ съ *опухолью*: 1) Arn., Chin., Coss., Hep., Rhus, Sulph.; 2) Ant., Bry., Chinin. — Въ соединеніи съ *геморроидальными припадками* и разстройствомъ *регула*: Verb.; — съ *пораженіемъ мочевого пузыря*: Verb., Caust., Sassa.

§ 3. Противъ *артритическихъ оселваховъ* назначаются: 1) Calc., Lyc., Rhod.; 2) Ant., Bry., Calc., Carb.-veg., Graph., Led., Lyc., N.-vom., Staph., или также; 3) Arn., Aur., Carb.-an., Dig., Lyc., Phosph., Sabin., Ser., Sil., Zinc.;—*безболѣзненныхъ*: Natr.;—*артритическихъ контрактуръ* съ пользою назначаются: 1) Bry., Caust., Guaj., Sulph., или также; 2) Calc., Coloc., Rhus, Sil.,

Thu.; — *предъстниковъ ломоты* употребляются тѣ же средства, какъ и противъ ея привадковъ, но въ особенности приносятъ пользу: Ant., Bell., Bry., N.-vom.; — *артритическихъ переносовъ*, если только они недавно произошли, отличную пользу оказываютъ: Acon., Bell., N.-vom., Sassa., Sulph. Въ большей части случаевъ однакожъ при этомъ надо обратить вниманіе на пораженный органъ и назначать средства, указанные при боляхъ головы, воспаленіи глазъ и гастрическихъ страданіяхъ артритаического происхожденія.

§ 4. Противъ артритическихъ страданій у людей, *предълежащихъ мянству*, отличную пользу оказываютъ: 1) Acon., Calc., N.-vom., Sulph., или также: 2) Arg., Chin., Her., Jod., Lach., Led., Puls.; — у пользующихся *обильнымъ столомъ*: Ant., Calc., Jod., Puls., Sulph.; — *работающихъ на водѣ*: Calc., Puls., Rhus, Sassa., Sulph. или еще: 2) Ant., Arg., Dulc., N.-mosch.

См. также *Ревматическія боли* и срав. *Причины, Приступы болей, Обстоятельства, время дня, вліяніе погоды и пищи.*

Ломота тазобедреннаго сочлененія, Coxalgia, Coxarthrocace.

§ 1. Средства противъ этой болѣзни вообще: — 1) Bell.,[†] Bry., Calc., Colch., Coloc., Her., Merc., Puls., Rhus, Sulph. или также: 2) Ant., Arg., Arg., Asa., Aur., Canth., Cham., Dig., Graph., Kreos., Lach., Lyc., N.-vom., Ser., Staph..

§ 2. Противъ *настоющей ломоты (Coxalgia)* этого сустава, смотря по симптомамъ, болѣе всего считаются приличными: 1) Bry., Calc., Caust., Led., Rhus; 2) Ant., Bell., Colch., Coloc., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Ser., Sulph.. — Противъ *нервной боли сустава (Ischias)* преимущественно рекомендуются: 1) Puls.; 2) Arg., Bell., Coloc., Lyc., Rhus, Ser.. — Противъ *воспаленія этого сустава, съ исходомъ въ нагноеніе (Coxarthrocace)*: 1) Coloc., Phosph.-ac.; 2) Calc., Her., Sil., Sulph., Zinc.. — Противъ такъ называемаго *произвольнаго вывиха (Luxatio, claudicatio spontanea)*: 1) Merc., Bell. очень удачно дѣйствуютъ, если давать ихъ попеременно, всякіе 4 — 8 дней по приему; 2) Calc., Coloc., Lyc., Puls., Rhus, Sulph., Zinc..

См. также: *Воспаленіе тазобедреннаго сустава, Ломота, Невралгія, Ревматизмъ, Боли.*

Лѣньность, чувство тяжести въ тѣлѣ, неохота къ движенію.

Эти явленія вообще указываютъ на: 1) Acon., Arg., Caps., Chin., Guaj., Lach., Natr., Natr.-m., N.-vom., Serp.; 2) Alum., Baryt., Bell., Bry., Chel., Cocc., Dulc., Hell., Ign., Iod., Mez., Mur.-ac., Op., Puls., Ruta, Tart., Thuj.. Если къ лѣньности присоединяется чувство *тяжести съ тѣмъ*, то это указываетъ преимущественно на: 1) Natr., Natr.-m., Phosph., Stann.; 2) Asa., Calc., Chin., Dig., Ign., Kal., Mez., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhab., Sec., Serp., Sil., Spong..

Любовь несчастная (болѣзненные послѣдствія)

Вообще эти послѣдствія излечиваются: 1) Aur., Hyos., Ign., Phos.-ac., Staph.; 2) Lach., Puls., Sulph.—Если отъ несчастной любви послѣдуетъ *меланхолія*, выражающаяся плачемъ и скорбію, то приличны преимущественно: Aur., Puls., Sulph.—При преобладаніи *резности*: Hyos., Lach., N.-vom.—При тихой печали и грусти: Ign. Phos.-ac., Staph.—При послѣдовательной *изнурительной лихорадкѣ*: Phos.-ac., Staph., Puls..

М.

Магnezія, послѣдствія злоупотребленія.

Лучшія средства противъ послѣдствій отъ злоупотребленія магnezія, какъ лекарства: Arg., Cham., Coff., Coloc., N.-vom., Puls. Rhab..

Авсенісум — когда замѣчаются: сильныя жгучія боли, которыя ночью усиливаются и заставляютъ больного вставать съ кровати.

Снлмомилла — при жестокой коликѣ, сопровождающей поносомъ, или безъ него.

Сорфеа — когда замѣчаются бессонница и возвышенная нервная раздражительность.

Colocynthis — при коликѣ съ невыносимыми судорожными болями и запоромъ, или медленными, скудными испражнениями.

Nux vomica — при упорномъ запорѣ безъ постороннихъ страданій, или когда при коликѣ съ поносомъ Coloc. оказался неудовлетворительнымъ.

Pulsatilla — при судорожной коликѣ, или при водянистомъ поносѣ съ коликою, и преимущественно, когда въ последнемъ случаѣ Rhab. оказался неудовлетворительнымъ.

Rhab. purg. — при водянисто-кисломъ поносѣ съ коликою и наугою на низъ.

Матки и маточнаго рукава выпаденію, Prolapsus uteri, P. vaginae.

Средства, до-сихъ-поръ съ успѣхомъ употребленныя противъ выпаденія матки и маточнаго рукава: 1) Aug., Bell., N.-vom.; 2) Calc., Kreos., Merc., N.-mosch., Stann.—Противъ выпаденія *матки въ особенности*: Aug., Bell., Calc., N.-vom., Sep., Stann.—Противъ *выпаденія рукава*: Kreos., Merc., N.-vom.—Противъ недавняго выпаденія, случившагося не далѣе, какъ за 14 дней, по моему мнѣнію, нѣтъ лучшаго средства, какъ N.-vom..

Матки страданія вообще, Affectiones uteri.

§ 1. Лучшія средства: 1) Bell., Cham., Cocc., Con., Hyos., Ign., Magn., Magn.-m., N.-vom., Plat., Puls., Sep., Sulph.; 2) Bry., Caust., Mosch., Natr.-m., N.-mosch., Stann., Stram., Veratr. (Срав. *Истерика*).

§ 2. Противъ *судорогъ матки* (metralgia, hysteralgia): 1) Cocc., Con., Ign., Magn., Magn.-m.; 2) Bell., Bry., Cham., Caust., Hyos., Natr.-m., N.-vom., Gran., Sep., Stann. Сравн. *Колिका при менструахъ* (colica menstrualis) и *Истерическія спазмы*.

§ 3. Противъ *выпаденія матки*: 1) Aug., Bell., Calc., N.-vom., Sep., Stann.; 2) Guaj., Kreos., Merc., N.-mosch..

§ 4. О *воспаленіи матки* см. эту статью.

§ 5. Противъ *опухомъ матки* (увеличеннаго объема живота) у пожилыхъ или многоорожавшихъ женщинъ: 1) Sep.; 2) Bell., Calc., Chin., N.-vom., Plat.—Противъ *метеорической вздутости* этого органа: Phosph., Lyc., Sulph..

§ 6. Противъ *идамидовъ* и *заноса*, по недостатку удовлетворительныхъ наблюдений, нельзя представить здѣсь вѣрнаго средства; но можетъ быть Bell. или Canth. окажутся дѣйствительными.

§ 7. Противъ *полиповъ* матки рекомендуютъ Staph., но по своимъ опытамъ нужно отдать первое мѣсто Calc. или Sang.

§ 8. О *скіррозныхъ* и *раковидныхъ* страданіяхъ матки см. эти статьи.

§ 9. *Омертвѣніе матки* (putrescentia uteri), встрѣчающееся у женщинъ слабаго тѣлосложенія послѣ тяжелыхъ родовъ, требуетъ Sec..

Меланхолія, Melancholia.

§ 1 Средства вообще: 1) Ars., Aur., Bell., Ign., Lach., Puls., Sulph.; 2) Calc., Caust., Coss., Con., Graph., Hell., Hyos., Lys., Merc., Natr.-m., N.-vom., Petr., Sil., Stram., Veratr.. — Противъ *черной меланхоліи*: 1) Ars., Aur., Lach., N.-vom.; 2) Ant., Aur., Calc., Graph., Merc., Sulph.. — Противъ *тихой меланхоліи*: 1) Coss., Hell., Ign., Lys., Puls., Sil., Veratr.; 3) Con., Petr., Sulph.. — Противъ *религіозной меланхоліи*: Aur., Bell., Lach., Lys., Puls., Sulph..

§ 2. По признакамъ назначаются:

А В С Е Н И С У М — когда замѣчаются періодическія припадки, *необыкновенная тоска и безпокойство, тревожное движеніе въ разныхъ сторонахъ и невозможность спокойно сидѣть или оставаться въ постели*; притомъ наступленіе припадковъ тоски преимущественно ночью или вечеромъ, въ сумеркахъ, склонность къ слезамъ, постоянная идея больного о томъ, что онъ всѣхъ обидѣлъ и что онъ не можетъ быть счастливымъ; *страхъ съ покушеніемъ на собственную жизнь*, или также необыкновенный страхъ смерти; тоска и стѣсненіе подъ ложечкою; красное и горячее лицо.

А Л Л И У М — сильная сердечная тоска, плачь, моленіе, сердцебіеніе, чувство тягости жизни и склонность къ самоубійству; *сомнѣніе въ себѣ и въ уваженіи другихъ*; больной видитъ все съ дурной стороны; неспособность къ самому незначительному умственному занятію; частое жужжаніе въ ушахъ и боль головы; болѣзненное ощущеніе разбитости въ мозгу послѣ всякаго умственнаго занятія; страданіе печени.

VELLADONNA—большая тоска, особенно при людях; страсть обижать окружающих и послѣ того слезы раскаянія, или безпокойное, мрачное и плаксивое расположение духа; апатія и равнодушіе ко всему; припадки влюбчивости; спазмы въ горлѣ или мочевыхъ путяхъ; сильное возбужденіе половой похоти.

IGNATIA—молчаливость, неподвижный взглядъ; притомъ урюмая печаль или совершенное равнодушіе ко всему; тоска и сердцебиеніе; большая склонность къ плачу; частые вздохи; землястое, поблеклое, осунувшееся лицо; выпаденіе волосъ.

LACHRIMIS—большая тоска, безпокойство, которое заставляетъ больного искать воздуха; грусть и непреодолимое желаніе предаваться печали, смотрѣть на все съ дурной стороны и отчаяваться въ спасеніи души; частые вздохи и облегченіе послѣ нихъ.

PULSATILLA—необыкновенная пулиность, тоска и желаніе скрыться; бессонница и тоска, или сонъ безпокойный, наполненный тягостными видѣніями; тоскливое стягиваніе въ груди, преимущественно вечеромъ или ночью; одышка и слезы.

SULPHUR—тоска и излишняя заботливость о своей судьбѣ, домашнихъ дѣлахъ и спасеніи души; безсмысліе, забытіе, сожалѣніе, или желаніе убѣжать; страхъ, тоска, плаксивость, моленіе, жалобы на возмутительныя мысли, которыя непроизвольно приходятъ въ голову; блѣдное лицо, необыкновенное равнодушіе ко всему.

См. Умопомраченіе, Болѣзни душевныя, Тоска по родитѣ, Ипсандрія

Мозга сотрясеніе, Commotio cerebri. — Средства противъ страданія мозга вслѣдствіе сотрясенія при паденіи, ударѣ по головѣ: 1) Arn. и Cic.; 2) Dig., Igu., Laur., Petr., Merc. (См. Поврежденія механическія).

Мозоли, Calli.

§ 1. Средства, которыя въ состояніи по крайней мѣрѣ уменьшить боль въ мозоляхъ, а иногда и совершенно удалить ихъ: 1) Ant., Calc., Sep., Sil.; 2) Amm., Carb.-an., Petr., Lyc., N.tr.-ac., Sulph.

§ 2. Кромѣ того: при сверлящихъ боляхъ отъ мозолей: **Вогал.**

Caust., Natr., Phosph.; — *лежучихъ*: Calc., Ign., Magn.-arct., Petr., Phos.-ac., Ser., Sil., Sulph.; — *давящихъ*: Ant., Graph., Bry., Phos., Ser.; — *воспалительная состояніи*: Lyc., Ser., Sil.; — *терзающихъ боляхъ*: Bry., Lyc., Magn.-m., Natr., Ser., S.l., Sulph.; — *калочихъ*: Ant., Bry., Calc., Lyc., Natr., Natr.-m., Rhus, Ser., Sil., Sulph.; — *боли, какъ бы отъ раненія*: Amb., Graph., Ign., Lyc., Magn.-arct., N.-vom., Rhus, Ser.; — *большеюности вообще*: Bry., Calc., Lyc., N.-vom., Phosph., Rhus, Ser., Sil., Sulph.

Молочница, Aphthae.

Лучшія средства противъ молочницы у дѣтей: Borax., Merc., N.-vom., Sulph., Sulph.-ac.

Сравни. *Воспаленіе злокачественное рта.*

Морская болѣзнь.

Средства: 1) Sulph.; 2) Arg., Coss.; 3) Colch., Ferr., N.-mosch., Ser., Sil., Tabac., Therid..—Если мада съ экипажемъ причиняетъ это страданіе: 1) Coss., Ser.; 2) Borax., Her., Ign., N.-mosch., Petr., Selen., Sil..—Противъ тошноты и рвоты отъ качки: Coccul., Petr.

Мочензуреніе, Diabetes mellitus.

Главныя средства: Carb.-veg., Led., Natr.-m., Phos.-ac.. Посредствомъ Phos.-ac. излечивается видъ мочевоы болѣзни, при которой отдѣляется *млековидная моча* точно такая, каковы иногда встрѣчается въ нѣкоторыхъ случаяхъ мочензуренія, когда моча бываетъ то млековидная, то водянистая и безцвѣтная. Въ другихъ случаяхъ, можно употребить: Arg., Carb.-veg., Merph., Merc., Muc.-ac., Nitr.-ac., Phosph., Sulph. (См. *Мочеотдѣленіе болѣзненное и Болѣзни почекъ*).

Мочеотдѣленіе болѣзненное, Urinae secretio morboza.

§ 1. Подъ этимъ названіемъ мы разумѣемъ всё принадди, относящееся къ *болѣзненно измѣненной мочѣ* вообще, гдѣ бы это измѣненіе ни происходило, въ органахъ мочеотдѣлительныхъ или въ мочевыхъ путяхъ.

§ 2. Въ отношеніи къ количеству отдѣляемой мочи, нужно имѣть въ виду:

При очень обильномъ, или вообще умноженномъ отдѣленіи мочи, назначаются: Arg., Carb.-veg., Led., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Phos.-ac., Puls., Rhus, Spig., Squill., Sulph., Verb.; 2) Alum., Amb., Ars., Canth., Carb.-an., Daph., Gasj., Ign., Lach., Natr., Nitr., Oleand., Phosph., Seneg. — При очень частомъ истусканіи мочи: 1) Arg., Baryt., Caust., Kreos., Lach., Merc., Nitr., Oleand., Phos.-ac., Rhus, Ruta, Sil., Squill., Staph.; 2) Aur., Bry., Calc., Coff., Daph., Kal., Mur.-ac., Spig., Veratr. — При редкомъ мочеиспусканіи в маломъ количествѣ мочы: 1) Acon., Arn., Aur., Bell., Bry., Canth., Hyos., Laur., N.-vom., Op., Plumb., Stram.; 2) Ars., Camph., Chin., Colch., Hep., Merc., Puls., Ruta, Sec., Sulph. — При слишкомъ скудномъ, уменьшенномъ: 1) Bell., Canth., Colch., Dig., Graph., Hell., Hyos., Jod., Laur., N.-vom., Op., Plumb., Ruta, Sec., Staph., Stram., Veratr.; 2) Acon., Alum., Arn., Bry., Cann., Carb.-veg., Caust., Dulc., Hep., Kal., Merc., Nitr.-ac., Phos., Puls., Rhus, Sassa., Sulph.; — совершенно недостаточномъ, прекратившемся: 1) Acon., Bell., Canth., Hyos., Jod., Laur., Op., Plumb., Sec., Stram.; 2) Alum., Colch., Dig., Graph., Hell., N.-vom., Ruta, Sassa., Veratr.

§. 3. Въ отношеніи къ качеству мочи, нужно имѣть въ виду:

Если моча издаетъ сильный аммиачный запахъ: Aca., Carb.-veg., Jod., Mosch., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Stront. — Если она блѣдная, водяниста, безцвѣтна: 1) Aur., Coloc., Con., Mur.-ac., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sulph.; 2) Alum., Arn., Bell., Colch., Dig., Hep., Ign., Magn.-c., Mur.-ac., Natr.-m., Plat., Rhus, Sassa., Sec., Sep., Stram., Stront., Sulph.-ac.; — темную цвѣта, красная, насыщенная, острая: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Carb.-veg., Colch., Merc., Sep., Sulph., Tart., Veratr.; 2) Ant., Calc., Caust., Caps., Chin., Dig., Dros., Hell., Hep., Ipec., Kal., Lach., N.-vom., Phosph., Puls., Selen., Staph.; — темно- или красно-кофейную цвѣта: 1) Arn., Bry., Dros., Lach., Phosph., Sulph.; 2) Acon., Amb., Ars., Caust., Calch., Kreos.; Merc., Nitr.-ac., Petr., Puls.; — темнокровянистую цвѣта: 1) Calc., Sep.; 2) Coff., Hep., Petr., Sulph.-ac.; — желтато цвѣта: 1) Amb., Arn., Bell., Cham.; 2) Ant., Canth., Carb.-veg., Colch., Hyos., Ign., Jod., Magn.-m., Nitr., Samb., Spong., Veratr.; — зеленовата: 1) Ars., Camph., Rhab., Ruta, Veratr.; 2) Aur., Chin., Jod., Kal., Magn., Rhod., Sulph.; — иррача: Acon.,

При очень обильномъ, или вообще умноженномъ отдѣленіи мочи, назначаются: Arg., Carb.-veg., Led., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Phos.-ac., Puls., Rhus, Spig., Squill., Sulph., Verb.; 2) Alum., Amb., Ars., Canth., Carb.-an., Daph., Gasj., Ign., Lach., Natr., Nitr., Oleand., Phosph., Seneg. — При очень частомъ истуканіи мочи: 1) Arg., Baryt., Caust., Kreos., Lach., Merc., Nitr., Oleand., Phos.-ac., Rhus, Ruta, Sil., Squill., Staph.; 2) Aur., Bry., Calc., Coff., Daph., Kal., Mur.-ac., Spig., Veratr. — При редкомъ мочеиспусканіи в маломъ количествѣ мочы: 1) Acon., Arn., Aur., Bell., Bry., Canth., Hyos., Laur., N.-vom., Op., Plumb., Stram.; 2) Ars., Camph., Chin., Colch., Hep., Merc., Puls., Ruta, Sec., Sulph. — При слишкомъ скудномъ, уменьшенномъ: 1) Bell., Canth., Colch., Dig., Graph., Hell., Hyos., Jod., Laur., N.-vom., Op., Plumb., Ruta, Sec., Staph., Stram., Veratr.; 2) Acon., Alum., Arn., Bry., Cann., Carb.-veg., Caust., Dulc., Hep., Kal., Merc., Nitr.-ac., Phos., Puls., Rhus, Sassa., Sulph.; — совершенно недостаточномъ, прекратившемся: 1) Acon., Bell., Canth., Hyos., Jod., Laur., Op., Plumb., Sec., Stram.; 2) Alum., Colch., Dig., Graph., Hell., N.-vom., Ruta, Sassa., Veratr.

§. 3. Въ отношеніи къ качеству мочи, нужно имѣть въ виду:

Если моча издаетъ сильный аммиачный запахъ: Aca., Carb.-veg., Jod., Mosch., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Stront. — Если она блѣдная, водяниста, безцвѣтна: 1) Aur., Coloc., Cop., Mur.-ac., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sulph.; 2) Alum., Arn., Bell., Colch., Dig., Hep., Ign., Magn.-c., Mur.-ac., Natr.-m., Plat., Rhus, Sassa., Sec., Sep., Stram., Stront., Sulph.-ac.; — темную цвѣта, красная, насыщенная, острая: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Carb.-veg., Colch., Merc., Sep., Sulph., Tart., Veratr.; 2) Ant., Calc., Caust., Caps., Chin., Dig., Dros., Hell., Hep., Ipec., Kal., Lach., N.-vom., Phosph., Puls., Selen., Staph.; — темно- или красно-кофейную цвѣта: 1) Arn., Bry., Dros., Lach., Phosph., Sulph.; 2) Acon., Amb., Ars., Caust., Calch., Kreos.; Merc., Nitr.-ac., Petr., Puls.; — темнокровянистую цвѣта: 1) Calc., Sep.; 2) Coff., Hep., Petr., Sulph.-ac.; — желтато цвѣта: 1) Amb., Arn., Bell., Cham.; 2) Ant., Canth., Carb.-veg., Colch., Hyos., Ign., Jod., Magn.-m., Nitr., Samb., Spong., Veratr.; — зеленовата: 1) Ars., Camph., Rhab., Ruta, Veratr.; 2) Aur., Chin., Jod., Kal., Magn., Rhod., Sulph.; — иррача: Acon.,

Arg., Bry., Canth., Cham., Colch., Dig., Hep., Merc., Nitr.-ac., N-vom., Phos.-ac., Sec., Squill.; — *холодна*: Agar., Nitr.-ac.; — *липкая* Arg., Canth., Coloc., Cupr., Kreos., Phos.-ac.; — *молоочнаю, бѣлаю, мутнобѣлаю цѣтта*, какъ будто смѣшана съ молокомъ, мукою или мѣломъ: 1) Phos.-ac.; 2) Arg., Carb.-veg., Cin., Con., Merc., Mur.-ac., Nitr.-ac., Phosph., Sulph.; 3) Alum., Amm., Arn., Bell., Cann., Canth., Caust., Chin., Dulc., Hep., Jod., Natr.-m., Rhus; — *кислаго запаха*: 1) Amb., Merc.; 2) Calc., Graph., [Natr., Nitr.-ac., Petr.]; — *остраю запаха*: 1) Borax., Cann., Caust., Hep., Merc.; 2) Arn., Calc., Clem., Graph., Jod., Kal., Natr.-m., Phosph., Rhus, Seneg., Thuja., Veratr.; — *плесневата*: Chin., Laur., Lyc., Seneg., Spong.; — *вомяча*: 1) Ars., Carb.-an., Carb.-veg., Guaj., Merc., Nitr.-ac., Puls., Sulph.; 2) Cupr., Dulc., Natr., Petr., Phosph., Phos.-ac., Sep., Stann. Viol.-tr.; — *мутна*: 1) Chin., Cin., Con., Dulc., Merc., Sabad., Sep.; 2) Amb., Bell., Cann., Carb.-an., Carb.-veg., Cham., Ign., Phosph., Puls., Rhus; — *мутится отосаждствіи*: Bry., Caust., Cham., Cin., Graph., Hep., Merc., Mez., Phos.-ac., Rhus, Seneg., Sulph.; — *даеть облако*: 1) Amb., Bry., Caust., Merc., Nitr., Petr., Phos.-ac., Seneg., Thuja.; 2) Ant., Chin., Kal., Lach., Rhod., Sassap..

§ 4. Относительно *нороднаго тѣла*, содержащагося въ мочѣ и образующаго осадокъ:

При *кровоюистой мочѣ*: 1) Canth., Cann., Dulc.; 2) Arg., Arg., Chin., Ipec., Lyc., Merc., Mez.; 3) Calc., Caps., Con., N-vom., Phosph., Sec., Sep., Sulph., Zinc.; — *кровоюистомъ осадкѣ*: 1) Ser., Sulph.-ac.; 2) Canth., Dulc., Lyc., Phos.-ac., Puls.; — *моюномъ осадкѣ* въ мочѣ или *моюною мочѣ*: Cann., Canth., Clem., Lyc., N-vom., Puls., Sep.; — *волоконнаго, пленчатого*: Cann., Canth., Merc., Mez., Nitr.-ac., Seneg., Tart.; — *жировомъ осадкѣ* или *жирной пленкѣ*: Calc., Chin., Hep., Jod., Par., Petr., Phosph., Puls., Sulph.; — *студенистой мочѣ*, или *студенистомъ осадкѣ*: Coloc., Puls.; — *желтомъ осадкѣ*: 1) Baryt., Cham., Chin., Cupr., Lyc., Phosph., Sil., Spong., Sulph.-ac., Zinc.; 2) Amm., Canth., Lach.; — *сыржю*: Con., Hyos., Spong.; — *песчаномъ, съ камушками*: 1) Lyc., Sassap.; 2) Calc., Cann., N-vom., Petr., Phosph., Sep., Sil.; 3) Alum., Amm., Amb., Ant., Calc., Canth., Chin., Lach., Natr.-m., Nitr.-ac., N-mosch., Puls., Thuja., Zinc.; — *глинистомъ осадкѣ*: Amm.-m., Sassap., Sep., Sulph., Sulph.-ac., Zinc.; — *мучнистомъ, какъ-бы известковомъ или*

мѣловомъ: Calc., Chin., Graph., Merc., Natr.-m., Phos.-ac., Sulph., Tart.; — *красноватомъ*, *красномъ*, *розовокрасномъ*, *кирпичномъ*: 1) Canth., Chin., Lyc., Natr.-m., Phosph., Puls., Ser., Squill., Val.; 2) Acon., Amb., Ant., Arg., Dulc., Lach., Nitr.-ac., Sil.; — *слизистой мочью* или *слизистомъ осадкѣ*: 1) Arg., Dulc., Merc., Natr.-m., Puls., Seneg.; 2) Ant., Canth., Carb.-veg., Coloc., Con., Her., Nitr.-ac., N.-vom., Sassa., Sulph.; — *съ тителевидною слизью*: Cann., Canth., Merc., Mez., Nitr.-ac., Seneg., Tart.; — *съ бѣловатымъ осадкомъ*: Colch., Dulc., Her., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rhiz., Ser., Spig., Sulph..

Сравн. *Мочегонуреніе*, *Перелой*, *Воспаленіе мочевого пузыря*, *Катарръ*.

Мочи задержаніе, Ischuria.

Противъ *спазмодическаго задержанія мочи*, можно употребить: 1) N.-vom., Op., Puls.; 2) Arg., Canth., Con., Dig., Hyos., Lach., Rhiz., Veratr.. (Сравн. *Мочегонуреніе болѣзненное*).—Противъ *воспалительнаго задержанія мочи*, преимущественно показаны: Acon., Cann., Canth., N.-vom., Puls.. (Сравн. *Воспаленіе мочевого пузыря и Мочегонуреніе болѣзненное*).—Противъ задержанія мочи вследствие *паралича мочевого пузыря (Ischuria paralytica)*: Arg., Dulc., Hyos. (См. *Мочегонуренія болѣзни*).

Мышьякъ, отравленіе имъ.

Въ трудныхъ случаяхъ отравленія, лучшія средства, по Герингу: 1) мыльная вода; 2) бѣлокъ, растворенный въ водѣ въ видѣ питья; 3) сахарная вода; 4) молоко; 5) всякая окись желѣза, но лучше водная окись и даже *рожевична* желѣза, даваемая съ сахарною водою. Уксусъ здѣсь бесполезенъ, а *масло растительное* даже вредно.

По устраниеніи опасныхъ симптомовъ, полезны нѣсколько приемовъ Ирес., потому Chin., въ особенности, когда у больного замѣчается большая раздражительность, безпокойный сонъ и ночныя лихорадочныя движенія; или N.-vom., если больной чувствуетъ себя хуже днемъ, особенно послѣ сна, и замѣчается запоръ или слизистый поносъ; также Veratr., если послѣ Ирес., остаются еще ча-

стая тошнота и рвота, жаръ или холодъ по всему тѣлу съ большою слабостью.—Противъ сыпи на лбу, воспаленія языка и жестокихъ головныхъ болей у тѣхъ, которые носятъ шляпы, отдѣляемая мышьякомъ, большія услуги оказываютъ: 1) Carb.-veg., Ferr.; 2) China, Нераг.—Противъ припадковъ, которые причиняются мышьякомъ въ видѣ лекарства, во зло употребленнаго: Chin., Ires., N.-vom., Veratr..

Мышцы судороги, отвердѣнiе и укороченiе мышц.
Contracturae.

Главныя средства противъ этого недуга, большею частію сопряженнаго съ ревматическими или ломотными страданіями, суть: 1) Amm., Amm.-m., Caust., Coloc., Graph., Lach., Natr., Natr.-m., Puls., Rhus, Serp., Sulph.; 2) Baryt., Carb.-an., Carb.-veg., Con., Lys., N.-vom..

См. *Ломота, Ревматизмъ.*

Мѣшеччатныя опухоли, Tumores cystici.

Средства противъ этого вида опухолей: 1) Calc., Darph., Graph., Kal.; 2) Нер., Nitr.-ac., Sil., Sulph..

Мнѣ удавалось вылечивать мѣшеччатныя опухоли посредствомъ Calc.—Противъ жировой опухоли (Steatoma) главнымъ средствомъ, кажется, можетъ служить Ваг.-с.. — Противъ кистъ надъ костями (Ganglia), главнымъ средствомъ считается Sil., а въ некоторыхъ случаяхъ Amm., или Phos..

Н.

Наваздъ, Incubus.

Асонитумъ — для дѣтей или женщинъ, если къ этому присоединяются: лихорадочный жаръ, жажда, сердцебиеніе, волненіе крови, тоскливость въ груди, тоска и безпокойство.

Nux vomica — если припадки вызываются употребленіемъ горькихъ напитковъ, пива, обильнымъ столомъ, сидячимъ образомъ жизни.

стая тошнота и рвота, жаръ или холодъ по всему тѣлу съ большою слабостью.—Противъ сыпи на лбу, воспаленія языка и жестокихъ головныхъ болей у тѣхъ, которые носятъ шляпы, отдѣляемая мышьякомъ, большія услуги оказываютъ: 1) Carb.-veg., Ferr.; 2) China, Neraг.—Противъ припадковъ, которые причиняются мышьякомъ въ видѣ лекарства, во зло употребленнаго: Chin., Ires., N.-vom., Veratr..

Мышцы судороги, отвердѣнiе и укороченiе мышц.
Contracturae.

Главныя средства противъ этого недуга, большею частію сопряженнаго съ ревматическими или ломотными страданіями, суть: 1) Amm., Amm.-m., Caust., Coloc., Graph., Lach., Natr., Natr.-m., Puls., Rhus, Serp., Sulph.; 2) Baryt., Carb.-an., Carb.-veg., Con., Lys., N.-vom..

См. *Ломота, Ревматизмъ.*

Мѣшеччатныя опухоли, Tumores cystici.

Средства противъ этого вида опухолей: 1) Calc., Darph., Graph., Kal.; 2) Ner., Nitr.-ac., Sil., Sulph..

Мнѣ удавалось вылечивать мѣшеччатныя опухоли посредствомъ Calc.—Противъ жировой опухоли (Steatoma) главнымъ средствомъ, кажется, можетъ служить Ваг.-с.. — Противъ кистъ надъ костями (Ganglia), главнымъ средствомъ считается Sil., а въ некоторыхъ случаяхъ Amm., или Phos..

Н.

Наваздъ, Incubus.

Асонитумъ — для дѣтей или женщинъ, если къ этому присоединяются: лихорадочный жаръ, жажда, сердцебиеніе, волненіе крови, тоскливость въ груди, тоска и безпокойство.

Nux vomica — если припадки вызываются употребленіемъ горькихъ напитковъ, пива, обильнымъ столомъ, сидячимъ образомъ жизни.

Орѣм—при тяжелыхъ припадкахъ съ прекращеніемъ дыханія, полуоткрытыми глазами, открытымъ ртомъ, хрипѣмъ, хрипѣ въ груди, тоскливости въ чертахъ лица, холодномъ ногѣ, покрывающемъ лицо, подергиваніяхъ и конвульсивныхъ движеніяхъ членовъ.

Pulsatilla—преимущественно при хрипавомъ дыханіи, тоскливыхъ, печальныхъ сновидѣніяхъ съ плачемъ, когда больной лежитъ на спинѣ съ руками, закинутыми на голову, покрытъ холоднымъ потомъ, или съ руками крестообразно сложенными на животѣ и къ туловищу пригнутыми ногами; преимущественно для женскаго пола.

Sulphur—при тождественномъ, чрезвычайно чуткомъ, несвѣжающемъ свѣ, давящихъ или бьющихъ головныхъ боляхъ; сновидѣніяхъ, представляющихъ огонь; когда больной спитъ съ полуоткрытыми глазами и закидываетъ руки на голову.

Кромѣ этихъ средствъ, можно еще имѣть въ виду: 1) *Amm., Bry., Cop., Her., Phosph., Ruta, Silic., Valer.*; 2) *Alum., Cimab., Con., Guaj. Natr., Natr. m.*

Нагноеніе.

§ 1. Средства отъ нагноенія при ранахъ и язвахъ: 1) *Ars., Her., Lach., Merc., Puls., Sil., Sulph.*; 2) *Asa., Bell., Calc., Canth., Carb.-v., Caust., Cist., Dulc., Kreos., Lyc., Magu., Nitr.-ac., Phosph., Rhus, Staph., Sulph.-ac.*

§ 2. Изъ этихъ средствъ, при *гнои кровянистомъ*: 1) *Asa., Her., Merc.*; 2) *Ars., Carb.-v., Caust., Nitr.-ac., Puls., Sil.*;—*гнои студенистомъ*: *Cham., Merc., Sil.*;—*гнои сукровичномъ*: 1) *Ars., Asa., Carb.-veg., Chin., Merc., Nitr.-ac., Rhus, Sil.*; 2) *Calc., Caust., Kreos., Phosph., Sulph.*;—*гнои водянистомъ, жидкомъ*: 1) *Asa., Caust., Merc., Sil., Sulph.*; 2) *Ars., Carb.-veg., Lyc., Nitr.-ac., Ran., Rhus, Staph.*;—*гнои осочекъ, мыломъ*: 1) *Asa., Carb.-veg., Chin., Her., Sil., Sulph.*; 2) *Ars., Calc., Graph., Kreos., N.-vom., Lyc., Phos.-ac., Serp.*;—*гнои сазомъ*: *Asa., Cop., Merc., Phosph., Serp.*

§ 3. При гноѣ *темноватомъ, кофейномъ цвѣтѣ*: *Ars., Bry., Carb.-veg., Rhus, Sil.*;—*гноѣ желтомъ цвѣтѣ*: 1) *Her., Merc., Puls., Sil., Sulph.*; 2) *Ars., Calc., Carb.-veg., Caust., Phosph., Rhus, Serp.*

Staph.;—*зеленоватю*: Asa., Arg., Caust., Merc., Puls., Rhus, Ser., Sil.;—*серою*: Ars., Caust., Merc., Sil.;—*черною*: Chin..

§ 4. При гноѣ, имѣющей кислый запахъ и кислотную реакцію: Calc., Her., Merc., Kal., Sulph.; — *соленою*: 1) Amb., Arg., Calc., Graph., Lys., Puls., Ser., Staph., Sulph.;—*острою, разъѣдающею*: 1) Ars., Caust., Merc., Nitr.-ac., Ran., Rhus, Ser., Sil.; 2) Carb.-veg., Cham., Clem., Lys., Natr., Petr., Staph., Sulph., Sulph.-ac..

§ 5. При доброкачественномъ нагноеніи: 1) Her., Lach., Merc., Puls., Sil., Sulph.; 2) Bell., Calc., Magn., Phosph., Rhus, Staph.;—*злокачественномъ*: 1) Asa., Chin., Her., Merc., Phosph., Sil.; 2) Ars., Calc., Carb.-veg., Caust., Kreos., Nitr.-ac., Rhus, Sulph., Sulph.-ac.; — *слишкомъ обильномъ*: 1) Asa., Her., Merc., Phosph., Puls., Ser., Sulph.; 2) Ars., Calc., Chin., Lys., Rhus, Sil.;—*задержанномъ или прежде времени прекратившемся*: Calc., Her., Lach., Merc., Sil..
При нагноеніи въ перепончатыхъ частяхъ: Sil..

См. *Нарывы, Омертвѣніе, Опухли, Язвы, Погрѣженія*.

Наркотизмъ, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія наркотическихъ веществъ, отравленіе ими.

Главные средства при отравленіи большими приемами: 1) черный кофе въ обильномъ количествѣ, въ видѣ питья; 2) уксусъ съ водою.—Остающіеся ведуга, смотря по страданіямъ, требуютъ: 1) Bell., Carb.-veg., Cham., Coff., Lach., Merc., N.-vom., Op., Puls.; 2) Amm., Arg., Caust., Graph., Hyos., Ipec., Lys., Natr.-m., Rhus, Ser., Sulph., Val..

См. *Болезни отъ пьянства, Омѣл* и вообще всѣ наркотическіе яды.

Нарывы внутренніе и наружныя. Abscessus.

§ 1. Нарывы во внутреннихъ частяхъ требуютъ тѣхъ же средствъ, какія употребляются противъ нарывовъ на наружныхъ частяхъ.

При *острыхъ нарывахъ*: 1) Bell., Her., Merc., Sil.; 2) Ars., Asa., Bry., Сера, Cham., Her., Led., Mez., Phosph., Puls., Sulph..—При *хроническихъ, галодныхъ, коместивныхъ*: Asa., Augum., Calc., Carb.-veg., Cop., Her., Jod., Laur., Lycor., Mang., Merc., Merc.-cor., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil., Sulph..

Кроме того, если в какой-либо внутренней или наружной части имеется *большая или весьма значительная красная опухоль*, из которой можно опасаться развития нарыва, то ее разрыву нередко можно достигнуть с помощью Bell, а при неудаче этого средства продолженіи 24, 48 часовъ, — Нер. — Если из гноя уже образовался, то вскрытію его всего лучше способствует Merc., но не должно назначать отнюдь не раннее образование гноя въ опухоли. Если вскрытійся фариъ не скоро закрывается при употребленіи Merc., то слѣдуетъ замѣнить Нер., или Silic., изъ которыхъ послѣднюю можно считать настоящимъ специфическимъ средствомъ противъ всѣхъ почти доброкачественныхъ и недоброкачественныхъ нагноеній.

§ 2. Въ частности, можно употребить:

ARSENICUM — при жгучихъ, невыносимыхъ боляхъ въ періодъ лихорадочномъ, или при склонности къ исходу съ смертностію и большой слабости.

ASA — при отдѣленіи безцвѣтнаго и сывороточнаго гноя; сильныхъ боляхъ при дотрогиваніи и большой чувствительности слизистыхъ частей.

VELLADONNA — при чувствѣ давленія, жженія и колотья и нарывѣ, творожистомъ гноѣ въ видѣ охлопьевъ; особенно прилична при нарывахъ печени.

VIUCONIA — если опухоль слишкомъ красна, или слишкомъ блѣдна, и сопровождается напрягающею болью.

MEZEVNUM — при нарывахъ *волокнистыхъ частей и сухожилий*, а также при нарывахъ, происшедшихъ отъ злоупотребленія ртутью.

RHIZ — преимущественно при нарывахъ *подхриповыхъ или окологлоточныхъ железъ*, если чувствуется боль въ опухоли при дотрогиваніи и истекаетъ *водянисто-кровянистый* гной.

Насморкъ, Coryza, Catarrhus nasalis.

§ 1. Главныя средства 1) Amm., Ars., Cham., Dulc., Нер., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Bell., Euphr., Ign., Ipec., Lyc., Natr., Samb.; 3) Alum., Anac., Bry., Calc., Carb.-veg., Camt. Con., Graph., Natr.-m., Nitr.-ac., Ser., Sil., Zinc.

§ 2. Противъ *предстаникамъ* насморка, медленно развивающагося и начинающагося катарральнымъ страданіемъ лобной ноздри и глазъ, рекомендуются: 1) Amm., Calc., Lach., N.-vom. Sulph.; 2) Camt., Нер., Natr.-m. — Противъ *катарральнаго* злота

нѣя носа, въ упорныхъ случаяхъ: Bry., Ign., Lyc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Sil. — Залеганіе носа у новорожденныхъ обыкновенно устраняется посредствомъ: N-vom. или Samb. — Противъ текущую насморка или слезотеченія изъ носу (blephorrhoea nasalis): 1) Merc., Puls., Sulph.; 2) Bell., Cham., Dulc., Нер., Ирес., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Sil.

§ 3. Вообще противъ обыкновеннаго насморка: 1) Merc., Нер., Bell., Lach.; 2) Arg., Dulc., N-vom., Ирес.; 3) Amm., Cham., Puls., Sulph. — Насморкъ, сопровождающійся *микродкою*, требуетъ: 1) Alum., Anac., Calc., Carb.-veg., Caust., Cop., Graph., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., Ser., Sil., Zinc. — Противъ *расположенія къ насморку* у людей, подвергающихся ему отъ малѣйшей причины: Calc., Graph., Natr., Puls., Sil., Sulph. (См. Простуда).

§ 4. *Послѣдствія скрывшагося* насморка требуютъ: Acon., Arg., Bell., Bry., Chin., Cin., N-vom., Puls., Sulph. — Если поражается преимущественно *носова*: 1) Acon., Bell., Cham., Chin., N-vom., Sulph.; 2) Arg., Bell., Carb.-veg., Lach., Lyc., Puls.; — *маза*: 1) Bell., Cham., Euphr., Ign., Lach., N-vom., Puls.; 2) Нер., Merc., Sulph.; — *послѣдовали астматическія* страданія: 1) Arg., Ирес.; 2) Bry., N-vom., Sulph.; — *при воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей* (Bronchitis): Acon., Bry., Merc., N-vom., Puls., Rhus, Sulph.

§ 5. Въ частности, можно употребить.

АММОНИУМЪ — при залеганіи носа, *происходящемъ особенно* ночью; припухлости и болѣзненной чувствительности ноздрей; при сморканіи кровью; *большой сухости въ носу*, болящихъ и слезящихся глазахъ; кровотеченія изъ носу; сухости во рту, преимущественно ночью.

АВВЕНИСУМЪ — при залеганіи носа и въ тоже время *обильномъ истеченіи водянистой слизи*, жженія въ носу и разрываніи смежныхъ частей; *бессонницѣ* ночью; кровотеченія изъ носу, охриплости; жужжанія въ ушахъ, боли головы, біенія во лбу и тошнотѣ; улучшенія въ теплѣ, отсутствіи жажды или позывѣ на питье, причѣмъ больной однако не много пьетъ за разъ.

ВВУОНИА — при тягостномъ сухомъ насморкѣ, съ давящею и колючею болью во лбу, когда притомъ N-vom. оказалась *безполезною* противъ этого состоянія.

DULSAMARA—когда замѣчаются: залеганіе носа и истеченіе изъ него, которое прекращается отъ дѣйствія холоднаго воздуха; ухудшеніе при покоѣ и улучшеніе при движеніи; кровотеченіе изъ носу; сухость во рту, безъ жажды; охрипый и оснпый голосъ.

SNAMOMILLA—преимущественно для дѣтей, или послѣ скрившагося носа и когда замѣчаются: изъязвленіе ноздрей; трещины на губахъ; необыкновенная сонливость и тяжесть въ головѣ съ особымъ родомъ притупленія чувствъ; ознобъ и жажда; краснота одной щеки и блѣдность другой; острая и разѣдающая носовая слезъ. (Часто причина послѣ или передъ Puls.).

НЕРВА—въ большей части случаевъ *обыкновеннаго насморка*, гдѣ Merc. имѣлъ мѣсто, но былъ неудовлетворителенъ, или когда больной прежде много принималъ ртути; вообще, когда холодный воздухъ причиняетъ новый насморкъ, или боль головы, или катарръ ограничивается одною ноздрей и боль головная ухудшается при движеніи.

ЛАСКИВІА—въ случаяхъ, гдѣ Merc. или Нер. имѣли мѣсто но были неудовлетворительны, а именно, когда замѣчаются: *необыкновенно обильное истеченіе водянистой слизи изъ носу*, припухлость и отслойка слезистой оболочки носа и губъ; парша въ ноздряхъ, слезотеченіе и частое чиханіе; или когда насморкъ не развязывается хорошо и производитъ залеганіе носа, жужжаніе въ ухахъ, слезотеченіе, боль головную, дурное расположеніе духа и совершенную невозможность размышлять; преимущественно, если N. vom. оказалась безъ успѣха противъ этого состоянія.

MERCURIUS—почти во всѣхъ случаяхъ *обыкновеннаго насморка*, будетъ ли онъ эпидемическій или спорадическій; именно, когда замѣчаются: частое чиханіе, *обильное истеченіе водянистой слизи*; опухоль, краснота и отслойка въ носу, зудъ и боли въ костяхъ при давленіи; истеченіе *вошочей слизи изъ носу*; чувство тяжести во лбу; ночной потъ, ознобъ или лихорадочный жаръ; сильная жажда, боли въ членахъ; отчужденіе отъ людей и постоянная мысль объ уединеніи; ухудшеніе состоянія какъ отъ теплоты, такъ и отъ холода. (Срав. Bell., Нер. и Lach.).¹

NUX VOMICA: прекращающійся текучій насморкъ и залеганіе

носа; боль головы и тяжесть во лбу или колюція и терзающія боли; когда притомъ замѣчаются: жаръ въ лицѣ, именно вечеромъ, и жгучая краснота щекъ; оковенѣлость всего тѣла; раздражительное расположеніе духа; насморкъ утромъ текучій, а вечеромъ сухой, при сухости во рту, безъ большой жажды; чувство сухости въ груди; запоръ или твердая испражненія на низъ, *залежаніе носа, одновременное истеченіе жидкой и разьдающей слизи изъ носу* и если Агв. противъ этого состоянія оказался неудовлетворительнымъ. (Срав. Агв., Грес. и Lach.)

PULSATILLA — когда замѣчаются: потеря аппетита, вкуса; *отдѣленіе желтоватой, зеленоватой и густой, вязкой слизи изъ носу*; припухлость носа; сморканіе кровью; изъязвленіе ноздрей; частое чиханіе; свѣтобоязнь; охрипый голосъ, чувство сжиманія и *тяжести въ животѣ, именно вечеромъ и въ теплой комнатѣ*; улучшеніе состоянія на воздухѣ; дрожь, именно вечеромъ; отсутствіе жажды; плаксивость; прилична передъ или послѣ Cham..

SULPHUR — когда имѣются: *залежаніе и большая сухость въ носу*; или же обильное отдѣленіе густой, желтоватой и *могвидной жидкости*; частое чиханіе; сморканіе кровью; потеря обонянія, отслойка и изъязвленіе ноздрей. (Часто прилична послѣ Puls.).

§ 6. Сверхъ того, можно имѣть въ виду:

VELLADONNA — если было показаніе для Merc. или Ner.; но они были неудовлетворительны, и именно когда обоняніе то изощряется, то притупляется. — **EUPHRASIA** при обильномъ истеченіи бѣловатой слизи и красныхъ, слезящихся глазахъ. — **JENATIA**, при насморкѣ у людей нервныхъ, головной боли во лбу и истерякѣ. — **IRESAQUANNA**, когда Агв. или N.-вош. имѣли мѣсто, но оказались неудовлетворительными, и вообще при большой слабости, потерѣ аппетита съ тошнотою, отвращеніи отъ пищи и настоящей рвотѣ. — **LUCORODIUM**, при *залежаніи носа, особенно ночью*, сжиманіи головы и жгучей боли во лбу. — **NATRIUM**, если насморкъ появляется черезъ день, или его вызываютъ сквозной вѣтеръ и малѣйшая простуда, и онъ удаляется только съ появленіемъ пота. — **SAMBUCUS**, если появляются у новорожденныхъ: *залежаніе носа вязкою; густою слизью и внезапное пробужденіе отъ сна, какъ-бы вслѣдствіе задушенія.*

Ож. Катарръ, Кашель, Воспаленіе носа и Страданія слухово-дѣленія.

Нервная слабость, возвышенная нервная раздражительность, чувствительность.

§ 1. Средства противъ слабости нервной системы или возвышеннаго ея раздраженія: 1) Асоп., Cham., Chin., Coff., N.-vom., Puls., Magn.-arct.; 2) Азаг., Нер., Iga., Nitr.-ac., Teucr., Val., Veratr..

§ 2. Если это состояніе происходитъ отъ напряженнаго умственнаго занятія, или продолжительныхъ ночныхъ бдѣній, или сидячаго образа жизни, то помогаютъ: 1) N.-vom., Sulph., а также 2) Calc., Carb.-veg., Cocc., Lach., Puls., Magn.-arct. — Отъ злоупотребленія ртутью: Carb.-veg., Cham., Нер., Nitr.-ac., Puls. — Отъ наркотическаго всеростъ: Cham., Coff., Merc., N.-vom. — Отъ чрезмернаго употребленія кофе: Cham., Iga., Merc., N.-vom., Sulph. — Отъ употребленія вина или другихъ спиртныхъ напитковъ: Асоп., Bell., Coff., N.-vom., Puls., Sulph..

§ 3. По принадлежамъ, назначаются:

АСОНИТУМЪ — молодымъ людямъ (и въ особенности дѣвцамъ) малокровнымъ, или ведущимъ сидячій образъ жизни; при необыкновенной чувствительности къ малѣйшей боли, бессонницѣ, безпокойномъ метаніи въ разныя стороны, возвышенной чувствительности зрѣнія и слуха, такъ что больной не переноситъ ни малѣйшаго свѣта, ни звука, и при этомъ замѣчаются: краснота щекъ, напоръ крови къ головѣ, *сердцебиеніе*.

СНАМОМІЛЛА — при возвышенной чувствительности къ боли и склонности къ обморокамъ вслѣдствіе малѣйшаго страданія; метаніе въ разныя стороны, плачь и крикъ; раздражительное и сварливое расположеніе духа; при поперебѣнной блѣдности и краснотѣ щекъ, или теплотѣ и краснотѣ одной щеки при холодѣ и блѣдности другой.

СНИНА — при большой слабости и трисеніи членовъ, неохотѣ къ умственнымъ и тѣлеснымъ занятіямъ; возвышеной раздражимостію всей нервной системы; крогѣ того, когда замѣчаются: необыкновенная чувствительность къ сквозному вѣтру; нескорое засыпаніе или бессонница вслѣдствіе напора мыслей; тягостныя

сновидѣнія, которыя мучать больного даже послѣ пробужденія отъ сна; склонность къ поту; хиондрическое расположеніе духа.

СОФЕА—противъ бессонницы, чувства досады и дурнаго расположенія духа, или при чрезмѣрной веселости и живости; необыкновенной чувствительности къ малѣйшей боли.

НИХ-УОМІСА — при раздражительности и необыкновенномъ нервномъ возбужденіи; чрезвычайной чувствительности всѣхъ органовъ, пугливости, тоскѣ; особенной охотѣ лежать, отвращеніи къ свѣжему воздуху и движенію; угрюмомъ и всмѣлчивомъ расположеніи духа.

PULSATILLA — въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ и N.-vom., но въ особенности женщинамъ кроткаго нрава.

MAGN.-AUST. — при возвышенной раздражительности и трясенія членовъ, безпокойствѣ, необыкновенной вздутости живота, тоскѣ, тревожномъ состояніи души и большой нервной слабости.

Ногтоѣда, Pararitium.

§ 1. Средства, большею частію рекомендуемыя при страданіяхъ ногтей вообще: 1) Graph., Sil., Sulph.; 2) Alum., Ant., Ars., Calc., Caust., Con., Her., Lach., Magn.-aust., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Ran., Sabad., Ser., Squill..

§ 2. Лучшія средства противъ такъ называемой *ногтоѣды* (pararitium), — которая ничего общаго съ ногтями не имѣетъ, кромѣ того, что она занимаетъ мѣсто близь ногтей, и составляетъ воспаление или кожи, или сухожилій и ихъ влагалищъ, или издѣстной пленки, вообще суть: 1) Sil., Sulph.; 2) Her., Lach.; 3) Alum., Calc., Kal., Merc., Nitr.-ac., Petr., Puls., Ser.—Если ногтоѣда произошла вслѣдствіе занозы или *укола* въ палецъ: 1) Nitr.-ac., Sil.; 2) Her., Lach., Petr., Sulph.—Если воспаление *поверхностное*, рожистое, подъ кожей ногтей, то въ большей части случаевъ Her. дѣйствуетъ специфически, послѣ чего Lach. довершаетъ леченіе, если только нагноеніе еще не образовалось; въ противномъ же случаѣ предпочитаютъ Sil. или Sulph.—При *флегмонозномъ* воспаленіи клѣтчатки, лучше сначала дать Sulph., а потомъ Her., если Sulph. не въ состояніи разрѣшить и предупредить нагноеніе. Послѣ Her., часто втеченіи нѣсколькихъ часовъ, наривъ вскрывается самъ собою.—При воспаленіи *глубинныхъ сухожилій* и сино-

главными перепонках, сперва слѣдуетъ также употребить Sulph., но немедленно замѣнить ее Sil., если въ течение 24 часовъ не наступитъ облегченія.—При *воспаленіи надкостной плесви*, Sil. всегда считается главнымъ средствомъ, которымъ можно достигнуть излеченія; иногда также рекомендуются Calc. или Sulph..

§ 3. Кроме того, средства противъ страданій самыхъ ногтей: если они *крошатся* или *растрескиваются*: 1) Graph., Sil., Squill., Sulph.; 2) Alum., Merc., Ser.. — При *отолщени* и *безобразности*: 1) Graph., Sabad., Sil., Sulph.; 2) Alum., Calc., Merc., Ser.. — При *вростаніи* ихъ въ палецъ: 1) Graph., Magn.-aust., Sulph.; 2) Kal., Sil.. — При *отпаденіи*: Ant., Ars., Bell., Merc., Squill., Sec., Ser., Thuj.. — При *развитіи заусеницъ*: 1) Natr.-m., Rhus, Sulph.; 2) Lyc., Calc., Merc., Sabad., Stann..—При *сильной боли и чувствительности*: 1) Caust., Graph., Magn.-aust., N.-vom., Ser., Sil.; 2) Amm.-m., Natr.-m., Puls., Rhus, Sulph.. — При *дурномъ цвѣтѣ* ногтей: Ant., Ars., Graph., Mur.-ac., Nitr.-ac., Ser., Sulph.. — При *сынеи* цвѣтѣ ихъ: Aur., Chel., Chin., Dig., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Sil..—При *пятнахъ* на нихъ: 1) Nitr.-ac., Sil.; 2) Alum., Ars., Natr.-m., Sulph.. — При *желтомъ цвѣтѣ* ногтей: 1) Amb, Cop., Ser.; 2) Chin., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Sil., Spig..—При *бѣлыхъ пятнахъ*: Nitr.-ac., Sil..

О.

Обмираніе, Аофиноія, Асрхузіа.

§ 1. Когда обмираніе или мнимая смерть есть слѣдствіе *паде-нія*, толчка или удара, то первое средство Arn., если только не было сдѣлано кровопусканія. Въ противномъ же случаѣ, или если вслѣдствіе поврежденія произошла значительная потеря крови, лучшимъ средствомъ считается Chin., за которою послѣ дается Arn.. Когда мнимая смерть есть слѣдствіе *задушенія*, то Герингъ совѣтуетъ: для *новосмившихся* Op.;—для *задушенныхъ* отъ вдыханія углекислаго газа также Op., или Acon., или Bell., а для *утомлен-ныхъ* Lach.. — При мнимой смерти вслѣдствіе *общаго осмо-*

бленія: Arg., Carb.-veg., Acon., Bry. — При мнимои смерти вслѣдствіе удара молніи: N.-vom. При этомъ дають больному полу-сидячее и полужакачее положеніе, обративъ лицо къ солнцу и посадивъ его, не закрывая лица, въ свѣжевскопанную землю, гдѣ онъ долженъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока не обнаружитъ первыхъ признаковъ жизни. — При обморокахъ *новорожденнаго*: Tart., Op., или Chin..

Сравни. *Причины, Обстоятельства.*

Обморокъ, Syncope, Lipothymia.

§ 1. Средства, до-сихъ-поръ большею частію съ успѣхомъ употребленныя противъ различныхъ видовъ обморока, *потери самосознанія и истерической слабости* вообще: 1) Acon., Camph., Carb.-veg., Cham., Her., Ign., Lach., Mosch., N.-vom., Phos.-ac., Veratr.; 2) Amm., Chin., Coff., Digit., Ipec., N.-mosch., Op., Sep., Stram..

§ 2. Если обморокъ оказывается послѣ испуга или другаго ка-кого-либо *душевнаго потрясенія*: Acon., Amm., Camph., Cham., Coff., Ign., Lach., Op. или Veratr.—Если причиною обморока *жестокая боль*: Acon., Cham.—Если онъ появляется отъ *малѣйшей боли*: Her., N.-mosch.— При обморокахъ у *истерическихъ субъектовъ*: 1) Cham., Coss., Ign., Mosch., N.-vom.; 2) Arg., Natr.-mur.— Если же онъ появляется вслѣдствіе ослабляющей потери соковъ или *острыхъ болѣзней*, то преимущественно служатъ: Carb.-veg., Chin., N.-mosch., N.-vom. — При обморокѣ у лицъ, *злоупотребляющихъ ртутью*: Carb.-veg., Her., Lach., Op..

§ 3. По принадлежамъ, назначаются:

Асонитум — когда замѣчаются: *сильное сердцебиеніе*, волненіе и напоръ крови къ головѣ, жужжаніе въ ушахъ; когда припадки появляются при всякой перемѣнѣ положенія, съ ознобомъ и смертною блѣдностью лица.

Савво-vegetabilis—если припадки начинаются *послѣ сна*, по утрамъ при *оставаніи*, или же, когда больной еще въ постелѣ

Снамомилла — если припадки сопровождаются головокруженіемъ, потемнѣніемъ зрѣнія, притупленіемъ слуха, чувствомъ мягкости или неприятности подъ ложечкою.

Соргеа — вообще для особъ чувствительныхъ и если Acon. оказался неудовлетворительнымъ противъ припадковъ обморока вслѣдствіе испуга.

НЕРВАВ — если припадки появляются по вечерамъ исключительно и имъ предшествуетъ головокруженіе.

LACHESIS — при *астматическихъ* страданіяхъ, *головокруженіяхъ*, блѣдности лица, потемнѣніи зрѣнія, тошнотѣ, рвотѣ, *болѣзняхъ и воспаленіяхъ съ стороны сердца*, холодномъ потѣ, судорогахъ, *сжатіи челюстей*, оковченѣлости, припулости живота и кровотеченіи изъ носу.

MOXUS — когда припадки появляются преимущественно по вечерамъ или по ночамъ, на воздухѣ, сопровождаются спазмами въ легкяхъ или головою болью.

NUX VOMICA — когда припадки появляются по утрамъ преимущественно, или послѣ стола, а также у беременныхъ, или у *модей, изнеможенныхъ отъ умственныхъ занятій*, или у страдающихъ послѣдствіями *отъ злоупотребленія спиртными напитковъ*, и вообще при тошнотѣ, блѣдности лица, искрахъ предъ глазами и потемнѣніи зрѣнія, боляхъ желудка, тоскѣ, трясеніи членовъ и приливахъ крови къ головѣ или груди.

RHODORHIZON ACIDUM — если припадки обнаруживаются послѣ стола и если *N. vom.* противъ нихъ оказалась неудовлетворительною.

VERATRUM — если припадки имѣютъ мѣсто при малѣйшемъ движеніи, или если имъ предшествуютъ необыкновенная *тоска*, упадокъ духа и отчаяніе, и сами припадки сопровождаются судорогами, сжатіемъ челюстей, конвульсивными движеніями глазъ и вѣкъ.

§ 4. Относительно *побочныхъ припадковъ* и сопутствующихъ *обстоятельствъ*, должно имѣть въ виду: При обморокѣ съ *тоскою*: Arg., Ign., Magn. m., Nitr. ac., Op.; — съ *затрудненіемъ дыханія*: Verb., Lach., Merc., Op., Ser.; — съ *помраченіемъ зрѣнія*: Calc., Ferr., Lach., Lyc., Petr.; — съ *болѣзью живота*: Bry., Calc., Carb. v., Graph.; — съ *полною потерей сознанія*: Arg., Calc., Lyc., Oleand.; — *важнѣемъ кровяи*: Bell., Verb., Petr.; — съ *позывами на рвоту*: Cham., Coec., Graph., Ipec., N. vom., Ser., Sulph., Veratr.; — съ *поносомъ*: Carb. v.; — съ *жаждою*: Lach.; — *рвотою*: Baryt., Calc., Sulph., Veratr.; — *блѣдностью лица*: Acon., Verb., Lach., Magn. m., Puls., Staph., Stram., Veratr.; — *краснотою лица*: Stram.; — *потомъ лица*: Calc.; — *сердцебиеніемъ*: Lach., Petr.; — *болѣзью въ сторонѣ сердца*: Cham., Ser., Petr., Veratr.; — *примивомъ кровяи*

изъ волосъ: Acon., Bell., Ferr., N.-vom., Tart.;—волосною бородою: Lyc., Petr.; — судорогами: Acon., Camph., Carb.-v., Cham., Cupr., Ign., Lach., Mosch., N.-vom., Veratr.; — болѣю полости: Calc., Ther.; — болѣю въ желудкѣ: Cham., Ign., Lach., Tart.;—шумомъ въ ушахъ: Acon., Ferr.; — сомнамбуліею: Lach., Merc., Ser., Stram.; — крово-
круженіемъ: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., N.-vom.; 2) Ambr., Carb.-v., Ign., Lach., Natr., Ser., Staph., Sulph., Ther. •

Обонянія потеря, Anosmia.

Лучшія средства противъ потеря обонянія вслѣдствіе паралича обонятельнаго нерва: Bell. Caust., Hyos., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Or., Plumb., Ser.—Противъ катарральной потеря обонянія: Alum., Calc., Her., Mez., Natr.-m., N.-vom., Puls., Ser., Sil., Sulp.

См. Воспаленіе носа, Насморкъ, Слабость зрѣнія и Потеря слуха.

Обонянія раздражительность и обманъ.

Главныя средства: 1) Aur., Bell., Calc., Graph., Lyc., Mang., N.-vom., Phosph., Ser., Sulph.; 2) Acon., Cham., Chin., Coff., Her., Puls.—При *возмущенной чувствительности*: 1) Aur., Bell. Con., Graph., Her., Lyc., Phos.-ac., Plumb., Sil., Sulph.; 2) Acon., Barut., Cham., Coff., Con., Kal., N.-vom., Ser.—При *обманѣ обонянія*, если въ носу ощущается вообще гнилой или вонючій запахъ, запахъ гнилыхъ яицъ, гнилаго сыру, навозу: Aur., Bell. Calc., Magn.-acet., Men., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Veratr.—Если ощущается запахъ известки или земли: Calc., Mang.-acet.—При *запахѣ*, какъ-бы отъ *селитры*: Agn., Bell.; — *соломъ* или *дерева*: Arg., Con.; — *кислоты* какой-либо: Alum.—При *сладковатомъ* запахѣ: Aur.—При *сърнистомъ* или при запахѣ, какъ-бы отъ *жженой шубки* или *пораха*: Apac., Arg., Calc., Graph., N.-vom.—При запахѣ какъ-бы отъ чего-нибудь *сожженнаго* или *юрлямаго*: Apac., Aur., Graph., N.-vom., Sulph.

Обстоятельства, при коихъ состояніе больного улучшается.

Само собой разумѣется, что обстоятельства, улучшенія со-

стояние больного, противоположны тѣмъ, при коихъ оно ухудшается; поэтому средства при первыхъ тѣ же, которыя будутъ вычислены при вторыхъ, противоположныхъ имъ; напр. средства при *улучшеніи состоянія въ темнотѣ* будутъ тѣ же, какія представлены при *ухудшеніи отъ яркаго свѣта*, но здѣсь мы вкратцѣ изложимъ все, что можетъ относиться *собственно къ улучшающимъ* обстоятельствамъ.

Кромѣ средствъ, исчисленныхъ въ вѣдущей статьѣ, можно еще обратить вниманіе на слѣдующія. При уменьшеніи боли чрезъ *опираніе*, употребляютъ: Bell., Carb.-veg., Kal., Merc., N.-vom., Rhus, Staph. — При *давленіи* на страдающую часть: 1) Amm., Amm.-m., Con., Magn.-m., Mang., Mur.-ac., Natr., Phos.-ac., Stann.; 2) Alum., Anac., Arg., Aur., Bry., Calc., Dulc., Graph., Kal., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.-ac.; — когда больной *подпираетъ* страдающую часть, или кладетъ ее на что-нибудь: Alum., Amm., Herp., N.-vom., Phosph., Puls., Ruta, Staph., Sulph. — При *допрониканіи* до страдающей части: 1) Asa., Calc., Mang., Men., Mur.-ac., Plumb.; 2) Anac., Bry., Caust., Natr.-m., Phosph., Sulph., Thuj. — При *хожденіи*: 1) Amm., Amm.-m., Ars., Dulc., Ferr., Magn.-c., Magn.-m., Mosch., Plat., Puls., Rhus, Sep., Val.; 2) Agar., Alum., Amb., Arg., Aur., Caps., Con., Lyc., Merc., Mur.-ac., Nitr., Sabad., Samb., Stann., Sulph. — При *употребленіи кофе*: Arg., Cham., Coloc. — При *дѣйствіи наружнаго холода*, см. ухудшеніе отъ теплоты. — При *перемѣнѣ положенія*: Arg., Cham., Ign., Phos.-ac., Puls., Val. — При *лежаніи*: Alum., Arn., Ars., Bry., Canth., Carb.-an., Cupr., Lyc., Magn.-c., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., N.-vom., Sabad., Spig., Spong., Staph., Stram., Veratr. — При *лежаніи на спинѣ*: Bry., Calc., Carb.-an., Ign., Kal., Lyc., N.-vom., Puls., Stann., Sulph. — При *лежаніи на боку*: Arn., Ars., N.-vom., Phosph., Sep. — При *лежаніи на больномъ боку*: Amb., Arn., Bry., Calc., Caust., Cham., Coloc., Ign., Kal., Magn.-aust., Puls., Rhus, Sep., Stann. — При *покоѣ*, см. ухудшеніе при *движеніи*. — При *улучшеніи состоянія отъ сна*: Calc., Chin., Colch., N.-vom., Phosph., Puls., Selen., Sep. — При *сидѣніи*: Acon., Anac., Bry., Carb.-an., Carb.-veg., Coff., Colch., Mang., Merc., Natr.-m., N.-vom., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Squill., Staph., Thuj. — При *свѣтѣ солнечномъ*: Con., Plat., Stram., Stront. — При *столчаніи положеніи*: Arg. Bell.

Calc., Coss., Colch., Graph., Ires., Merc., Min.-ac., Phosph., Plumb.—
 При пребываніи въ комнатѣ, см. Ухудшеніе на воздухѣ.

**Обстоятельства, подъ влияніемъ которыхъ со-
 стояніе больного ухудшается.**

§ 1. Почти всѣ практики нашей школы уже издавна признали
 важность этихъ обстоятельствъ, такъ что многіе изъ нихъ при-
 дали имъ абсолютное самостоятельное значеніе въ терапевти-
 ческомъ характерѣ нашихъ врачебныхъ средствъ, какъ относ-
 тельно сущности, такъ и въ отношеніи къ замѣчаемымъ припад-
 камъ.

§ 2. Время дня. Если страданія появляются или усливаются
 вечеромъ вообще: 1) Amb., Amm.-m., Amm., Arn., Arg., Bell., Bry.,
 Calc., Caps., Caust., Colch., Dulc., Euphr., Hell., Hyos., Lach.,
 Laur., Mang., Merc., Nitr., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sep., Sulph.-ac.,
 Thuj., Zinc.; 2) Ant., Asa., Borax, Carb.-an., Carb.-veg., Cham.,
 Chin., Coss., Con., Croc., Graph., Guaj., Hep., Ign., Kal., Laur.,
 Led., Lyc., Magn.-c., Mez., Natr., Natr.-m., N.-vom., Petr., Phos-
 ac., Plat., Rhod., Rhus, Seneg., Sil., Stann., Staph., Stront., Sulph.,
 Tart. — *Вечеромъ въ постели или передъ полночью:* 1) Ars., Bry.,
 Calc., Carb.-veg., Graph., Hep., Lyc., Merc., Phosph., Puls., Rhus,
 Selen., Sep.; 2) Alum., Amm., Arn., Aur., Calad., Carb.-an., Carb.-
 veg., Cham., Chin., Coss., Con., Croc., Graph., Guaj., Hep., Ign.,
 Kal., Laur., Led., Lyc. Magn.-c., Magn.-m., Mez., Natr., Natr.-m.,
 N.-vom., Petr., Phos.-ac., Plat., Rhod., Rhus, Seneg., Sil., Stann.,
 Staph., Stront., Sulph.-ac., Tart., Thuj., Veratr. — *Ночью* вообще:
 1) Acon., Arn., Ars., Bell., Calc., Caps., Cham., Chin., Cin., Colch.,
 Con., Dros., Dulc., Ferr., Graph., Hep., Hyos., Ign., Magn.-c.,
 Magn.-m., Magn., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus,
 Sep., Sil., Staph., Stront., Sulph., Thuj.; 2) Ant., Aur., Baryt., Bry.,
 Camph., Canu, Cauth., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Coff., Croc.,
 Cupr., Hell., Jod., Kal., Kreos., Lach., Led., Lyc., Magn.-arct., Mez.,
 Natr., N.-vom., Plumb., Ran., Rhab., Sabad., Samb., Sec., Selen.,
 Spig., Sulph.-ac., Tart., Thuj. — *Во время сна:* 1) Alum., Ars.,
 Aur., Bell., Bry., Cham., Hep., Lach., Merc., Mosch., Nitr., Nitr.-
 ac., Puls., Samb., Sep., Sil., Stram., Sulph.; 2) Acon., Anac., Arn.,

Baryt., Borax, Calc., Caust., Chin., Cin., Con., Dulc., Graph., Hyoa., Ign., Kal., Led., Lyc., Magn.-arct., Mur.-ac., Natr.-m., N.-vom., Op., Phosph., Phos.-ac., Rhab., Rhus, Ruta, Stann., Thuj. — *Послѣ помычки, во время съ постели, при пробужденіи:* 1) Alum., Amb., Amm., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Caust., Con., Graph., Hep., Kal., Lach., Lyc., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phosph., Sep., Sulph.; 2) Amm., Ant., Arn., Aur., Calc., Cann., Canth., Caps., Carb.-an., Chin., Croc., Dros., Ferr., Ign., Mang., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr., Phos.-ac., Plat., Ran., Rhod., Sabad., Samb., Sil., Squill., Staph., Sulph.-ac., Thuj., Veratr. — *Утромъ вообще:* 1) Amb., Amm., Amm.-m., Ant., Ars., Bry., Calc., Carb.-veg., Cin., Croc., Dros., Guaj., Ign., Natr., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Squill., Veratr.; 2) Acon., Alum., Anac., Ant., Aur., Carb.-an., Con., Coff., Hep., Kal., Lach., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Petr., Phos.-ac., Plat., Puls., Sabin., Sep., Sil., Staph., Sulph., Tart., Thuj. — *Передъ помычкой или послѣ заправки:* 1) Carb.-veg., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Sep.; 2) Amm., Anac., Ars., Bry., Calc., Caust., Cham., Con., Dig., Graph., Guaj., Hep., Kal., Magn., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sabad., Sassa., Sil., Staph., Sulph.-ac., Val., Veratr. — *Послѣ помычки или послѣ обѣда:* 1) Alum., Asa., Bell., Lyc., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sil., Thuj., Zinc.; 2) Amm., Amm.-m., Ant., Borax, Calc., Canth., Cic., Coloc., Con., Graph., Ign., Mosch., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Ran., Sassa., Selen., Val.

§ 3. П и щ а. Если страданія появляются до заправки и уменьшаются послѣ него: Baryt., Calc., Hep., Ign., Jod., N.-vom., Petr., Plat., Rhus, Sep., Staph., Sulph. — Если они появляются или усиливаются послѣ заправки: Amm.-m., Borax, Bry., Calc., Carb.-veg., Caust., Con., Graph., Kal., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Sep., Sulph., Thuj., Zinc. — Если припадки, появляющіеся передъ обѣдомъ, уменьшаются послѣ него: 1) Amb., Calc., Cann., Ferr., Ign., Jod., Lach., Natr., Phosph., Sabad., Stront., Zinc.; 2) Alum., Amb., Anac., Baryt., Caps., Chin., Graph., Laur., Puls., Rhus, Sep., Spig., Sulph. — Если припадки появляются во время стола: 1) Amm., Baryt., Carb.-an., Carb.-veg., Coss., Graph., Hep., Kal., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sep.; 2) Amb., Ars., Borax, Calc., Caust., Cham., Cic., Con.,

Магн.-м., N.-vom., Phos.-ас., Sil., Sulph., Veratr. — Позволяется или усиливается после обода: 1) Амм., Анас., Арг., Бру., Calc., Carb.-veg., Caust., Chin., Con., Kal., Lach., Lyc., Natr., Natr.-м., Nitr.-ас., N.-vom., Phosph., Sep., Sil., Sulph., Zinc.; 2) Амм.-м., Ant., Borax, Carb.-ан., Cham., Cin., Cocc., Нер., Ign., Natr., Petr., Phos.-ас., Puls., Ran., Squill., Stann., Sulph.-ас., Thuj.; — ослабляется или усиливается после жидк.: 1) Арг., Bell., Canth., Carb.-veg., Chin., Cocc., Ferr., Natr., Natr.-м., N.-vom., Rhus, Sil., Veratr.; 2) Acon., Ant., Арг., Baryt., Бру., Caust., Cin., Coloc., Con., Hell., Нер., Hyos., Ign., Lach., Nitr.-ас., Phosph., Phos.-ас., Puls., Sep., Sil., Stram., Sulph., Sulph.-ас.; — вызываются или усиливаются от курения табаку: 1) Amb., Calc., Ign., Ipec., Lach., N.-vom., Phosph., Puls., Spong., Staph.; 2) Acon., Alum., Анас., Ant., Арг., Бру., Carb.-ан., Chin., Cic., Clem., Cocc., Euphr., Magn.-aret., Natr., Natr.-м., Petr., Ruta, Selen., Sulph., Sulph.-ас..

Подробные см. *Изменение слабости*.

§ 4. ВРЕМЕНА ГОДА И МЕСЯЦЫ. Если припадки преимущественно позволяют или усиливаются: *Весною*: 1) Carb.-veg., Lach., Rhus, Veratr.; 2) Amb., Aug., Bell., Calc., Natr.-м., Puls.; — *летом*: 1) Bell., Бру., Carb.-veg., Dulc.; 2) Lyc., Natr., Puls., Rhod., Sil.; — *осенью*: 1) Calc., Colch., Dulc., Lach., Merc., Petr., Rhod., Rhus, Veratr.; — *зимой*: 1) Acon., Bell., Бру., Carb.-veg., Cham., Colch., Dulc., Ipec., N.-vom., Petr., Rhus, Sulph., Veratr.; 2) Амм., Aug., Camph., Merc., Natr.-м., N.-mosch., Phosph., Puls., Rhod., Sep.; — при *ущербе ума*: 1) Alum., Calc., Sabad., Sil.; — при *новолунии*: Alum., Амм., Calc., Caust., Cupr., Lyc., Sabad., Sep., Sil.; — во время *полнолуния*: Alum., Calc., Graph., Natr., Sabad., Sil., Spong., Sulph.; — при *нарастающ. луне*: Alum., Dulc., Thuj..

§ 5. Воздух и ветер. Если *дуриал поода* усиливает страданія: 1) Бру., Rhod., Sep., Sil.; 2) Carb.-v., Caust., Lach., Merc., Natr., Natr.-м., Nitr.-ас., N.-vom., Petr., Phosph. — Если состояние больного ухудшается при *бурной, отрывной, сырой погоде*: 1) Бру., Rhod., Sil.; 2) Carb.-v., Chin., Lach., Lyc., Mur.-aa., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Puls., Sil., Veratr. — Если *отверь* вообще наносит страданія: 1) Carb.-v., Cham., Lyc., Sulph.; 2) Acon., Aug., Bell., Chin., Con., Graph., Mur.-ас., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sep., Thuj. — Если *сырости ветру* причиняет не-

дуги: Acon., Caust., Her., N.-vom., Ser., Sil. — Если недуги обнаруживаются при *восточномъ вѣтрѣ*: 1) Acon., Bry., Carb.-veg., Her., Sil.; 2) Caust., N.-vom.; — при *южномъ вѣтрѣ*: Bry., Carb.-veg., Rhod., Sil.; — при *западномъ*: Calc., Carb.-v., Dulc., Lach., Rhod., Rhus, Veratr.; — при *северномъ*: 1) Acon., Anac., Bell., Calc., Cham., Sil., Sulph.; 2) Caps., Caust., Graph., Her., Ign., Kal., Natr., N.-vom., Rhus, Selen., Ser.; — при *прохладномъ вечернемъ воздухѣ*: 1) Amm., Carb.-veg., Merc., Nitr.-ac., Sulph.; 2) Borax, Mez., N.-mosch., Plat.; — на *открытомъ воздухѣ* или на *прогулкѣ*: 1) Amm., Calc., Carb.-an., Caust., Cham., Cocc., Coff., Con., Kal., Lyc., Natr., N.-vom., Sil., Stram., Sulph.; 2) Alum., Bry., Camph., Carb.-veg., Chin., Ferr., Guaj., Hell., Her., Lach., Led., Mag.-anst., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Puls., Rhus, Selen., Spig., Sulph.-ac., Thuj., Val., Veratr. — Если припадки скорѣе появляются или усиливаются при *пробываніи въ комнату*, нежели на воздухѣ, гдѣ они уменьшаются: 1) Alum., Aza., Croc., Magn.-arct., Magn.-c., Magn.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sabin.; 2) Acon., Amb., Anac., Ant., Asar., Baryt., Graph., Hell., Her., Ipec., Lyc., Mez., Mosch., Natr.-m., Op., Plat., Sassa., Seneg., Ser., Spong., Stront., Thuj..

§ 6. Холодъ и сырость: Если *холодъ* вообще вреденъ, вызываетъ или усиливаетъ страданія: 1) Ars., Baryt., Bel., Calc., Camph., Caps., Caust., Cocc., Dulc., Hell., N.-mosch., N.-vom., Rhod., Rhus, Sabad.; 2) Acon., Amm., Anac., Aur., Borax, Carb.-an., Carb.-v., Colch., Her., Hyos., Ign., Kal., Lach., Lyc., Mang., Merc., Mez., Mosch., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Ser., Sil., Spig., Stront., Sulph., Sulph.-ac., Thuj. — Если *холодный воздухъ* причиняетъ вредъ: 1) Bry., Calc., Carb.-v., Cham., Merc., Rhus, Veratr.; 2) Ars., Aur., Camph., Caps., Caust., Cocc., Colch., Dulc., Hell., Lyc., N.-mosch., Phosph., Rhod., Ser., Stront. — Если недугъ *появляется или усиливается*, когда въ какомъ-либо членѣ ощущается *холодъ*: Bell., Cham., Hell., Her., Puls., Rhus, Ser., Sil. — Если *раскрытие частей тѣла* причиняетъ страданія: 1) Ars., Aur., Cocc., Con., Her., Kal., Merc., Mosch., N.-vom., Rhus, Samb., Squill., Sil., Stront.; 2) Arn., Bry., Camph., Caust., Cic., Clem., Colch., Con., Dulc., Graph., Hyos., Magn.-c., Natr., Magn.-m., Natr.-m., N.-mosch., Phosph., Sabad., Ser., Staph. — Если *сырой холодъ*, съ-

рля и холодная погода причиняютъ страданія: 1) Amm., Calc., Carb.-v., Dulc., Lach., Merc., N.-mosch., Rhod., Rhus, Veratr.; 2) Borax, Carb.-an., Chin., Colch., Lyc., Mang., Nitr.-ac., Puls., Ruta, Sassa., Ser., Spig., Sulph.—Если отъ промоченія нѣла или частей ея происходятъ болѣзненные явленія: 1) Ars., Calc., Colch., Dulc., N.-mosch., Puls., Rhus, Sassa., Ser.; 2) Bell, Bry., Her., Ipec., Lach., Lyc., Phosph., Sulph. — Если страданіе легко происходитъ отъ работъ на водѣ или съ водою: Amm., Ant., Bell., Calc., Carb.-veg., Clem., Merc., Nitr.-ac., N.-mosch., Phosph., Puls., Rhus, Sassa., Ser., Sulph.— Если всякая переменная погода причиняетъ болѣзненные явленія: 1) Calc., Carb.-v., Dulc., Lach., Merc., Rhus, Sil, Sulph., Veratr.; 2) Graph., Mang., Nitr. ac., N.-vom., Phosph., Puls., Rap., Rhus, Sulph., Veratr..

§ 7. Тѣплота: Если всякая переменная температура вредна: Ars, Carb.-veg., Dulc., N.-vom., Phosph, Puls., Rap., Rhus, Sulph., Veratr. — Если вообще теплота производитъ или усиливаетъ недуги: Amb., Ars., Aur., Camph., Cann., Led., Carb.-v., Dros., Jod, Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls, Ruta, Sec., Seneg., Thuj. — Если теплый воздухъ, теплая погода оказываются вредными: Ant., Bry., Carb. v., Coss., Colch., Jod., Lach., Lyc., Puls., Sulph.— Если теплая постель причиняетъ болѣзненные явленія: 1) Ars., Bell., Carb.-v., Cham., Dros., Graph., Led., Lyc., Merc., Puls., Rhus, Sabin, Sulph., Veratr.; 2) Amb., Calc., Caust., Coss., Graph., Kal, Led., Lyc., Phosph., Phos.-ac., Spong., Thuj.— Если теплота отъ печи, или комнатная причиняетъ вредъ: Acon., Agn., Alum., Anac., Ant., Arn., Cin., Colch., Croc., Jod., Natr.-m., Op., Phosph., Plat., Puls., Sabin., Spong., Sulph., Thuj.— Если дѣйствіе солнца производитъ или усиливаетъ страданія: Agar., Ant., Bell., Bry., Camph., Curg., Graph., Lach., Natr., Puls., Selen., Sulph., Val.— Если теплое укрываніе части пораженной или теплая примарка усиливаютъ страданія: Acon., Borax, Bry., Calc, Ign., Lyc., Magn.-arct., Phosph., Puls., Spig., Sulph., Thuj., Veratr..

§ 8. Наружныя механическія вліянія: Если давленіе на наружную часть причиняетъ боль: 1) Agar., Anac., Bar., Bry., Cin., Her., Ksl., Lach., Lyc., Magn.-c., Merc., Plat., Sil; 2) Ant., Arg., Bell., Calc., Cann., Caps., Carb.-v., Guaj., Magn.-m., Mex., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Oleand., Phos.-ac., Ruta,

Ser., Val., Zinc.—Если *даление* отъ *пальца* невыносимо: 1) Bry., Calc., Carb.-v., Caust., Con., La h., Merc., N.-vom., Puls., Spong.; 2) Sars., Her., Nitr.-ac., Sassa., Ser., Stann., Sulph., Val.—Если одно *прикосновение* причиняетъ боль, или возбуждаетъ страданіе: 1) Ang., Bell., Bry., Sars., Cham., Chin., Cin., Cocc., Calc., Curt., Her., Huos., Lys., N.-vom., Puls., Ran., Sabin., Ser., Spig., Staph., Sulph., Tart.; 2) Acon., Anac., Arn., Camph., Cann., Carb.-v., Caust., Euphorb., Graph., Hell., Kreos., Lach., Magn.-с., Magn.-ш., Met., Natr.-ш., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus, Sil., Stram., Sulph., Veratr.—Если боль увеличивается отъ того, что *опираются* или *касаются* на что-нибудь страдающую часть: 1) Arn., Bell., Calc., Carb.-veg., Chin., Con., Her., Nitr.-ac., Puls., Rhab., Rhus, Ser., Sil., Sulph., Thuj., Veratr.—Если *ослабленіе* или *сжатіе* руками вызываетъ или усиливаетъ боль: Amm., Calc., Carb.-v., Caust., Cham., Chin., Led., Lys., Nitr., Natr.-ш., Nitr.-ac., Plat., Puls., Sil.

§ 9. Положенія тѣла: Если *напряженіе* шлѣа причиняетъ болезненные явленія: 1) Acon., Arn., Arg., Bell., Bry., Cocc., Igu., Natr.-ш., Natr., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Cham., Chin., Con., Lys., Op., Veratr.—Если боль является при *вставленіи* въ *лежачее* *положеніи*: Acon., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Cham., Cocc., Con., Dulc., Guaj., Her., Lach., Natr.-ш., Nitr.-ac., N.-vom., Oleand., Petr., Ser., Graph., Sil., Val., Veratr.—При *вставленіи* въ *сидячее* *положеніи*: Bell., Bry., Sars., Carb.-v., Caust., Chin., Con., Ferr., Lys., Mang., Natr.-ш., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus, Ruta, Sil., Staph., Sulph., Tart., Thuj., Veratr.—Если *сжатіемъ* страдающей части причиняетъ боль: Alum., Bry., Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Chin., Con., Her., Kal., Mang., Ruta, Ser., Sulph., Thuj.—Если *натяженіе* причиняетъ или усиливаетъ болезненные явленія: 1) Acon., Alum., Barut., Bell., Bry., Calc., Graph., Her., N.-vom., Petr., Puls., Ser., Spig., Thuj., Val.; 2) Amm., Amm.-ш., Arn., Cic., Cocc., Ipec., Kal., Lach., Lys., Merc., Natr.-ш., Phosph., Rhus, Sulph.—Если страданія усиливаются при *стоячемъ* *положеніи*: Agar., Amm.-ш., Ang., Bry., Sars., Caust., Cocc., Con., Mang., Petr., Phos.-ac., Plat., Puls., Sabad., Ser., Sil., Stann., Sulph., Val., Veratr.—Если состояніе больного ухудшается въ *сидячемъ* *положеніи*: 1) Agar., Amb., Arg., Asa., Barut., Sars., Cin., Ferr., Guaj., Lach., Magn.-с., Magn.-ш., Natr., Plat., Puls., Ruta, Ser.; 2) Acon., Alum., Anac., Sassa.,

Chin., Dulc., Euphorb., Graph., Lyc., Merc., Natr.-m., Op., Phos.-ac., Rhod., Rhus, Sulph., Sulph.-ac., Tart., Val., Veratr. — Если страданія появляются или усиливаются преимущественно въ *моком*: 1) Agar., Asa., Aur., Caps., Con., Dros., Dulc., Euphorb., Ferr., Lach., Phos.-ac., Puls., Rhod., Rhus, Samb., Sulph., Val.; 2) Amm., Amm.-m., Chin., Coloc., Kal., Kreos., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Mosch., Ruta, Sabad., Sil., Stann. — Если *лежаніе* неприятнѣе и болѣзненнѣе, нежели другія положенія: 1) Amb., Ars., Caps., Dros., Mosch., Natr.-m., Puls., Rhus, Samb., Ser., Verbas.; 2) Alum., Asa., Aur., Carb.-v., Chin., Con., Dulc., Euphorb., Ferr., Lyc., Mur.-ac., Natr., Rhod., Ruta, Sil., Val.; — *положеніе на спинѣ* причиняетъ больше боли, нежели другія позавія: Acon., Amm.-m., Ars., Caust., Cham., Chin., Coloc., Caps., Ign., Magn.-m., Merc., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sil. — Если *боковое положеніе* есть самое болѣзненное: Acon., Ars., Bry., Carb.-an., Cin., Ferr., Graph., Her., Ign., Kal., Lyc., Natr., Phosph., Puls., Rhus, Sabad., Sil., Stann., Sulph.; — *лежаніе на правомъ боку* причиняетъ боль: Amm.-m., Aur., Borax., Caust., Kal., Magn.-m., Merc., N.-vom., Puls., Spong., Stann.; — *лежаніе на лѣвомъ боку* причиняетъ боль: Acon., Amm., Colch., Kal., Lyc., Natr., Natr.-m., Phosph., Puls., Ser., Sil., Sulph., Thuj. — Если лежа на *здоровомъ боку*, больной ощущаетъ больше боли, нежели тогда, когда онъ лежитъ на страдающемъ: Amb., Arn., Bry., Calc., Caust., Cham., Coloc., Ign., Kal., Magn.-aust., Puls., Rhus, Ser., Stann. — Всякая *перемѣна положенія* причиняетъ страданія или боль: Caps., Carb.-v., Caust., Con., Lach., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Ran.

§ 10. Движеніе: *движеніе вообще* вредно: 1) Arn., Bell., Bry., Calc., Dig., Graph., Hell., Ipec., Led., Magn.-aust., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Ran., Spig., Squill., Staph.; — боли появляются или усиливаются при *движеніи страдающей части*: Arn., Bell., Bry., Caps., Cham., Chin., Coss., Ferr., Guaj., Led., Merc., Mez., N.-vom., Puls., Rhus, Spig., Staph., Thuj.; — при *подниманіи* страдающей части: Arn., Bell., Bry., Chin., Con., Ferr., Graph., Kal., Led., Natr., Puls., Rhus, Sil.; — при *поворачиваніи и сгибаніи* части: Amm.-m., Arn., Bell., Bry., Calc., Chin., Her., Ign., Kal., Lyc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Ser., Sil., Spig., Spong., Stann.; — при *падѣ, качаніи и друтихъ пассивныхъ движеніяхъ*:

1) Ars., Cocc., Petr., Sulph.; 2) Colch., Ferr., N.-mosch., Sep., Sil.; 3) Borax, Carb.-veg., Colch., Graph., Herp., Ign., Kal., Natr., Natr.-m., Phosph., Plat., Selen., Staph.;—при *хождении*: Arn., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Chin., Colch., Con., Dig., Graph., Hell., Herp., Led., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Sassar., Sep., Squill., Staph., Sulph.-ac., Veratr.;—При *блужданіи* или скорой *ходьбѣ*: Arn., Ars., Aur., Bry., Calc., Caust., Ign., Kal., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Seneg., Sep., Sil., Sulph.; — *верховой язвѣ*: Ars., Natr.-m., Sep., Sulph.-ac.; — *восхожденіи* на высоту: Acon., Alum., Ars., Aur., Baryt., Bry., Calc., Cann., Merc., N.-vom., Petr., Rhus, Sep., Spig., Spong., Stann., Sulph., Thuj..

§ 11. ПОТРАСАЮЩІЯ ДВИЖЕНІЯ. Если *сотрясеніе вообще* причиняет или усиливает боли и болѣзненные явления: Arn., Bry., Cic., Con., Herp., Ign., N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Ruta, Sulph.-ac. — Если болѣзненные явления обнаруживаются, когда кто-нибудь *наступитъ* больному на ногу: Ant., Arn., Bell., Bry., Calc., Caust., Chin., Con., Graph., Magn.-m., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rap., Rhus, Sep., Sil., Spig., Sulph. — Если *оступъ* или неловкій шагъ причиняет боль: Arn., Bry., Cic., Con., Puls., Rhus, Spig. — Если *напряженіе тѣла* причиняет или усиливает страданія: Acon., Arn., Ars., Bry., Calc., Chin., Cocc., Coff., Lyc., Merc., Natr., Rhus, Ruta, Sil., Sulph., Veratr. — Если *работа руками* причиняет вредъ: Amm.-m., Merc., Natr.-m., Sil., Veratr. — Если страданія появляются *при смѣхѣ*: Ars., Bell., Borax, Carb.-veg., Chin., Dros., Kal., Lach., Mang., Phosph., Stann.; — *приступы кашля* причиняют боль или страданія: Acon., Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Dros., Herp., Ipec., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sulph., Veratr.; — *чиханіе* причиняет боль: Acon., Amm.-m., Arn., Ars., Bell., Borax, Bry., Carb.-veg., Chin., Cin., Lyc., Merc., Mez., Mosch., N.-vom., Puls., Rhus, Sabad., Sep., Sil., Spig.;—при *сморканіи* ощущаются боли въ другихъ мѣстахъ: Arn., Bry., Calc., Caust., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sep., Spig., Sulph.; — *тѣніе* причиняет или вызываетъ страданія: Amm., Dros., Herp., Sulph.; — *разговоръ* причиняетъ страданія: 1) Анас., Arn., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Cocc., Ign., Natr., Natr.-m., Phosph., Rhus, Sil., Stann., Sulph.; 2) Acon., Alum., Amb., Amm.,

Aug., Cann., Chin., Dulc., Ferr., Kal., Magn.-m., Phos.-ac., Plat., Puls., Rhus, Selen., Sil., Veratr..

§ 12. Впечатлѣнія на душу и чувства: Если *душевные потрясенія* причиняють вредъ: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Cham., Coloc., Ign., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Staph.; 2) Arg., Aug., Caust., Cocc., Coff., Hyos., Nitr.-ac., N.-mosch., Op., Plat., Rhus, Ser., Stram., Sulph., Veratr.. — Если состояніе больного ухудшается въ *удивленіи*: Arg., Con., Droa., Mez., Phosph., Sil., Stram., Zinc.. — Если хуже чувствуетъ себя, когда находится между людьми или въ обществѣ: 1) Baryt., Hyos., Lyc., Natr., Puls., Rhus; 2) Amb., Carb.-an., Carb.-veg., Con., Magn.-c., Natr., Petr., Phosph., Plumb., Ser., Stann., Stram., Sulph.. — Если *напряженіе ума* причиняетъ страданія: 1) Bell., Calc., Ign., Lach., Natr.-m., N.-vom., Puls., Ser., Sulph.; 2) Amb., Anac., Arn., Arg., Aug., Borax, Cocc., Lyc., Natr., Oleand., Sabad., Selen., Sil., Staph.. — Если страданія являются во время *чтенія*: 1) Agn., Aug., Calc., Cin., Con., Graph., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sil.; 2) Aza., Bell., Borax, Bry., Carb.-veg., Caust., Chin., Coff., Dulc., Ign., Kal., Natr., Oleand., Rhod., Ruta, Sabad., Sulph.. — Если они *вызываются* или *усиливаются*, когда больной *пишетъ*: 1) Aza., Aug., Calc., Cin., Ign., Kal., Natr.-m., Ser., Sil., Zinc.; 2) Borax, Bry., Cann., Carb.-veg., Chin., Cocc., Graph., Herp., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Oleand., Ran., Rhod., Rhus, Ruta, Sabin., Spong., Sulph.-ac.. — Если *яркій свѣтъ* возбуждаетъ страданія: 1) Acon., Bell., Calc., Colch., Con., Graph., Hyos., Lyc., Merc., Phosph., Stram.; 2) Arn., Arg., Bry., Cham., Chin., Coff., Euphr., Hell., Herp., Ign., Natr., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Rhus, Ser., Sil., Spig., Sulph.. — Если *шумъ, тревога* и т. д. *усиливаютъ* страданія: 1) Acon., Arg., Bell., Calc., Cham., Coff., Con., Lyc., Natr., N.-vom., Plat., Ser., Spig.; 2) Ang., Aug., Bry., Carb., Chin., Colch., Ign., Mang., Petr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Zinc.; — *острые запахи* вызываютъ или *усиливаютъ* страданія: 1) Acon., Aug., Bell., Cham., Chin., Coff., Colch., Graph., Lyc., N.-vom., Phosph.; 2) Baryt., Con., Herp., Ign., Kal., Phos.-ac., Selen., Ser., Sil..

См. Слабость мозга, Воспаленіе уха, Слуха раздражительность, Белыя пятна, зубовъ, Лихорадка, Причуда.

Ожирѣніе, тучность, Polysarcia.

Противъ чрезмѣрной тучности и ожирѣнія у молодыхъ людей и дѣвицъ, опытъ и аналогія симптомовъ указываютъ: 1) Ant., Calc., Capr., Ferr., Puls., Sulph.; 2) Arg., Baryt., Cupr., Lyc., Vegetr.

Ожоги, Combustiones, см. Поврежденія механическія.

Ознобленія, Congelationes.

Средства, до-сихъ-поръ употребленія съ успѣхомъ: Agar., Bell., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Arg., Carb.-an., Carb.-veg., Cham., Chin., Hyos., Lyc., Magn.-aust., Phos.-ac., Rhus, Sulph.-ac. — Противъ *воспаленія* вслѣдствіе ознобленія: Arg., Cham., Lyc., Nitr.-ac., Puls., Sulph. — Противъ опухолей *сине-краснаго цвѣта*: Arg., Bell., Kal., Puls. — Противъ очень *большіихъ опухолей* вслѣдствіе ознобленія: 1) Ner.; 2) Arg., Nitr.-ac., Petr., Phos.-ac., Puls., Ser.

Олово, отравленіе имъ и вредныя послѣдствія отъ употребленія.

Противъ отравленія большими приемами олова служатъ преимущественно: 1) бѣлокъ; 2) сахаръ; 3) молоко. — Противъ послѣдовательныхъ недуговъ, или противъ хроническаго отравленія, преимущественно: 1) Puls.; 2) Carb.-veg., Ner., Ign.

Омертвѣніе, антоновъ огонь, гангрена, Gangraena.

§ 1. Средства, дознанныя опытами и наблюденіями: 1) Arg., Chin., Lach., Sil.; 2) Asa., Bell., Euphr., Hell., Plumb., Sabin., Sec., Squil.; 3) Acon., Con., Merc., Ran., Sulph.-ac., Sulph., Tart.

§ 2. *Мокрому омертвѣнію*, какъ кажется, соответствуютъ преимущественно: Chin., Hell., Squil. — *Горячему*: 1) Sabin., Sec.; 2) Arg., Bell., Mur.-ac. — *Холодному*: 1) Arg., Asa., Chin., Squil., Sec.; 2) Bell., Con., Euphr., Lach., Merc., Plumb., Ran., Sil., Sulph.-ac., Tart.

§ 3. Противъ Антонова огня у стариковъ (Gangraena senilis): 1) Sec.; 2) Chin., Con., Plumb.

§ 4. Главныя средства отъ такъ называемой *замрзлой или черной осы*: 1) Arg., Carb.-v.; 2) Bell., Hyos., Lach., Rhus, Sec.

Sil.; 3) Ant., Mur.-ac., Ser. — Противъ такъ называемыхъ *амреозныхъ пузырей*: 1) Ars., Bell., Camph., Lach., Ran., Sabin., Sec.; 2) Acon., Carb.-v., Mur.-ac., Phos. — Противъ *амреозныхъ чирьевъ и прыщей* (Carbunculi): 1) Ars., Bell., Sil.; 2) Caps., Hyos., Rhus, Sec., Tart. (Сравни. *Злокачественный чирей*).

Опій и маковый сокъ, вредныя отъ него послѣдствія.

Противъ полного отравленія большими приемами: 1) черный кофе; 2) уксусъ. Если больной пришелъ въ себя, то очень хорошо дѣйствуетъ Ирес. — Противъ послѣдствій, оставшихся послѣ употребленія Op., рекомендуютъ Merc., N.-vom. и Bell. Послѣднія средства считаются также полезными, какъ *врачебное средство*.

Опрѣлость кожи, Intertrigo.

Лучшія средства: 1) Cham., Chin., Graph., Ign., Lyc., Puls., Ser., Sulph.; 2) Acon., Arn., Bell., Calc., Carb.-veg., Caust., Herp., Mang., Merc., Oleand., Petr., Phosph., Phos.-ac., Ruta, Sulph.-ac. — Опрѣлость у *взрослыхъ*, встрѣчающаяся *мѣтлою*, часто излечивается посредствомъ: Arn., Carb.-veg., N.-vom., Lyc., Sulph. — *Пролежни* у больныхъ, страдающихъ тяжелою болѣзнію, требуютъ: Arn., Carb.-veg., Chin., Plumb., Sulph. ac. — При опрѣлости *рудныхъ сосковъ*: 1) Arn., Sulph.; 2) Calc., Caust., Cham., Graph., Lyc., N.-vom., Ser. — При опрѣлости *у дѣтей*: 1) Acon., Cham., Lyc., Sulph.; 2) Chin., Graph., Ign., Merc., Puls., Ruta, Ser. — Если больной неумѣренно употреблялъ *ромашку*: Ign., Puls.

Опухоли, Tumores.

§ 1. Средства противъ различныхъ припухлостей: 1) Ars., Bell., Bry., Cham., Herp., Merc., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Ant., Arn., Carb.-veg., Caust., Chin., Dulc., Kal., Lach., Led., Nitr.-ac., N.-vom., Rhod., Rhus, Sabin., Samb., Ser., Sil.

§ 2. Въ отношеніи къ различнымъ видамъ опухолей, надо замѣтить, что при *воспалительной* или *флегмонозной* опухоли заслуживаютъ вниманія: Ars., Bell., Bry., Cham., Herp., Phosph., Puls.

Если удастся заблаговременно назначить то или другое изъ этихъ средствъ, то, при соответствіи его симптомамъ (см. ниже), можно въ большей части случаевъ предупредить нагноеніе и произвести разрѣшеніе.—*Агъ.* приличенъ при *ожоженіи* въ опухоли;—*Вгу.*, когда опухоль представляется *юрлячою*, *напряженною*, *красною* или *блѣдною*; *Bell.*, — если *краснота* опухоли далеко распространяется на сосѣднія части; *Нер.* — если въ опухоли ощущается *боль* при ощупываніи ея; *Puls.* — когда опухоль *обведена краснымъ кружкомъ*.—При *отвердѣвшихъ* опухоляхъ, главныя средства: *Baryt.*, *Carb.-an.*, *Carb.-veg.*, *Соп.*, *Jod.* и *Kal.*, или также *Вгу.*, *Стам.* и *Sulph.*. Эти средства производятъ разрѣшеніе безъ нагноенія; но если гной уже началъ образоваться и разрѣшеніе уже невозможно, то *Нер.* и *Lach.* скорѣе всего способствуютъ скорѣйшему *высрѣженію нарыва*. — Если *высрѣжившаяся опухоль* долго гноится, то приличнѣйшія средства: *Calc.*, *Нер.*, *Мерс.*, *Phosph.*, *Sil.* — *Phosph.* и *Sil.* назначаются тамъ, гдѣ вслѣдствіе продолжительнаго нагноенія развивается извурительная лихорадка (см. *Нагноеніе и Язвы*).

§ 3. Лучшія средства противъ *лимфатическихъ опухолей* и *нарывовъ*: *Aca.*, *Bell.*, *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Dulc.*, *Нер.*, *Lach.*, *Мерс.*, *Phosph.*, *Ser.*, *Sil.* и *Sulph.*.—Если такія опухоли будутъ *воспалительнаго свойства*, то предпочитаютъ: 1) *Мерс.*; 2) *Bell.*, *Carb.-veg.*, *Нер.*, *Lach.*, *Ser.*, *Sil.* и *Phosph.*.—Если же онѣ *холодны*, не воспалены, то болѣе приличны: *Aca.*, *Bell.*, *Calc.*, *Coccul.*, *Dulc.*, *Мерс.*, *Sulph.*.

§ 4. Противъ такъ называемыхъ *кистообразныхъ* или *мышеччатыхъ опухолей*, главныя средства: 1) *Calc.*; 2) *Graph.*, *Нер.*, *Sil.*; 3) *Baryt.*, *Caust.*, *Nitr.-ac.*, *Sulph.*. — Противъ *жировыхъ опухолей* (*Steatoma*), *Ваг.* имѣетъ мѣсто преимущественно передъ всѣми прочими. — Противъ *желваковъ* (*Ganglia*), часто образующихся на *сухожиліяхъ*: 1) *Arn.*, *Rhus*; 2) *Amm.*, *Phosph.*, *Phos.-ac.*, *Sil.*, *Zinc.*.

§ 5. Такъ называемая *бѣлая опухоль* бедра или колѣна (*Phlegmasia alba dolens*) лечатся посредствомъ: 1) *Вгу.*, *Лус.*; 2) *Ant.*, *Агъ.*, *Puls.*, *Rhus*, *Sabin.*, *Sulph.*; 3) *Bell.*, *Calc.*, *Chin.*, *Jod.*, *Мерс.*, *Rhus*, *Ser.*, *Sil.* — Противъ *отечныхъ* и *идролическихъ* припухлостей: 1) *Ant.*, *Агъ.*, *Вгу.*, *Chin.*, *Hell.*, *Лус.*, *Мерс.*, *Puls.*, *Sulph.*; 2) *Ant.*,

Baryt., Bell., Dig., Dulc., Ferr., Kal., Led., Phosph., Rhod., Rhus, Sabin., Samb., Stram.—Противъ *артритической* опухоли: 1) Acon., Ant., Arn., Chin., Colch., Merc., Sulph.; 2) Coccul., Her., Kreos., N.-vom., Rhus. — Противъ *ревматической*: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Cham., Chin., Colch., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Coccul., Her., Kreos., Lach., Rhus. — Противъ такъ называемыхъ *артритическихъ узловъ* (отложеній въ сочлененіяхъ): 1) Agn., Ant., Calc., Carb.-an., Caust., Graph., Lys., Merc., Puls., Rhus, Sabin., Staph., Sulph.; 2) Acon., Arn., Aur., Clem., Cic., Dig., Her., Led., Nitr.-ac.

§ 6. Кроме того, въ особенныхъ случаяхъ, достойны вниманія:

При опухоли *блѣдную цѣтца*: Baryt., Bry., Lys., Rhus; 2) Arn., Calc., Led., Merc., Puls., Ser.;—*синекрасною*: 1) Arn., Bell., Cham., Lach.; 2) Ars., Canth., Con., Kal., Sil.; — съ *красными пятнами*: Chin., Lys., Ser.; — *рожевидной*: 1) Bell., Puls., Rhus; 2) Acon., Amm., Arn., Ars., Her., Phosph., Ser.;—*темносиней*: 1) Ars., Lach., Puls.; 2) Acon., Arn., Bell., Dig., Merc., Op., Veratr..

§ 7. При *чирьяхъ*, *красныхъ* опухоляхъ: 1) Arn., Ars., Bell., Borax, Bry., Chin., Coccul., Her., Lach., Lys., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Ser., Sil., Sulph.; 2) Acon., Ant., Asa., Aur., Cann., Colch., Led., Mang., Natr.-m., Nitr.-ac.; — при *молящихся* 1) Calc., Her., Merc., Phosph., Sil.; 2) Baryt., Lach., Lys., Mang., Sulph.; — *твердыя, напряженныя*: Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-an., Cham., Graph., Lys., Phosph., Puls., Rhus, Sil., Sulph.;— *блестящія*: Arn., Ars., Bry., Merc., Sulph.; — *холодныя*: 1) Ars., Calc., Bell., Coccul., Dulc., Merc., Sulph.; 2) Asa., Con., Lach., Puls., Rhod., Spig..

§ 8. При опухолихъ, въ конхъ ощущается *жучая боль*: 1) Ars., Bry., Lys., Phosph., Sulph.; 2) Acon., Arn., Bell., Caust., Lach., Merc., Puls., Rhus, Ser., Sil.;—*свербѣніе*: Arn., Colch., Merc., Puls., Rhus, Ser., Sulph.; — *колючая боль*: Acon., Bry., Caust., Nitr.-ac., Puls., Ser., Sulph..

Сравни *Нарывы*, *Бользни железа*, *Нагноеніе*, *Язвы*, *Ломота*, *Рожь*, *Ревматизмъ*, *Мышеччатая опухоль* и статьи, въ которыхъ изложены *опухоль мѣстныя*, какъ напр. опухоли *щекъ*, *кожма* и т. д..

Опухоль губъ.

Золотушная опухоль на губахъ требуетъ преимущественно: Aug., Bell., Bry., Her., Lach., Merc., Sil., Sulph., Staph.—Если въ то же время замѣчается и заворотъ губъ, то Bell., Merc.—Противъ корожа и изъязвленія на губахъ: 1) Bell., Her., Merc., Ser., Sil., Staph.; 2) Arg., Aug., Cic., Clem., Graph., Natr.-m., Nitr.-ac.—При скirrosномъ затвердѣннн и раковидныхъ язвахъ: 1) Bell., Sil., Sulph.; 2) Arg., Clem., Cop..

Сравни. Сынн.

Опухоль щекъ, флюсъ.

Лучшія средства противъ опухоли щекъ вслѣдствіе зубной боли: 1) Arg., Cham., Merc., Magn.-acet., N.-vom, Puls., Ser., Staph.; 2) Arg., Aug., Bell., Bry., Carb.-v., Caust., Sulph.—Если опухоль красна и горяча: Arg., Bell., Bry., Cham., Merc.—При твердости опухоли: Arg., Bell., Cham.; — блѣдности: Bry., N.-vom., Ser.;—рожевидной опухоли: 1) Cham., Ser.; 2) Bell., Graph., Her., Lach., Rhus. Sulph.—Сравни. Розжа.

Если при появленіи опухоли были употреблены средства отъ зубной боли и между ними были Merc. или Cham., то послѣ нихъ приличнѣе всего Puls., или Merc., если прежде прописаны были Puls. или Bell., или же Bell. послѣ Merc., или Sulph. послѣ Bell., Bry..

Сравни. Боль зубная.

Оспа, Variolae.

§ 1. Главныя средства: 1) Arg., Merc., Rhus; 2) Acon., Bell., Bry., Camph., Chin., Sulph., Tart..

§ 2. Въ періодъ, предшествующемъ высыпанію оспы: Acon., Coff., Bry., Rhus, для уменьшенія лихорадки и ускоренія высыпанія. При переносъ оспы на мозгъ: Bell., а если по скрытіи оспы обнаружатся гастрическія страданія: Arg., Ipec.—Для ускоренія высыпанія: Sulph., или Merc.. Если же высыпаніе очень сильно, то даютъ приѣмъ Bell.; а если замѣчается очень сильная лихорадка во время высыпанія, — Acon. или Bell., или также Cham., какъ скоро къ этимъ явленіямъ присоединяется кашль. Если гной

сухровицный и можно опасаться мокраго омертвѣнія, то предпочитаютъ Arg. и Carb.-v. — Противъ *слюмотеченія*, часто появляющагося при оспѣ: Merc. — Противъ катарра, *кашля и охриплости*: Arg. или Merc., а противъ *поноса* Chin..

§ 3. Періоду *лихорадки* соотвѣтствуютъ: 1) Acon., Bell.; 2) Op., Arg.; — *высыпанія*: 1) Merc.; 2) Ant.-cr., Stram., Bell.; — *созрѣванія*: Merc.; — *высыханія*: 1) Acon., Bell., Cham., Puls.; 2) Bry., Nux.-v. — *Черной, заниренозной оспѣ*: 1) Arg., Carb.-v.; 2) Bell., Huov., Lach., Rhus, Sec., Sil..

§ 4. По припадкамъ назначаются:

АСОНИТУМ. — при воспаленіи горла и переносѣ сыпи на лицо или горло, подѣ конецъ періода высыпанія, а также при черной оспѣ.

ВЕЛЛАДОННА — послѣ употребленія Acon., при жестокой лихорадкѣ, напорѣ крови къ головѣ, невстывомъ бредѣ; воспаленіи глазъ; свѣтобоязни; воспаленіи мозга или частей, его окружающихъ.

ВЪУОНИА — до высыпанія, при тошнотѣ, рвотѣ и т. д., или послѣ этого періода, если развивается брюшная водянка.

СНИНА — при чернѣхъ осипахъ, поносѣ, тоскливости во время высыпанія.

СОФФА — при безпокойствѣ и желчной рвотѣ вначалѣ высыпанія.

МЕРКУРИУС — при *слюмотеченіи*, напорѣ крови къ головѣ, раздраженномъ состояніи слизистой оболочки глазъ, носа и рта въ періодѣ *созрѣванія*; при поносѣ подѣ конецъ высыпанія.

Оспа ложная, Varicellae.

§ 1. Средства противъ различныхъ ея видовъ вообще: 1) Acon., Ant., Bell., Puls., Rhus, Tart.; 2) Arg., Canth., Carb.-veg., Con., Ipec., Merc., Sep., Sil., Thuj.; 3) Asa., Caust., Led., Natr., Natr.-m., Sec., Sol.-m..

§ 2. Въ отношеніи частныхъ видовъ: при *водной* или *отрыльной оспѣ* (Varicellae emphysematicae) приличны: 1) Acon., Ant., Bell., Puls., Tart.; 2) Canth., Con., Merc., Sec., Sil., Thuj. — При такъ называемой *осипной* или *осѣной* оспѣ: Acon., Bell., Led., Puls.,

Rhus.—При бородавчатой: 1) Acon., Ant., Puls., Rhus, Tart.; 2) Arg., Carb.-veg., Ipec., Ser., Thuj..

§ 3. Въ периодъ воспаления, какую бы форму смъ не принимала, большею частію найдутся приличными: Acon., или Bell., если замѣчается сильное раздраженіе мозга.—Противъ запора или нутми мочи, сопровождающихъ ложную оспу, назначаются: Canth., Con., Merc.. — При опухахъ шейныхъ и заткочныхъ железъ: Bell., Carb.-veg., Merc..—При болшихъ мозговыхъ пузырькахъ съ сильными нагноеніемъ: Arg., Merc., Puls., Rhus, Thuj.. — При медленномъ развитіи смъ, сопровождаемой истрическими или эсечными страданіями: 1) Ant., Puls., Tart.; 2) Ipec., Rhus, Sulph..

См. Оспа и Накожная сыпь.

Отвердѣнія, Indurationes.

§ 1. Главныя средства: 1) Bell., Carb.-an., Carb.-veg., Con., Lach., Rhus, Ser., Sil., Spong., Sulph.; 2) Agn., Alum., Baryt., Bor., Bry., Cann., Cham., Clem., Dulc., Jod., Kal., Magn.-m., Phosph., Plumb., Rap., Staph..

§ 2. Изъ нихъ въ особенности противъ воспалительныхъ затвердѣній (послѣ воспаления): 1) Bell., Carb.-veg., Chin., Clem., Bry., Lach., Magn.-m., Rhus, Ser., Sulph.; 2) Agn., Arn., Baryt., Bor., Calc., Cham., Con., Dulc., Graph., Jod., Lys., Puls., Ser., Sil., Staph.. — Противъ скirrosныхъ затвердѣній: Bell., Carb.-an., Carb.-veg., Cham., Clem., Con., Magn.-m., N.-vom., Phosph., Ser., Sil., Staph., Sulph..

Сравни. Железъ болтани и Ракъ.

Отекъ ногъ, Oedema pedum.

Если этотъ недугъ не сопровождается другими органическими страданіями, то назначаются: Arg., Chin., Ferr., Kal., Lys., Merc., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.. — Если онъ обнаруживается послѣ потери крови: Chin., Arg., Ferr.; — послѣ злоупотребленія хмемъ: Arg., Ferr., Puls., Sulph..

Отравленія, Toxicationes.

§ 1. Гомеопатъ не долженъ при отравленіяхъ призывать на помощь кровозвлеченіе, или сильныя рвотныя средства. Прежде

всего, конечно, нужно удалить причину средствами, самыми простыми и безвредными, то есть какъ возможно скорѣе вывести ядъ изъ организма, или сдѣлать его безвреднымъ, нейтрализуя химически. Слѣдующіе способы предложены отчасти Ганеманомъ, отчасти Герингомъ.

1) Возбудить *рвоту* или *испражненіе* низою самыми простыми средствами, какъ-то: питьемъ *теплой воды*, щекотаніемъ въ глоткѣ перомъ или другимъ чѣмъ-либо; поспынаніемъ *языка салю, табакомъ, орочицей*, или наконецъ *клястирами изъ табаку*, если ни одно изъ предъидущихъ средствъ не подѣйствовало.

2) Для нейтрализованія яда употребляютъ: бѣлокъ, уксусъ и лимонную кислоту, камфору, молоко, масло, мыло, слизистое питье, чай, вино, сахаръ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ также: аммиачный газъ, окись желѣза, древесный уголь, поваренную соль, глауберову соль, масло сладкихъ миндалей, поташъ, варенный крахмалъ и пр..

§ 2. Изъ этихъ противоядій, въ отдѣльныхъ случаяхъ, предпочитаютъ:

Бѣлокъ, растворенный въ достаточномъ количествѣ воды и даваемый въ видѣ питья, противъ *металлическихъ веществъ*, именно: *ртути, сулемы, яри медянки, алова, селенца и сурьмой кислоты*, и въ особенности, когда больной ощущаетъ жестокия боли въ желудкѣ и животѣ, гнеущій поносъ на низъ, съ поносомъ и болямъ въ заднемъ проходѣ.

Боее чернилъ, крѣпкій, сваренный изъ зеренъ немного поджаренныхъ, дается въ видѣ питья, настолько горячаго, сколько больной можетъ переносить. Это одно изъ необходимѣйшихъ средствъ противъ большинства ядовъ, и въ особенности, когда замѣчаются: *сонливость, ослѣпленіе, потеря самосознанія или помрачительство ума, бредъ*, однимъ словомъ, при отравленіи наркотическими веществами, какъ-то: *опіемъ, чемибузою, дурманомъ, наркотическими грибами, горькими миндалями, синильною кислотю, красавкою, колокоинтамъ, валеріанною, бамболовомъ, сурьмою, фосфоромъ и фосфорною кислотю*.

Камфора — при всѣхъ отравленіяхъ растительными веществами, особенно ѣдкими, и когда замѣчаются: рвота и поносъ, блѣдность лица, холодъ конечностей, потеря самосознанія. Кам-

фора почти своеобразно дѣйствуетъ противъ страданій, произведенныхъ отравленіемъ масякомыми, напр. *шианскими мушками*, принятыми внутрь или употребленными снаружи, и противъ припадковъ, причиненныхъ такъ называемыми *противоискусными средствами*, *табакомъ*, *юрькими миндалями* и другими плодами, содержащими синильную кислоту. Она также оказывается полезною при вторичныхъ страданіяхъ послѣ отравленія *кислотами*, *солями*, *металлами*, *фосфоромъ*, *ядовитыми грибами* и т. д., если только они были выведены изъ организма произведенною рвотою или испраженіемъ низомъ (см. *Рвота*).

Масло деревянное, оливковое—назначается во всѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣютъ мѣсто молоко и жирныя вещества, однакожъ прилично въ меньшемъ числѣ случаевъ, нежели какъ обыкновенно думаютъ. При отравленіи *металлическими* веществами, оно мало приноситъ пользы, а при отравленіи *мылькомъ* оно даже вредно. При отравленіи *шианскими мушками* это самое вредное вещество; также при отравленіи другими *масякомыми*, или если ихъ ядъ попалъ въ глазъ. Оно употребляется только для излеченія *ожога масякомыми*, попавшихъ въ ухо. Назначается также при отравленіи *осирями*, *подкми кислотами*, напр. *селитряною* и *сѣрною*. Часто можно его употреблять при отравленіи *щелочами* и *грибами*.

Молоко прилично въ меньшемъ числѣ случаевъ, нежели какъ обыкновенно полагаютъ; для обволакиванія же яда предпочитаютъ слизистыя вещества. Простокваша назначается или запрещается тамъ, гдѣ пригоденъ или непригоденъ укусъ.

Мыло обыкновенное бѣлое, растворенное въ 4-хъ частяхъ воды, составляетъ превосходное средство при многихъ отравленіяхъ. Его надо принимать всякія 2, 3, 4 минуты вездѣ, гдѣ было показаніе для бѣлка, который оказался неудовлетворительнымъ. Въ особенности прилично мыльная вода при отравленіи *металлическими* веществами, а именно *мылькомъ*, *сѣмцомъ* и т. д.. Она полезна также при отравленіи *острыми кислотами*, какъ напр. *сѣрною*, *селитряною*, *квасцами*, *подкми растительными веществами*, *клещевиннымъ масломъ* и т. д.. Вредно дѣйствуетъ мыло при отравленіи *щелочами*, напр. *щелочомъ*, *подкми кали*, *поташемъ*,

содоро, вимоканьнохислымъ камъ, нашатырнымъ спиртомъ, улекислымъ амміакомъ, ѣдкою или каменною известью, баритомъ и пр.

Сахаръ, или сахарная вода, лучшее средство во многихъ случаяхъ. Но при отравленіи минеральными кислотами лучше съ самаго начала употребить дѣйствительныя противоядія, хотя здѣсь сахарная вода вреда не сдѣлаетъ. Она предпочитается всѣмъ другимъ средствамъ при отравленіи *металлическими веществами, различными видами красокъ, ярью мыльною, мѣдью, мѣднымъ купоросомъ*, а послѣ того, какъ больной почувствуетъ себя легче, ее можно замѣнить бѣлкомъ или мыльною водою. Сахаръ составляетъ одно изъ лучшихъ средствъ при отравленіи мышьякомъ и ѣдкими растительными веществами.

Слизистыя вещества — слизистое питье, клистиры изъ нихъ, приличны преимущественно при отравленіи щелочами и употребляются попеременно съ уксусомъ.

§ 3. Изъ прочихъ вышеприведенныхъ противоядій, назначаются:

Амміакальній газъ — противъ *спирта, горькихъ миндалей и синильной кислоты*. — Вино — противъ *среднихъ газовъ и ядовитыхъ грибовъ*. — Глауберова соль — противъ *щелочныхъ ядовъ*. — Древесный уголь — противъ *иной рыбы, много мяса, ядовитыхъ грибовъ и раковины*. — Крахмалъ — противъ отравленія *йодистыми препаратами*. — Магnezія — противъ *кислотъ*. — Миндальное масло (сладкихъ минд.) противъ *кислотъ*. — Поваренная соль — противъ *адскаго камня и при рагахъ отравленныхъ*. — Поташъ — противъ *кислотъ*. — Ржавчина жѣлѣза — противъ *мышьяка*. — Азотъ — противъ *щелочныхъ и животныхъ ядовъ*. — Чай — противъ *жировой кислоты и ядовитого меду*.

§ 4. Относительно возбужденія рвоты, нужно замѣтить:

Если неизвѣстно, какимъ ядомъ больной отравленъ, то назначается преимущественно бѣлокъ, когда замѣчаются очень жестокія боли, или же кофе при *адурънім*. Если мы знаемъ, что ядъ вообще принадлежалъ къ *металламъ, или кислотамъ, или щелочнымъ веществамъ, къ животнымъ или растительнымъ ядамъ*, но не знаемъ, какое именно ядовитое вещество введено въ органы, то руководствуемся слѣдующими правилами:

а) Если извѣстно, что ядъ принадлежитъ къ *металлическимъ веществамъ*, то даемъ сначала бѣлокъ, сахарную, мыльную воду; §

противъ послѣдовательныхъ страданій—*Sulph.*, которая, по Ожюу, составляетъ вѣрное противоядіе металламъ.

b) При отравленіи *кислотою* или неизвѣстнымъ ядомъ *веществомъ*: 1) мыльная вода; 2) магнезія, растворенная въ водѣ; 3) мѣловая вода; 4) щелокъ или поташъ, растворенный въ водѣ и даваемый по столовой ложкѣ до-тѣхъ-порѣ, пока не произойдетъ рвоты. Потомъ слизистыя вещества и попеременно *Coff.* или *Op.*, какъ гомеопатическія средства. Противъ оставшихся страданій отъ *серной кислоты* — *Puls.*; отъ *соляной* — *Vru.*; отъ *азотной* — *Per.*; отъ *фосфорной* — *Coff.*; отъ *другихъ кислотъ* — *Acop.* Если мѣста на кожѣ обожжены ядовитыми веществами, то хорошо помогаетъ или мыльная вода, или водный растворъ *Caust.*, употребляемый въ видѣ примочки, а если ядкое вещество попало въ глазъ, то лучше всего свѣжее масло сладкихъ миндалей или свѣжее, несоленое масло коровье, впускаемое въ глазъ.

c) Противъ *щелочныхъ веществъ*: 1) уксусъ, смѣшанный съ водою и даваемый въ обильномъ количествѣ, въ видѣ питья; 2) сокъ лимонный или другихъ растительныхъ кислотъ, разжиженный въ достаточномъ количествѣ воды; 3) кислое молоко; 4) слизистое питье или клистиръ. Уксусъ вреденъ при отравленіи баритомъ; спасительно здѣсь дѣйствуетъ растворъ Глауберовой соли въ водѣ, а потомъ *Sulph.*, или *Nitr.-spig.* При отравленіи *поташомъ*, противъ послѣдовательныхъ недуговъ, приличны преимущественно: *Coff.* или *Caib.-v.*, а при отравленіи *амміакомъ*—*Per.*

d) Противъ отравленія дыханіемъ вредныхъ газовъ—спрыскиваніе большого разведеннымъ водою уксусомъ или введеніе паровъ хлорнаго раствора въ дыхательные пути; послѣ, когда больной пришелъ въ себя, дается черный кофе или нѣсколько приемовъ *Op.* или *Bell.* (См. *Газы вредныя*).

e) Противъ *растительныхъ ядовъ*: 1) камфора, какъ пахучее средство, или нѣсколько капель камфорнаго спирта на сахарѣ внутрь; 2) черный кофе или винный уксусъ преимущественно противъ растительныхъ наркотическихъ ядовъ; противъ острыхъ, ядовитыхъ *растительныхъ ядовъ* рекомендуютъ мыльную воду и молоко.

f) Противъ *животныхъ ядовъ*, см. *испанскія мушки*, *жировой ядъ*, *укушенія насекомыми*, *рыбий ядъ*. Кроме того, противъ *жабьего яда* и подобныхъ ему, введенныхъ въ желудокъ: *древесный уголь*

съ порошкѣ, смѣшанной съ масломъ или молокомъ, нюханіе подслащенного азотнаго газа при неблагопріятныхъ припадкахъ и затѣмъ Агв.. Если таковаго рода ядъ былъ вприснута въ глаза: Асоп..

§ 5. Относительно леченія отравленныхъ ранъ или укушеній бѣшенными животными, нужно воспользоваться важными въ практикѣ опытами Геринга. Противъ укушеній змѣями, употребляется жаръ на разстояніи. Все, что при укушеніи попадаетъ подъ руку, — каленое желѣзо, раскаленный уголь, горячую сигару нужно держать какъ можно ближе къ ранѣ, не обжигая при этомъ кожи и не причиняя большой боли. Въ то же время, надо приготовить каленое желѣзо, чтобы температура жара, дѣйствующаго на рану, не уменьшилась. Жаръ долженъ быть направленъ на одну только рану. Если подъ рукою находится масло или жиръ, то можно ихъ смазывать край раны всякій разъ, какъ скоро кожа сдѣлается сухою. При недостаткѣ масла или жира, можно ихъ замѣнить мыломъ и даже слюною. Все, что изъ раны будетъ вытекать, должно быть тщательно смываемо и удаляемо. Такимъ образомъ до-тѣхъ-поръ употребляютъ каленый жаръ, пока больной не начнетъ ощущать озноба, или пока не начнетъ потягиваться. Когда эти явленія обнаружатся по истеченіи нѣсколькихъ минутъ, то продолжаютъ сказанный способъ еще цѣлый часъ, или по-крайней-мѣрѣ до-тѣхъ-поръ, пока не ослабѣютъ припадки, причиненные отравленіемъ.

§ 6. Въ то же время надо употреблять и *внутреннія* средства. При укушеніи змѣею, даютъ по временамъ по глотку раствора соли въ водѣ, или пороху на кончикѣ ножа, или нѣсколько кусковъ чесноку. Если, несмотря на это, появляются неблагопріятные припадки, то лучше давать внутрь по столовой ложкѣ вина или водки, всякія двѣ минуты, до-тѣхъ-поръ, пока страданія не уменьшатся, и всякій разъ повторять, какъ скоро они возобновятся. Если боли ожесточаются, или онѣ принимаютъ направленіе отъ раны къ сердцу, если рана дѣлается синеватою, мраморнаго цвѣта, припухшею и появляются рвота и головокруженіе, то Агв. самое лучшее средство. Если болѣзненные явленія еще усиливаются, то повторяютъ это средство по прошествіи получаса, или по прошествіи трехъ часовъ, если не замѣчается никакой перемены въ

состояніи больного и если оно не сдѣлалось хуже послѣ перваго приѣма; но въ случаѣ улучшенія, не прежде давать новый приѣмъ, пока не наступитъ новое ухудшеніе. Если нѣсколько разъ повторенный Arg. оказался безъ успѣха, то назначаютъ Bell.; иногда полезнымъ оказывается Seneg.; противъ хроническихъ недуговъ послѣ укушенія змѣями, Phos.-ac. и Merc. обыкновенно оказываются полезными.

§ 7. При леченіи укушенныхъ бѣшеною собакою, нужно тоже употребить *жаръ на разстояніи* и послѣ лечить, какъ сказано въ статьѣ: *водобоязнь*. Если вслѣдствіе укушенія не бѣшенымъ, но разъяреннымъ человекомъ или животнымъ, появятся неблагопріятныя припадки или язвы, то часто гомеопатическій приѣмъ Hydrophobin'a оказываетъ отличныя услуги.

§ 8. При ранахъ, отравленныхъ попавшими въ нихъ гнилыми веществами, животными, или гноемъ отъ язвы больного человека или животного, полезнѣйшимъ средствомъ считается Arg..

Лучшее профилактическое средство отъ зараженія и для предохраненія себя отъ дурныхъ послѣдствій при леченіи, есть тоже употребленіе *жара на разстояніи*. Съ этою цѣлью, послѣ того какъ имѣли дѣло съ зараженнымъ или прикасались къ зараженной матеріи, достаточно поддержать 5 или 10 минутъ руки предъ жаромъ такой степени, которую можно переносить, а потомъ обмыть ихъ съ мыломъ. Кромя того, въ подобныхъ случаяхъ употребляютъ еще и хлоръ.

Охриплость и потеря голоса, Raucedo и Aphonia.

§ 1. Дѣйствительнѣйшія средства вообще: 1) Carb.-veg., Dros., Mang., Phosph., Spong.; 2) Bell., Bry., Caps., Caust., Cham., Dulc., Hep., Merc., Natr., N.-vom., Petr., Puls., Rhus, Sil., Sulph..

§ 2. Противъ обыкновенной *катарральной* охриплости съ кашлемъ, или безъ него: 1) Cham., Carb.-veg., Dulc., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Sulph.; 2) Bell., Calc., Caps., Dros., Hep., Mang., Natr., Phosph., Tart.—Противъ *хронической* охриплости: 1) Carb.-v. Caust., Hep., Mang., Petr., Phosph., Sil., Sulph.; 2) Dros., Dulc., Rhus.—Противъ совершенной *потери голоса*: Ant., Bell., Caust., Merc., Phosph., Sulph.. — При одновременной *сухости носа*: Ant., Baryt..

§ 3. Противъ осиплости въслѣдствіе кори: Bell., Bry., Carb.-veg., Cham., Dros., Dulc., Sulph.; — вслѣдствіе крупа: 1) Нер., Phosph.; 2) Bell., Carb.-veg., Dros.; — вслѣдствіе бронхиальнаго катарра, насморка: Carb.-veg., Caust., Dros., Mang., Phosph., Rhus, Sil., Sulph.; — вслѣдствіе простуды: Bell., Carb.-veg., Dulc., Sulph. и если болѣзнь усиливается всякій разъ при холодной и сырой погодѣ: Carb.-veg., Sulph.

§ 4. Вообще нужно имѣть въ виду:

При *однотонномъ* голосѣ, безъ всякой модуляціи: Dros., Graph., Spong., Stram. — При *высокомъ, тонкомъ*: Bell., Cupr., Stann., Stram. — При *пустомъ, мухомъ*: 1) Bell., Caust., Phosph., Samb., Spong., Veratr.; 2) Camph., Carb.-veg., Нер., Ipec., Stann., Veratr. — При *каркающемъ*: Acon., Cin., Ruta. — При *трескучемъ*: Cupr., Stram. — При *полномъ безмаси*: 1) Baryt., Bell., Carb.-veg., Caust., Phosph.; 2) Ant., Dros., Нер., Lach., Merc., Natr.-m., Plat., Puls., Spong., Sulph., Veratr. — При *носовомъ* голосѣ: 1) Aur., Bell., Lach., Lyc., Merc., Phos.-ac.; 2) Alum., Bry., Staph. — При *жесткомъ, охрипломъ*: 1) Carb.-veg., Dros., Mang., Phosph., Spong.; 2) Bell., Bry., Caust., Cham., Dulc., Нер., Merc., Natr., N.-vom., Petr., Puls., Rhus, Samb., Sil., Sulph.; 3) Amb., Calc., Chin., Graph., Natr.-m., Seneg., Stann., Veratr. — При *слабомъ, тихомъ*: 1) Ant., Canth., Caust., Нер., Sec., Veratr.; 2) Bell., Carb.-veg., Chin., Lyc., Op., Spong., Staph. — При *низкомъ, басистомъ* голосѣ: 1) Chin., Dros., Sulph.; 2) Anac., Jod., Laur., Rag. — При *нечистомъ, невѣрномъ*: 1) Caust., Graph., Merc., Spong.; 2) Baryt., Camph., Chin., Croc., Nitr.-ac., N.-mosch., Sabad. — При *беззвучномъ*: Agn., Dros. — При *прерывистомъ, осѣвляющемъ*: Dros., Spong. — При *шиплящемъ*: Caust., Phosph.

См. *Катарръ воздухоносныхъ путей, Кашель, Пороки речи.*

II.

Падучая болѣзнь, Epilepsia.

Главнѣйшія средства: 1) Bell., Calc., Caust., Cic., Cin., Hyos., Lach., Op., Stram., Sulph.; 2) Ars., Camph., Cham., Coccul., Ign.,

Иpec., Kal., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Plumb., Sep., Sil.;
3) Agar., Canb., Plumb., Stann.

См. *Судороги*, гдѣ изложены симптомы, указывающіе на то или другое изъ сказанныхъ средствъ.

Памяти слабость, неспособность размышлять, тупость умственныхъ способностей.

§ 1. Средства вообще: Agr., Aur., Calc., Carb.-veg., Chin., Lach., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Sil., Staph., Sulph., Veratr.

§ 2. Если причину этого состоянія составляетъ *ослабляющая потеря соковъ*: Chin., N.-vom. и Sulph. (см. *Астенія*). Если же она происходитъ вслѣдствіе *чрезмѣрныхъ умственныхъ занятій*: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Aur., Calc., Lach., Natr., Natr.-m., Puls. и Sil. (см. *Утомленіе*). — Если она происходитъ вслѣдствіе *злоупотребленія спиртныхъ напитковъ*: 1) N.-vom.; 2) Calc., Lach., Op., Merc., Puls. и Sulph. (см. *Больши отъ пьянства*); — *механическаго поврежденія*, напр. удара, паденія на голову и т. д.: 1) Agr.; 2) Cic., Merc., Rhus; — *сильныхъ душевныхъ потрясеній*, какъ-то испуга, печали, гнѣва: 1) Acon., Staph.; 2) Op., Phos.-ac. (Сравни. *Душевные потрясенія*); — *сырости*, пребыванія въ болотистыхъ, сырыхъ мѣстахъ: 1) Carb.-veg., Rhus, Veratr.; 2) Calc., Puls., Sil. — Если болѣзнь сопряжена съ *манорожъ крови къ волосъ*: Chin., Merc., Rhus Sulph.

§ 3. Кромѣ того, при *утомленіи волосъ* вообще: 1) Aur., Bell., Calc., Hyos., Lach., Lyc., N.-vom., Op., Phos.-ac., Puls., Sep., Stram., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Anac., Caust., Chin., Coccul., Hell., Hep., Ign., Merc., Natr., Natr.-m., Phosph., Plat., Rhus, Sil., Staph. — При *тупости памяти*: 1) Anac., Bell., Hyos., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., Rhus, Staph., Sulph.; 2) Alum., Bry., Calc., Con., Cycl., Graph., Hell., Hep., Oleand., Petr., Sil., Stram., Veratr., Zinc. — При *потери памяти*: Anac., Bry., Con., Hep., Hyos., Natr.-m., Op., Petr., Puls., Sil., Stram., Veratr. — При *неопытности*: Amb., Calc., Con., Cycl., Hell., Ign., Lyc., Merc., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Oleand., Phos.-ac., Op., Rhus, Sep., Staph., Stram., Thuj. — При *медленномъ теченіи мыслей*, трудномъ мышленіи: Alum., Amm.,

Aur., Calc., Carb.-veg., Hyos., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Op., Petr., Phos.-ac., Rhus, Sep., Sil., Staph. — При *тупоумии* и недостаткѣ мыслей: Alum., Amm., Caust., Hell., Hyos., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Oleand., Staph., Thuj., Veratr. — При совершенномъ *слабоумии*: Alum., Bell., Calc., Hell., Hyos., Natr., Natr.-m., Oleand., Op., Phos.-ac., Sep., Staph., Stram., Sulph.

Сравн. *Упомянутельство, Душевная болѣзнь, Боли головы.*

Параличъ, Paralysis.

Средства, до сихъ поръ оказавшіяся полезными: 1) Caust., Coss., N.-vom., Rhus; 2) Arn., Baryt., Bell., Bry., Dulc., Ferr., Lach., Led., Lyc., Oleand., Ruta, Sil., Stann., Sulph., Zinc.

§ 1. Параличъ вслѣдствіе *кровянаго удара*: 1) Arn., Bar.-c., Bell., N.-vom., Stann., Zinc; 2) Anac., Con., Lach., Laur., Stram. — *Параличъ половинъ тѣла*: 1) Caust., Coss., Lach., N.-vom.; 2) Arg.-n., Bell., Graph., Plumb.; 3) Alum., Anac., Rhus; — *левой стороны*: Arn., Ars., Bell., Caust., Rhus; — *правой стороны*: Aur., Bell., Caust., Rhus; — *послѣ судорогъ*: 1) Ars., Caust., Cupr., Sec., Sulph.; 2) Bell., Coss., Laur., N.-vom.; 3) Cic., Sil., Stram. — *Вслѣдствіе потери силъ, послѣ потери соковъ*: Chin., Ferr., Natr.-m., Sulph.; — *отъ ревматизма*: 1) Arn., Caust., Ferr., Ruta; 2) Bry., Coss., Lyc., Sulph.; — *вслѣдствіе скрившейся спины* яв. внаго болѣзненнаго отдѣленія: Caust., Dulc., Her., Sulph.; — *отъ душевныхъ потрясеній*: Arn., Natr., Stann.; — *отъ физическихъ напряженій*: Arn., Rhus; — *отъ пьнства*: N.-vom.; — *отъ простуды*: Arn., Caust., Colch., Dulc., Merc., Rhus; — *отъ влажнаго голода*: Caust., Rhus; — *отъ сухаго*: Caust.; — *отъ прекращенія пота*: Colch.; — *послѣ перемежающейся лихорадки*: Arn., Ars., Natr.-m., N.-vom., Rhus; — *послѣ тифознаго*: Coss., Cupr., Rhus, Sulph.

§ 2. Противъ *паралича языка*: 1) Sep., Spig., Veratr.; 2) Bell., Nitr.-ac., Stram., Zinc; 3) Coss., Op., Plumb., Rhus; — *лицевыхъ мышцъ*: Caust., Graph., Op.; — *языка и органовъ глотанія*: Caust., Lach., Sil.; — *языка и органовъ рѣчи*: Bell., Caust., Dulc., Hyos., Lach., Stram.; — *верхнихъ конечностей*: 1) Calc., Chin., Coccul., N.-vom., Rhus, Sep.; 2) Acon., Bell., Lyc., Nitr., Veratr.; — *костей руки*: 1) Ferr., Ruta, Sil.; 2) Amb., Cupr., Natr.-m.; — *пальцевъ*: 1) Calc.;

2) Magn.-с., Phosph.;—*нижнихъ конечностей*: 1) Alum., Arn., Bell., Bry., Chin., Cocc., Colch., Dulc., Kal., Merc., N.-vom., Phosph., Plumb., Rhus, Sec., Sulph., Veratr.;—*правой*: Plumb., Rhus;—*левой*: Arn.;—*коленей*: Bell., Bry., Chin., Cocc., N.-vom., Rhus, Veratr.;—*ногъ*: Ars., Chin., Oleand., Plumb.;—*мышцъ бедра*: Acon., Aur., Chel., Cocc., Sulph.;—*чувства и движенія*: Ars., Bell., Caus., Rhus;—*только чувства*: Plumb., Sil..

Параличъ легкихъ, удушавный катарръ, Paralysis pulmonum, Orthopnoea paralytica, Catarrhus suffocativus.

§ 1. Дѣйствительнѣйшія средства вообще: 1) Ars., Carb.-veg., Chin., Ipec., Lach., Op.; 2) Acon., Baryt., Camph., Graph., Puls., Samb., Tart.; 3) Aur., Bell., Bry., Cham., Con., Dros., Her., Hyos., Ign., Magn.-arct., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Spong., Sulph., Veratr..

§ 2. Если недугъ свойства катаррального и происходитъ отъ слишкомъ обильнаго накопленія слизи въ бронхіяхъ (catarrhus suffocativus): 1) Ars., Camph., Chin., Ipec., Tart.; 2) Dros., Her., Merc., Phosph., Puls., Spong., Sulph., Veratr.—Если же онъ зависить отъ компрессионнаго состоянія, отъ слишкомъ сильнаго напора крови къ легкимъ (арореплексія pulmonalis): 1) Acon., Bell., Bry., Chin., Ipec., Phosph., Samb.; 2) Ars., Aur., Cham., N.-vom., Op., Spong., Sulph.—При чисто нервнои или настоящемъ параличѣ легкихъ (paralysis pulmonum): 1) Baryt., Graph., Hyos., Lach., N.-vom., Op.; 2) Ars., Aur., Carb.-v., Chin., Magn.-arct..

§ 3. При параличѣ у дѣтей преимущественно: 1) Acon., Ipec., Samb., Tart.; 2) Bell., Cham., Her., Ign., Merc., Sulph.—У новорожденныхъ людей: 1) Baryt., Lach., Op.; 2) Ars., Aur., Carb.-v., Chin., Con., Phosph., Veratr..

См. Удушье, Примесь къ ируди, Катарръ, Кашель, Воспаленіе легкихъ.

Параличъ мочевого пузыря, Paralysis vesicae urinae.

Испытанныя средства противъ этой болѣзни: Ars., Dulc., Lach.. Также можно ожидать уснѣха отъ: Acon., Bell., Caust., Cic., Hyos.,

Laur., Magn.—При параличѣ *самаго нутря:* Ars., Bell., Laur.—
При параличѣ его *шеи:* 1) Ars., Dulc., Hyosc.; 2) Acon., Bell.,
Cic., Hell., Lach., Laur., Mgn.-aust..

Парша на головѣ, Tinea.

Средства вообще: 1) Ars., Calc., Her., Lyc., Rhus, Sulph.; 2)
Var.-c., Cic., Graph., Merc., Oleand., Phosph., Sep., Staph., Zinc.—
Противъ *сухой* парши (Tinea furfuracea, amiantacea, granulata):
1) Calc., Sulph.; 2) Ars., Her., Merc., Phosph., Rhus.—Противъ
влаготочивой (Achor, Favus, Tinea favosa muciflua): 1) Lyc., Sulph.;
2) Her., Oleand., Rhus, Sep., Staph., Zinc..

§ 2. Относительно различныхъ *формъ* сыпи, слѣдуетъ замѣ-
тить: При паршѣ *асбестовой*, на подобіе горнаго льна (*T. amian-*
acea, Esveta capitis): Ars., Carb.-an., Merc., Rhus, Staph.— При
злакачественной коростѣ (*T. favosa*): 1) Ars., Sulph.; 2) Her.,
Merc., Phosph.; 3) Baryt., Brom., Calc.— При *влажныхъ паршахъ*
(*T. porriginosa, s. muciflua, Porrigo capitis*): 1) Calc., Rhus, Sulph.;
2) Ars., Her., Lyc., Sil., Sep.; 3) Baryt., Cic., Graph., Merc.,
Oleand., Staph., Viol.-tric.— При *прыщатой* формѣ (*T. granulata,*
s. impetiginosa, Impetigo capitis): 1) Sulph.; 2) Calc.; 3) Ars., Her.,
Merc., Phosph., Rhus.— При *отрубевидной* (*T. furfuracea, Pity-*
riasis capitis): 1) Alum., Mez., Oleand., Sulph.; 2) Bry., Calc., Graph.,
Staph.; 3) Ars., Dulc., Lyc., Phosph., Sep.— При *круточешуйчатой*
паршѣ (*Psoriasis capitis*): 1) Calc.; 2) Graph., Lyc., Sep.,
Sulph.; 3) Cic., Led., Merc., Oleand.— При *пеллечей паршѣ* (*Crusta*
serpiginosa): 1) Sulph.; 2) Ars., Calc.; 3) Clem., Dulc., Graph.,
Sass., Sep..

Если въ то же время обнаруживаются и *золотушные* страда-
нія, какъ напр. припухлость *затылочныхъ и шейныхъ железъ*, то
приличнѣйшія средства: 1) Amm., Arg., Baryt., Calc., Staph.; 2)
Bry. или Dulc..

См. *Лишай и Осыпъ лица.*

Парша лишайная, влажные прыщатая сыпь, Impre-
tigo.— § 1. Здѣсь приимемъ: 1) Ars., Calc., Graph., Rhus, Sulph.;
2) Bell., Cic., Clem., Dulc., Lyc., Merc., Mur.-ac., Sep., Staph.; 3)

Alum., Baryt., Con., Kreos., Lach., Natr.-m., Nitr.-ac., Oleand., Sass.;
 4) Amm., Carb.-v., Caust., Her., Phosph., Phosph.-ac., Ran., Sil.—
 Изъ нихъ употребительны въ особенности: противъ *чесоточной*
 или *зудливой* формы (imp. scabida): Dulc., Graph., Lyc., Sulph.—
 Противъ *мокрой парши* (imp. purifluens): 1) Calc., Rhus, Sulph.;
 2) Carb.-v., Cic., Con., Graph., Lyc., Sep., Sil.; 3) Nitr.-ac., Staph.—
 Противъ *роющей* формы (imp. rodens): 1) Ars., Graph., Rhus,
 Sulph.; 2) Calc., Carb.-v., Cic., Con., Her., Merc., Sep., Sil., Staph.;
 3) Bell., Natr.-m., Nitr.-ac.. — *Узорчатая сыпь* (imp. figurata) тре-
 буетъ: Ars., Calc., Clem., Dulc., Graph., Her., Rhus, Sulph.. —
 Противъ *разсыпанной парши* (imp. sparsa): Cic., Lach., Sulph.. —
 Наконецъ, по мѣсту сыпи, слѣдуетъ различать: прыщи около
 мазъ: 1) Ars., Her., Merc., Sulph.; 2) Calc., Oleand., Petr., Sil.,
 Staph.;—около рта: Ars., Calc., Graph., Kreos., Rhus, Sep., Sil.,
 Staph.; — на *рудныхъ соскахъ*: Ars., Cham., Graph., Her., Lyc.,
 Sulph.

Паховики, Bubones.

Сифилитическіе паховики для излеченія требуютъ преимуще-
 ственно Merc., а если больной принялъ много ртути, то Aug.,
 Carb.-v., Nitr.-ac., Staph., Thuj.. См. *Сифилисъ*.

Золотушные паховики лечатся слѣдующими средствами: Ars.,
 Calc., Clem., Dulc., Her., Jod., Merc., Nitr.-ac., Sil., Sulph. (См.
Болезни железа).

Перелой, гоноррея, Gonorrhoea.

§ 1. Главное средство противъ *перелоя* въ періодѣ воспаления
 составляетъ Сапп., котораго одинъ приемъ достаточенъ на 5—6—8
 дней. Это лучше частыхъ, хотя-бы и растворенныхъ приемовъ.
 По прошествіи нѣсколькихъ дней, можно замѣтить значительное
 облегченіе воспалительныхъ принадлежковъ и болѣе *спокойное со-*
стояніе больного.

§ 2. Когда воспалительное состояніе пройдетъ, можно дости-
 гнуть совершеннаго излеченія, назначивъ Merc. (3 разведенія), или
 Sulph., или попеременно то и другое. Merc. имѣетъ мѣсто преа-

мущественно тамъ, гдѣ истекающая матерія цвѣта зеленоватаго и гнойная, а Sulph. лучше употребить при истеченіи водянистой, бѣловатой матерія, безъ боля. Но бываютъ случаи, гдѣ нужно прибѣгнуть и къ другимъ средствамъ, какъ напр. къ Canth., когда воспаленіе очень сильно и сопровождается *задержаніемъ мочи, болѣзненными эрекціями* и когда Cann. мало оказываетъ пользы; иногда нужно бываетъ обратиться къ Petros. если *затрудненное мочеиспусканіе* не облегчается. При очень сильныхъ боляхъ, часто помогаетъ Acon..

§ 3. Противъ *вторичнаго перелою*, если онъ былъ лечимъ большими приѣмами копейскаго бальзама или кубебы, лучше всего дѣйствуютъ: 1) Sulph.; 2) Merc.; 3) Sars., Ferr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Ser., Thuj.. — Sars. имѣетъ мѣсто, когда матерія бѣловатого цвѣта, густа какъ сметана, съ жженіемъ при мочеиспусканіи. Если Sars. окажется недостаточнымъ, то Ferr., или N.-vom. могутъ уничтожить остатки болѣзни. Если послѣ перелою остается *суженіе* мочеиспускательнаго канала, то назначаютъ: 1) Petr., Sulph.; 2) Dig., Dulc., Puls., Rhus.

§ 4. Если при перелоѣ разовьются сморквинныя бородавки, то назначаютъ преимущественно: 1) Nitr.-ac., Thuj.; 2) Cinn., или попеременно Merc. и Sulph.. Если *перелою* осложняется сифилитическою *язвой*, то показавъ Merc., какъ при первичномъ, такъ и при вторичномъ перелоѣ.

§ 5. Кромѣ всѣхъ вышесказанныхъ средствъ, предлагаются еще: Agn., Con., Cor., Cub., Dulc., Her., Led., Lyc., Merc.-c., Mez., Petr., Sabin., Selen.. — Agn. полезенъ тамъ, гдѣ половое возбужденіе почти потеряно или по-крайней-мѣрѣ слабо, равно при хроническомъ, сывороточномъ перелоѣ безъ болей. — При сильномъ *воспалительномъ состояніи* перелою: 1) Cann.; 2) Canth., Merc., Merc.-c.; 3) Cinnab., Sulph.. — При *зеленоватожелтомъ* истеченіи: 1) Cann.; 2) Merc., Merc.-c.; 3) Cinnab.. — При *раздраженіи мочевого органа*: 1) Cann., Canth.; 2) Dig., Merc., Petr., Sulph.. — При *млекообразномъ* истеченіи: 1) Cann.; 2) Sars., Ferr., N.-vom., Sulph.

§ 6. Наконецъ противъ *послѣдствій* или *переносовъ* перелою: при *воспаленіи мазы*: 1) Acon.; 2) Puls.; 3) Nitr.-ac., Sulph., Thuj.. — При *воспаленіи шуга*: 1) Aur., Merc., Puls.; 2) Agn., Brom., Nitr.-ac., Rhod.. — При *перелойномъ ревматизмѣ*: 1) Clem., Daphn.;

2) Sass., Sulph.; 3) Lyc., Thuj.—При суженіяхъ канала: 1) Clem., Caps., а можетъ быть также 2) Arg.-n., Petr., Rhus, Sulph.—При воспаленіи предстательной железы: Cann., Nitr.-ac., Puls., Thuj..

Касательно послѣдствій скрышилось отдѣленія, напр. *режматизма въ чаенасть, воспаленія яичекъ, воспаленія мазъ, см. эти статьи.*

Перелой ложный, Gonorrhoea spuria.

Если воспаленіе сифилитическаго или сикозическаго происхожденія, то, смотря по обстоятельствамъ, употребляются Merc., Nitr.-ac. или Thuj. Во всѣхъ прочіихъ случаяхъ можно ожидать успѣха отъ: 1) N.-vom., Ser., Sulph.; 2) Chin., Merc., Mez., Nitr.-ac., Thuj.

Перелой послѣдствія и осложненія: незагула, удавка, воспаленіе крайней плоти, Phimosiis, Paraphimosiis, Balanoposthitiis.

Если недугъ происходитъ вслѣдствіе *сифилитической* страданія, то главныя средства: Merc., Nitr.-ac., Ser., Thuj.—При *перелой*: Cann., Merc. или Sulph.. Если же онъ произошелъ отъ *тряння* или другихъ механическихъ раздраженій, то главное средство Arg.—При сильномъ *воспаленіи*, слѣдуетъ прежде дать приемъ Acon., и если послѣ этого Arg. окажется неудовлетворительною, то Rhus или Euphr.—Если причину болѣзни составляетъ *неоправность*, то Acon., Merc., или Sulph.—Если она произошла отъ дѣйствія *химическихъ веществъ*, напр. ядовитыхъ *растеній*, то Acon., Bell., Bry., Camph.—При *мамоени*: Merc., Caps., Ner.—Если затѣмъ остаются *затвердннхъ*: Lach., Sulph., Ser.— При угрожающемъ *омертвннхъ*: Arg., Lach., Canth.— У *мамъ дѣтей*: Acon., Merc., Calc., Sulph..

Пищеваренія разстройство, слабость, Dyspepsia.

§ 1. Подъ именемъ дурнаго или слабого пищеваренія мы разумѣемъ родъ легкаго воспаленія желудка, gastrosiis или gastritiis антифлогистической школы Бруссе и нѣмецкихъ врачей, которое выражается слабостью пищеваренія, недостаточнымъ, слабымъ или неправильнымъ аетитомъ, тягостью въ сторонѣ желудка, отрыжкою, вѣтрами, дурнымъ расположеніемъ духа, сонливостью и дру-

гями неприятностями послѣ стола; наклонностью къ несваренію пищи, кислотами и накопленіемъ слизи въ первыхъ путяхъ. Этихъ дурное пищевареніе отличается отъ гастрическихъ страданій, которыхъ оно составляетъ первую степень, точно такъ, какъ гастрическія страданія составляютъ первую степень воспаленія желудка.

§ 2. Дѣйствительнѣйшія и лучшія средства: Нер. и Sulph., съ тѣмъ только, чтобы пріемы были даваемы въ продолжительныхъ промежуткахъ времени. Затѣмъ приличнѣйшія средства: 1) Arn., Bry., Calc., Chin., Lach., Merc., N.-vom., Puls., Rhus; 2) Amm., Anac., Aur., Baryt., Bell., Con., Dros., Ferr., Graph., Hyos., Ign., Kal., Kreos., Lyc., N.-mosch., Petr., Phosph., Staph., Veratr..

§ 3. Слабое пищевареніе часто требуетъ: Baryt., Calc., Ipec., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.— У стариковъ: 1) Baryt., Cic.; 2) Ant., Carb.-veg., Chin., N.-mosch., N.-vom. — У *итохондриковъ*: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Bry., Calc., Chin., Con., Lach., Natr., Staph., Veratr.— У истерическихъ женщинъ: 1) Puls., Sep.; 2) Bell., Bry., Calc., Con., Hyos., Ign., Lach., N.-mosch., Phosph., Sep., Sulph., Veratr. — У беременныхъ: Acon., Ars., Con., Ferr., Ipec., Kreos., Lach., Magn.-m., Natr.-m., N.-mosch., N.-vom., Petr., Phosph., Puls., Sep..

§ 4. При диспепсiи вслѣдствіе *сидлачаю*. образа жизни: Bry., Calc., N.-vom., Sep., Sulph.. — Вслѣдствіе *продолжительныхъ ночныхъ бдній*: Arn., Carb.-veg., Coss., N.-vom., Puls., Veratr. — Вслѣдствіе *сильныхъ умственныхъ занятій*: Arn., Calc., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.. — Вслѣдствіе *ослабляющей потери соковъ*, злоупотребленія слабительныхъ, рвотныхъ, общихъ кровопусканій и т. д.: Chin., Carb.-veg., Ruta, Calc., Lach., N.-vom., Sulph.. — Вслѣдствіе *неумереннаго удовлетворенія половой потребности*: Calc., Merc., N.-vom., Phosph.-ac., Staph.. — Вслѣдствіе *обремененія желудка*: Ant., Ars., Ipec., N.-vom., Puls.. — Послѣ *чрезмѣрнаго употребленія вина или спиртныхъ напитковъ*: 1) Carb.-veg., Lach., N.-vom., Sulph.; 2) Ars., Bell., Chin., Merc., Natr., Puls.. — Послѣ *употребленія кофе*: Coss., Puls., Carb.-veg., Cham., Ign., Merc., N.-vom., Rhus, Sulph.; — *чая*: Ferr., Thuj.; — *табаку*: Coss., Merc., Ipec., N.-vom., Puls., Staph.. — Вслѣдствіе *наруженія пооружденій, удара по желудку, насады, подниманія тяжести* и т. д., Arn.,

Вгу., Rhuz. — Вслѣдствіе *унижающихъ душевныхъ силъ*, напр. *нечаян, имья*: Вгу., Cham., Chin., Coloc., N.-vom., Rhov.-ac., Starb.

§ 5. По принадлежамъ, назначаются:

АВНИСА часто послѣ Chin., когда послѣдняя оказалась неудовлетворительною и замѣчаются: *большая чувствительность и особенная нервная раздражительность*; языкъ сухой или обожженный желтоватою корою; кислый, *имлой или юрькій вкусъ во рту*; вловоніе изо рта; *частая отрыжка, иногда имлыми дѣцами*; позывъ на кислыя вещества; полнота въ надчревной части, вѣтры и вздутіе живота послѣ принятія пищи; головокруженіе, чувство сжиманія въ головѣ, въ особенности во лбу надъ глазами, одурѣніе и жаръ въ головѣ; *безпокойный сонъ, частое пробужденіе, тягостныя и тоскливыя видѣнія*; *железистый, землисто-блѣдный цвѣтъ лица*; частая тошнота и склонность ко рвотѣ, въ особенности по утрамъ или послѣ стола; *инохондрическое расположение духа*. (Послѣ Agn. иногда пріятна N.-vom.). Сравни также Вгу. и Rhuz.

ВУОНИА — преимущественно тогда, когда диспенсія является гѣтомъ, или при сырой и теплой погодѣ, или когда замѣчаются: потеря аппетита, смѣняющаяся чрезвычайнымъ голодомъ даже во время ночи, или аппетитъ, исчезающій послѣ перваго куска пищи; позывъ на вино, кофе и кислыя вещества; *отращеніе отъ пищи* до того, что даже запахъ ея становится невыносимымъ; *частая отрыжка, преимущественно послѣ стола, обыкновенно пустая, или же кислая или юрькая*; давленіе и вздутость около желудка; *колика, отрыжка и даже настоящая рвота* принятою пищею всякій разъ послѣ стола; *пищевареніе, портищееся отъ употребленія хлѣба и молока*; истеченіе желудочной мокроты изо рта, какъ-бы отъ кислотъ (сосанія глестовъ); *чувство боли при ошутываніи стенокъ желудка и невозможность носить тѣсно сидящее платье*; запоръ или твердыя испраженія; нравъ безпокойный, склонный къ гнѣву.

САЛСАВА — противъ вазкости, сухости, кислаго или юрькаго *вкуса во рту*, когда притомъ имѣются: *постоянная жажда и слабый аппетитъ, безвкусіе въ пищѣ*; голодъ послѣ стола; *приступы чрезвычайнаго голода по утрамъ*; *отращеніе отъ мяса и теплой пищи и позывъ на вино или лакомства*; тошнота или от-

рыжка кислую жидкостью послѣ молока; жаръ, вздутость живота, боль головы, боль въ желудкѣ или животѣ, или охота спать послѣ стола; изгара и развитіе кислоты; осмизненіе желудка, тошнота, припухлость около желудка и большая его чувствительность при дотрогиваніи, напряженіе въ подреберьяхъ и невозможность носить узкое платье; испражненіе на мизъ всякіе два, три или четыре дня, или отъ двухъ до трехъ испражненій ежедневно; общая слабость; колючая или давящая головная боль и чувство голода съ жаждою; полнокровное и тучное тѣлосложеніе. (Часто прилична послѣ Sulph.).

СНИЛА — назначается не только противъ дурнаго пищеваренія вслѣдствіе потери соковъ, но и противъ диспансій, происходящей отъ дѣйствія вредныхъ испареній въ воздухѣ, весною или осенью, вблизи каналовъ, болотъ и т. д. и вообще, когда замѣчаются: равнодушіе къ пище и питью, какъ при насмизненіи; позывъ на вино, остриня, прянныя, кислыя и возбуждающія вещества; травянистый, кислый или горькій вкусъ въ пищѣ; часто портящееся пищевареніе (indigestio), особенно послѣ поздняго ужина; чувство неловкости, сонливость, тифозное расположеніе духа, полнота, вздутость живота, отрыжка или настоящая рвота принятою пищею; большая слабость и постоянное желаніе лежать даже послѣ утренней пищи; ознобъ и большая чувствительность къ малѣйшему сквозному вѣтру; позднее засыпаніе ночью и чуткій сонъ. (Сравн. также Agn., Вгу., Rhuz).

НІРАВЪ — во многихъ случаяхъ хронической диспансій, особенно если больной принималъ много ртути, и если при этомъ имѣются: часто и легко образующаяся индигестія, несмотря на всю осторожность въ діетѣ; позывъ на вино, кислыя, острыя или возбуждающія вещества; частая тошнота, преимущественно по утрамъ; наклонность ко рвотѣ и настоящая рвота, кислыми, желчными или слизистыми веществами; накопленіе слизи въ горлѣ; боли живота; твердыя, натуженныя и сузья испражненія на мизъ; давленіе, вздутость и тяжесть въ надчревной части, горечь во рту и горькій вкусъ въ пищѣ; отвращеніе отъ жира; сильная жажда; чувство давленія и стѣсненія отъ платья въ округъ подреберій. (Послѣ Нер. часто приличны Lach. или Merc.).

ЛАСПІСІВІС — также во многихъ случаяхъ хронической диспанс-

сн, преимущественно послѣ употребленія Нер. и когда при этомъ замѣчаются: неправильный, почти совсѣмъ потерянный или чрезвычайно сильный аппетитъ, отвращеніе отъ хлѣба и *позывъ на вино и молоко*, употребленіе коихъ причиняетъ непріятное чувство; *тошнота и частая отрыжка*, или даже *настоящая рвота пищею послѣ стола*; *неловкость, мнѣность, сонъ, головокруженіе, боли желудка* и многія другія страданія *всякій разъ послѣ стола*; вѣтры; отрыжка и облегченіе послѣ нея; частая одышка; безпокойный, тревожный сонъ съ частыми видѣніями; запоръ или твердые, натужныя испраженія; землистооблеженный, желтоватый цвѣтъ лица; давленіе и полнота въ подреберьяхъ и надчревной части, ощущеніе боли при малѣйшемъ дотрогиваніи и неловкость отъ платья. (Послѣ Lach. часто приличенъ Merc.).

МѢСУРИУСЪ — часто послѣ Lach. или Нер., если только больной не принималъ ихъ много и вообще когда замѣчаются: *гниловатый, сладковатый или юркій вкусъ по утрамъ*; потеря аппетита или большая прожорливость и скорое ощущеніе сытости во время стола; отвращеніе отъ плотной пищи, мяса, теплой и вареной пищи и *позывъ на освѣжающія вещества, молоко, холодное питье*, или же на вино и водку; *давленіе въ надчревной части*, отрыжка, изгага и другія непріятности послѣ стола, особенно послѣ употребленія хлѣба; частая отрыжка, тошнота и *наклонность ко рвотѣ*; болѣзненная чувствительность, полнота, давленіе и напряженность въ желудкѣ; вѣтры; запоръ съ частыми, но тщетными потугами и понужденіемъ на нязъ; печаль, ипохондрическое, недобѣрчивое и раздражительное расположеніе духа.

НУХ-ЧОМІСА — часто вначалѣ леченія, особенно людямъ, расположеннымъ къ геморрою и вообще, когда при этомъ замѣчаются: *кислый или юркій вкусъ во рту и въ пищѣ*, даже въ хлѣбѣ, или же безвкусіе въ пищѣ; отвращеніе отъ пищи и *позывъ на пиво, молоко, вино, водку*, или же голодь невысытанный, болѣзненный, очень скоро и малымъ количествомъ пищи удовлетворяемый; *тошнота, отрыжка*, или *настоящая рвота пищею*; *вспучиваніе живота*, чувство неловкости, ипохондрическое расположеніе духа, усталость и сонливость послѣ стола; *вадутость, полнота и напряженность въ надчревной части*; *большая чувствительность при дотрогиваніи и неловкость отъ платья вокругъ подреберій*; питье, ржаной хлѣбъ

и кислым вещества причиняютъ страданія; притомъ замѣчаются: кислая отрыжка, тошнота и склонность ко рвотѣ; осмѣженіе желудка; изъяс; тяжесть въ головѣ и невозможность заниматься умственной работою; частая краснота и блѣдность лица; нравъ безпокойный, сварливый; живой и холерическій темпераментъ; ассиметричный, землисто-охлажденный цвѣтъ лица; запоръ, трудныя, твердыя испраженія. (Послѣ N.-vom. часто прилична Sulph.).

PULSATILLA — при тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ назначается N.-vom.; вначалѣ леченія, въ особенности женщинамъ или мужчинамъ холоднаго, флегматическаго темперамента, кроткаго характера, расположенныхъ къ осмѣженію первыхъ путей, склоненію въ нихъ кислотъ, равно когда замѣчаются: кислый, горькій или гнилой вкусъ во рту и пищи, отвращеніе отъ теплой или вареной пищи и позывъ на кислым, острымъ, раздражающимъ вещества, на вино, водку и т. д.; отсутствіе жажды; тошнота, склонность ко рвотѣ; отрыжка или настоящая рвота; затрудненное дыханіе, печаль, меланхолія послѣ стола; страданія послѣ употребленія хлѣба; зоркая или кислая отрыжка, или отрыжка, имѣющая вкусъ принятой пищи; скопленіе кислотъ въ желудкѣ; частая икота; частыя испраженія въ видѣ поноса, или медленныя, натужныя испраженія; волна, ворчаніе и перекачиваніе вѣтровъ.

Rhus — во многихъ случаяхъ, гдѣ Bry. имѣла мѣсто, но оказалась неудовлетворительною и когда вообще замѣчаются: травяной, клейкій вкусъ во рту; ималостивый, сладковатый или зоркій вкусъ пищи, потеря аппетита какъ-бы отъ сытости и отвращеніе особенно отъ хлѣба и мяса, или позывъ на лакомства; страданія отъ хлѣба и пива; сонливость, полнота, отрыжка, тошнота, усталость, головокруженіе послѣ стола; притомъ частая, большею частію пустая, сильная и бѣлѣзненная отрыжка; скопленіе кислотъ въ желудкѣ, давленіе и вздутость около желудка; частые и вонючіе вѣтры; гастрическія страданія по ночамъ; гипохондрическое расположеніе духа, меланхолія, упадокъ духа, страхъ будущности, чрезмѣрное безпокойство о своихъ дѣлахъ (Сравн. также Arg. и Chin.).

SULPHUR — въ большей части случаевъ хронической диспепсиса, вначалѣ леченія, или особамъ, слишкомъ раздражительнымъ, послѣ N.-vom или Pulv., и когда замѣчаются: кислый, ималой или

слабозвонный вкус во рту, особенно по утрам; потеря вкуса или слишком соленый вкус в пище, отвращение от мяса, хлеба, жира и молока, и позывы на кислые вещества или вино; страдания от мяса, жира, молока, кислоты, обжаренных и мушкетных веществ; затрудненное дыхание, тошнота, боль желудка; возбуждение нищим или даже настоящая рвота принятой пищи, усталость, озноб, частая отрыжка послѣ стола и истечение желудочныхъ мокротъ; расположение къ ослизненію первыхъ путей; скопление вѣтровъ и недѣятельность брыжнихъ органовъ; сильная жажда; печальное, ипохондрическое расположение духа, или же угрюмое и сварливое. (Послѣ Sulph. часто бываютъ вредны: Calc., Merc.).

§ 6. Изъ прочихъ средствъ, чаще всего могутъ быть употреблены:

САВВО-УВГВТАВІЛІВ — при горькомъ вкусѣ во рту, отвращеніи отъ мяса, молока, жира и кислотъ въ желудкѣ; также при частой, кислой, горькой или пустой отрыжкѣ, ослизненіи желудка; частомъ скопленіи вѣтровъ, одышкѣ. — **НАТРИУМЪ**, когда Вгу., Chin., N.-vom. оказались неэффективными противъ слабости пищеварительныхъ органовъ, и если замѣчаются: давленіе въ желудкѣ; состояніе, при которомъ больной ничто спокойно не переноситъ и дурное расположеніе послѣ стола, или послѣ всякаго уклоненія отъ обмененнаго образа жизни; расстройство отъ употребленія молока и питья и постоянная тошнота. — **НАТРИУМЪ ИУВІАТІСУМЪ** — если страданія причиняются жирною, мучною пищею, кислыми веществами или хлѣбомъ; аетитъ неправильный, то совершенно потерянный, то жадный; при изверженіи обильныхъ желудочныхъ мокротъ или рвотѣ принятой пищею. — **ЦУГА** — противъ потери вкуса въ пищу; гнилой отрыжкѣ послѣ употребленія мяса; часто и внезапно появляющейся тошноты во время стола; изверженіе принятой пищи рвотой; страданія послѣ употребленія хлѣба. — **СЕРІА** — противъ потери аетита и отвращенія отъ мяса, равно противъ чрезмѣрнаго аетита и прожорливости; страданія послѣ употребленія жирной пищи, молока и кислыхъ веществъ; скопленія кислоты въ желудкѣ, преимущественно послѣ стола; изверженія мокроты желудочныхъ, особенно послѣ питья. — **СІЛІСІА** — при горькомъ вкусѣ во рту, особенно по

утрамъ; частой отрыжкѣ, нѣвѣщей иногда вкусъ принятой пищи; *постоянной тошнотой*, особенно по утрамъ или послѣ стола; *постоянной тошнотой*, особенно по утрамъ или послѣ стола; отвращеніи отъ вареной пищи, а именно отъ варенаго мяса; рвотѣ послѣ питья; боляхъ желудка и изверженія *желудочнаго мотота*.

§ 7. Вообще во всѣхъ случаяхъ:

При разстройствахъ вслѣдствіе *чрезмѣрнаго употребленія мяса*: 1) Arg., Bell., Coloc., Ferr., N.-vom., Puls., Rhus, Ser., Sulph.; 2) Alum., Asa., Ign., Mez., Mur.-ac., Stann., Veratr.; — *лимоиана*: Selen.; — *водки*: 1) N.-vom., Op., Sil., Zinc.; 2) Ant., Arn., Natr., Natr.-m., Puls., Selen., Sulph.; — *спиртными напитками* вообще: 1) Arg., Calc., Carb.-veg., Hell., Hyos., Lach., N.-vom., Op., Puls., Sulph.; 2) Ant., Bell., Chel., Chin., Coff., Ign., Led., Lyc., Merc., Natr., Natr.-m., Mosch., Rhus, Selen., Sil., Stram., Veratr.; — *кофе*: 1) Cham., Coccul., Ign., Merc., N.-vom.; 2) Canth., Carb.-veg., Caust., Chin., Coccul., Her., Ipec., Lyc., Puls., Rhus, Sulph.; — *чаю*: 1) Chin., Ferr., Selen.; 2) Arg., Coff., Her., Lach., Veratr.; — *шоколада или какао*: Bry., Caust., Lyc., Puls.; — *молока*: 1) Bry., Calc., N.-v., Sulph.; 2) Amb., Arg., Carb.-veg., Chin., Cop., Cupr., Ign., Kal., Lach., Lyc., Magn.-c., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.-ac.. — Если не переносятся даже чистая вода безъ примѣся вина или спирта: 1) Chin., Merc., Puls., Rhus, Sulph.-ac.; 2) Arg., Caps., Cham., Ferr., Natr.-m., N.-vom., Veratr.. — Если *жѣлъ* причиняетъ страданія: 1) Baryt., Bry., Caust., Chin., Merc., Natr.-m., Phos.-ac., Puls., Rhus, Ser., Staph.; 2) Cic., Coff., Kal., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Sulph., Zinc.. — Если *масло* отягощаетъ желудокъ: Arg., Carb.-veg., Chin., Her., Nitr.-ac., Puls., Ser.. — Если *жиръ* причиняетъ страданія: 1) Arg., Carb.-veg., Chin., Natr.-m., Puls., Ser., Sulph., Tarax., Thuj.; 2) Colch., Cycl., Ferr., Hell., Magn.-m., Nitr.-ac.. — При страданіяхъ отъ *ювальныхъ*: Calc., Ferr., Merc., Puls., Ruta, Ser., Sil., Sulph.; — *телятнихъ*: Calc., Caust., Ipec., Nitr., Ser.; — *свиного мяса*: Carb.-veg., Colch., Dros., Natr.-m., Puls., Ser.; — *доистую жира и испортившихся колбасъ*: Arg., Bell., Bry., Phos.-ac., Rhus; — *рыбы*: Carb.-an., Kal., Plumb.; — *устрицъ*: Puls. и обильное питье молока; — *малой рыбы*: 1) Carb.-veg., Puls.; 2) Chin., Rhus; — *доистыхъ раковинъ*: Bell., Carb.-veg.,

Euphorb., Lyc., Rhus. — При вредныхъ послѣдствіяхъ отъ *нечистой пищи*: 1) Carb.-veg., Chin.; 2) Bry., Chin., Cupr., Lyc., Petr., Puls., Ser., Veratr.; — *картофель*: Alum., Amm., Ser., Veratr.; — *овощей, плодовъ*: 1) Bry., Puls., Sulph.; 2) Arg., Carb.-veg., Kal., Veratr.; — *мяса*: 1) Colch., Ferr., Puls.; — *кислота в желудкѣ*: 1) Acon., Arg., Carb.-veg., Herp., Ser.; 2) Ant., Ferr., Lach., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sulph., Sulph.-ac.; — *селенна*: Arg., Calc., Carb.-veg., Dros., Lyc., Nitr., Ser.; — *сладкою и сахару*: Acon., Cham., Ign., Merc., Selen., Zinc.. — При вредныхъ послѣдствіяхъ отъ употребленія *мѣда, мороженого*: Arg., Carb.-veg., Puls.; — *перца*: Arg., Chin., Cic., N.-vom.; — *лука*: Thuj.. — При диспенсиі въдствие *курения табаку*: 1) N.-vom., Puls.; 2) Ign., Spong., Staph.; 3) Acon., Ant., Arn., Bry., Cham., Chin., Clem., Coccul., Coloc., Cupr., Euphr., Ipec., Lach., Merc., Natr., Natr.-m., Phosph., Veratr.. — Если *ничего вообще* причиняетъ страданія: 1) Calc., Carb.-veg., Caust., Chin., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Amm., Arg., Bry., Con., Cycl., Graph., Kal., Lach., Lyc., Natr., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Phos.-ac., Puls., Rhus, Ser., Sil.. — При страданіяхъ отъ *нитыя* вообще: 1) Arg., Carb.-v., Chin., Ferr., Natr., N.-vom., Sil., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Bell., Caps., Cin., Cocc., Ign., Merc., Natr.-m., Puls., Rhus, Thuj., Veratr..

Сравн. *Потеря аппетита, Голодь, Рвота, Изнаи, Разстройство желудка, Боли живота, Поносъ, Жировой ядь, Кофе, Табакъ.*

Плачь судорожный, у истерическихъ особъ. Главными средствами служатъ: Alum., Aur., Bell., Caust., Cin., Cupr., Ign., Lach., Mosch., Plumb., Stram..

Поваренная соль, вредныя послѣдствія отъ неумѣреннаго употребленія.. — Главное средство: Nitr.-sp. Загѣмъ слѣдуютъ: Arg., Carb.-veg., Lyc., Merc., N.-vom., Puls..

Поврежденія механическія, Laesiones traumaticae.

§ 1. Главныя средства: 1) Arn., Cic., Con., Herp., Lach., Puls.,

Rhus, Sulph.-ac.; 2) Acon., Amm., Bry., Calc., Caust., Cham., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Ruta, Sil., Staph., Sulph., Zinc..

§ 2. Изъ этихъ средствъ, при *отмыкании*, остуни, рекомендуются: 1) Arn. снаружи въ видѣ обмываній и примочекъ (Tinct. arn. gutt. ij на стаканъ воды) до и послѣ хирургической помощи, напр. вправленія вывихнутаго члена и т. под.. При *отмыкании члена* или очень значительной остуни, можно Arn. дать и внутрь, и если по прошествіи двухъ сутокъ не найдемъ въ этомъ хорошаго успѣха, то давать Rhus, только внутрь. Если же улучшение не идетъ впередъ и Rhus остается безъ успѣха, или если по временамъ появляются боли въ поврежденномъ членѣ, то приличны будутъ: 1) Amm., Ruta; 2) Ang., Bell., Bry., Puls.; 3) Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Ign., Lyc., Magn.-aust., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phosph., Ser., Sulph..

Если поврежденіе произошло вслѣдствіе *массады* при поднятій *массажномъ*, то лучшее средство Rhus, преимущественно, когда поранены мѣшцы спиннаго затылочнаго и позвоночнаго столба, и замѣчаются: боль головы, спини и гастрическія страданія; а если Rhus окажется неудовлетворительнымъ, то рекомендуются: 1) Calc., Coss., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Arn., Bry., Carb.-an., Carb.-veg., Graph., Kal., Lyc., Ser., Sil.. Но если вслѣдствіе поднятія тяжести или неловкаго движенія при напряженіи, произошла *врезка паховая* или вообще *выпаденіе внутренностей*, то оказываютъ пользу: 1) N.-vom., Sulph.-ac.; 2) Coss., Sulph..—При происшедшемъ въ такомъ случаѣ *выпаденіи матки*, почти специфическимъ средствомъ считается N.-vom., затѣмъ Ser. и Bell..—При страданіяхъ вслѣдствіе *остуны* (distorsio) заслуживаютъ вниманія: 1) Bry.; 2) Sic., Cop., Puls., Rhus; 3) Arn., Spig..

§ 3. При поврежденіяхъ вслѣдствіе *ушиба, паденія* или *удара*, прежде всего Arn..—Если раненіе незначительно, то достаточно однихъ примочекъ съ Arn., или Calend.. Если же ушибу подверглись голова, грудь и другія части, отъ сотрясенія которыхъ произошли различные непріятные припадки, или если кромѣ боли замѣчается общее страданіе, то лекарство нужно дать и внутрь.—При неполномъ успѣхѣ отъ Arn., рекомендуются еще противъ поврежденія вслѣдствіе простаго ушиба, *безъ сотрясенія*: 1) Euphr., Jod., Puls., Ruta, Sulph.-ac.; 2) Croc., Her., Mez., Petr., Phosph., Sulph..

Съ сотрясеніемъ: 1) Cic., Con., Puls., Rhus; 2) Euphr., Jod., Lach., Sulph., Sulph.-ac. — Если вслѣдствіе паденія было сотрясеніе во всемя тѣлѣ: Bry., Cic., Con., Puls., Rhus, Sulph.-ac. — Если замѣчается значительный подтекъ крови, который не уступаетъ дѣйствію арники: 1) Bry., Rhus, Sulph.-ac.; 2) Con., Dulc., Lach., N.-vom., Puls., Sulph. — При большой опухоли поврежденныхъ частей: 1) Bry., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Bell., N.-vom., Sulph.-ac.

§ 4. При разрывѣ частей и ранахъ, Agr. съ водою, въ видѣ примочки и внутрь. — При ранахъ отъ укушенія неядовитыми животными: Agr., Sulph.-ac., а при ранахъ отъ укушенія ядовитыми животными: 1) Amm., Arg., Bell.; 2) Caust., Lach., Natr.-m., Puls., Seneg. — Противъ ушибовъ см. § 3. — Противъ осажень и пролежней у больныхъ: 1) Agr., Sulph.-ac.; 2) Carb.-veg., Chin., Puls. — Противъ морозовъ: 1) Staph., Sulph.; 2) Natr., Plumb., Sil., Sulph.-ac. — Противъ ранъ отъ онеострымаго оружія: 1) Euphr., Nitr.-ac., Plumb., Sulph.-ac.; 2) Puls., Ruta, Sulph. — Отъ занозы: 1) Acon., Carb.-veg., Cic., Lach., Nitr.-ac., Sil.; 2) Con., Her., Plumb., Sulph. — Отъ укуса: 1) Carb.-veg., Cic., Lach., Nitr.-ac., Sil.; 2) Con., Her., Plumb., Sulph. — Отъ осожы: Acon., Arg., Carb.-veg., Caust., Lach., Stram., Urtic. Здѣсь иногда очень полезно обмываніе ранъ спиртомъ мыльнянки (Spiritus Saponariae). При осожы языка, иногда очень скоро помогаетъ Arg. или Caust.

§ 5. Кромя того, заслуживаютъ еще вниманія:

При ранахъ отъ кровотоочиванія: 1) Acon., Agr., Chin., Phosph.; 2) Carb.-veg., Diad., Lach., Sulph., Sulph.-ac. — Если нагноеніе очень обильно: 1) Bell., Chin., Merc., Puls., Sulph.; 2) Bell., Her., Lach., Plumb. — Если раны дѣлаются злокачественными и изъязвляются: 1) Cham., Sil.; 2) Borax, Graph., Her., Lach., Merc., Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sulph., Sulph.-ac. — При изъязвленія или болѣзненности старика рубцовъ: 1) Carb.-v., Lach., Natr.-m., Phosph.; 2) Nitr.-ac., N.-vom., Sil., Sulph. — Если къ ранамъ присоединяется смертоноснѣе: 1) Arg., Chin., Lach., Sil.; 2) Acon., Amm., Bell., Carb.-veg., Euphorb.

§ 6. Если только мышцы и мякяя части повреждаются: 1) Agr., Euphr., Her., Puls., Sulph.; 2) Con., Dulc., Lach., N.-vom., Sulph. — Если поражаются однѣ сухожилія, связки и синовиальная оболочка: 1) Amm., Agr., Bry., Rhus, Ruta; 2) Calc., Natr., Natr.-m., Phosph.;

3) Agn., Carb.-an., Carb.-veg., Lys., Magn.-aust., N.-vom., Petr., Serp.—При поврежденіи *железа*: 1) Cop., Jod., Kal., Phosph.; 2) Cic., Ner., Merc., Puls., Sil., Sulph.—Если повреждена *надкостная плеска*: 1) Calend., Phos.-ac., Puls., Ruta; 2) Calc., Phosph., Sil., Staph.—При *переломахъ* костей: Calc., Calend., Ruta, Sil., Sympn.-off.

§ 7. Противъ *конвульсій*, присоединяющихся къ поврежденіямъ (Tetanus traumaticus), если Agn. оказалась неудовлетворительною: Bell., Cic. Soss.—Противъ *мигренокъ* при ранахъ (Febris traumatica), если не успѣли предупредить ея посредствомъ Agn., употребляются: Acon., Bry., Rhus.—Противъ *нервныхъ припадковъ* послѣ сильного сотрясенія черепного или спинного мозга: 1) Cic., Cop.; 2) Bell., Calc., Cin., Ner., если Agn. оказалась неудовлетворительною.—О другихъ показаніяхъ и средствахъ см. *Наружная болѣзнь* и сравн. *Отравленія ядовитыми животными*.

Подагра, см. ломота.

Ползаніе мурашекъ (ощущеніе), Formicatio.

Составляетъ симптомъ, указывающій на параличъ нервовъ того мѣста, гдѣ оно ощущается. Противъ этого, смотря по обстоятельствамъ, приличны: 1) Baryt., Carb.-veg., Rhodod., Secal., Sulph.; 2) Aur., Borax, Lycop., Magnes.-m., Natr., Phos.-ac., Plat., Sabad., Staph.; 3) Cann., Laur.-c., Mur.-ac., Phosph., Rhus, Silic., Zinc.

Полипы, Polypi.—Главные средства противъ всѣхъ видовъ полиповъ: 1) Calc., Lys., Sang., Staph.; 2) Cop., Kal.-bi., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Phosph.-ac., Puls., Sil., Thuj.—Въ частности: при *пузырчатыхъ*: Calc.;—*сосудистыхъ*: 1) Calc., Staph.; 2) Agn., Lys., Petr., Phosph., Serp., Sil., Sulph., Teucr., Thuj.;—*мясистыхъ*: 1) Calc., Staph., Thuj.; 2) Lys., Merc., Nitr.-ac., Phosph.;—*роговые*: 1) Nitr.-ac., Thuj.; 2) Calc., Lys., Staph.;—*зубчатыхъ*: 1) Calc., Staph.; 2) Lys., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Serp., Sil., Sulph.—Вообще для удачнаго леченія полиповъ, особенно важно выжидать дѣйствіе одной дозы подходящаго средства отъ 6 до 8 недѣль.

Полипы мочевого пузыря, Polypi vesicae urinariae.

Объ излеченіи этой болѣзни гомеопатіею сдѣлано до-сихъ-поръ только одно наблюденіе, гдѣ полипъ излеченъ посредствомъ Calc.

Можетъ быть принесли бы пользу также Starph., или Con., Merc., Rhus, Puls., Sil., Thuj.—При этомъ надо помнить, что сказано о продолжительности дѣйствія Calc. при мѣшеччатыхъ опухоляхъ и полипахъ вообще. Собственный опытъ при леченіи носовыхъ и маточныхъ полиповъ меня научилъ, что частая перемежна средства и повторенные приемы Calc. ни къ чему не ведутъ, только производятъ волненія, между тѣмъ, какъ выжидая дѣйствіе одного приема, мы достигаемъ отпаденія полиповъ по истеченіи 4—7 недѣль.

Полипы носа, Polypī nasi.

Главное средство Puls.. Если 4 его приема, каждые 4 дня, по прошествіи 14—16 дней, не помогаютъ, то дается приемъ Calc. дѣйствія которой, не повторяя, выжидаютъ 4, 6, 8 недѣль. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно имѣть въ виду: Phosph., Starph., Sep. Sil..

Полипы ушные, Polypī aurī.

Противъ нихъ можно употребить Calc. и Starph..

Полнокровіе, Plethora.

Гомеопатія малѣйшими приемами приличнаго средства устраняетъ симптомы, приписываемые полнокровію и до-сихъ-поръ подававшіе поводъ извлекать кровь розжками, пиявками и совершенно напрасными общими кровопусканіями. Къ такимъ средствамъ относятся: 1) Acon., Bell., Ferr., Hyos., Merc., N.-vom., Phos., Puls., Sulph.; 2) Arn., Aur., Bry., Calc., Chin., Croc., Dig., Graph., Lys., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., Rhus, Sep., Stram., Thuj..

Половая способность, слабость ея.

§ 1. Главнѣйшія средства: 1) Agn., Baryt., Calad., Calc., Cann., Con., Graph., Ign., Lys., Mosch., Mur.-ac., Natr.-m., Selen., Sulph.; 2) Agn., Ant., Canth., Caust., Chin., Graph., Hyos., Lach., Magn.-aust., N.-mosch., Petr., Sep..

§ 2. Противъ мужскаго беземія: 1) Baryt., Calad., Calc., Cann., Con., Lys., Mosch., Mur.-ac., Natr.-m., Selen., Sulph.; 2) Agn., Ant.,

Camph., Caust., Chin., Graph., Hyos., Lach., Magn.-aust., N.-mosch., Petr., Ser.

§ 3. Противъ *бесплодія у женщины*: 1) Borax, Calc., Cann., Merc., Phosph.; 2) Amm., Caust., Con., Graph., Natr.-m., Sulph., Sulph.-ac.; 3) Agn., Cic., Croc., Dulc., Ferr., Hyos., Merc., Natr., Plat., Ruta.

См. *Неправильное месячное очищеніе и Выкиды.*

§ 4. Если *совокупленіе* причиняетъ страданія, то, смотря по обстоятельствамъ, могутъ оказаться полезными: 1) Agar., Kal., Ser.; 2) Alum., Bor., Carb.-veg., Chin., Graph., Merc., Natr., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Selen., Staph.

Сравн. *Слабость, Приливы.*

Половое возбужденіе, болѣзненные его уклоненія.

§ 1. Средства: 1) Caust., Canth., Chin., Con., Lyc., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sulph., Thuj.; 2) Agn., Amb., Ars., Carb.-veg., Caust., Chin., Clem., Graph., Her., Ign., Kal., Lyc., Petr., Rhus., Ser., Staph.

§ 2. Средства, дѣйствующія на *женскіе второродные органы*: 1) Amb., Bell., Con., Croc., Ferr., Graph., Hyos., Ign., Kreos., Mosch., N.-mosch., N.-vom., Plat., Puls., Sabin., Sec., Ser., Sulph., Thuj.; 2) Acon., Alum., Ava., Aur., Calc., Carb.-veg., Cham., Chin., Coss., Kal., Lyc., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Rhus., Staph.

§ 3. При *слишкомъ возбужденномъ состояніи половой похоти*: 1) Canth., Chin., Magn.-arct., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Veratr.; 2) Ant., Aur., Calc., Cann., Graph., Hyos., Ign., Lach., Lyc., Merc., Mosch., Natr.-m., Natr., Op., Sabin., Sil., Stram.—Если это состояніе у *мужчины* доходитъ до *блужденства* (satyriasis): 1) Canth., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Hyos., Phosph., Stram., Veratr.—При *слишкомъ возбужденномъ состояніи у женщины*: 1) Hyos., Phosph., Stram., Veratr.; 2) Bell., Canth., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sulph.—При частыхъ болѣзненныхъ *эрекціяхъ* (priapismus): 1) Canth., Coeloc., Graph., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Rhus., Sil.; 2) Cann., Ign., Kal., Magn.-art., Op., Phos.-ac., Plat., Sulph., Thuj.

§ 4. Противъ *страсти къ онанизму*: 1) Calc., N.-vom., Sulph.;

2) Chin., Sassa., Merc., Natr.-m., Phosph.; 3) Ant., Carb.-veg., Plat., Puls. — Вредныя послѣдствія этой привычки, въ большей части случаевъ, требуютъ: Chin., N.-vom., Phos.-ac., Staph., когда эти послѣдствія обнаруживаются въ видѣ острой болѣзни. Если же онѣ представляются въ видѣ изнурительной и хронической болѣзни, то Calc., N.-vom., Phosph., по одному приему и въ большихъ промежуткахъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, могутъ быть полезны: 1) Сосс., Merc., Phosph.; 2) Ant., Carb.-veg., Plat., Puls.

§ 5. Противъ обильныхъ молочий: 1) Chin., Phos.-ac., Selen, Sulph.; 2) Carb.-veg., Caust., Con., Kal., Lyc., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phosph., Puls., Ser.; 3) Bell., Calc., Graph., Merc., Stann.— Если молочия будутъ слѣдствіемъ распухлости (онанизма или чрезмѣрнаго совокупленія): 1) Chin., Phos.-ac., Sulph.; 2) N.-vom., Phos., Puls., Ser. Противъ обильнаго отдѣленія сока предстательной железы: 1) Calc., Her., Phos.-ac., Ser., Sil., Sulph.; 2) Agn., Apac., Natr., Nitr.-ac., Puls., Selen., Staph., Thuj.

Поносъ, Diarrhoea.

§ 1. Средства вообще: 1) Ars., Cham., Chin., Dulc., Ferr., Ipec., Merc., Puls., Rhab., Sec., Sulph.; 2) Ant., Bry., Calc., Caps., Coloc., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhus; 3) Arn., Bell., Berb., Carb.-veg., Cupr., Graph., Her., Hyos., Lach., Magn., Nitr.-ac., N.-mosch., Petr., Ser., Veratr..

§ 2. Поносъ безъ боли требуетъ преимущественно: 1) Ferr.; 2) Chin., Cinn.—Сопровождающійся болями живота: Agn., Bry., Cham., Coloc., Her., Merc., Nitr.-ac., Puls., Rhab., Rhus, Sulph.— При поносѣ съ натугами: Ars., Caps., Her., Ipec., Lach., Merc., N.-vom., Rhab., Rhus, Sulph.—Со рвотою: Ars., Bell., Ipec., Cham., Coloc., Dulc., Ferr.. (Сравни. *Холера*).— Съ испражненіями непереваренной пищи (*Lienteria*): 1) Chin., Ferr., Oland.; 2) Agn., Bry., Calc., Cham., Dulc., Men., Phosph., Phosph.-ac., Sec.; 3) Ant., Arn., Asag., Bor., Con., Nitr.-ac., N.-vom., Rhab., Rhus, Sil., Sulph.— Съ уадкою слезъ (при изнурительномъ, коликативномъ поносѣ): 1) Agn., Chin., Ipec., Veratr.; 2) N.-mosch., Phosph., Phos.-ac., Sec.— Съ испражненіями осечеными, слизистыми (см. историческія средства).

Хромическіе поносы часто излечиваются посредствомъ: Calc., Chin., Ferr., Graph., Her., Lach., Nitr.-ac., Petr., Phosph.-ac., Ser., Sulph.—*Расположеніе* ежедневно имѣть по нѣскольکو невражненій *Вывожъ* часто излечивается посредствомъ: Calc., Graph., Kreos., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Sulph..

§ 3. При поносѣ *ослѣдствіе острой сими*, напр. кори, скарлатины, оспы и т. п.: Arg., Chin., Merc., Phosph.-ac., Puls., Sulph.;—*простуды*: 1) Bell., Bry., Cham., Dulc., Merc., N.-mosch., Veratr.; 2) Caust., Chin., Natr., N.-vom., Op., Puls., Sulph.;—*простуды въ лѣтнее время, осеннее и весеннее*: Arg., Dulc., Bry., Merc.;—*холодною лихорадка*: Arg., Carb.-veg., N.-mosch., Puls.;—*послѣ сильного душевнаго потрясенія, испуга, радости*: 1) Ant., Coff., Op., Veratr.; 2) Acon., Puls.;—*угнетающей страсти, печали*: Ign., Phos.-ac.;—*оторченія, досады, жѣлы*: Cham., Coloc.;—*разстройства желудка (indigestio) или неправильной діеты*: Ant., Coff., Ipec., Puls., N.-vom.;—*переполненія желудка роскошною и обильною пищею, похмѣльемъ кутежей*, съ похмѣлья: Carb.-veg., N.-vom.;—*послѣ молока*: Bry., Sulph., Lyc., Natr., Ser.;—*послѣ кислоты или овощей*: Arg., Lach., Puls.;—*вслѣдствіе неумѣреннаго употребленія врачебныхъ средствъ*:—*злоупотребленія ртути*: Her., Carb.-veg., Chin., Nitr.-ac.;—*магнезіи*: Puls., Rhab.;—*ревекя*: Cham., Merc., Puls., Coloc., N.-vom.;—*табаку*: Cham., Puls..

§ 4. Поносъ у людей *ослабленнаго или истощеннаго* требуетъ: Chin., Ferr., N.-mosch., Phosph., Phos.-ac., Sec.—*У чахоточнаго*: Calc., Chin., Ferr., Phosph.—*У золотушнаго*: Arg., Bar.-c., Calc., Chin., Dulc., Lyc., Ser., Sil., Sulph.—*У стариковъ*: Arg., Bry., Phosph., Sec.—*У беременнаго*: Ant., Dulc., Hyos., Lyc., Petr., Phosph., Ser., Sulph.—*У роженнаго*: Ant., Dulc., Hyos., Rhab.—*У дѣтей*: Ant., Cham., Ferr., Hyos., Ipec., Jalap., Magn., Merc., N.-mosch., Rhab., Sulph., Sulph.-ac.—*Во время прорѣзыванія зубовъ*: Arg., Calc., Cham., Coff., Ferr., Ipec., Magn., Merc., Sulph..

§ 5. По принадлежамъ назначаются:

АВРЕНІСУМ—если испражненія *воднисты или слизисты*, блѣловаты, зеленоваты или темны; отходятъ преимущественно по ночамъ, послѣ полнотчи или къ утру, или также послѣ жидк. и жѣлы, и сопровождаются рвѣемъ въ животѣ, жгучими или терзающими въ немъ болями и сильнымъ жаждою; притомъ: потеря але-

гита, тошнота и настоящая рвота; необыкновенное истощение и слабость; бессонница и тоска ночью; вздутость живота, холодъ конечностей; блѣдность лица и висковъ щекъ; впалые глаза съ синевой вокругъ нихъ.

СНАМОМІЛЛА—при *воднистомъ, желчномъ или слизистомъ* поносѣ испражнениями цвѣта *желтоватого, бѣловатого или зеленоватого*, похожими на *рубленая яйца*, или при испражненіи непереваренной пищею; ворчаніи и перекатываніи вѣтровъ въ животѣ, потерѣ аппетита, жаждѣ, обложенномъ языкѣ, герпящихъ боляхъ, или рѣзи въ животѣ, полнотѣ подѣ ложечкою, вздутости и твердости живота, частой отрыжкѣ, склонности ко рвотѣ и настоящей *рвотѣ желчною*, горечи во рту; равно при поносѣ у *дѣтей*, если замѣчаются: крикъ, безпокойство, безпокойное метаніе въ разныя стороны; постоянное желаніе, чтобъ его носили.

ОНІНА — если испражненія обильны, водянисты, *зеленоватого цвѣта* и перемежаны съ *несваренными веществами*; если они появляются преимущественно по *ночамъ*, или непосредственно *послѣ stools* и сопровождаются сильными, давящими, стягивающими и судорожными болями живота, или же не сопровождаются болями; при чувствѣ слабости въ животѣ, ворчаніи и перекатываніи вѣтровъ, отрыжкѣ, жгучихъ боляхъ въ заднемъ проходѣ, потерѣ аппетита, сильной жаждѣ и совершенномъ упадкѣ силъ.

ДУСАМАВА—при *жидкихъ, зеленоватыхъ или желтоватыхъ, слизистыхъ или желчныхъ* испражненіяхъ; *испражненіяхъ съ ночное время*, сопровождающихся коликою, рѣзью въ животѣ, преимущественно около пупка; притомъ потеря аппетита и *большая жажда*, при *тошнотѣ* или даже настоящей рвотѣ, блѣдности лица, большой усталости и безпокойствѣ.

ФИБРУМ—если поносъ имѣетъ мѣсто преимущественно *ночью* или послѣ *приманія пищи и милая*, и сопровождается легкими, *безболѣзненными испражненіями*; при испражненіи *водянистыхъ веществъ, перемежанныхъ съ непереваренною пищею*; если притомъ замѣчаются: блѣдность лица, истощеніе, твердость и вздутость живота, безъ вѣтровъ; жажда, потеря аппетита, *сильнящаяся чрезвычайнымъ голодомъ*; давящіе спазмы желудка; судорожныя боли въ *спинѣ и заднемъ проходѣ*.

ІРСОСУЛНА—при *воднистомъ или слизистомъ* поносѣ испраж-

неніями, *жовтотою*, бѣловатаго или зеленоватаго цвѣта, сопровождающемся тошнотою, наклонностью ко рвотѣ или настоящей рвотою, которою навзгается желтоватая, бѣловатая или зеленоватая слизь; терзающія боли или рѣзь въ животѣ, а также крикъ (у дѣтей) метаніе въ разныя стороны и безпокойство; при накопленіи слюны во рту; вздутости живота, слабости и постоянномъ желаніи лежать; блѣдности лица, съ синевой вокругъ глазъ; ознобѣ и раздражительности.

MERCURIUS — если испражненія большею частію являются *ночью*, *воднисты*, слизисты, пѣнисты, или даже *желчны* или *кроволисты* цвѣта зеленоватаго, бѣловатаго или желтоватаго, или если они похожи на рубленныя яйца и при этомъ замѣчаются: частый позывъ на нязъ, жженіе, зудъ и садненье въ заднемъ проходѣ; *слабныя* боли и *рѣзь въ животѣ*; изгага, тошнота и отрыжка; *подираніе по кожѣ* и *вздрагиваніе*; холодный потъ, трясеніе членовъ и большая усталость.

PULSATILLA — при *слизистомъ*, желчномъ или воднистомъ поносѣ, цвѣта *бѣловатаго*, желтоватаго или зеленоватаго, или же *перемѣчиваго*; испражненіяхъ кашецеобразныхъ; испражненіяхъ *волючихъ* и садненья въ заднемъ проходѣ, если, въ это же время, замѣчаются: горечь во рту; языкъ, обложенный бѣлою корою, тошнота, наклонность ко рвотѣ; неприятная отрыжка или настоящая слизистая и горькая рвота; боли и рѣзь въ животѣ, преимущественно ночью.

RIHAB. VAVAVUM — если испражненія издають кислый запахъ, если они жидки, слизисты, какъ-бы закисшія, и при этомъ замѣчаются: блѣдность лица, слюнотеченіе, боли живота, частый позывъ на нязъ съ натугами; или же при обильныхъ испражненіяхъ, сопровождающихся рвотою и необыкновенною слабостью; равно если поносъ у дѣтей сопровождается крикомъ и безпокойствомъ, если дѣти при этомъ бросаются въ разныя стороны и притягиваютъ ноги къ животу. (Если Rhab. окажется недостаточнымъ, то Spas. часто производитъ совершенное излеченіе, особенно когда боли очень сильны).

SERALE — если испражненія биваютъ безъ боли и большой при этомъ чувствуетъ большую слабость, или испражненія *воднисты*, желтоваты или зеленоваты и *извергаются быстро* и съ

большою смалою, иногда даже произвольно; при испражненіи непереваренной пищи; боли живота и рѣзы, особенно къ ночи; обложеніе языка слизью; травяной вкусъ, частое ворчаніе и перекачиваніе вѣтровъ и полнота живота.

SULPHUR—во многихъ, даже упорныхъ случаяхъ поноса, преимущественно, если испражненія обильны, совершаются по ночамъ и сопровождаются коликою, натугою на низъ, вздустіемъ живота, одышкою, ознобомъ и большою слабостью; при пѣнистыхъ или водянистыхъ, *слизистыхъ*, бѣловатого или *зеленоватого цвета* испражненіяхъ непереваренными, кислыми, даже кровянистыми веществами; если поносъ возвращается отъ малѣйшей простуды, при исхуданіи въ то же время.

§ 6. Изъ прочихъ средствъ, можно имѣть въ виду:

ANTIMONIUM—при водянистомъ поносѣ, совмѣстномъ съ разстройствомъ желудка; языкѣ, обложенномъ бѣлою слизью, потерѣ аппетита, отрыжкѣ и тошнотѣ.—**ВУЮНІА** назначается часто во время жаровъ, если поносъ есть слѣдствіе холоднаго питья, или огорченія, гнѣва, и Cham. оказалась неудовлетворительною противъ этого. **САЛСАВЛА**—часто послѣ Sulph. при хроническомъ поносѣ, особенно у золотушныхъ дѣтей, сопровождающемся слабостью, исхуданіемъ, блѣдностью лица и сильнымъ аппетитомъ. **САРСІСІМ**—противъ *слизистаго* поноса, сопровождающагося натугами и жжениемъ въ заднемъ проходѣ. **СОЛОСІНТІС**—противъ желчнаго или водянистаго поноса, сопровождающагося сильною судорожною коликою и особенно тогда, когда причину поноса составляютъ огорченіе или гнѣвъ и Cham. противъ этого состоянія оказалась неудовлетворительною. **НУХ ВОЖІСА**—при *обильныхъ*, но *трудныхъ* испражненіяхъ водянистыхъ, слизистыхъ или зеленоватыхъ, сопровождаемыхъ рѣзью въ животѣ и натугами. **РНОЗРНОВУС**—преимущественно противъ хроническаго поноса съ болѣзненными испражненіями и медленнымъ упадкомъ силъ. **РНОЗРНОВІ АСІДУМ**—противъ водянистаго или слизистаго поноса съ испражненіями непереваренной пищи или произвольными. **ВНУС**—противъ поноса, имѣющаго мѣсто преимущественно ночью и сопровождающагося терзаніемъ въ членахъ, болью головы и рѣзью въ животѣ, которыя усиливаются всякій разъ послѣ пріятія пищи. **УВВАТВІУМ**—при поносѣ *безболѣзненнымъ*, водянистомъ

или кашицеобразномъ, цвѣта зеленоватаго или коричневаго, сопровождаемомъ *перекатываніемъ*, чувствомъ голода съ животъ и большею или меньшею слабостію.

§ 7. Вообще: При *кровянистыхъ* испражненіяхъ: 1) Ars., Canth., Chin., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Sulph.; 2) Arn., Asar., Bry., Calc., Caps., Carb.-veg., Dros., Ferr., Her., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sil., Sulph.-ac.—При *кашицеобразномъ*: 1) Ant., Chin., Lach., Phos.-ac., Rhab., Rhod., Sil., Sulph.; 2) Bell., Calc., Cin., Mez., Natr., Phosph.—При *моевидныхъ*: 1) Arn., Canth., Lach., Merc., Sil.; 2) Bell., Calc., Kal., Puls., Sep., Sulph.—При *мыльныхъ*: 1) Ars., Carb.-veg., Chin., N.-mosch., N.-vom., Sulph.; 2) Coccul., Graph., Ipec., Nitr.-ac., Sec., Sep.—въ видѣ *охлажденія*: 1) Ars., Veratr.; 2) Ipec.—*железныхъ*: 1) Cham., Chin., Merc., Phosph., Sulph.; 2) Ars., Cin., Coloc., Dulc., Ipec., N.-vom., Veratr. (Сравни. *зеленія* и *желтія*). въ видѣ *рубастаго* *лица*: 1) Cham., Merc., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Lach., N.-mosch., Sulph.-ac., Viol.-tric.; 3) Ipec., Magn.—*железныхъ*: 1) Ars., Chin., Coccul., Dulc., Ipec., Petr., Rhus; 2) Calc., Cham., Coloc., Merc., Petr.—*стрихъ*, цвѣта *пчельнаго*: Dig., Merc., Phos.-ac. (Сравни. *бѣловатія*).—*зеленыхъ*: 1) Cham., Merc., Puls., Phosph., Sulph.; 2) Ars., Dulc., Ipec., Sep., Stann.—*урзано цвѣта*: Ars., Cham., Cin., Merc., Mur.-ac., Rhab.—*острихъ*, *разпадающимъ*: 1) Ars., Cham., Chin., Ferr., Merc., N.-vom., Puls., Sulph., Veratr.; 2) Ant., Dulc., Graph., Ign., Kal., Lach., Phosph.—*мылопазнующимъ*: 1) Calc., Graph., Sep., Magn.-carb., Merc., Rhab., Sulph.; 2) Cham., Natr., Sep.—*тенистыхъ*: 1) Chin., Coloc., Rhus; 2) Calc., Magn.-c., Merc., Sulph.—*слизистыхъ*: 1) Asar., Bell., Borax, Caps., Cham., Chin., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-veg., Coloc., Graph., Hell., Ign., Ipec., Petr., Phos.-ac., Rhab, Rhus, Ruta, Sep., Sec., Tart.—*черныхъ*: 1) Ars., Camph., Chin., Ipec., Squill., Sulph.-ac., Veratr.; 2) Cupr., Merc., Stram., Sulph., Sulph.-ac.—очень *вонючихъ*, гнилаго запаха: 1) Ars., Carb.-veg., Chin., Puls., Sil., Sulph.; 2) Ars., Calc., Cham., Guaj., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Sep., Squill., Sulph.-ac.—состоящихъ изъ *непереваренной пищи*: 1) Chin., Phos.-ac. 2) Arn., Ars., Ferr., Oleand.; 3) Asar., Bry., Calc., Cham., Con., Lach., Merc., N.-vom., Sulph.—*непроизвольныхъ*: 1) Arn., Bell., Chin., Hyos., Op., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sec., Veratr.; 2) Ars., Calc., Carb.-veg.,

Cin., Mur.-ac., Natr.-m., Sulph. — *воднистая*: 1) Cham., Chin., Ferr., Hell., Ipec., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Puls., Sec.; 2) Acon., Ars., Calc., Dig., Natr.-m., Petr., Sulph., Veratr. — *блуждающая*: 1) Calc., Cham., Chin., Dig., Hep., Merc., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Ars., Caust., Cin., Ign., Lach., N.-vom., Phosph.-ac., Spong., Veratr.

См. Холера, Рвота, Гастрическія страданія, Кровавый потъ, Глистная болѣзнь.

ПОТЬ БОЛѢВЕННЫЙ, НОЧНОЙ ПОТЬ, Sudor posturgus.

§ 1. Это очень важный симптомъ, которому соответствуютъ средства: 1) Bell., Bry., Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Cham., Chin., Graph., Hep., Kal., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Selen., Sep., Sulph., Veratr.; 2) Acon., Ars., Borax, Coct., Coff., Guaj., Ign., Lyc., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sil., Stann., Staph., Thuja.; 3) Amb., Amm.-m., Amm., Baryt., Caps., Coloc., Con., Dros., Dulc., Ferr., Hell., Hyos., Lach., Magn.-arct., Magn.-aust., Nitr., Rhab., Rhod., Spig., Spong., Sulph.-ac., Tart..

§ 2. Изъ нихъ: при обильномъ ночномъ потѣ: 1) Amm.-m., Arg., Baryt., Bry., Calc., Carb.-an., Caust., Chin., Graph., Ipec., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Sil., Stann., Staph., Sulph.; 2) Alum., Amb., Amm., Anac., Arn., Bell., Canth., Carb.-veg., Dig., Dros., Dulc., Ferr., Hep., Lach., Magn.-arct., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr., N.-vom., Sabin., Samb., Sep., Veratr.—Если потъ появляется уже съ вечера въ постели или при засыпаніи: Ars., Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Cham., Con., Hep., Magn.-c., Merc., Mur.-ac., Op., Phosph., Rhus, Veratr.—При утреннемъ потѣ: 1) Bry., Calc., Caust., Chin., Con., Ferr., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Sil., Stann., Sulph.; 2) Amm., Amm.-m., Arg., Canth., Carb.-an., Carb.-veg., Guaj., Hep., Hell., Jod., Kal., Magn.-c., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Phos.-ac., Veratr.—Если потъ появляется также днемъ отъ малѣйшаго напряженія (ходьбы, работы руками и т. д.): 1) Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Chin., Hep., Kal., Natr., Natr.-m., Puls., Selen., Sep., Sulph., Veratr.; 2) Amm., Avar., Bell., Bry., Ferr., Graph., Lach., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Phosph., Phos.-ac., Rhod., Rhus, Spig., Staph., Sulph.-ac., Zinc.—Если онъ возбуждается днемъ даже при покоѣ (въ сидячемъ положеніи): 1) Anac., Rhus, Sep., Sulph.; 2)

Asar., Calc., Con., Ferr., Phos.-ac., Spong., Staph., Sulph.-ac.—
Преимущественно при *умощенныхъ замкнутыхъ* (чтенія, письма, раз-
мышления, серьезныхъ бесѣдахъ): Borax, Graph., Herp., Serp., Sulph.

§ 3. Относительно *мыслимаго пота*: Если онъ появляется только
на одной половинѣ тела: Amb., Baryt., Bry., Cham., Ign., N.-vom.,
Puls., Rhab., Rhus, Spig., Sulph.;—*потѣть только голова* 1) Bell,
Bry., Calc., Cham., Chin., Merc., Puls., Sil., Veratr.; 2) Graph.,
Kal., N.-vom., Op., Phosph., Rhab., Rhus, Sassa., Staph., Val.; 3)
Samp., Dulc., Guaj., Herp., Magn.-m., Sabad., Serp., Spig.;—*только*
лица: 1) Carb.-veg., Ign., Puls., Rhus, Samb., Spong., Veratr.; 2)
Alum., Bell., Borax, Carb.-an., Chin., Cocc., Coff., Dros., Dulc.,
Magn.-arct., Merc., Phosph., Rhab., Ruta, Serp., Sil., Stram., Sulph.;
— *подъ носомъ или вокругъ него*: Bell., N.-vom., Rhab.;—*только*
шея и затылокъ: 1) Bell., Nitr.-ac., Sulph.; 2) Ars., Kal., Mang.,
N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Stann.;—*только стина*: 1) Chin., Petr.,
Phos.-ac.; 2) Ars., Calc., Dulc., Guaj., Herp., Lach., Natr., Serp.,
Sil., Veratr.;—*одна грудь*: Agar., Arn., Canth., Chin., Cocc., Graph.,
Herp., Lyc., Nitr., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Selen., Serp., Sil.;—
живота: Amb., Anac., Arg., Canth., Dros., Phosph., Plumb., Staph.;
—*половая часть*: 1) Aur., Herp., Serp., Sil., Sulph., Thuj.; 2) Amm.,
Baryt., Bell., Canth., Con., Ign., Magn.-m., Merc., N.-vom., Phos.-
ac., Rhod., Selen., Staph.;—*только подкрыльцовая впадина*: 1) Herp.,
Kal., Lach., Nitr.-ac., Petr., Serp., Sulph.; 2) Bry., Caps., Carb.-an.,
Dulc., Rhod., Selen., Squill., Thuj., Zinc.;—*только руки*: 1) Calc.,
Con., Herp., Serp., Sil., Sulph.; 2) Baryt., Carb.-veg., Dulc., Ign.,
Jod., Led., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Puls., Rhab., Thuj., Zinc.;—
ноги: 1) Calc., Carb.-veg., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Serp., Sil., Sulph.;
2) Amm., Baryt., Cupr., Dros., Graph., Lach., Magn.-m., Natr.-m.,
Petr., Phos.-ac., Puls., Sabad., Sabin., Thuj., Zinc. и если этотъ
потъ очень вонючъ: Baryt., Graph., Kal., Nitr.-ac., Serp., Sil.,
Zinc.

§ 4. *Измурающий*, ослабляющій потъ требуетъ: 1) Ars., Carb.-
an., Chin., Ferr., Natr.-m., Nitr., Phosph., Serp., Sil., Stann., Sulph.;
2) Calc., Cocc., Jod., Lyc., Merc., N.-vom., Veratr.—Сильный потъ,
но не облегчающій страданій, напр. болѣй въ членахъ при катар-
ральныхъ или ревматическихъ лихорадкахъ требуетъ: Chin.,
Dulc., Lach., Lyc., Merc., Nitr., Serp.—*Маслянистой, жирной*

потъ: Bry., Chin., Magn.-с., Merc., Stram. — *Горькій*: Bell., Bry., Camph., Cham., Lach., Op., Phosph., Sabad., Stann. — *Холодный*: 1) Ars., Camph., Carb.-veg., Chin., Cic., Hyos., Ipec., Secl., Veratr.; 2) Aur., Cupr., Ferr., Hep., Ign., Lach., Magn.-arct., N.-vom., Petr.-Puls., Sabad., Sep., Staph., Stram., Tart. — *Клейкій*: Acon., Anac., Ars., Bry., Calc., Camph., Carb.-an., Cham., Chin., Ferr., Hep., Lyc., Merc., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Plumb., Sec., Spig., Veratr. — *Окрашивающій бѣлье*: Ars., Bell., Carb.-an., Graph., Lach., Merc., Rhab., Selen..

§ 5. *Потъ помочій* требуетъ: 1) Amm.-m., Baryt., Dulc., Graph., Hep., Led., Lyc., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Rhus, Selen., Sep., Sil., Staph., Sulph.; 2) Bell., Canth., Carb.-an., Ferr., Kal., Magn.-с., Merc., Puls., Rhod., Spig., Veratr.; — *кисло запаха*: 1) Ars., Asar., Bry., Lyc., Nitr.-ac., Sep., Sil., Sulph., Veratr.; 2) Arn., Bell., Carb.-veg., Cham., Ferr., Hep., Ipec., Kal., Led., Magn.-с., Merc., N.-vom., Rhus; — *юрьковатая запаха*: Veratr.; — *запахъ крови*: Lyc.; — *прожлязо*: Bell., Magn.-arct., Sulph.; — *нилая*: Carb.-veg., N.-vom., Staph., Stram.; — *острая*: Rhus.

ПОТЬ КРОВАВЫЙ И КРОВЯНИСТЫЯ ВЫПОТѢНІЯ.

Составляютъ симптомъ, сопутствующій другимъ болѣзнямъ, и указываютъ на: 1) Arn., Calc., N.-vom.; 2) Cham., Clem., Coccul., Crotal., Lach., N.-mosch..

ПРИЛИВЫ КРОВИ вообще, Congestiones.

Средства противъ нихъ: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Chin., Ferr., Hyos., Merc., N.-vom., Op., Phos., Puls., Sil., Sulph.; 2) Alum., Amm., Asa., Aur., Calc., Carb.-veg., Coff., Graph., Hep., Kal., Lyc., Merc., Mosch., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Plumb., Rhus, Sep., Spong., Stram., Sulph.-ac., Thuj., Veratr..

См. *Приметы крови къ брюшнымъ органамъ, къ груди, голове.*

ПРИЛИВЫ КРОВИ къ брюшнымъ внутренностямъ, Congestiones abdominales.

Средства вообще: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Ars., Caps., Carb.-v.; 3) Bell., Bry., Cham., Merc., Puls., Rhus, Veratr..

АВВЕНІСУМ соотвѣтствуетъ случаямъ, гдѣ замѣчаются: частыя, малоколичественныя, слизистыя или водянистыя испражненія и большая слабость.

NUX-VOMICA — для людей, ведущихъ сидячій образъ жизни и занимающихся умственными работами, а въ особенности, когда имѣются: запоръ, твердая, трудная испражненія, боли живота, какъ-будто чресла и спина перебиты и безсильны; твердость и напряженность живота.

CARPISUM — людямъ флегматическимъ, лѣнивымъ и нечувствительнымъ, а именно когда замѣчаются: частыя, малоколичественныя, водянистыя или слизистыя испражненія на низъ.

САВВО-ВЕГЕТАВИЛІС — при накопленіи вѣтровъ, вялости кишечнаго канала, запорѣ, дурномъ пищевареніи и потерѣ аппетита.

SULPHUR — преимущественно ипохондрикамъ въ большей части упорныхъ случаевъ, въ особенности послѣ употребленія *N. vom.*

См. Геморрой.

Приливы, напоръ крови въ головѣ, Congestiones ad caput.

§ 1. Средства вообще: 1) *Acon.*, *Arn.*, *Bell.*, *Bry.*, *Coff.*, *Merc.*, *N. vom.*, *Op.*, *Puls.*, *Phos.*, *Veratr.*; 2) *Cham.*, *Chin.*, *Dulc.*, *Ign.*, *Sil.*, *Sulph.*; 3) *Aur.*, *Cann.*, *Graph.*

§ 2. У особъ, *преданныхъ спиртнымъ напиткамъ*, должно имѣть въ виду преимущественно: 1) *N. vom.*, *Puls.*, или также 2) *Op.*, *Calc.* и *Sulph.* — У особъ, *ведущихъ сидячій образъ жизни*: *Acon.*, *Bell.*, или *N. vom.* — У дѣвицъ, *въ эпоху формировація* *Acon.*, *Bell.*, *Puls.* — У дѣтей, во время прорѣзыванія зубовъ: *Coff.*, *Cham.*.

Если приливъ крови происходитъ отъ *потрясенія души*: отъ *внезапной сильной радости*: *Coff.*, *Op.*; — отъ *страха или испуга*: *Op.*; — отъ *явля*: *Cham.*, *Bry.*, *N. vom.*; — *скрытаго опорченія или досады* *Ign.* — При напорѣ крови послѣ *паденія, удара или сильнаго сотрясенія*: *Arn.*, *Cic.*, *Merc.*; — послѣ *ослабляющей потери*: *Chin.*, *Calc.*, *Sulph.*, *N. vom.*, *Veratr.*; — *простуды*: *Dulc.*; — *поднятія жажестей*: *Rhus*, *Calc.*; — *запора на низъ*: *Bry.*, *N. vom.*, *Op.*, *Merc.*, *Puls.* — *Хроническое расположеніе къ приливамъ крови* требуетъ: *Calc.*, *Hep.*, *Sil.*, *Sulph.*

§ 3. По принадлежкамъ назначаются:

АСОНИТУМ — при біеніи и чувствѣ полноты въ головѣ, частомъ *головокруженіи*, преимущественно при *нагибаніи*; оцущеніи, какъ-будто голова лопається, особенно во лбу, надъ глазами, которое сильнѣе при *нагибаніи*; *сверканіе и темнота предъ глазами*; *жужжаніе* въ ушахъ; при этомъ: частые припадки обморока, сердцебіеніе, или сильныя, жгучія боли во всей головѣ, ижево во лбу, съ краснотой и одутлостію лица, краснотой глазъ, потерев терпѣнія до того, что больной приходитъ въ бѣшенство. (Послѣ Асоп. часто прилична Bell).

АВНІСА — при жарѣ въ головѣ, совмѣстно съ холодомъ и ознобомъ въ прочихъ частяхъ тѣла; при этомъ: тупое давленіе въ мозгу, или жгучее біеніе, шумъ въ ушахъ и головокруженіе съ потемнѣніемъ зрѣнія преимущественно при вставаніи.

ВЕЛЛАДОННА — при сильномъ давленіи во лбу, или бьющихъ жгучихъ болахъ въ одной половинѣ головы; усвленіи болей на *всякомъ шагу*, при *всякомъ движеніи, непрямомъ положеніи, малѣйшемъ шумѣ* и нѣскольکو яркомъ свѣтѣ, что сопровождается *краснотой и одутлостію лица, краснотой глазъ, сверканіемъ и темнотой передъ глазами, шумомъ въ ушахъ, двойнымъ зрѣніемъ сомнѣеостію*, или когда при этомъ замѣчаются: тупыя, давящія боли въ глубинѣ мозга, сопровождающіяся блѣднымъ, болѣзненнымъ видомъ лица, потерей самосознанія, бредомъ и бормотаньемъ, или если боль подымается послѣ стола и ей сопутствуютъ: усталость, сонливость, болѣзненная ооченѣлость затылка, тяжесть въ языкѣ и другіе симптомы, предвѣщающіе припадокъ апоплексическій. (Очень часто умѣстна послѣ Асоп.).

ВКУОНИА — при болѣзненномъ сдавливаніи обѣихъ половинокъ головы, или оцущеніи, какъ-будто во время *нагибанія* все стремится выйти черезъ лобъ; при кровотеченіи изъ носу, не приносящемъ однакожь облегченія; слезотеченія и жженія въ глазахъ; *запорѣ* на низъ.

СОФРЕА — когда замѣчаются: живость и чрезмѣрно возбужденное состояніе духа; бессонница, большая тяжесть въ головѣ; усиливашійся *напоръ* крови во время разговора; живость и краснота глазъ.

МЕРСУРИУС — при чувствѣ полноты въ головѣ, какъ-будто лобъ трескается, или какъ-будто голова стянута повязкою; равно

когда замѣчаются: ухудшеніе по ночамъ, которому сопутствуютъ жгучія, терзающія, сверлящія или колючія боли и легко возбуждаемое, частое и обильное отдѣленіе пота. (Часто умѣстенъ послѣ Bell. или Op.).

Nux-vomica — при возвышенной нервнои раздражительности, съ болѣзненнымъ ощущеніемъ въ мозгу при хожденіи и движеніи головы; давленіи въ вискахъ, которое не уменьшается ни при лежачемъ положеніи, ни при вставаніи; при этомъ: мутность глазъ и потребность закрывать ихъ, безъ позова на сонъ; большая тяжесть въ головѣ, особенно при движеніи глазъ, съ ощущеніемъ, при размышленіи, какъ-будто голова лопается; ухудшеніе по утрамъ, на открытомъ воздухѣ, или послѣ стола, и преимущественно послѣ употребленія кофе.

Orium — при очень сильномъ приливѣ, съ жестокими, терзающими болями; давленіи во лбу внутри наружу; біеніи жилъ на вискахъ; при этомъ невѣрный взглядъ, большая жажда; сухость во рту, кашель отрыжка, позывъ на рвоту, или же настоящая рвота.

Pulsatilla — при мучительной, жестокой, давящей боли въ одной половинѣ головы; боль начинается съ затылка, оттуда распространяется къ корню носа, или на оборотъ; уменьшеніе боли, какъ скоро больной повяжетъ голову платкомъ или будетъ давить на нее, или при хожденіи; ухудшеніе при сидячемъ положеніи; тяжесть головы; блѣдность лица съ головокруженіемъ пассивное расположеніе духа, дрожь, тоска; холодный, флегматическій темпераментъ.

Rhus — если приливъ крови сопровождается жгучими, бьющими болями, чувствомъ полноты въ головѣ, давящею тяжестью, или свербеніемъ, колебаніемъ и качаніемъ въ мозгу, и вообще тогда, когда боли появляются послѣ стола.

Uvaeursi: давящіе удары, или боли въ одной половинѣ головы, или ощущеніе, какъ-будто мозгъ разваливается; при стягивающей боли, съ ощущеніемъ стягиванія въ горлѣ; притомъ: болѣзненная ооченѣлость въ затылкѣ, обильное отдѣленіе воднистой мочи, тошнота, рвота.

§ 4. Вообще можно имѣть въ виду: Если приливъ сопровождается головокруженіемъ: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Calc., Caust., Cic., Cop., Lach., Natr.-m., Nitg.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus,

Сер., Sil., Sulph.; 2) Amm., Baryt., Brus., Cann., Carb.-ан., Cham., Chin., Coccul., Dig., Нер., Ign., Kal., Laur., Lyc., Petr., Phos.-ас., Spig., Stram., Sulph.-ас., Tart., Veratr. — Если оно такъ жестоко, что больной *падаеть*: 1) Bell., Coccul., Puls., Rhus, Sil.; 2) Acon., Chin., Cic., Con., Graph., Lach., Phos.-ас., Rhus, Sulph., Zinc.; — если *падаетъ лицо* *спизъ*: 1) Cic., Graph., Sil.; 2) Cupr., Magn.-с., Magn.-м., Mang., Natr.-м., Phos.-ас., Rhus, Sabin., Sassaп., Sulph.; — на *спину*: 1) Chin., Phos.-ас.; 2) Kal., Rhod., Sassaп.; — на *боку*: 1) Cann., Sulph.; 2) Acon., Lach., Sil., Zinc.; — на *левой боку*: 1) Lach., Zinc.; 2) Dros., Mez., N.-mosch., Sil.; — на *правой*: Acon., Ferr., Sabad., Sil. — При *сильномъ жарѣ* въ головѣ: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Carb.-veg., Chin., Lach., Merc., Natr., Natr.-м., Nitr.-ас., Сер., Sil., Sulph. — При *полюетъ*: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Caps., Chin., Graph., Merc., Phosph., Sil., Sulph.; 2) Amm., Carb.-veg., Chin., Coff., Petr., Spong., Sulph.-ас. — При *большой слабости* въ головѣ: 1) Arn., Arg., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Merc., Natr.-м., N.-vom., Puls., Rhus, Сер., Sil., Stann., Sulph.; 2) Acon., Amm., Amm.-м., Camph., Carb.-ан., Cham., Con., Dulc., Hell., Kal., Lach., Laur., Lyc., Magn.-с., Magn.-м., N.-mosch., Oleand., Op., Petr., Phosph., Plumb., Staph. — При *сжиманіи* головы: 1) Anac., Bell., Calc., Carb.-veg., Chin., Hell., Magn.-аust., Merc., Natr.-м., N.-vom., Op., Petr., Phos.-ас., Rhus, Сер., Sil., Staph., Sulph.; 2) Acon., Arg., Bell., Carb.-ан., Cic., Coccul., Ferr., Graph., Hell., Ign., Kal., Magn.-с., Natr., N.-mosch., Puls., Spig., Staph., Stram., Thuj., Zinc. — При *отуманеніи*, помраченіи чувствъ: 1) Acon., Agar., Bell., Bry., Cic., Hell., Hyos., Laur., Natr.-м., Op., Stram., Veratr.; 2) Calc., Cann., Carb.-veg., Caust., Cham., Coccul., Con., Kal., Magn.-м., N.-vom., Phos.-ас., Puls., Rhab., Rhus, Sil. — При *одуртении* и *потери разсудка*: 1) Arn., Bell., Hell., Hyos., Laur., N.-vom., Op., Phosph., Phos.-ас., Plat., Rhus, Stram., Veratr.; 2) Arg., Bry., Calc., Camph., Cic., Con., Cupr., Laur., Natr.-м., N.-mosch., Puls., Rhab., Sabad., Sabin., Stann., Staph., Verb. — При *совершенной потери самосознаніи*: 1) Arn., Bell., Hyos., N.-vom., Op., Phos.-ас., Plat., Rhus, Stram., Veratr.; 2) Baryt., Camph., Cic., Cupr., Hell., Kal., Mur.-ас., Natr.-м., N.-mosch., Phosph., Puls.

См. Воли головы, Апатексія, Прямые кроки вообще.

Приливы, напоръ крови въ груди, Congestiones ad pectus.

Средства вообще: Acon., Aug., Bell., Chin., Merc., N.-vom., Phos., Spong., Sulph.

Асонитум — при ощущеніи сильнаго давленія, сердцебиеніи, короткомъ дыханіи, тоскѣ, короткомъ и сухомъ кашлѣ, мѣшающемъ спать; необыкновенномъ жарѣ и жаждѣ.

Аурум — при большой тоскѣ, синеватомъ цвѣтѣ лица, сердцебиеніи, тоскливости, или настоящихъ припадкахъ задушенія, съ чувствомъ, какъ-будто грудь станута, причемъ больной падаетъ безсознательно.

Вилладонна — при большомъ безпокойствѣ съ ощущеніемъ биенія въ груди, *сердцебиеніи*, которое отдается въ голову; тоскливости, одышкѣ и короткомъ дыханіи; короткомъ кашлѣ, мѣшающемъ спать; внутреннемъ жарѣ и жаждѣ.

Спина — гдѣ причину составляетъ ослабляющая потеря севова; при *сердцебиеніи*, одышкѣ и сильной тоскливости, или когда дыханіе затрудняется при низкомъ положеніи головы.

Мевсуриус — при тоскливомъ сжиманіи въ груди, одышкѣ и чувствѣ необходимости вдохнуть глубже; при жарѣ и жженіи въ груди, сердцебиеніи и кашлѣ съ мокротою.

Нух vomica — при жарѣ и жженіи въ груди, преимущественно по ночамъ; безпокойномъ металіи въ равныя стороны, тоскѣ и бессонницѣ; напрягающемъ давленіи, какъ-бы отъ какой тяжести, чувствуемомъ на воздухѣ; одышкѣ и чувствѣ неловкости, причиняемой платьемъ вокругъ груди.

Рноэрновос — при чувствѣ сильнаго сжиманія, тяжести, напряженія и полноты въ груди; сердцебиеніи, тоскѣ и ощущеніи жара, восходящаго до гортани.

Спонгия — при волненіи крови послѣ малѣйшаго напряженія или движенія, чувствѣ сжиманія въ груди, тоскѣ, тошнотѣ и слабости, доходящей до обморока.

Сулфур — при волненіи крови въ груди, чувствѣ неловкости, обморокѣ, дрожаніи рукъ, сердцебиеніи, тяжести, полнотѣ и давленіи груди, что въ особенноти ощущается во время кашля; при стѣсненномъ и сжатомъ дыханіи, преимущественно ночью въ постели.

Приступы болей, невралгін, артритическія и ревматическія боли вообще.

§ 1. Средства при недугахъ, отличающихся чрезвычайною болью, вообще: 1) Acon., Arn., Arg., Bry., Cham., Chin., Coff., Her., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Veratr.; 2) Bell., Caps., Colch., Coloc., Con., Kal., Magn.-c., Mez., Phosph., Ruta, Sep., Spig., Stann., Staph., Thuj., Val., Verb.; 3) Agn., Alum., Anac., Ant., Arg., Ass., Asar., Aur., Baryt., Calc., Canth., Caust., Cocc., Ferr., Graph., Hyos., Led., Magn.-aust., Natr., Natr.-m., Phosph., Rhod., Sabin., Sassa., Spong., Stront., Sulph., Zinc..

§ 2. Если эти боли обнаруживаются у раздражительныхъ, нервныхъ субъектовъ: 1) Acon., Ars., Bry., Cham., Chin., Coff., Her., Ign., Merc., N.-vom., Val., Veratr.; 2) Asar., Aur., Canth., Cocc., Ferr., Magn.-arct., Phosph., Puls., Rhus., Sil., Staph.;—у страдающихъ ревматизмомъ: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Cham., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus; 2) Ant., Ars., Carb.-veg., Caust., Chin., Colch., Ferr., Ign., Lach., Lyc., Rhod., Ruta, Sassa., Sep., Sulph., Thuj., Veratr.;—ластомою: 1) Acon., Bell., Bry., Colch., Kal.-c., Merc., Phosph., Rhod., Rhus, Sabin., Spong., Staph.; 2) Agn., Arg., Baryt., Calc., Caust., Chin., Cocc., Ferr., Graph., N.-vom., Puls., Sassa., Sep., Stann., Sulph., Thuj.;—употреблявшихъ много ртути: 1) Arn., Carb.-veg., Cham., Chin., Her., Puls.; 2) Arg., Bell., Dulc., Calc., Guaj., Lach., Lyc., Mez., Phos.-ac., Sassa., Sulph.;—много кофе: 1) Cham., Coff., Ign., N.-vom.; 2) Bell., Canth., Caust., Cocc., Her., Merc., Puls., Sulph.;—у палочковидныхъ: 1) Acon., Arn., Bell., Ferr., Hyos., Merc., Natr.-m., N.-vom., Puls.; 2) Aur., Bry., Calc., Chin., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sulph..

§ 3. По припадкамъ назначаются:

АСОНИТУМЪ—при невыносимыхъ боляхъ, являющихся преимущественно ночью, свойства колеблющего или бьющаго; также когда замѣчаются: лихорадочный жаръ, вздохи, жалобы, неутѣшная тоска и страхъ смерти; жажда, краснота щекъ, малый и ускоренный пульсъ; большая чувствительность всей нервной системы, особенно зрительнаго и слуховаго органовъ; бессонница и беспокойное метаніе въ разныя стороны.

АВНІСА—при чувствахъ свербенія въ страдающей части, без-

покойствѣ, заставляющемъ больного часто перемѣнять свое мѣсто, ухудшеніи страданій при малѣйшемъ напряженіи и даже отъ малѣйшаго шума.

Аввѣнисум — если боли жгучія или терзающія и появляются преимущественно ночью, даже во время сна, или если онѣ такъ невыносимы, что доводятъ больного до отчаянія; если въ то же время замѣчаются: большая тоска, необыкновенная слабость и необходимость лежать; періодичность приступовъ; чувство холода въ страдающихъ частяхъ; ухудшеніе при покоѣ послѣ работы, или вечеромъ въ постели, или послѣ стола; облегченіе отъ приложенія наружной теплоты.

Belladonna — при колючихъ, жгучихъ боляхъ, которыя усиливаются при всякомъ движеніи, нѣсколько яркомъ свѣтѣ и всякомъ шумѣ, а также отъ малѣйшаго сотрясенія, даже отъ ходьбы окружающихъ лицъ; при ежедневныхъ приступахъ боли послѣ обѣда до полуночи; ухудшеніи отъ сквознаго вѣтра, постельной теплоты.

Вутона — при давящихъ или натягивающихъ и терзающихъ, колючихъ боляхъ, какъ отъ подкожнаго нарыва; усиленіе боли отъ движенія; облегченіе иногда отъ движенія страдающей части; при раздражительномъ и всплывчивомъ нравѣ; при расположеніи къ ревматическимъ недугамъ.

Снамомилла — при подергивающихъ, терзающихъ и бьющихъ боляхъ съ ощущеніемъ оцѣпенѣнія въ страдающей части; необыкновенной чувствительности къ малѣйшей боли; потерѣ силъ до обморока отъ болей; одутловомъ лицѣ, или краснотѣ одной щеки съ блѣдностью другой; горячемъ потѣ головы, потѣ въ волосахъ, безпокойствѣ, крикѣ, плачѣ, раздражительномъ и сварливомъ расположеніи духа.

Сина — при необыкновенной чувствительности кожи; усиленіи болей при малѣйшемъ прикосновеніи; ощущеніи оцѣпенѣнія и параличной слабости въ страдающей части; также, когда замѣчаются: давящія боли, дурное расположеніе духа, недовольный характеръ, чувствительный темпераментъ, блѣдность лица, на которомъ часто появляется летучая краснота и теплота; большая болтливость или безпокойство ночью. (Это средство можно употребить послѣ *Coff.*).

С о р г е а — при невыносимыхъ боляхъ, плаксивомъ, крайне раздражительномъ расположеніи духа; безпокойствѣ, метаніи въ разныя стороны, крикѣ и сильной тоскѣ; чувствѣ холода на воздухѣ; сильной чувствительности всѣхъ органовъ и особенно слухового, причѣмъ больной не переноситъ ни малѣйшаго шума. (Послѣ Соф. иногда приличны: N.-vom., Ign., Chin. или Puls.).

Н е р а в — при боляхъ какъ отъ ссадины, или какъ отъ подкожнаго нарыва, усиливающихся отъ самаго легкаго прикосновенія; припадки обморока при малѣйшей боли, преимущественно вечеромъ.

И г н а т і а — при терзающихъ боляхъ, давленіи снаружи, или колючемъ сверленіи; блѣдности лица; водянистой мочѣ; минутномъ облегченіи при перемѣнѣ положенія; возвратѣ приступовъ послѣ стола, вечеромъ и въ постели; при перемѣнчивомъ расположеніи и пугливости, или печальномъ, молчаливомъ расположеніи духа; кроткомъ, чувствительномъ темпераментѣ.

М е в с у р і у с — расположеннымъ къ ревматизму, у которыхъ замѣчаются: ночные поты, терзающія и колющія боли; ухудшеніе ночью, чувство холода въ страждущей части, большая слабость и волненіе крови при малѣйшемъ напряженіи тѣла; блѣдность или летучая краснота лица, красныя пятна на щекахъ.

Н у х в о м і с а — для субъектовъ, преданныхъ спиртнымъ напиткамъ или вофе, живаго и холерическаго темперамента, съ краснымъ лицомъ, также для тѣхъ, кои ведутъ сидячій образъ жизни; при потягивающихъ и подергивающихъ боляхъ, появляющихся или усиливающихся по утрамъ въ постели, послѣ стола, по вечерамъ, на открытомъ и холодномъ воздухѣ, при чтеніи или при размышленіи.

Р у л в а т і л л а — при терзающихъ или колющихъ, бьющихъ боляхъ, занимающихъ одну сторону и усиливающихся по вечерамъ въ постели, или утромъ при вставаніи, а также при повоѣ и въ сидячемъ положеніи, а уменьшающихся на открытомъ воздухѣ; преимущественно для женщинъ и людей кроткаго, робкаго и спокойнаго нрава, съ блѣднымъ цвѣтомъ лица и расположеніемъ къ злбости.

В н и в — при свербящихъ, жгучихъ боляхъ, потягивающемъ ко-

лотѣ; болякъ, какъ-бы отъ подкожнаго нарыва; усиленіи болей при покоѣ и на воздухѣ, улучшеніи при движеніи и отъ теплоты; при спокойномъ темпераментѣ, расположеніи къ меланхоліи и принадлежатъ тоски.

Въ обратномъ — при сильныхъ боляхъ, на короткое время вызывающихъ бѣшенство и бредъ; боляхъ съ слабостью, доводящей до обморока и холоднаго пота, и если при этомъ замѣчаются общій холодъ тѣла и жажда; при ухудшеніи отъ постельной теплоты и ночью подъ утро; улучшеніе при вставаніи и хожденіи.

§ 4. Должно имѣть въ виду: если боли сопровождаются возбужденіемъ нервной и сосудистой системы, съ лихорадкою, краснотою щекъ: 1) Acon., Cham., Chin., Coff., Ign., Merc., Val.; 2) Arg., Arg., Bell., Bry., Canth., N.-vom., Puls., Rhus.—Если при боляхъ замѣчаются необыкновенная слабость, ознобъ и холодъ: 1) Arg., Veratr.; 2) Arg., Chin., Her., Merc., N.-vom., Puls.—Если пораженная часть сильно зудитъ или сводитъ: 1) Caust., Staph.; 2) Arg., Carb-veg., Graph., Led., Mez., Natr.-m., Plumb., Puls., Sil.—Если онѣ легко потымаютъ: Bell., Calc., Cham., Chin., Graph., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhod., Ser., Sulph.

§ 5. При ощущеніи, какъ-будто пораженная часть опухла, увеличена или вздута: Bell., Bry., Carb-veg., Chin., Dulc., Hyos., Ign., Laur., Merc., N.-vom., Oleand., Op., Puls., Rhus, Ser., Spig., Staph., Sulph.-ac.; — при болезненномъ напряженіи страдающей части: 1) Asa., Bell., Bry., Caust., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Stront., Sulph.; 2) Arg., Arn., Arg., Aur., Calc., Coloc., Con., Kal., Magn.-m., Mang., Merc., Mez., Mosch., Nitr.-ac., Phosph., Plat., Rhod., Rhus, Ser., Stann., Veratr., Zinc.; — при ощущеніи полноты: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Carb-veg., Chin., Merc., Mosch., Phosph., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Amm., Amm.-m., Asa., Calc., Caps., Cham., Coff., Con., Graph., Hell., Kal., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Natr., Natr.-m., N.-vom., Petr., Puls., Ser., Spong., Sulph.-ac.; — какъ-будто все стремится выйти вонъ чрезъ страдающую часть (впередъ, вверхъ или вниз): 1) Acon., Bell., Bry., Caust., Cham., Chin., Coss., Kal., Lach., Lyc., Magn.-arct., Magn.-m., Mosch., Natr., N.-vom., Plat., Puls., Ser., Sil., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Alum., Amm.-m., Aur., Calc., Cain., Con., Croc., Magn.-c., Phosph., Phos.-ac., Spig., Spong. Staph., Stront., Твай.; — какъ-будто часть ломается: 1) Bell., Bry., Calc., Caust.

Con., Ign., Lach., Merc., Natr.-m., Puls., Sep., Sil., Spig., Sulph.;
2) Acon., Amm., Ant., Baryt., Caps., Carb.-an., Carb.-veg., Chin.,
Con., Graph., Her., Kal., Magn.-arct., Merc., Mez., Natr., N.-vom.,
Oleand., Petr., Phosph., Ran., Sabin., Spong., Staph., Thuj..

§ 6. При *сжимающихся*, сдавливающих болях, какъ-будто часть ввинчена: Alum., Bell., Cocc., Hell., Ign., Ipec., Magn.-с., Mosch., Natr.-m., N.-vom., Plat., Spig., Spong., Sulph.-ac. — При чувствѣ, какъ-будто страдающая часть охвачена *пояскомъ или обручемъ*: Anac., Aur., Bell., Chin., Con., Graph., Ign., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sassar., Sep., Sil., Spong., Stann.—При чувствѣ, какъ-будто платье слишкомъ плотно, *сжимаетъ, давитъ на часть*, или какъ-будто оно слишкомъ тяжело: 1) Bry., Calc., Carb.-veg., Caust., Kreos., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Sulph.; 2) Amm., Caps., Carb.-an., Nitr.-ac., Puls., Sassar., Sep., Sil., Spong., Stann.—При чувствѣ *тяжести* въ страдающей части: 1) Acon., Bell., Calc., Carb.-veg., Chin., Magn.-arct., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Sil., Stann., Sulph.; 2) Alum. Amm.-m., Arn., Ars., Baryt., Bry., Carb.-an., Cham., Con., Dulc., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-m., Natr., N.-mosch., Op., Petr., Plumb., Sabad., Sabin., Spig., Spong., Staph., Thuj., Veratr..

§ 7. При *давящихъ* болях: 1) Arn., Bell., Calc., Carb.-veg., Caust., Chin., Cupr., Ign., Lyc., N.-vom., Phosph., Sep., Stann., Staph., Sulph., Zinc.; 2) Acon., Alum., Amb., Amm.-m., Anac., Ars., Aur., Carb.-an., Cocc., Cupr., Ign., Magn.-arct., Merc., Natr., Natr.-m., Phos.-ac., Plat., Ruta, Sassar., Veratr.; — При давлении какъ-бы отъ вложеннаго клина или *возда*: 1) Arn., Her., Ign., N.-vom., Oleand., Plat., Ruta., Sulph.-ac.; 2) Acon., Anac., Ant., Asa., Carb.-veg., Cocc., Coff., Dulc., Hell., Lyc., Magn.-arct., Natr.-m., Rhus, Ruta, Spig., Spong., Sulph., Thuj.;—При *сверлящихъ* болях: 1) Bell., Calc., Dulc., Her., Merc., Natr.-m., Puls., Ran.-ac., Sep., Spig.; 2) Acon., Ang., Ant., Arg., Aur., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Cin., Cocc., Hell., Ign., Kal., Laur., Magn.-с., Magn.-m., Merc., Mosch., Rhod., Sil., Stann., Staph., Thuj., Zinc.; — При *буравящихъ*: 1) Amm.-m., Arn., Bell., Cin., Dulc., Mang., N.-mosch., Sep., Spig., Stann.; 2) Acon., Asa., Bry., Calc., Carb.-an., Cic., Cocc., Con., Kal., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Plat., Rhod., Rhus, Ruta, Seneg., Sulph., Val.;—При чувствѣ *сос-*

ходящую или вѣшко сидящую клубка: Acon., Ign., Lach., Natr.-m., Plumb., Ser., Sil.

§ 8. При чувствѣ *стѣсненія* въ пораженной части: 1) Alum., Anac., Bell., Chin., Graph., Ign., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Plumb., Plat., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Aug., Calc., Canth., Cocc., Con., Dig., Dros., Ipec., Lyc., Mosch., N.-mosch., Phosph., Phos.-ac., Sassa., Ser., Stann., Sulph., Sulph.-ac., Thuj, Veratr.;—*жгучаго*, сгребанія въ страждущихъ частяхъ: 1) Calc., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Ign., N.-vom., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Amm., Bell., Coloc., Graph., Нер., Lyc., Magn.-m., Merc., Natr.-m., Stann., Stront.;—при *ожучихъ* боляхъ: 1) Arn., Bell., Calc., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Ars., Cham., Colch., Mez., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Rhab., Ser., Staph., Veratr.;—*чувствѣ стѣсненія*, какъ-будто часть укоротилась или сжалась: 1) Amm.-m., Baryt., Caust., Coloc., Con., Graph., Lach., Natr.-m., Phosph., Rhus, Ser., Sulph.; 2) Alum., Arn., Asa., Bell., Bry., Carb.-an., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Rhod., Seneg., Stann., Stront., Zinc.;—*землюющихъ*, *судорожныхъ* боляхъ: 1) Amb., Calc., Carb.-veg., Coloc., Ign., Oleand., Phos.-ac., Plat.; 2) Acon., Anac., Agn., Arn., Ars., Bell., Carb.-an., Caust., Chin., Cin., Cocc., Con., Graph., Kal., Lyc., Magn.-c. Magn.-m., Mez., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Rhod., Ser., Stann., Staph., Sulph.;—при ощущеніи *сведенія* въ частяхъ: 1) Anac., Bell., Calc., Caust., Cin., Coloc., Graph., Lyc., Merc., Plat., Rhus, Ser.; 2) Agar., Amb., Ars., Asa., Camph., Cann., Cocc., Con., Dulc., Ign., Kal., Magn.-arct., Mez., Nitr.-ac., N.-vom., Plat., Phosph., Sec., Spig., Stann., Sulph., Thuj.;—чувствѣ *искривленія*: 1) Calc., Caust., Coloc., Graph., Guaj., Lyc., Merc., Rhus, Sec., Sil.; 2) Anac., Carb.-an., Caps., Chin., Cin., Ferr., Hyos., Lach., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Plat., Sol.-nigr., Stram., Tart.

§ 9. При *ошущающихъ* боляхъ, съ чувствомъ *коченѣлости* или *онѣмѣнія* въ частяхъ: 1) Acon., Bry., Cham., Cocc., Con., Lyc., N.-vom., Oleand., Plat., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Amm., Anac., Ars., Asa., Bell., Calc., Carb.-an., Caust., Chin., Hell., Hyos., Ign., Merc., Mosch., Op., Phosph., Phos.-ac., Ser., Stram. — При *поющихъ* боляхъ: 1) Aug., Caps., Carb.-veg., Cham., Cic., Cocc., Colch., N.-vom., Puls., Rhus, Sabad., Sabin., Staph.; 2) Acon., Bell., Bry., Caust., Ign., Magn.-arct., Natr.-m., Phosph., Rhod., Sil., Veratr. — При бо-

лѣзвенномъ чувствѣ разбитости: 1) Arn., Chin., Cocc., Herp., Ign., Natr.-m., N.-vom., Puls., Rhus, Ruta, Sep., Sulph., Veratr.; 2) Arg., Aur., Bry., Calc., Camph., Carb.-veg., Caust., Con., Dros., Ferr., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sil., Stann., Thuj.—При ощущеніи, какъ-будто *мякля части отрываются отъ кожей*: Bry., Canth., Ign., Led., Merc., Mosch., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Rhus, Staph., Sulph., Thuj.— При боли какъ-бы отъ *шиба, толчка или удара*: 1) Arn., Cic., Cin., Con., Dros., Lach., Oleand., Plat., Puls., Ruta; 2) Acon., Alum., Amm., Caust., Ign., Kal., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Phosph., Plumb., Rhus, Sulph.— При боли какъ-бы отъ *вывиха или остути*: 1) Arn., Bry., Calc., Caust., Ign., Natr.-m., Petr., Phosph., Puls., Rhod., Rhus, Sulph., 2) Amb., Amm., Carb.-veg., Graph., Lach., Nitr., N.-vom., Ruta, Sep., Spig., Stann., Thuj.

§ 10. При *терзающихъ боляхъ*: 1) Acon., Arn., Bell., Bry., Caust., Chin., Ign., Kal., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Rhod., Rhus, Sil., Stront., Sulph., Zinc.; 2) Alum., Amb., Arg., Calc., Caps., Carb.-veg., Ferr., Led., Natr.-m., Nitr., Phosph., Phos.-ac., Sassa., Sep., Thuj., Val.;—*тяжущихъ*: 1) Bell., Calc., Canth., Coloc., Dros., Kal., Lyc., Merc., Natr., Phos.-ac., Rhus, Sil., Sulph.-ac.; 2) Alum., Caust., Chin., Con., Dulc., Graph., Hyos., Ign., Mur.-ac., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Spig., Staph., Sulph.;—*колющихъ боляхъ*: 1) Acon., Asa., Bell., Bry., Calc., Canth., Chin., Guaj., Ign., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Rhus, Sep., Spig., Staph., Sulph., Thuj.; 2) Amm., Amm.-m., Arn., Ars., Caust., Cocc., Colch., Con., Dros., Graph., Hell., Kal., Magn.-c., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Sabad., Sassa., Sil., Spong., Sulph.-ac., Verb.;—боли какъ бы отъ *осколковъ переломленной кости*: 1) Carb.-v., Herp., Nitr.-ac., Sil.; 2) Arn., Cic., Colch., Petr., Plat., Ran., Sulph.;—ощущеніи *толчковъ*: 1) Amb., Calc., Cic., Colch., Ign., Magn.-arct., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sep., Spig., Stann., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Anac., Arn., Ars., Bell., Cann., Cham., Lyc., Magn.-c., Mez., Petr., Rhus, Spong., Tart.;—*подергивающихъ боляхъ*: 1) Asa., Calc., Caust., Chin., Colch., Cupr., Graph., Ign., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Alum., Anac., Aur., Bell., Bry., Cin., Clem., Con., Graph., Lyc., Magn.-aust., Merc., Phos.-ac., Sep., Spig., Stann., Val.

§ 11. При *прыгущихъ, разъедающихъ, склобящихъ боляхъ*

1) Alum., Ars., Asa., Baryt., Bell., Calc., Canth., Caust., Cham., Con., Cupr., Dros., Kal., Kreos., Lach., Lyc., Mang., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac., Plat., Puls., Ran.-sc., Rhus, Ruta, Sabad., Spig., Staph.;—*свербежи*: 1) Acon., Arn., Bell., Caps., Chin., Colch., Kal., Phos.-ac., Plat., Puls., Sec., Sep., Solan.-nigr., Spig., Sulph.; 2) Alum., Ars., Caust., Croc., Euphr., Ign., Magn.-aust., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sabad., Zinc.;—*чувствѣ жуда и ползания*: Alum., Arn., Aur., Bell., Calc., Kal., Nitr.-ac., N.-vom., Rhod., Rhus, Sep., Sec., Staph., Sulph., Thuj.;—*частомъ отъжимѣ въ частяхъ*: 1) Calc., Carb.-an., Carb.-v., Chin., Cocc., Croc., Graph., Kal., Lyc., Merc., Petr., Phos.-ac., Puls., Rhus, Sep., Sil., Sulph.; 2) Amb., Arg., Baryt., Caps., Cham., Con., Guaj., Hyos., Ign., Magn.-arct., Magn.-aust., Magn.-m., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Rhod., Stram., Sulph., Thuj., Veratr.;—*чувствѣ, какъ-будто дуетъ стѣнь, или воздухъ проходитъ чрезъ страдающія части*: Aur., Colch., Graph., Magn.-aust., Oleand., Puls., Rhus, Sabin., Spig., Stram., Zinc.;—*чувствѣ холода въ страдающихъ частяхъ*: 1) Arg., Calc., Camph., Carb.-veg., Chin., Colch., Dros., Ipec., Laur., Lyc., Magn.-aust., Merc., Mez., Natr., Natr.-m., Nitr., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sep., Sulph., Veratr..

§ 12. При *ожугахъ* боляхъ: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Canth., Carb.-veg., Caust., Euphorb., Graph., Merc., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sabad., Sep., Stann., Sulph.; 2) Arn., Calc., Chin., Kal., Lach., Lyc., Mez., Petr., Plumb., Rhod., Ruta, Sabin., Sil., Veratr.;—*бьющимъ, какъ молоткомъ*: 1) Acon., Amm.-m., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Cham., Cocc., Ferr., Ign., Kal., Magn.-aust., Natr.-m., Phosph., Puls., Sep., Sil., Sulph., Tart.; 2) Alum., Asa., Bry., Cann., Caps., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Nitr.-ac., Petr., Rhod., Ruta, Sabad., Stram., Veratr.;—*боляхъ, какъ отъ марья или подкожнаго нагноенія*: 1) Amm., Bry., Caust., Kal., Lach., Phosph., Puls., Ran., Rhus, Sil.; 2) Cann., Caust., Cham., Cic., Graph., Ign., Mang., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Thuj., Zinc.;—*какъ-бы отъ ожога*: Baryt., Bell., Bry., Caust., Hyos., Ign., Lach., Magn.-m., N.-vom., Phosph., Puls., Sep., Sulph.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Ran., Rhus, Sil., Stann., Staph., Sulph..

§ 13. При боляхъ, идущихъ *сверху внизъ*: Acon., Agar., Baryt., Bell., Bry., Canth., Caps., Carb.-veg., Caust., Chin., Cin., Ferr.,

Graph., Kal., Kreos., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Sabin., Sassap., Sep., Sulph., Val., Veratr., Zinc.;—*смысу сверху*: Acon., Alum., Anac., Arn., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Caust., Cham., Chin., Colch., Con., Dulc., Euph., Magn.-arct., Magn.-c., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Samb., Sep., Spong., Stront., Sulph., Thuj., Val.;—*смысу внутри*: 1) Arg., Asa., Bell., Bry., Chin., Con., Rhus, Spig., Spong., Stann., Sulph., Val.; 2) Acon., Alum., Calc., Dros., Dulc., Ign., Lyc., Magn.-arct., Magn.-aust., Merc., Mez., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sep., Sil., Staph.;—*снаружи внутрь*: 1) Anac., Arn., Calc., Canth., Ign., Kal., Plat., Spig., Staph., Zinc.; 2) Bell., Calc., Cann., Caust., Cocc., Dulc., Hell., Laur., Mez., Nitr.-ac., Oleand., Plumb., Rhus, Sabin., Sulph.-ac.;—*въ одной половинѣ тѣла*: 1) Alum., Asa., Calc., Cocc., Coloc., Dulc., Graph., Kal., Magn.-arct., Magn.-aust., Mang., Mez., N.-vom., Oleand., Phosph.-ac., Plat., Puls., Sassap., Spig., Staph., Sulph.-ac., Verb.; 2) Agar., Amb., Anac., Arg., Ars., Canth., Carb.-veg., Caust., Chin., Cic., Cin., Guaj., Ign., Lach., Merc., Mur.-ac., Phosph., Rhus, Sabad., Sassap., Stann., Zinc.;—*крестообразно распространяющихся*: Agar., Calc., Magn., Nitr.-ac., Sil., Val.;—*на левой сторонѣ*: 1) Calc., Chin., Coloc., Lach., Merc., Petr., Phosph., Sulph.; 2) Arn., Asa., Colch., Cupr., Graph., Hep., Lyc., Nitr.-ac., Mez., Phosph., Rhod., Sep., Spig., Sulph.-ac., Thuj.;—*на правой сторонѣ*: 1) Amm., Amm.-m., Cant., Caust., Sabad., Stront., Zinc.; 2) Agar., Alum., Calc., Dros., Ign., Lyc., Mosch., Ruta, Sabin.;—*блуждающихъ*: 1) Arg., Chin., Daph., N.-mosch., Puls., Rhod., Sulph.; 2) Ars., Asa., Bell., Con., Ign., Jod., Mang., Sabin., Sassap., Sec., Sep., Val., Zinc..

См. Обстоятельства, Причины, Реизитизмъ, Дюмота.

ПРИЧИНЫ БОЛѢЗНЕЙ, Causae occasionales.

Такъ какъ больного иногда поражаетъ не одно вредное вліяніе, а нѣсколько вдругъ, то для облегченія обзора дѣйствующихъ причинъ и сравненія ихъ между собою, мы въ этой статьѣ представимъ вообще всѣ причины, которыя въ подробности изложены въ отдѣльныхъ соответствующихъ имъ статьяхъ.

Вообще къ болѣзненнымъ причинамъ относятся:

а) *Злоупотребленіе врачебныхъ средствъ.* (См. эти статьи).

б) Неумѣренное половое совокупленіе и послѣдствія: 1) Calc., Chin., N.-vom., Phos.-ac., Sil., Staph., Sulph.; 2) Arn., Anac., Carb.-veg., Con., Merc., Natr.-m., Phosph., Sep.; 3) Agar., Ars., Cin., Con., Kal., Natr., Petr., Phosph., Puls., Sil., Spig., Thuj. (Сравни. Слабость).

в) Послѣдствія купанья: Ant., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Caust., Nitr.-ac., Rhus, Sassa., Sep., Sulph. (Сравни. Простуда).

г) Вредные пары (см. Газы вредныя).

д) Омозленія: 1) Acon., Ars., Bry., Carb.-veg., Lach., Nitr.-ac., Puls., Sulph.-ac.; 2) Agar., Camph., Colch., Petr., Phosph., Sulph. (См. Обширание).

е) Разгоряченіе и послѣдствія: 1) Acon., Ant., Bell., Bry., Camph., Carb.-veg., Sil.; 2) Sars., Kal., Natr.-m., N.-vom., Op., Thuj., Zinc. (Сравни. Недуги отъ жара).

ж) Утомленіе отъ ходьбы: Arn., Bry., Cann., Chin., Coff., Ferr., Rhus, Thuj., Veratr. (Сравни. Изнеможение).

з) Сильное сотрясеніе тѣла: 1) Arn., Bry., Cic., Con., Spig.; 2) Acon., Bell., Calc., Cin., Hep., Ign., N.-vom., Phos.-ac., Rhus, Ruta, Sulph.

и) Вѣда въ экипажѣ, качка и другія пассивныя движенія: 1) Ars., Coss., Petr., Sulph.; 2) Colch., Ferr., N.-mosch., Sep., Sil.; 3) Borax, Carb.-veg., Colch., Croc., Graph., Hep., Ign., Kal., Natr., Natr.-m., Phosph., Plat., Selen., Staph.

к) Напряженіе умственныхъ способностей: 1) Bell., Calc., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Anac., Arn., Aur., Coss., Colch., Ign., Lyc., Natr.-m., Oleand., Plat., Sabad., Sep., Sil. (См. Изнеможение).

л) Вредная и неудобоваримая пища. (См. Пищеваренія слабость).

м) Ядовитыя вещества, укушеніе ядовитыми животными и т. д. (См. Отравленія).

н) Укаленіе насѣкомыми. (См. эту статью).

о) Усиленное напряженіе тѣла: 1) Acon., Arn., Bry., Calc., Chin., Coss., Coff., Merc., Rhus, Sil., Veratr.; 2) Alum., Cann., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Ruta, Sabin., Sulph. (См. Изнеможение).

п) Расстройство желудка: 1) Ant., Arn., Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Acon., Ars., Bry., Carb.-veg., Chin., Coff., Hep., Ign., Natr., Staph.; 3) Calc., Carb.-veg., Cham., Hep., Natr., Natr.-m., Phosph., Sep., Sil., Sulph., Veratr..

q) *Ночная бдѣнія*: 1) Carb.-veg., Coss., N.-vom., Puls.; 2) Amb., Bry., Chin., Ipec., Natr., Natr.-m., Phos.-ac., Ruta, Sabin., Selen. Ser. (Сравн. *Изнеможеніе*).

r) *Промоканіе на дождь*: 1) Calc., Dulc., Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-veg., N.-mosch., Rhus, Sassaп.; 3) Ars., Bell., Borax, Bry., Caust., Colch., Нер., Lyc., Phosph., Ser. (Сравн. *Простуда*).

s) *Пльнство и ночной кутежка*: 1) Ant., Carb.-veg., Coff., N.-vom., Sulph.; 2) Bell., Bry., Calc., Chin., Dulc., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Rhus. (Сравн. *Болезни отъ пльнства и Изнеможеніе*).

t) *Потеря соковъ послѣ кровопусканій, обильныхъ потовъ и т. д.*: 1) Calc., Carb.-veg., Chin., Cin., Lach., N.-vom., Phos.-ac., Sulph., Veratr.; 2) Ars., Con., Ferr., Ign., Kal., Merc., Natr., Natr.-m., Phosph., Puls., Ser., Sil., Spig., Squill., Staph. (Сравн. *Слабость*).

u) *Привычное пльнство*: 1) Ars., Bell., Calc., Chin., Coff., Hell., Hyos., Lach., Merc., Natr., N.-vom., Op., Puls., Sulph.; 2) Agar., Ant., Carb.-veg., Coss., Ign., Led., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., Ran., Rhod., Rhus, Ruta, Selen., Sil., Spig., Stram., Veratr. (Сравн. *Болезни отъ пльнства*).

v) *Онанія*: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Calc., Carb.-veg., Chin., Coss., Con., Natr.-m., N.-mosch., Phosph., Phos.-ac., Staph.; 2) Анас., Ant., Cin., Dulc., Kal., Lyc., Merc., Petr., Phosph., Puls., Ser., Sil., Spig., Staph. (Сравн. *Слабость, Спитная сухотка и Половое возбужденіе*).

w) *Вліяніе солнечнаго жара*: 1) Amb., Bell., Camph., Hyos., Natr., Puls.; 2) Acon., Agar., Bry., Euphr., Lach., Selen., Sulph., Val. (Сравн. *Жаръ*).

x) *Вредное дѣйствіе каменной тлѣи, какъ это бываетъ у рѣзчиковъ на камняхъ*: 1) Calc., Sil.; 2) Lyc., Natr., Puls., Sulph.

y) *Прекращеніе привычныхъ отдѣленій или сыпей*: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Chin., Lyc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-veg., Caust., Cham., Dulc., Graph., Kal., Lyc., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Ser., Sil., Stram.; 3) Amb., Amm., Ant., Arn., Aur., Baryt., Cin., Coss., Cupr., Ferr., Нер., Hyos., Ign., Ipec., Merc., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Ran., Seneg., Spong. (Сравн. *Прекращеніе отдѣленій*).

z) *Простуда*: 1) Acon., Cham., Coff., Dulc., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Ars., Bell., Bry., Carb.-veg., Hyos., Ipec., Phosph., Rhus, Sil., Spig.; 3) Calc., Chin., Coloc., Con., Graph., Нер., Lyc.,

Mang., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Samb., Ser., Veratr. (См. *Простуда*).

за) *Повреждения, поранения*: 1) Acon., Amm., Bry., Calc., Caust., Cham., Euphr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Ruta, Sil., Staph., Sulph., Zinc.; 2) Arn., Cin., Con., Her., Lach., Puls., Rhus, Sulph.-ac.; 3) Alum., Bell., Borax, Carb.-veg., Dulc., Jod., Petr., Sil. (Сравни. *Повреждения*).

zb) *Мытье и работа в воде*: 1) Calc., N.-mosch., Puls., Sassa., Sulph.; 2) Amm., Ant., Bell., Carb.-veg., Dulc., Merc., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Spig. (Сравни. *Простуда*).

zc) *Скрытие перемежающихся лихорадок*. (См. *Перемежающаяся лихорадка*).

Проказа, Lepra. — Alum., Ars., Carb.-vp., Carb.-v., Caust., Graph., Natr., Petr., Phos., Ser., Sil., Sulph. — Протявъ язву и разрывъ шиповъ у пораженныхъ проказою: Alum., Natr., Sil.

Простуда.

§ 1. Средства вообще: 1) Acon., Cham., Coff., Dulc., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Ars., Bell., Bry., Carb.-veg., Huoa, Ipec., Phosph., Rhus, Sil., Spig.; 3) Calc., Chin., Coloc., Con., Graph., Her., Lys., Mang., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Samb., Ser., Veratr..

§ 2. Если недугъ, происшедшій вследствие простуды, свойства *острого* и причиняетъ сильную боль: Acon., Ars., Bell., Cham., Coff., Merc., N.-vom., Puls., Samb., Spig.—Если боль при этомъ *незначительна*: Dulc., Chin., Ipec., N.-mosch.—Упорные, *хронические* недуги, происшедшіе вследствие простуды, кромѣ сказанныхъ средствъ, требуютъ: Calc., Carb.-veg., Graph., Her., Lys., Mang., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil., Sulph..

§ 3. При простудѣ, которая развилась вследствие того, что больной *промок* или *промочилъ* некоторыя части тѣла: 1) Calc., Dulc., Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-veg., N.-mosch., Rhus, Sassa.; 3) Ars., Bell., Bry., Caust., Colch., Her., Lys., Phosph., Ser.—При недугахъ, произведенныхъ *купаньемъ*: 1) Ant., Calc., Carb.-veg., Sulph.; 2) Ars., Bell., Caust., Nitr.-ac., Rhus, Sassa., Ser., Sulph.;—*мытьемъ* или *работою на водѣ*: 1) Calc., N.-mosch., Puls., Sassa., Sulph.; 2) Amm., Ant., Bell., Carb.-veg., Dulc., Merc., Nitr.-ac.,

Rhus, Ser., Spig.;—охлажденіемъ испотышано жѣла: Acon., Calc., Carb.-veg., Chin., Dulc., Merc., Phos.-ac., Rhus, Ser.;—промоченіемъ или простудю головы: Acon., Baryt., Bell., Led., Puls., Ser.;—промоченіемъ или простудю ноги: 1) Cupr., Nitr.-ac., Puls., Ser., Sil; 2) Cham., Merc., Natr., Rhus;—простудю живота льдомъ, водою со льдомъ, ядами, кислотами: Ars., Carb.-v., Puls..

§ 4. Если простудю остановлены потъ или испарина: 1) Bell., Bry., Cham., Chin., Dulc., Lach., Sil, Sulph.; 2) Acon., Ars., Calc., Graph., Lyc., Merc., N.-mosch., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Rhus;—скрылась какая-нибудь сыпь: 1) Bry., Ipec.; 2) Acon., Ars., Carb.-veg., Cham., Dulc., Merc., Rhus, Puls., Sulph.;—скрылся привычный насморкъ: Acon., Ars., Calc., Chin., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.;—произошелъ безпорядокъ резуль: Acon., Bell., Dulc., Calc., Chin., Puls., Ser., Sil, Sulph. (См. Скрытие отдѣлений).

§ 5. При расположеніи къ простудѣ: 1) Bell., Calc., Carb.-veg., Coff., Dulc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Sil; 2) Acon., Baryt., Borax, Graph., Hyos., Ign., Lyc., Magn.-ш., Merc., Natr., Natr.-ш., Petr., Phosph., Ser., Spig., Sulph.; при этомъ однако нужно помнить, что если мы имѣемъ дѣло съ хроническимъ расположеніемъ къ простудѣ, то нужно давать соответствующія средства въ единственныхъ приѣмахъ и въ большихъ промежуткахъ,—чрезъ 6—8 недѣль. То же самое должно сказать и о леченіи необыкновенной чувствительности къ *оттру*, *погодѣ*, *сквозному оттру*, *теплотѣ*, къ *голоду*, противъ которыхъ, если всякій *холодный воздухъ* причиняетъ болѣзнь: Bry., Calc., Carb.-veg., Cham., Merc., Rhus, Veratr.—Если *холодъ вообще* вреденъ: Ars., Baryt., Bell., Calc., Camph., Caps., Caust., Coss., Dulc., Hell., N.-mosch., N.-vom., Rhod., Rhus, Sabad.—При необыкновенной чувствительности къ *оттру*: Carb.-veg., Cham., Lach., Lyc., Sulph.—Если *сквозной оттеръ* не переносится: Acon., Anac., Bell., Calc., Cham., Chin., Sil., Sulph.—Если *холодный вечерній воздухъ* вызываетъ недуги: Amm., Carb.-veg., Merc., Nitr.-ac., Sulph.—Если болѣзнь вызывается *сырою бурною погодю*: Bry., Rhod., Sil;—*сырою холодною*: Amm., Borax, Calc., Carb.-veg., Dulc., Lach., Rhod., Rhus, Veratr.;—*всѣю перемѣною погоды*: Calc., Carb.-veg., Dulc., Lach., Merc., Rhus, Sil., Sulph., Veratr.;—*переходомъ изъ холодной въ теплую*: Carb.-veg., Lach., Sulph.;—*изъ теплой въ холодную*: Dulc., Merc., Rhus, Veratr.,

§ 6. При простудѣ въ *осеннее время*: Carb.-veg., Lach., Rhus, Veratr.;—*лѣтнее время*: Bell., Bry., Carb.-veg., Dulc.;—*бурную погоду* во время лѣта: Bry., Rhod., Brom., Ser., Sil.;—*осеннее время*: 1) Dulc., Merc., Rhus, Veratr.; 2) Calc., Bry., Chin.;—*зимнее время*: 1) Acon., Bell., Bry., Dulc., Rhod., Rhus; 2) Cham., Ipec., N.-vom., Sulph. Veratr.;—въ зимнее время при *сухомъ холодѣ*: Acon., Bell., Bry., Cham., Ipec., N.-vom., Sulph.;—*сыромъ*: Dulc., Rhod., Rhus, Veratr..

§ 7. Кромѣ того, при выборѣ средствъ нужно всегда имѣть въ виду:

АСОНИТУМ—назначается при зубной, лихвой боли или другихъ невралгіяхъ, боли головы, напорѣ крови къ головѣ, жужжаніи въ ушахъ, окоченѣлости членовъ, сильномъ *лихорадочномъ жарѣ*; боли до того сильной, что больной выходитъ изъ себя, беспокоится, мечется въ разныя стороны.

АНТИМОНІУМ—противъ головной боли и гастрическихъ страданій, потерѣ аппетита, тошнотѣ, отвращенія отъ пищи.

АРНИКА—противъ болей въ членахъ, ревматическихъ или артритическихъ.

АРВЕНІСУМ—при астматическихъ или гастрическихъ страданіяхъ и спазмахъ желудка.

ВЕЛЛАДОННА—противъ головной боли, мутности зрѣнія и боли горла, гастрическихъ страданій, насморка, лихорадочнаго жара.

ВУОНИА—противъ судорожнаго кашля и наклонности ко рвотѣ; боли въ членахъ, поносѣ.

САЛСАВНА—противъ упорной боли въ членахъ, которая усиливается при всякой переменѣ погоды, или отъ работы на водѣ.

САВВО ВЕГЕТАВІЛІС—при пустомъ, упорномъ кашлѣ со рвотою; астматическихъ страданіяхъ, грудныхъ боляхъ.

СНАМОМІЛЛА—противъ головной, зубной, ушной боли или другихъ невралгій, безпокойства, склонности къ гнѣву, сильного лихорадочнаго жара, мокраго кашля (у дѣтей), жестокихъ приступовъ колени съ поносомъ.

СОССУЛУС—противъ гастрическихъ страданій.

СОФФЕА—при зубной или другой какой-либо нервной боли, плаксивости, возвышенной чувствительности ко всякой боли, бессонницы.

DULCAMAHA—при боли головы, слабости зрѣнія или слуха; боли зубовъ, горла, гастрическихъ страданійхъ, мокромъ кашлѣ, поносѣ безъ боли, боли въ членахъ или лихорадѣ.

ИРРАВ—при воспаленіи глазъ, боли зубовъ, или упорной боли въ членахъ.

ИРЕСАУАННА—при гастрическихъ страданіяхъ, тошнотѣ съ наклонностью ко рвотѣ; судорожномъ кашлѣ со рвотою и астматическихъ страданіяхъ.

МЕРКУРИУС—противъ боли въ членахъ, боли горла, страданій глазъ, зубной ушной боли, поноса съ болью, испражненій въ видѣ кроваваго поноса.

НИХУОМІСА—при лихорадѣ, сухомъ насморкѣ съ залеганіемъ носа, сухомъ кашлѣ, запорѣ на нивъ, испражненіяхъ въ видѣ кроваваго поноса, слизистомъ поносѣ съ болью, натугою и малоколичественными испражненіями.

РНОСРНОІ АСІДУМ—при ревматическихъ упорныхъ боляхъ, или кашлѣ, возвращающемся отъ малѣйшаго холода.

ПУЛСАТИЛЛА—противъ влаготочиваго насморка, мокраго кашля, боли ушной, поноса, особенно если такіе симптомы встрѣчаются у беременныхъ.

РНУС—противъ зубной боли и боли въ членахъ.

СІЛІСІА—противъ упорной боли въ членахъ, усливающейся при переменѣхъ погоды.

СУЛФУР—при упорной боли въ членахъ, приступахъ боли, слизистомъ поносѣ; насморкѣ или катаррѣ съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи; слабости и мутности зрѣнія; ушной и зубной боли.

Сравн. *Боли головы, ушныя, зубныя, Ревматизмъ и Обострѣтельность.*

Прямой кишки выпаденіе, Prolapsus intestini recti.

Лучшія средства: Ign., N.-vom., Merc., Sulph., а для уничтоженія наклонности къ этой болѣзни, можно также употребить: Arg., Calc., Lyc., Ruta., Ser.—Выпаденіе прямой кишки у *дѣтей* лечится преимущественно посредствомъ Ign. или N.-vom..

Р.

Ракъ и скирръ, Carcinoma et Scirrhus.

Средства противъ этихъ болѣзней: 1) Ars., Bell., Con., N.-vom., Ser., Sil., Sulph.; 2) Aur., Calc., Carb.-an., Chin., Clem., Coloc., Graph., Lys., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Staph., Thuj.; 3) Calend.—При *мозговидномъ раке*: 1) Bell., Phosph.; 2) Carb.-a., Sil., Sulph., Thuj.—*Скиррозныя затвердѣнія* требуютъ: 1) Bell., Con., Ser., Sil.; 2) Carb.-an., Carb.-veg., Cham., N.-vom., Phosph., Staph., Sulph.—При *открытомъ раке*: 1) Ars., Con., Sil., Sulph.; 2) Apis., Aur., Bell., Calc., Her., Lach., Merc., Nitr.-ac., Ser., Staph., Thuj.—При скирровныхъ и раковидныхъ болѣзняхъ, происшедшихъ *отъшиба* или *толчка*: 1) Con.; 2) Staph., Arn.

См. *Ракъ матки, лица* и т. д.

Ракъ водяной, Noma.

Въ вѣкоторыхъ провинціяхъ Франціи, особенно у худосочныхъ дѣтей, оказались дѣйствительными противъ этой болѣзни: 1) Sulph.; 2) Calc., Sil., Sulph.-ac.

Мнѣ извѣстенъ одинъ только случай излеченія водяного рака посредствомъ Sulph., Cal., Sil. Причины, заставлявшія употребить эти средства заключались въ золотушномъ тѣлосложеніи дитяти и его родителей. Исторія этой болѣзни можетъ послужить доказательствомъ справедливости Ганемановой теоріи о исорѣ и положенія, что только тотъ выборъ средствъ вѣренъ, который соответствуетъ патологической натурѣ больного и всему объему признаковъ, выражающихъ индивидуальное тѣлосложеніе.

Ракъ глаза, Cancer oculi.

Противъ этой болѣзни до-сихъ-поръ существуетъ одно только средство: Linc. Но изъ совокупности симптомовъ этого средства и другихъ можно почти съ вѣрностью заключить, что оно занимаетъ здѣсь только второстепенное мѣсто, и что больше пользы можно ожидать отъ: 1) Bell., Calc., Sil.; 2) Ars., Her., Lys., Ser..

Ракъ и скирръ желудка, Carcinoma et Scirrhus ventriculi.—Средства противъ нихъ: Ars., Baryt., Lyc., N.-vom., Phosph., Veratr..

Сравн. *Ракъ вообще.*

Ракъ матки и затвердѣнія этого органа, Carcinoma et Scirrhus uteri.

§ 1. Средства противъ этихъ недуговъ: 1) Carb.-an., Staph., Kreos.; 2) Ars., Aug., Bell., Chin., Cic., Clem., Coccul., Con., Dulc., Jod., Magn.-m., Merc., Nitr.-ac., Ser., Sil., Staph., Thuj..

§ 2. Противъ *затвердѣнія матки* (Scirrhus uteri): 1) Carb.-an.; 2) Aug., Bell., Chin., Magn.-m., Ser., Staph.; 3) Clem., Coccul., Con., Rhus., Phosph.—Противъ *настоящаго рака матки* (Carcinoma uteri) еще не имѣемъ вѣрныхъ средствъ, но находимъ, что нѣкоторымъ удавалось вылечить эту болѣзнь посредствомъ: 1) Graph., Kreos.. Кроме того, не мѣшаетъ имѣть въ виду: 2) Carb.-an.; 3) Ars., Bell., Chin., Clem., Merc., Ser., Sil.—Противъ *размѣдающихъ* (неравновидныхъ) язвъ матки и ея шейки: 1) Nitr.-ac., Thuj.; 2) Ars., Bell., Chin., Coccul., Merc., Ser..

§ 3. По совокупности симптомовъ, сказанныя средства назначаются при слѣдующихъ показаніяхъ:

Велладонна — при частыхъ маточныхъ кровотеченияхъ съ чувствомъ низдавленія къ половымъ частямъ, сильной боли въ крестцѣ и возбужденномъ состояніи нервной системы.

Сониумъ — противъ *колющихъ болей*, особенно, если въ это время обнаруживаются страданія, подобныя сопровождающимъ беременность, какъ напр. тошнота, рвота, прихотливость аппетита и т. д.

Сварнитесъ — когда имѣются: жаръ и боль въ маточномъ влагалищѣ; припухлость лимфатическихъ сосудовъ и слизистыхъ железъ; твердость маточной шейки и припухлость ея; причемъ также замѣчаются на ней бугорковидныя узлы и наращеваніе въ видѣ цвѣтной капусты; большая тяжесть въ животѣ при вставаніи; обморочная слабость при усиленіи болей; медленные регулы и усиленіе страданій незадолго до наступленія и во время ихъ, — причемъ истекаетъ кровь черная, свернувшаяся, вонючая; пробѣгающія по животу до реберъ электрическія покалыванія; *жмучія*

и колющія боли; запоръ, землисто-поблеклый цвѣтъ лица; нравъ печальный и тоскливый.

К в е о с о т и м—когда замѣчаются: электрическія покалыванія, происходящія какъ-бы отъ живота и идущія до влагалнца; припухлость губъ и зудъ въ рукавъ; истечение темной, свернувшейся мѣсячной крови, съ которою отдѣляется острая, кровянистая су-кровица; ощущение невдавленія и гнетенія на половныя части, во время регулъ и въѣ оныхъ.

Сравни. *Регуль* *неправильность* и *Затвердѣнія*.

Равъ носа, Сапсег паві.—Главныя средства: 1) Arg., Sil., Sulph.; 2) Arg., Calc., Carb.-ap., Ser.

См. *Рихъ* и *Сынъ на мизъ*.

Рафанія, болѣзнь отъ злоупотребленія спорынья, Raphania, Ergotismus.

До-сихъ-поръ почти специфическимъ средствомъ отъ рафаніи оказался Solan. nig. Кроме того, смотря по обстоятельствамъ, рекомендуются: Acon., Bell., Colch., Hyos., Op., Plat., Stram., Rhus, или также, при омертвѣніи членовъ: Arg., Chin., Euphorb., Sil.

Рвота и тошнота.

§ 1. Оба эти явленія почти всегда составляютъ симптомъ другой болѣзни, но иногда они такъ преобладаютъ надъ другими симптомами, что обращаютъ на себя особенное вниманіе. Средства, имъ соотвѣтствующія: 1) Ipec., N.-vom., Puls.; 2) Arg., Bry., Cham., Cupr., Ferr., Sil., Sulph., Veratr.; 3) Ant., Arn., Bell., Calc., Chin., Cin., Con., Dig., Dros., Dulc., Hyos., Ign., Lach., Merc., Phosph., Plumb., Sec., Ser., Tart.

§ 2. При *рвотѣ принятою пищею*: 1) Arg., Ferr., Hyos., N.-vom., Puls., Sil., Sulph.; 2) Bell., Bry., Coll., Coss., Cin., Cupr., Dros., Grapg., Kal., Lach., Natr.-m., Phosph., Rhus, Ser., Stann., Veratr.—При *рвотѣ питьемъ, напитками*: 1) Arg., Lyosc., Ipec., Sil., Veratr.; 2) Arn., Cin., Samb., Spong.—Противъ *красавой рвоты* (Haematemesis v. vomitus cruentus): 1) Acon., Arn., Ferr., Hyos., Ipec., N.-vom.; 2) Amm.-c., Bell., Bry., Canth., Carb.-veg.,

Caust., Chin., Lach., Lyc., Mez., Mill., Plumb., Puls., Sulph., Veratr.—При *черной рвотѣ*—веществами *чернаго цвѣта*—(Melasma): 1) Ars., Calc., Chin., Veratr.; 2) Ipec., N.-vom., Sulph.—Против *рвоты калома* (Passio iliaca, Peus, Miserere): 1) Bell., Bry., N.-vom., Op..

§ 3. Рвота у беременных: 1) Ipec., N.-vom.; 2) Acon., Arg., Con., Ferr., Kreos., Lach., Magn.-m., Natr.-m., N.-mosch., Petr., Phosph., Puls., Ser., Veratr.—Рвота у *пьяницъ*: 1) Arg., Lach., N.-vom., Op.; 2) Calc., Sulph.—Рвота вследствие *пассивныхъ движений*, напр. качки, бѣды въ экипажѣ, или по морю и т. д.: 1) Arg., Coccul., Colch., Ferr., Petr.; 2) Bell., Croc., N.-mosch., Sec.—Если *мышцы* составляютъ причину рвоты: 1) Acon., Cin., Ipec., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Bell., Carb.-veg., Chin., Lach.—При рвотѣ отъ *разстройства желудка* послѣ обремененія или неудобоваряемой пищи: 1) Ipec., Puls.; 2) Ant., Bry., N.-vom., Sulph.; 3) Arg., Bell., Ferr., Rhus.

§ 4. Во всѣхъ связанныхъ случаяхъ можно еще имѣть въ виду:

При рвотѣ *желчною*, имѣющей *горькій вкусъ* или *зеленоватый цвѣтъ*: 1) Ars., Bell., Bry., Cham., Ipec., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Veratr.; 2) Ant., Arn., Cann., Chin., Cin., Coloc., Con., Cupr., Dros., Dulc., Ign., Lach., Lyc., Petr., Sec., Sulph.—При *соленой рвотѣ*: Magn.-с., Puls., Sil., Sulph.—Если рвота имѣетъ *кислый запахъ* или *кислоту*: 1) Calc., Cham., Chin., N.-vom., Phosph., Phos.-ас., Puls., Sulph.; 2) Ars., Bell., Ferr., Ipec., Lyc., Sulph.-ас., Tart.—При рвотѣ *слизью*: 1) Arg., Bell., Dros., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Acon., Ant., Calc., Cham., Chin., Cin., Con., Guaj., Ner., Hyos., Ign., Merc., Sec., Veratr.;—*водянистой жидкостью*: 1) Bell., Bry., Caust., Ipec.; 2) Arn., Arg., Chin., Cupr., N.-vom., Puls., Sulph.

§ 5. Если *всякое движение* вызываетъ рвоту: Arg., Bry., N.-vom., Veratr.—При рвотѣ, съ *поносомъ*: Arn., Bell., Coloc., Cupr., Dulc., Ipec., Phosph., Puls., Veratr.;—*усиливающейся* всякій разъ *послѣ приема пищи*: 1) Arg., Ferr., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Acon., Arg., Hyos., Ipec., Natr.-m.;—*являющейся каждое утро*: 1) Arg., Dros., N.-vom.; 2) Ner., Lyc., Natr.-m., Sil., Veratr. (См. также *Время дня*);—преимущественно *ночью*: Arg., Ferr., Chin., N.-vom., Sil., Sulph.;—*всякій разъ послѣ питья*: 1) Arg., Ferr., Chin.; 2) Acon., Arn., Bry., Cham., N.-vom., Sil.

См. *Гастрическія страданія, Растройство желудка, Пищеваренія слабость, Воспаленіе желудка, Помось, Холегра, Боли живота, Глистная болѣзнь.*

Ревматизмъ, Rheumatismus.

§ 1. Средства противъ него: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Merc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sang., Sulph.; 2) Ant., Arg., Carb.-veg., Caust., Chin., Colch., Ferr., Her., Ign., Lach., Lyc., N.-mosch., Rhod., Ruta, Sassa., Ser., Thuj., Veratr.; 3) Camph., Cann., Canth., Coloc., Cupr., Euphr., Kreos., Magn.-c., Mez., Nitr.-ac., Ran., Spig., Squil., Stann., Tart., Val.

§ 2. Противъ *острую* ревматизма: Acon., Arg., Ars., Bell., Bry., Cham., Chin., Colch., Dulc., Ign., Merc., N.-vom., Puls. и Rhus. Противъ *хроническаго*: 1) Caust., Clem., Her., Lach., Lyc., Phosph., Sulph., Veratr.; 2) Bry., Dulc., Ign., Merc., N.-vom., Puls., Rhus, Thuj.—При ревматизмѣ съ *сочлененіяхъ* (съ опухолью ихъ): Acon., Ant., Arg., Bell., Bry., Chin., Clem., Her., N.-vom., Rhus, Sulph.—При ревматизмѣ съ *искривленіемъ и окоченностію* пораженной части: 1) Ant., Bry., Caust., Guaj., Lach., Sulph.; 2) Amm.-т., Coloc., Graph., Lyc., Natr.-т., N.-vom., Rhus, Ser.—Ревматизмъ, сопровождающійся *параличемъ*: 1) Arg., Chin., Ferr., Ruta; 2) Cin., Coccul., Hell., Plumb., Sassa., Staph.—Противъ *блуждающихъ* ревматическихъ болей: 1) Bry., N.-mosch., N.-vom., Puls.; 2) Arg., Ars., Aza., Bell., Daph., Mang., Plumb., Rhod., Sabin., Sassa., Ser., Sulph., Val.

§ 3. При ревматизмѣ вслѣдствіе *переохлажденія*: 1) Clem., Sassa., Thuj.; 2) Daph., Lyc., Sulph.;—вслѣдствіе *злоупотребленія ртутью*: 1) Carb.-veg., Chin., Guaj., Lyc., Sassa., Sulph.; 2) Arg., Arg., Bell., Calc., Cham., Chin., Guaj., Her., Lach., Lyc., Mez., Phos.-ac., Puls.: -- вслѣдствіе *наибольшей простуды*: Acon., Arg., Bry., Calc., Dulc., Merc., Phos.-ac., Sulph.—Если боли ревматическія *вызываются дурною поюдою*: 1) Calc., Dulc., N.-mosch., Rhod., Rhus, Veratr.; 2) Amm., Ant., Carb.-an., Carb.-veg., Lach., Lyc., Mang., Merc., Nitr.-ac., Puls., Ser., Spig., Stront., Sulph.—Если онѣ *появляются при всякой переменной поюдою*: Bry., Calc., Carb.-veg., Dulc., Graph., Lach., Mang., Merc., N.-mosch., Phosph., Rhod., Rhus, Sil,

Sulph., Veratr.—Если онъ произошелъ отъ простуды въ водѣ или отъ сырого холода: 1) Calc., N.-mosch., Puls., Rhus, Sassa., Ser.; 2) Bell., Borax, Bry., Carb.-veg., Caust., Colch., Dulc., Her., Ltc. Sulph.;—отъ ознобленія въ зимнее время: 1) Arg., Bry., N.-top.; 2) Carb.-veg., Colch., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sulph.-ac..

§ 4. По припадкамъ, назначаются:

АСОНИТУМ—при терзающихъ или колющихъ боляхъ, которыя въ сидячемъ положеніи унимаются, но ночью становятся невыносимыми до того, что больной терзаетъ всякое терпѣніе; крокъ этого, когда замѣчаются: красная и блестящая опухоль страдающей части и необыкновенная чувствительность ея при дотрогиваніи и движеніи; усиленіе и возвратъ страданій отъ употребленія вина или другихъ разгорячающихъ веществъ, а также и отъ душевныхъ потрясеній; сильная лихорадка съ сухимъ жаромъ, жажда, краснота щекъ, или попеременная краснота и блѣдность лица.

АВНИСА—при боляхъ какъ-бы отъ ошвига или ушиба, чувствѣ опѣмѣнія и свербенія въ страдающихъ частяхъ; при твердой и блестящей опухоль, сильныхъ боляхъ въ страдающихъ частяхъ, съ чувствомъ, какъ-будто всякое мѣсто для члена твердо; ухудшенія страданія при попыткѣ двигать членъ. (Arg. умѣстна послѣ или передъ: Chin., Arg., Ferr., Rhus).

ВЕЛЛАДОНИА—при колющихъ или жгучихъ боляхъ, усиливающихся ночью и отъ движенія; опухоли страдающей части, съ блестящею, далеко распространяющеюся краснотою; сильной лихорадкѣ и біеніи шейныхъ артерій; напорѣ крови къ головѣ, краснотѣ лица и глазъ. (Вообще Bell. часто умѣстна послѣ Acon., Cham., Merc., Puls.).

ВУОНИА—при напрягающихъ и терзающихъ боляхъ, поколебавшихъ въ страдающей части при движеніи, или боляхъ, немѣющихся опредѣленнаго мѣста, или же при боляхъ, немѣющихся мѣсто больше въ мышцахъ, нежели въ костяхъ; красной или блѣдной и напряженной опухоль, или окоченѣлости больной части; ухудшенія болей ночью и при малѣйшемъ движеніи; общемъ потѣ или ознобѣ и дрожи, или сильномъ лихорадочномъ жарѣ и боли головы; желчныхъ или гастрическихъ страданіяхъ; раздражительномъ расположеніи духа и гнѣвѣ (часто послѣ Acon. или Rhus.).

СНАЖОНИЛА—при потягивающихъ или терзающихъ боляхъ и

чувствъ онѣмненія или паралича въ пораженной части; постоянныхъ и ночью усмищающихся боляхъ; лихорадка съ эцимъ эциромъ въ страдающей части и дрожью почти лихорадочною; горячемъ потѣ головы, даже между волосами; краснотѣ большей частью одной щеки иногда обѣихъ; большомъ безпокойствѣ; метаніемъ въ разныя стороны; дрожи и постоянномъ желаніи лежать. (Вообще назначается послѣ или передъ Bell., Puls., Ign.).

MIVESCIVUS — при колючихъ, терзающихъ или жгучихъ боляхъ, которыя усмищаются на сыромъ и холодномъ воздухѣ, а также съ постельной теплотой, ночью или къ утру; отекой опухоли страдающей части; боли въ сочлененіяхъ или костяхъ; чувствѣ холода въ пораженной части; обильномъ потѣ, не приносящемъ однако никакого облегченія. (Часто умѣстенъ послѣ или передъ: Bell., Bry., hip., Dulc., Lach.).

PULSATILLA — при потягивающихъ, терзающихъ и подергивающихъ боляхъ, особенно отъ переменъ положенія, въ которомъ страдающая часть долго оставалась; при боляхъ, скоро переходящихъ изъ одного сочлененія на другое; чувствѣ онѣмненія или паралича въ страдающихъ частяхъ, покалываніяхъ и чувствѣ холода при всякой переменѣ погоды; облегченіи болей при раскрываніи члена или на воздухѣ; блѣдности лица и дрожи, которыя усмищаются виѣстѣ съ болями. (Часто умѣстна послѣ Cham., Ign. или Agr.).

RHUS — при терзающихъ, жгучихъ, напрягающихъ боляхъ, или вывихной боли съ чувствомъ парамичной слабости и свербенія въ страдающихъ частяхъ; околечности или красной и лоснящейся опухоли сочлененія и покалыванія при дотрогиваніи; усиленіи болей при покоѣ и дурной погодѣ. (Умѣстенъ бываетъ послѣ Agr. или Bry.).

SANGUINARIA: воспалительная опухоль суставовъ, съ краснотой и судорожными болями въ пораженныхъ частяхъ.

Регулы болѣзненныя, *Molimina menstruum.*

§ 1. Главныя средства: 1) Bell., Bry., Calc., Cocc., Coff., Graph., Ign., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sec., Sep., Sulph., Vegetr.; 2) Acon., Amm., Amm.-m., Carb.-veg., Caust., Cupr., Kal., Kreos., Lach., Lyc., Magn.-c., Magn.-m., Merc., Natr.-m., N.-mosch., Petr., Sil., Zinc.

§ 2. Изъ этихъ средствъ заслуживаютъ вниманiя:

Вилладонна — когда замѣчаются: колѣна предъ наступленiемъ регулъ и большое расслабленiе; потеря аппетита и истощенiе зрѣнiя; регулы, сопровождающiяся ночнымъ потомъ, частю зѣвотою, ознобомъ и приступами колѣки; притомъ часто являющаяся сердечная тоска, жгучая жажда, боль въ поясницѣ, судорожныя боли въ спинѣ, чувство низдавленiя въ животѣ, какъ-будто все стремится къ дѣтороднымъ частямъ, съ тяжестью, какъ-бы отъ камня; онѣмѣлость ногъ при сидачемъ положенiи и давленiе на прямую кишку, какъ при позывѣ на нивъ, а также напоръ крови къ груди и головѣ; бьющая боль, жаръ въ головѣ, краснота и одутливость лица; особенно если все это встрѣчается у молодыхъ, полнокровныхъ женщинъ.

Витониа — если есть напоръ крови къ грудямъ или головѣ, короткiй кашель или частое кровотеченiе; бѣли, ревматическiя боли въ членахъ, давящая или жгучая боль въ желудкѣ; давленiе и полнота въ надчревной части; ознобъ или частая дрожь, запоръ.

Салсава — напоръ крови къ головѣ, одурѣнiе и головокруженiе, или терзающая, сверлящая боль головы, которая усиливается при всякомъ душевномъ потрясенiи и пережѣнiи погоды; бѣли, рѣзь въ животѣ, боли спинныя и судорожныя въ крестцѣ; жестокая колика, потеря аппетита; астматическiя страданiя; болъ зубная, тошнота или настоящая рвота.

Снамомилла — сильная колика послѣ обильныхъ и рановременныхъ регулъ; большая чувствительность живота при дотрогиванiи, какъ будто-бы все внутри изъязвлено; притомъ спинныя боли и спазмы въ нижней части живота, сопровождающiяся сильнѣйшими болями; зеленоватныя или водянистыя частыя испраженiя; тошнота, отрыжка, наклонность ко рвотѣ; языкъ, покрытый желтоватою корою и горькiй вкусъ во рту; кровь темнаго цвѣта въ видѣ сгустковъ; припадки обморока, жажда, холодъ членовъ, блѣдный и страдальческiй видъ лица.

Соссилус — рановременное появленiе регулъ, сопровождающихся судорогами нижней части живота; или же слабыя регулы, перемежающiяся бѣлями, или каплеобразное истеченiе темной свернувшейся крови; давящiя боли, вѣтры брюшныя, тошнота,

доходящая до обморока, параличная слабость, тоскливость и спазмы груди; тоска и конвульсивныя движенія членовъ; также тогда, когда вмѣсто мѣсячнаго очищенія появляются красноватые бѣли, перемѣшанныя съ кровяными струйками и гнойною кровянистою жидкостію.

СОФГА — при необыкновенно большеннымъ и до того жестокимъ приступамъ колики, что больная приходитъ въ отчаяніе, въ особенности, когда кровь вытекаетъ въ большомъ количествѣ, сопровождается обильнымъ отдѣленіемъ слизи, сладострастнымъ вудомъ и возвышенною раздражительностію дѣтородныхъ частей.

СВАРНІТЪВ — трудно появляющіяся и малоколичественныя и непродолжительныя регулы и истеченіе густой и черной, или же водянистой и блѣдной крови; притомъ *рѣзь съ жидкостью и смазкой* нижней части живота; давящая боль головы, тошнота; боли грудныя, бронхиальный катарръ и насморкъ; большая слабость; ревматическія боли въ членахъ; отечная опухоль ногъ; *попазаніе* или зубная боль и припулость щекъ.

ІЕНАТІА — когда регулы слишкомъ рановременны и обильны; притомъ истекаетъ темная кровь въ видѣ сгустковъ; *судорожная* колика; боль отъ тяжести въ головѣ; свѣтобоязнь, тоска, сердцебіеніе и большая слабость, доходящая до обморока.

НУХ УОМІСА — слишкомъ обильная *рановременная* и *продолжительная* регулы, коимъ предшествуетъ втягивающая боль въ затялочныхъ мышцахъ или: *судороги* матки и давяція боли въ подреберья, простирающіяся до лядвей; *тошнота* и *обморокъ*, *примущественно по утрамъ*; большое расслабленіе, дрожь, ревматическія боли въ членахъ; боль въ крестцѣ, какъ-будто тамъ все разбито; запоръ и тщетное понужденіе на низъ; частое, но тщетное понужденіе въ мочеспусканію; ощущеніе вздутости, какъ-будто животъ готовъ лопнуть; *напоръ* крови къ мозгу, головокруженіе и давящая головная боль; раздражительное и сварливое расположеніе духа, или до того сильное *безпокойство*, что больная *выходитъ изъ себя*.

РНОВРНОВУС — регулы слишкомъ скудныя, коимъ предшествуютъ бѣли, плевксивость, колика и рѣзь въ животѣ; рвота желчью, сливью и пищею; *медленно* *появляющіяся* регулы, но зато обильныя и *продолжительныя*, съ большою слабостію, синевою подъ

главами, искуданіемъ и безпокойствомъ, или колючею головою болью, болѣвненнымъ чувствомъ разбитости въ членахъ, сурдобиеніемъ, кровохарканіемъ, дрожью и припулостію десенъ или щекъ.

PLATINA — слишкомъ обильныя или слишкомъ продолжительныя регулы, или появляющіяся рановременно, при конхъ истекаетъ темная и слизистая кровь; появленіе бѣлей передъ регулами или послѣ нихъ; судорожная колика и давящая боль надъ дѣтородными частями; частый позывъ на моченспусканіе; запоръ или твердая испражненія; рѣзь въ животѣ; потеря аппетита, частые приступы головокруженія, или тоска съ *безпокойствомъ и насечемъ; истеченіе темной и чистой кровью;* бессонница ночью; короткое дыханіе и недовѣрчивое расположеніе духа.

PURGATILLA — въ большей части случаевъ труднаго мѣсячнаго очищенія (*Dysmenorrhoea*) и менструальной колики, особенно, когда регулы появляются поздно и истекаетъ черная свернувшаяся кровь, или же блѣдная и водянистая, или когда при этомъ замѣчаются: колика, судороги нижней части живота, боль въ печени, спазмы желудка, боль съ крестцомъ, тошнота и наклонность ко рвотѣ, или же настоящая кислая или слизистая рвота; мигрень, головокруженіе; дрожь и блѣдность лица; частый позывъ на испражненіе низомъ или на испусканіе мочи; бѣли, *слабость* или тоска, грусть и меланхолія.

SECALE — когда регулы слишкомъ обильны или слишкомъ продолжительны, сопровождаются терзающими и рѣжущими коликами; когда замѣчаются: *холодъ съ членами;* блѣдность лица, холодный потъ; большая слабость; малый и почти угнетенный пульсъ.

SERIA — когда регулы не слишкомъ обильны или не очень малоколичественны, сопровождаются болями, судорожною коликою и давленіемъ надъ дѣтородными частями, болью головы, *ожесточенностью членовъ,* зубною болью и меланхоліею.

SULPHUR — когда регулы появляются слишкомъ рано и слишкомъ обильны, или же слишкомъ скудны, причемъ истекаетъ чрезвычайно блѣдная кровь; и когда передъ, во время или послѣ регулъ замѣчаются: колика, спазмы съ нижней части живота, боль мозговая, напоръ крови къ голове и кровоотеченіе изъ носу,

Боль в крестнице; сильное беспокойство и тоска, боль зубная; изгага; спазмы желудка, зудъ въ дѣтородныхъ частяхъ и блии; астматическія страданія; кашель, или даже конвульсія.

§ 3. При выборѣ средствъ, можно имѣть въ виду:

Если страданія появляются у *молодыхъ дѣвицъ*, еще не сформированныхъ, въ то время, когда должны наступить регулы: 1) Puls., Sulph.; 2) Caust., Cocc., Graph., Kal., Natr.-m., Ser., Vegetr. — Когда регулы *слишкомъ рано* появляются: 1) Amb., Amm., Calc., Carb.-veg., Ipec., Kreoz., Kal., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plat., Rhns, Sabin., Ser., Sil., Sulph., Sulph.-ac.; 2) Amm.-m., Cham., Cin., Coccul., Con., Croc., Ign., Ruta, Sec., Sulph.-ac.; — *слишкомъ поздно наступаютъ*: 1) Caust., Con., Cupr., Dulc., Graph., Jod., Kal., Lyc., Magn.-c., Natr.-m., Puls., Ser., Sil., Sulph.; 2) Dros., Her., Lach.; — *очень не долго* продолжаются: Amm., Baryt., Dulc., Graph., Lach., Natr.-m., Phosph., Puls., Sulph.; — *слишкомъ продолжительны*: Chin., Cupr., Kreoz., Lyc., Natr., N.-vom., Phosph. Plat., Puls., Sec., Sulph.-ac.; — *слишкомъ скудны, малокачественны*: 1) Alum., Amm., Carb.-veg., Caust., Con., Graph., Kal., Lach., Magn.-c., Natr.-m., Puls., Sil., Sulph.; 2) Coccul., Dulc., Ferr., Merc., Phosph., Ruta, Sabad., Sassaп., Ser., Staph.; — *слишкомъ обильны*: 1) Acon., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Chin., Ferr., Ipec., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plat., Sabin., Sec., Sil., Stram., Sulph.-ac.; 2) Bry., Cham., Cin., Hyos., Ign., Lyc., Merc., Nitr.-ac., Ruta Samb., Ser., Sulph. — При *неправильномъ мѣсячномъ очищеніи* у женщинъ въ *переходную пору*, когда регулы начинаютъ прекращаться: 1) Lach., Puls.; 2) Caust., Coccul., Con., Graph., Kal., Lyc., Natr.-m., Ruta, Ser., Sulph..

§ 4. Если регулы *слишкомъ блѣдны, водянисты*: 1) Bell., Calc., Carb.-veg., Cocc., Ferr., Graph., Lyc., Nitr.-ac., Plat., Puls., Sulph.; 2) Ars., Chin., Con., Hell., Kal., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plumb., Ser., Spig. — Если кровь *кофейнаго цвета*: 1) Croc., Cupr., Plat., Sulph.; 2) Arn., N.-mosch., Puls. — Если кровь *очень густа*: 1) Croc., Cupr., Plat., Sulph.; 2) Arn., N.-mosch., Puls. — Если кровь *темнаго цвета*: 1) Bell., Bry., Cham., Croc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amm., Ant., Kreoz., Lach., Magn.-c., Nitr.-ac., Ser.; — *ярко-краснаго цвета*: Bell., Calc., Carb.-veg., Dulc., Ferr., Hyos., Nitr.-ac., Sabin., Sulph.; — *въ видѣ сгустковъ*: Amm., Bell., Cham., Chin.,

Coccul., Ferr., Hyos., Igu., Magn.-с., Magn.-м., Nitr.-ас., Plat., Puls., Rhus, Sabin., Stram.; — свойства *кожаю*, разъядающего: Amm., Carb.-veg., Kal., Natr., Nitr., Sassaп., Sil., Sulph.; — *ихтеъ заматъ зловоный*: Bell., Bry., Carb.-ан., Carb.-veg., Caust., Cham., Croc., Kal., Phosph, Sabin., Sil.

§ 5. Если во время мѣсячнаго очищенія обнаруживается *непоръ крови съ галотъ или зловоокруженіе*: Caust., Jod., Merc., Phosph., Veratr. — Если есть *галотная боля*: 1) Carb.-veg., Lys., Natr.-м., N.-vom., Sulph.; 2) Calc., Cupr., Graph, Hyos., Magn.-с., Magn.-м., Phosph., Ser., Veratr. — Если *страдаютъ глаза*: Calc., Magn.-с., Merc., Puls., Sil., Sulph. — Если присоединяется *отухалъ щекъ*: Graph., Phosph., Ser. — При *зубной боли*: 1) Barut., Calc., Carb.-veg., Kal., Magn.-с., Ser.; 2) Amm., Graph., Natr.-м., Phosph., Sulph.-ас. — При *тошнотъ или рвотъ*: 1) Amm., Carb.-veg., Lys., N.-vom., Puls., Veratr.; 2) Caps., Hyos., Magn.-с., Phosph., Sulph. — При *болѣхъ живота и судорогахъ нижней ея части*: Bell., Cham., Coccul., Coff., Con., Graph., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sec., Ser., Sulph. — При *носоъ*: 1) Graph., Sil., Veratr.; 2) Alum., Amm., Caust., Kreos., Magn.-с. — Если замѣчаются *трудныя струданія и затрудненное дыханіе*: Coccul., Graph., Lach., Puls. Ser. — При *сердцебиеніи*: Alum., Cupr., Igu., Jod., Nitr.-ас., Phosph., Ser., Spong. — При *болѣхъ крестца и спинъ*: Amm., Amm.-м., Calc., Caust., Graph., Kal., Lach., Magn.-с., Magn.-м., N.-vom., Phosph., Plat., Ser. — При *болѣхъ съ членахъ*: Bry., Graph., Ser., Veratr. — При *судорогахъ*: 1) Acon., Cham., Coccul., Coff., Cupr., Igu., Plat., Puls.; 2) Bry., Con., Chin., Graph., Magn.-м., N.-vom., Natr.-м. — Если замѣчается: *большая слабость, расслабленіе и обморокъ*: Caust., Graph., Igu., Magn.-с., N.-vom., Puls., Ser.; — *ненормальность ума и духа*: Acon., Cham., Hyos., Natr.-м., Stram., Veratr.

§ 6. Если страданія появляются: *незадолго до наступленія регуля*: 1) Barut., Calc., Carb.-veg., Cham., Coccul., Cupr., Lach., Lys., Merc., Phosph., Puls., Ser., Sulph., Veratr.; 2) Amm., Acon., Con., Dulc., Natr.-м., Phos.-ас., Plat., Sil.; — *во время регуля*: 1) Amm., Amm.-м., Carb.-veg., Cham., Con., Graph., Hyos., Kal., Kreos., Lach., Phosph., Puls., Ser.; 2) Alum., Ars., Borax., Bry., Calc., Chin., Cocc., Coff., Igu., Lys., Magn.-с., Magn.-м., Merc., Natr.-м., N.-vom., Plat., Sil., Sulph., Veratr., Zinc.; — *послѣ регуля*:

1) Borax., Grsph., Kreos., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Phosph.-ac., Plat., Ruta, Stram.; 2) Alum., Ars., Calc., Cop., Magn.-c., Phosph., Ser., Sil..

Сравн. *Болезни матки, Кровотечение изъ матки, Боль живота, Задержаніе регулъ; Бѣлы.*

Регуль недостаточность, Amenia, Menochesis.

§ 1. Лучшія средства: 1) Puls., Ser., Sulph.; 2) Acon., Bry., Cop., Dulc., Graph., Kal., Lyc., Sil.; 3) Amm., Ars., Bell., Baryt., Calc., Caust., Cham., Coccul., Cupr., Ferr., Natr.-m., Phosph.; 4) Chin., Jod., Merc., N.-mosch., Op., Plat., Rod., Sabin., Staph., Stram., Val., Veratr., Zinc..

§ 2. Первые регулы, долго не появляющіяся въ соответственное возрасту время у молодыхъ дѣвицъ, вызываются преимущественно посредствомъ: 1) Puls., Sulph.; 2) Caust., Cocc., Graph., Kal., Natr.-m., Petr., Ser., Veratr.—*Остановившіяся регулы* вслѣдствіе простуды требуютъ: 1) N.-mosch., Puls.; 2) Bell., Dulc., Ser., Sulph.. — Если онѣ *остановились* вслѣдствіе испуга или внезапной душевной потрясенія: 1) Acon., Lyc.; 2) Coff., Op., Veratr.— Если регулы не совершенно остановились, а только *малоколичественны* (Menochesis): Calc., Caust., Cop., Graph., Kal., Lyc., Magn., Natr.-m., Phosph., Puls., Sil., Sulph., Veratr., Zinc.

§ 3. Кроме того, если этотъ недугъ встрѣчается у женщинъ *полнокровныхъ*: Acon., Bell., Bry., N.-vom., Op., Plat., Sabin., Sulph.— У *слабыхъ* женщинъ, истощенныхъ и кахетическихъ: Ars., Chin., Cop., Graph., Jod., Natr.-m., Puls., Ser., Sulph..

§ 4. Въ отношеніи къ страданіямъ, замѣаемымъ вслѣдствіе этихъ безпорядковъ, или къ *постороннимъ* принадлежамъ, которыми они сопровождаются, можно замѣтить слѣдующее:

Асоитум имѣетъ мѣсто, когда замѣчаются: частые приливы крови къ головѣ или груди и сердцебиеніе; давящая, бьющая или колючая боль головы; краснота лица, полный и твердый пульсъ; большой жаръ и жажда; склонность къ гнѣву и т. д., въ особенности у молодыхъ дѣвицъ, которыя ведутъ сидячую жизнь.

Аввенисум — когда имѣются: большая слабость; блѣдный, поблѣдный видъ лица съ синевой вокругъ глазъ; постоянное же-

даже кислыхъ вещей, кофе и водки; необыкновенная похотливость, развѣдающія бѣлки; частые приступы обморока.

VYUONIA—если задержаніе регулъ сопровождается раздраженіемъ кровеносной системы, при частомъ приливѣ крови къ головѣ и груди, кровотеченіи изъ носу или сухомъ кашлѣ; притомъ ознобъ и частая дрожь, смѣняющіеся иногда сухимъ и жгучимъ жаромъ; запоръ, давящая боль живота и колѣна.

SALSAKKA—при частомъ напорѣ крови къ головѣ, головокруженіи, жгучей боли во лбу или бьющей и давящей головной боли, жужжаніи въ ушахъ; давящей боли живота и чувствъ полноты въ подреберьяхъ; невозможности носить узкое платье; боли и рѣзы въ животѣ, простирающіеся до бедеръ и появляющіеся при наступленіи регулъ; большомъ расслабленіи и тяжести въ животѣ, особенно въ ногахъ.

CAUSTICOM—при припадкахъ истерии, рѣзы въ животѣ, боли поясницы, спазмахъ нижней части живота и желтоватомъ цвѣтѣ лица.

SPINA—при блѣдности лица и синевѣ вокругъ глазъ, давящей боли головы, особенно ночью; давящей боли живота, преимущественно послѣ стола; дурномъ пищевареніи; искуданіи, большой слабости, расслабленіи и тяжести въ ногахъ; бессонницѣ или безпокойномъ снѣ съ тягостными и мучительными видѣніями; также: при спазмахъ нижней части живота и легкихъ; приливѣ крови къ головѣ и біеніи шейныхъ артерій; бѣшенствѣ матки (*Nymphomania*), возвышенной нервной раздражительности и большой чувствительности къ малѣйшему шуму.

COSSULU—если при наступленіи регулъ появляются: истерическія спазмы нижней части живота, чувство давленія на грудь, тоскливость, безпокойство, тоска, печаль, вздохи и стоны; притомъ большая слабость, не позволяющая даже говорить; если показывается кровь, то свѣтлаго, то темнаго цвѣта и истекаетъ каплями, сопровождаясь нервными страданіями.

SONIUM—при припадкахъ истерии и блѣдной немочи, влажныхъ, засохшихъ, или твердыхъ и болящихъ грудяхъ; при обыкновенномъ расслабленіи и истерической нервной слабости, выражающейся непроизвольнымъ смѣхомъ и плачемъ; большой

усталости послѣ прогулки, тоскѣ и печали; спазмахъ нижней части живота и колючихъ боляхъ; при бѣлахъ.

Сиррумъ—при напорѣ крови къ головѣ и давящей боли въ темени; краснотѣ лица и глазъ; при блѣдности лица и синевѣ вокругъ глазъ; частой тошнотѣ и рвотѣ, спазмахъ нижней части живота, подергиваніи въ членахъ и крикѣ; сердцебіеніи и спазмахъ въ груди.

Гербумъ—при большомъ изнеможеніи, слабости и трясеніи членовъ; исхуданіи; *необыкновенной охотѣ лежать или сидѣть*; напорѣ крови къ головѣ, бьющей въ ней боли, шумѣ и жужжаніи; при блѣдномъ и землисто-поблекломъ цвѣтѣ лица съ синевой вокругъ глазъ; или жгучей краснотѣ лица и глазъ; давленіи въ желудкѣ и головѣ; отежной опухолью лица, рукъ и ногъ; большомъ расслабленіи въ ногахъ и другихъ принадлежкахъ блѣдной немочи.

Гварнитекъ—когда появляющіяся регулы слишкомъ блѣдны, и скоро опять останавливаются; особенно если въ то же время замѣчаются: *мыши на кожу или розжевидная сыпь*; при истерической головной боли; тошнотѣ; боляхъ грудныхъ; большой слабости; рѣзи въ животѣ и истерическихъ судорогахъ; бѣлахъ и безплодіи; расположеніи къ геморрою.

Юрдіумъ—когда имѣются: частое сердцебіеніе, блѣдное лицо иногда сильно краснѣющее; одышка при восхожденіи на высоту; большое изнеможеніе и слабость особенно въ ногахъ; признаки блѣдной немочи.

Кали-савонісумъ составляетъ одно изъ лучшихъ средствъ противъ задержанія и отсутствія регулъ; именно, когда при этомъ замѣчаются: затрудненное дыханіе; сердцебіеніе; расположеніе къ розжевиднымъ сыпямъ и блѣдность лица, часто смѣняющаяся сильной краснотой.

Лусородіумъ—при явленіяхъ блѣдной немочи, большой склонности къ печали, *меланхолии* и плачу; истерической головной боли; кислой рвотѣ и кислому вкусу во рту; опухолью ногъ, боляхъ спины, поясницы и колѣнъ; припадкахъ обморока; бѣлахъ, припухлости и чувствѣ давленія въ сторонѣ шупка; потягивающихъ и напругающихъ боляхъ по всему животу.

Меркуріусъ—противъ задержанія регулъ, сопровождающагося напоромъ крови къ головѣ, сухимъ жаромъ и лихорадкой;

если при этомъ замѣчаются: бѣли, отекая опухоль конечностей или лица; блѣдность и страдальческій видъ лица; большое *утомленіе и слабость*, трясеніе членовъ и волненіе крови послѣ малѣйшаго движенія; раздражительный нравъ; печальное или угрюмое расположеніе духа.

NaTRUM — при частой головной боли, припадкахъ истерии или блѣдной немочи; *склонности грустить* и равнодушія; сильной слабости душевной и тѣлесной, тяжести въ членахъ и неохотѣ къ движенію; склонности къ гнѣву и вспыльчивости.

ORUM — противъ остановившихся регулъ, если это сопровождается напоромъ крови къ головѣ, которая кажется слишкомъ тяжелой, краснотой и жаромъ лица, спячкою и конвульсивными движеніями.

NUX VOMICA — противъ остановившихся регулъ, съ судорогами и другими истерическими припадками; при склонности къ сну и обморокамъ, большому изнеможенію и слабости, и совершенномъ истощеніи послѣ малѣйшаго движенія; при боляхъ постылицы, частой кислой изжогѣ, переменчивомъ расположеніи духа.

PULSATILLA — одно изъ первыхъ средствъ при задержаніи регулъ, преимущественно, *когда последнее обнаружилось вслѣдствіи мокротою холода или сырости*; или когда при этомъ замѣчаются частые припадки болѣе одной половины головы; колючія боль, простирающіяся до лица и зубовъ; головная боль во лбу и давленіе въ макушкѣ; блѣдный цвѣтъ лица; головокруженіе и жужжаніе въ ушахъ; колючая зубная боль и *внезапное перескакиваніе боли съ одной стороны на другую*; частый насморкъ; затрудненное дыханіе, одышка послѣ малѣйшаго движенія; *сердцебиеніе, холод конечностей*, смѣняющійся иногда внезапнымъ жаромъ; *склонность къ слизистымъ носамъ*; бѣли; боли въ поясницѣ; давящая тяжесть въ животѣ; боль живота съ *тошнотой, наклономъ ко рвотѣ и настоящею рвотою*; постоянная дрожь, зѣвота, потягота и большое утомленіе, особенно въ ногахъ; *отуханіе ногъ*; преимущественно назначается для женщинъ съ *бѣлокурыми волосами, голубыми глазами, веснушками на лицѣ, съ кроткими нравами и наклономъ къ печали и плачу*.

SABINA — если у женщинъ, вмѣсто прежде бывшихъ обильныхъ регулъ, появляются густыя и вонючія бѣли.

СЕРІА—столь же хороша противъ задержанія регулъ съ болями, какъ и Puls.; назначается въ слѣдующихъ случаяхъ: частые припадки истерической или нервною головной боли; боль зубная и необыкновенная чувствительность зубныхъ нервовъ; нѣжное тѣлосложеніе; нѣжная и чувствительная кожа; *поблеклый цвѣтъ* лица или *нечистая плътка на немъ*; нервная слабость и большая склонность къ поту; частая дрожь, смѣняющаяся жаромъ; *расположеніе къ меланхолии, грусти и плачу*; часто случающійся насморкъ; боль въ членахъ, какъ-будто они разбиты; частая колка и боль въ крестцѣ; равно въ случаяхъ, когда больная работала на водѣ и промокла.

СУЛРНИУ—когда замѣчаются: *давящая и жгучая боль в оловѣ*, особенно въ затылкъ, *идущая до спины*, или бьющая боль головы, напоръ крови къ ней, жаръ, бурвленіе, поталкиваніе и *жужжаніе въ мозгу*; блѣдный, страдальческій видъ лица съ синевою вокругъ глазъ и краснотою щекъ; *сыпь на лбу и вокругъ рта*; *непомятый языкъ* и большая прожорливость, при общемъ искуданіи; кислая и жгучая отрыжка; давленіе, чувство полноты и тяжести *въ животѣ, подреберьяхъ* и нижней части живота; *расположеніе къ геморрою*; поносъ и слизистыя испраженія, или *запоръ*, твердыя испраженія и частый, но тщетный позывъ на низъ; судороги нижней части живота; бѣли, зудъ въ дѣтородныхъ частяхъ; припадки истерика и блѣдной немочи; скорая онѣмѣлость членовъ; одышка; боли поясницы; припадки обморока; большая *склонность къ простудѣ*; нервная слабость; большое *утомленіе*, особенно *въ ногахъ*, и большая усталость отъ разговора; раздражительный нравъ и склонность въ гнѣву, или мрачное и меланхолическое настроеніе духа и частый плачь.

УЕНАТІУМ — противъ задержанія регулъ, сопровождающагося нервною головною болью и истерическими припадками, блѣднымъ, землисто-поблеклымъ цвѣтомъ лица, частою тошнотою и рвотою, холодомъ конечностей и носа; большою слабостью, склонностью къ обмороку; возбужденнымъ состояніемъ половой похоти, доходящимъ до нимфоманіи и другими нервными припадками.

См. *Регулы болѣзненные* и *Блѣдная немочь*.

Роговины глаза болѣзни, Morbi membranae corneae, Corneitis.

Лучшія средства противъ этихъ болѣзней: 1) Calc., Can., Con., Euphr., Puls., Sulph.; 2) Ars., Aur., Chel., Chin., Her., Kal.-bi., Lach., Magn.-c., Merc., Natr., Nitr.-ac., Ruta, Seneg., Ser., Sil., Spig. — Противъ пятну роговой оболочки болѣе всего прѣдпочтены: 1) Calc., Can., Caust., Cupr., Her., Nitr.-ac., Seneg., Sil.; 2) Ars., Calc., Cin., Kal.-bi., Ruta, Ser., Spig.; 3) Aur., Con. — Противъ язвочекъ и рубчиковъ: 1) Euphr., Her., Sil.; 2) Ars., Calc., Lach., Merc., Natr. — Противъ потемнѣній роговой оболочки: 1) Calc., Can., Euphr., Magn.-c., Puls., Sulph.; 2) Calc., Chel., Chin., Nitr.-ac., Phosph. — При образованіи крыловидной плесви (*Pterygium*): Chrom., Lach., Or., Plumb. — При кровяномъ наростѣ: 1) Bell., Calc., Lys., Ser., Sil.; 2) Carb.-a., Sulph., Thuj. — При стафиломѣ: Ars., Calc., Cuphr., Lys., Sulph.

Срavn. *Воспаленіе мазь.*

Родинки, пятна, Naevi.

Главные средства: 1) Calc., Carb.-veg., Sulph.; 2) Graph., Sulph.-ac.; 3) Lys., Nitr.-ac., Petr., Plat., Sil., Thuj. — *Поверхностная плеснь (Naevi pigmentarii)*: 1) Con., Phosph., Ser., Sulph.; 2) Amm., Ant., Calc., Graph., Lys., Puls., Sil.; — *возвышенная, сосудистая (N. vasculares)*: 1) Carb.-veg., Plat., Ser., Thuj.; 2) Berb., Crotal., Lys., Natr.-m., Sulph.

Роднички, поздно зарастающіе у дѣтей.

Въ этомъ случаѣ употребляютъ: 1) Calc.; 2) Sil., Sulph.

Роды, Partus.

§ 1. Средства для ускоренія родового акта, или для устраненія препятствій, которыя встрѣчаются при немъ: 1) Cham., Coff., N.-vom., N.-mosch., Or., Puls., Sec.; 2) Acon., Bell., Calc.

§ 2. Противъ судорожныхъ потугъ: 1) Coff., N.-vom.; 2) Bell., Cham., N.-mosch., Puls.

СОФФА — когда потуги такъ сильны, что доводятъ роженницу до отчаянія; если Coff. окажется неудовлетворительнымъ, то Acon.

НУХ-УОМІСА—когда потуги не сопровождаются очевидными действительными явлениями родового акта, или вообще, когда онъ, сопровождаются постояннымъ позывомъ на низъ или на испусканіе мочи. Если *N.-vom.* въ этомъ случаѣ не окажется удовлетворительною, то пригодны: 1) *Cham.* 2) *Bell.* 3) *N.-mosch., Puls.*, смотря по обстоятельствамъ.

§ 3. При недостаткѣ потугъ: *Op., Puls., Sec.*

ОРИУМ тамъ, гдѣ у полнокровныхъ женщинъ вдругъ прекращаются потуги, вслѣдствіе испуга или друаго какого-либо душевнаго потрясенія, и если это сопровождается напоромъ крови къ мозгу, краснотою и одутлостью лица и даже сонливымъ состояніемъ.

ПУЛВАТИЛЛА — если потуги не появляются у женщинъ довольно хорошаго тѣлосложенія; кромѣ того, при судорожныхъ боляхъ, или также, когда недостатокъ потугъ зависитъ больше отъ недѣятельности матки, нежели отъ общей слабости.

СЕКАЛЕ необходима, если недостатокъ потугъ будетъ у слабыхъ, кахектическихъ женщинъ, или у истощенныхъ отъ сильной потери крови, но будутъ ли при этомъ судорожныя потуги, или отсутствіе ихъ, это не важно. Какъ полезно дѣйствіе этого средства въ сказанномъ случаѣ, такъ оно сомнительно въ большей части другихъ и отъ употребленія его не во-время могутъ произойти послѣдствія весьма непріятныя.

§ 4. Если по отдѣленіи плацента не появится правильныхъ сокращеній для изгнанія приращеннаго послѣда, то для скорѣйшаго окончанія родового акта, достаточно *Puls.*, или *Sec.* При этомъ надо помнить вышесказанныя правила. Если *Puls.* не окажется удовлетворительною тамъ, гдѣ для нея существовало показаніе, или если замѣчается сильный приливъ крови къ головѣ и оттого краснота лица, свержающіе глаза, большая сухость кожи и маточнаго рукава, большая тоска и беспокойство, то показана *Bell.*

§ 5. Противъ слишкомъ сильныхъ и продолжительныхъ послеродовыхъ потугъ: 1) *Arn., Cham., Coff.*; 2) *Calc., N.-vom., Puls.*

§ 6. Противъ конвульсій и судорогъ, которыя иногда появляются во время родовъ: 1) *Huov., Ign.*; 2) *Bell., Cham., Cic.* — При порожденіи половыхъ частей вслѣдствіе трудныхъ родовъ, главное

средство Arn.; 10 капель на 8 унцій воды употребляются и видѣ обмыванія.—Противъ внезапнаго кровоизверженія изъ матки 1) Croc., Plat.; 2) Bell., Cham., Ferr., Sabin..

Рожа, воспаление розжистое, Erysipelas.

§ 1. Главныя средства: 1) Acon., Bell., Graph., Lach., Merc., Puls., Rhus; 2) Arn., Ars., Bry., Calc., Camph., Canth., Carb.-an. Cham., Clem., Her., Nitr.-ac., Phosph., Plumb., Sil., Sulph.; 3) Amm. Carb.-v., Chin., Croc., Euphorb., Hyos., Jod., Kal., Lyc., Sep., Stram. Thuj..

§ 2. Въ легкихъ случаяхъ, противъ обыкновенной рожи: Acon. Bell., Her., Lach.—Противъ такъ называемой *блуждающей рожи* 1) Bell., Rhus; 2) Graph., Puls.—Противъ *флегмонозной рожи*, или *розжистой воспалительной опухоли*: 1) Bell., Graph., Her., Merc. Puls., Rhus; 2) Acon., Calc., Chin., Kal., Lyc., Nitr.-ac., Phosph., Sulph., Thuj..—При *рожѣ яркочермнаго цвѣта*: 1) Alum., Bell. Hyos., Merc., Phosph.; 2) Acon., Ars., Bry., Croc., Lach., Stram. Sulph.—При *пузырчатой рожѣ*: 1) Rhus; 2) Staph.; 3) Ars., Bell. Hyos., Lach.—Противъ *полной розжистой сыпи* вокругъ туловища (Zona): 1) Rhus; 2) Graph., Puls; 3) Ars., Merc., Sil., Sulph.—При *вторичной рожѣ*, встречающейся при отечныхъ опухоляхъ: 1) Rhus 2) Ars., Chin., Kal., Merc., Sulph.—Противъ рожи, которая переходитъ въ *мишю* съ большими изъязвленными поверхностями 1) Clem., Rhus; 2) Ars., Graph., Merc., Sil., Sulph.—Если рожа переходитъ въ *омертвѣніе*: 1) Ars., Carb.-v.; 2) Bell., Chin., Lach. Sabin., Sil.

Сравн. *Опухоль, Омертвѣніе, Рожа лица, Скарлатина.*

Рожа лица, Erysipelas faciei.

Средства: 1) Aris., Bell., Lach., Rhus; 2) Cham., Graph., Her. Puls., Sulph; 3) Acon., Camph., Canth., Carb.-an., Carb.-veg., Euphorb., Supr., Sep., Stram..

ARIS во многихъ случаяхъ, гдѣ Bell. оказалась безуспѣшною, равно и при самомъ началѣ леченія у людей, часто страдавшихъ рожею прежде, и преимущественно у женщинъ и дѣтей.

BELLADONNA — когда заиѣчаются: бредъ, колючая боль головой, бѣшенный взглядъ, сильная жажда, сухость языка, сухость губъ и другіе симптомы, угрожающіе переносомъ рожи лица на оболочку мозга.—**LACHESIS**—вначалѣ болѣзни, или когда Bell. не успѣла устранить церебральныхъ припадковъ. Послѣ Lach. во многихъ случаяхъ показана Нер. или Merc.—**RHUS**—при пузырьчатой рожѣ, или когда поражаются покровы черепа. Въ послѣднемъ случаѣ онъ дѣйствуетъ специфическимъ образомъ.— При опасности *переноса на мозгъ*, пригодны въ особенности: 1) Bell., Bry.; 2) Curg., Rhus.

См. *Рожа* и сравн. *Опухоль шеи*.

Роженницы состояніе, Morbi parturientium.

Средства противъ различныхъ страданій и болѣзненныхъ состояній *роженницъ* вообще:

Противъ слишкомъ жестокихъ или слишкомъ продолжительныхъ *послеродовыхъ потугъ*: 1) Arn., Cham., Coff.; 2) Calc., N.-vom., Puls. (см. *Роды*). — Противъ *молочной мигорадки*: 1) Acon., Coff.; 2) Arn., Bell., Bry., Rhus. — Противъ *недостаточнаго отдѣленія молока*: 1) Calc., Caust., Puls.; 2) Acon., Bell., Bry., Cham.—Противъ *скрытія молока*: Acon., Bell., Bry., Calc., Cham., Coff., Merc., Puls., Rhus, Sulph. — Противъ *истеченія* молока и страданій вслѣдствіе *отнятія* ребенка отъ *груды*: Bell., Bry., Calc., Puls. (См. *Кормленіе грудью*). — Противъ *отслойки грудныхъ сосковъ*: 1) Arn., Sulph.; 2) Calc., Cham., Ign., Puls.. — Противъ *воспаленія или нагноенія* грудей: Bell., Bry., Merc., Phosph., Sil., Sulph. (См. *Женскія груды*). — Противъ задержанія *послеродоваго очищенія*: Coloc., Hyos., N.-vom., Plat., Sec., Veratr., Zinc. — Противъ слишкомъ обильнаго или слишкомъ продолжительнаго *послеродоваго очищенія*: Bry., Calc., Croc., Нер., Plat., Puls., Rhus, Sec.— При *большой болящей опухли бедра*: Arn., Bell., Rhus. — Противъ *родильной мигорадки*: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., N.-vom., Rhus; 2) Coff., Coloc., Hyos., Ipec., Merc., Puls., Veratr. (См. *Родильная мигорадка*). — Противъ *душевныхъ потрясеній роженницъ*: Bell., Plat., Puls., Sulph., Veratr., Zinc.. — Противъ *конвульсій, эклампсис и т. д.*: 1) Cycl., Hyos., Ign., Plat.; 2) Bell., Stram. (Сравн. *Судо-*

ром).—Противъ слабости: 1) Calc., Kal.; 2) Chin., Sulph.; 3) N. vom., Phos.-ac., Veratr. (Сравни. Слабость).—Противъ бесшумнаго Соф. — При большомъ животѣ у роженицы: 1) Ser.; 2) Coloc.— При чрезмерномъ потѣ: 1) Acon., Bry.; 2) Chin., Sulph., Veratr.— При ухудшеніи состоянія послеъ каждаяго кормленія грудью: Ferr., Hell., Sil.—Противъ колики: 1) Bry., Cham.; 2) Arn., Bell., Hyos., Lach., N.-vom., Puls., Ser., Veratr. (См. Боли живота).—Противъ поноса: Ant., Dulc., Hyos., Rhab. (Сравни. Поносъ);—запора на тѣхъ Bry., N.-vom., Op., или Plat. (Сравни. Запоръ на низѣ).—Противъ выпаденія волосъ: Calc., Lys., Natr.-m., Sulph. (Сравни. Волосъ выпаденіе).

Ромашка, вредъ отъ злоупотребленія.

Средства противъ такихъ послѣдствій: 1) Acon., Coff., Cost., Ign., N.-vom., Puls.; 2) Alum., Bogax, Camph., Coloc.

Асонитум — когда замѣчаются: лихорадка съ жаромъ и терзающими или потягивающими болями, которыя уменьшаются при движеніи.

Соссулюс — если ромашка произвела истерическія судороги нижней части живота у женщинъ, или усилила прежде существовавшія судороги.

Соффа — при сильныхъ боляхъ или лихорадочномъ жарѣ, раздражительности и чувствительности.

Игнатія — если у дѣтей отъ ромашки обнаружались сильныя судороги и конвульсии, или ссадины въ складкахъ сочлененій, и когда Puls. оказалась неудовлетворительною.

Нух vomіса — если отъ ромашки усилились прежде существовавшія страданія больного и Соф. оказалась недостаточной, или если ромашка произвела спазмы желудка.

Пульсатилла — если вслѣдствіе употребленія ромашки развились тошнота и рвота, или если у дѣтей показались ссадинныя отслойка кожи въ складкахъ сочлененій.

Ростъ быстрый, болѣзни отъ него.

Какъ противъ болей въ членахъ, такъ и общаго тѣлеснаго и душевнаго утомленія, появляющихся у молодыхъ людей во время слишкомъ быстрого роста тѣла, главное средство Phos.-ac.

Рта вловоніе, Foetor oris.

§ 1. Почти всегда составляет симптомъ другой болѣзни, которой однакожь не долженъ быть оставленъ безъ вниманія при леченіи главной болѣзни. Средства вообще: 1) Agr., Aca., Aug., Carb.-v., Merc., Puls., Ser., Sulph.; 2) Bell., Bry., Cham., Chiu., Dulc., Hyos., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Rhus, Sil., Stann.; 3) Acon., Amb., Apac., Carb.-an., Coff., Graph., Ipec., Spig.

§ 2. При вловоніи изо рта у дѣвцъ въ періодъ зрѣлости, часто очень полезно Aug., или также: Bell., Hyos., Puls., Ser.; — если дурной запахъ изо рта обнаруживается только по утрамъ, то приличнѣйшими средствами считаются: Agr., Bell., N.-vom., Sil., Sulph.; — если онъ появляется послѣ стола: Cham., N.-vom., Sulph.; — если же только по вечерамъ или ночамъ: Puls. или Sulph.; — если онъ слѣдствіе злоупотребленія ртути, то: 1) Aug., Carb.-v., Lach., Sulph.; 2) Aug., Bell., Ner..

Ртуть, вредныя послѣдствія отъ ея злоупотребленія.

§ 1. Средства при опасныхъ отравленіяхъ сурою (Hydrargyrum muriaticum siccativum), по Герингу: 1) бѣлокъ, растворенный въ водѣ, въ видѣ питья; 2) сахарная вода; 3) молоко; 4) крахмалъ, смѣшанный съ водою, или клейстеръ изъ крахмала (клей переплетчиковъ); впрочемъ бѣлокъ и сахарная вода составляютъ вдѣсь главные средства и лучше всего давать ихъ попеременно.

§ 2. Послѣдствіями страданія требуютъ такого же леченія, какъ и недуги, происшедшіе отъ злоупотребленія препаратовъ ртути, принятыхъ въ видѣ врачебныхъ пособій.

Въ послѣднемъ случаѣ, главное и почти всегда дѣйствительное противоядіе составляетъ Kal.-hydr. въ большихъ приемахъ, или Ner. въ малыхъ, утромъ и вечеромъ по приему; послѣднее средство въ особенности полезно, когда замѣчаются: боль головы по ночамъ; выпаденіе волосъ; болящія желваки на языке; воспаленіе и краснота глазъ и болѣзненная чувствительность носа при давленіи; струны вокругъ рта; слюнотеченіе и изъязвленіе десенъ; припухлость миндалинъ и шейныхъ железъ; припухлость и изъязвленіе паховыхъ и подкрыльцовыхъ железъ; невращенія частыя и жидкія съ натугою; воспаленіе и наклонность кожи къ

изъявленію. Если Нер. не произвела дѣйствія, то можно употребить Bell. или Nitr.-ас.; если послѣ дѣйствія Nitr.-ас. остаются еще нѣкоторыя страданія, то одинъ приемъ Sulph., которому дадутъ дѣйствовать нѣсколько недѣль, окажетъ много пользы; послѣ Sulph. иногда уместна также Calc.. Если больной въ одно и то же время во зло употреблялъ *ртуть* и *сыру*, то излеченіе скорѣе всего достигается посредствомъ Bell., Puls. и Merc..

§ 3. При хроническихъ страданіяхъ вслѣдствіе злоупотребленія ртути, можно употреблять:

Противъ *болѣзней рта* и *десенъ*, также и противъ *слюноточенія*: 1) Carb.-veg., Dulc., Нер., Nitr.-ас., Staph., Sulph.; 2) Chin., Jod., Natr.-т. — Противъ *болѣзней юрла*: 1) Bell., Carb.-veg., Нер., Lach., Staph., Sulph.; 2) Arg., Lys., Nitr.-ас., Thuj.. — Противъ *нервной слабости* и потерн силъ: 1) Chin., Нер., Lach.; 2) Carb.-veg., Nitr.-ас. — Противъ *сильной нервной раздражимости*: Carb.-veg., Cham., Нер., Nitr.-ас., Puls.. — Противъ *большой чувствительности къ переменѣ погоды*, холоду и т. д.: Carb.-veg., Chin.. — Противъ *ревматическихъ болѣзней*: 1) Carb.-veg., Chin., Dulc., Guaj., Нер., Lach., Phos.-ас., Sassa., Puls., Sulph.; 2) Arn., Bell., Calc., Cham., Lys.. — Противъ *болѣзней костной системы*, наростовъ на костяхъ, *костнойды* и т. д.: 1) Aur., Phos.-ас.; 2) Asa., Calc., Dulc., Lach., Lys., Nitr.-ас., Sil., Sulph.. — Противъ *болѣзней железъ*, *паховиковъ* и т. д.: Aur., Carb.-veg., Dulc., Nitr.-ас., Sil.. — Противъ *язвъ*: Aur., Bell., Carb.-veg., Нер., Lach., Nitr.-ас., Sassa., Sil., Sulph., Thuj.. — Противъ *идротическихъ страданій*: Chin., Dulc., Hell., Sulph..

См. о другихъ страданіяхъ вслѣдствіе злоупотребленія ртути въ статьяхъ: *Болѣзнь чолови*, *Воспаленіе глаза*, *Болѣзнь зубовъ*, *Кожиха*, *Помесь*.

С.

Самоубійство (наклонность къ нему).

Главныя средства: 1) Arg., Aur., N.-vom., Puls.; 2) Alum., Amb., Amm., Bell., Lach., Nitr.-ас., Plat., Sep.; 3) Ant., Carb.-veg., Chin., Dros., Нер., Hyos., Mez., Rhus, Sec., Spig., Stram., Tart.

Изъ этихъ средствъ въ особенности: при *меланіи* покуситься или удавиться: Arg.; — *утопиться*: Bell., Dros., Hyos., Dulc., Sec.; — *застрыгнуться*: Ant., Carb.-v..—Если при этомъ замѣчается *страхъ смерти*: Alum., Chin., Nitr.-ac., Plat., Rhus. — Если до покушенія на самоубійство доводить *большая тоска и страхъ*: 1) Aur., N.-vom., Puls.; 2) Bell., Caust., Chin., Dros., Her., Plat., Rhus, Spong., Staph.; — *злость и меланхолія*: 1) Aur., Lach.; 2) Carb.-veg., Her., Plat., Ruta, Spong., Sulph., Sulph.-ac.; — *отчаяніе*: Amb., Carb.-veg., Hyos., Lach., Natr., Ser..

Свинецъ, послѣдствія отравленія имъ.

§ 1. При отравленіи большими приемами: 1) *сѣрно кислая магнезія*, растворенная въ водѣ и даваемая въ видѣ питья; 2) *сѣрно-кислое кали*; 3) *милкая вода*; 4) *бѣлокъ*; 5) *молоко*; 6) *слизистое питье* или клистиры изъ слизистыхъ веществъ.

§ 2. Противъ остающихся *динамическихъ* недуговъ очень успѣшны: Alum., Bell., N.-vom., Op., Plat.. Эти же средства употребляются противъ дурныхъ послѣдствій отъ употребленія свинца въ видѣ лекарства.

Свищъ мочевого пузыря и ваналя, Fistula vesicae urinariae et uretrae.—Средства противъ этого недуга: Arg., Calc., Carb.-an., Sil., Sulph..

О прочемъ см. *Язва, Перелой, Болѣзнь мочевого пути*.

Свищъ прямой кишки, Fistula intestini recti, ani.

Средства, которыя можно употребить при этомъ свищѣ: Calc. Caust., Sil. и Sulph.. См. *Язва (свищевая)*.

Свищъ слезнаго мѣшка, Fistula sacci lacrymalis.

Средства, которыя опытами и чистыми наблюденіями признаны полезными: 1) Bell., Calc., Chel., Puls., Ruta; 2) Bry., Natr., Natr.-m., Petr., Phos., Sil., Stann., Staph.. Срав. также *Язва, Воспаленіе глаза*.

Сердца болѣзни, Affectiones cordis.

§ 1. Лучшія средства противъ страданій сердца вообще сук:
 1) Acon., Arg., Aur., Bell., Carb.-v., Glon., Kalm., Oxal., Phosph., Puls., Spig.; 2) Arn., Benz., Cann., Caust., Kal.-bi., Lach., Spong.; 3) Ambr., Apis, Asa, Con., Cupr., Kreos., Mang., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Rhus, Ser., Sulph..

§ 2. При *воспаленіи сердца* (Carditis) часто употребляются 1) Acon., Bry., Cann., Caust., Glon., Lach., Puls.; 2) Apis, Ars., Cocc., Spig.—При остромъ *ревматизмѣ сердца*: 1) Acon., Aur., Calc., Caust., Lach.; 2) Ars., Bry., Calc., Puls., Spig.—При *воспаленіи внутренней оболочки сердца* (Endocarditis): 1) Acon., Cann.; 2) Ars., Bism., Bry., Cocc., Dig., Glon., Spig.; 3) Apis, Crotal., Caust., Lach., Natr.-m., Puls.;—*наружной оболочки* (Pericarditis): 1) Ars., Bell, Cann., Colch., Crotal., Glon.; 2) Apis.—При *выпотнѣнн въ сердечную сорочку*: Apis, Arg., Cann., Crotal., Dig., Glon.—При *экссудатахъ и отлаженіяхъ* вообще: Ars., Cann.—При *пораженъ заслонокъ*: Aur., Bism., Cann., Crotal., Dig., Rhus, Spig.—При *аневризмѣ сердца*: 1) Aspar., Cann., Carb.-v., Graph., Puls., Spig., Veratr.; 2) Aur., Calc., Caust., Graph., Guaj., Lach., Lyc., Rhus; 3) Ambr., Arn., Ars., Ferr., Natr.-m., Zinc.—При *инертрофіи*: 1) Acon., Aspar., Bism., Graph., Lyc., Puls., Spig., Veratr.; 2) Ars., Brom., Jod., Kal.-bi., Kalm., Phosph., Spong.—При *полнотѣ сердца*: 1) Lach.; 2) Calc., Staph., Brom.

§ 3. Противъ *сердцебиенія*: 1) Acon., Calc., Chin., Jod., Lyc., Merc., Natr.-m., Phos., Puls., Ser., Spig., Sulph.; 2) Alum., Arg., Aur., Bell., Bry., Caust., Cocc., Coff., Ign., Kal, Lach., N.-vom., Petr., Phos.-ac., Ruta, Thuj., Veratr.; 3) Verb., Cham., Dig., N.-mosch., Op.—Въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ, когда причина болѣзни неизвѣстна: Acon., Arg., Sulph.—Главныя средства противъ *сердцебиенія* вслѣдствіе *примеса крови или полицеміи*: Acon., Aur., Bell., Coff., Ferr., Lach., N.-vom., Op., Phos., Sulph.—У *истерическихъ женщинъ*: Asa., Cham., Cocc., Coff., Ign., Lach., N.-vom., Puls., Veratr.—Противъ *сердцебиенія* вслѣдствіе *душевной потрясенія*: Acon., Cham., Coff., Ign., N.-vom., Op., Veratr.;—вслѣдствіе *огорченія*: Acon., Cham., Ign., N.-vom.;—вслѣдствіе *испуга*: Op. Coff.;—вслѣдствіе *внезапной радости*: Acon., Coff.;—вслѣд-

ствіе *смазано страха или тоски*: Veratr.; — *вслѣдствіе ослабляющей потери соколов*: Chin., N.-vom., Phos.-ac., Sulph.; — *у опачистов*: Ferr.; — *вслѣдствіе скрюченной внутри сени, или скоро заличенныхъ застарѣлыхъ явъ*: Arg., Caust., Lach., Sulph..

Сравн. *Приметы крови къ гуды, Душевная потрясенія, Полнокровіе.*

§ 4. Показанія различаются также относительно *различныхъ обстоятельствъ*. Такъ при *сердцебиеніи вечеромъ*: Carb.-a., Caust., Lyc., Natr., Nitr., Nitr.-ac., Petr., Phosph., Ser., Sulph.. — При *душевныхъ напряженіяхъ*: Ign., Staph.. — При *тѣлесныхъ усміяхъ*: Amm.. — При *дежженіи*: Graph., Natr.-m., Phosph., Staph., Veratr.. — *Послѣ яды*: 1) Lyc.; 2) Camph., Carb.-a., Carb.-v.; 3) Calc., Ign., Her., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Ser., Sil., Sulph., Thuj.; — *утромъ*: 1) Kal.; 2) Carb.-an., Ign., N.-vom., Phosph.; — *отъ всякаго потрясенія души*: 1) Puls.; 2) Nitr.-ac., Phosph.; — *при тѣни*: Carb.-an.; — *при лежаніи на спинѣ*: Ars., Nitr.; — *на боку*: Baryt., Natr., Natr.-m., N.-vom., Pulc.. — *Отъ музыки*: Carb.-a., Staph.; — *ночью*: 1) Calc., Phosph., Puls.; 2) Ars., Ign., Lyc., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., Sil., Sulph.; — *во время реумъ*: 1) Cupr.; 2) Alum., Ign., Jod., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Spong.; — *въ сидячемъ положеніи*: Ang., Carb.-v., Dig., Magn.-m., Natr., Phosph., Rhus, Sil., Spig.; — *послѣ разговора*: Puls.; — *при восхожденіи на высоту*: 1) Nitr.-ac., Sulph., Thuj.; 2) Natr.; — *послѣ испраженія на низъ*: Caust., Tart.; — *послѣ тины*: Cop.; — *сопровождаемомъ большою тоскою*: Ars., Veratr..

§ 5. Наконецъ по *качеству* сердцебиенія. Когда оно *прерывисто*: 1) Chin., Kal., Natr.-m., Ser.; 2) Acon., Ars., Bry., Chin., Dig., Her., Lach., Natr.-m., Op., Phosph.-ac., Sulph.; — *не совпадаетъ съ ударами пульса*: Acon., Arn., Cann., Dig., Kal., Natr.-m., Spig., Veratr.; — *неправильно*: 1) Ars., Natr.-m., Spig.; 2) Alum., Arn., Aur., Laur., Sabin., Zinc.; — *выражается трепетаніемъ органа*: 1) Ars., Calc., Natr.-m., Spig.; 2) Cic., Cocc., Kal., Lach., Phosph., Rhus, Staph..

Синильная кислота, отравленіе ею.

Лучшія средства при *полныхъ отравленіяхъ* суть: 1) *наименерный спиртъ*, который даютъ нюхать, или же *внутрь* растворъ двухъ капель его въ стаканѣ воды, принимать по чайной ложкѣ;

2) *черный кофе*, въ видѣ питья или клистировъ; 3) *укусъ или камфорные пары*.—Противъ оставшихся менѣе важныхъ недуговъ: *Coff.*, *Ирес.*, или *N.-vom.*.—Тоже самое нужно сказать и объ употребленіи *журькими миндалями* и *сокомъ лаврового листа*.

Синяя немочь, синюха, Cyanosis.

Въ клиническихъ сочиненіяхъ гомеопатинъ находятся одно только наблюденіе надъ излеченіемъ синюхи посредствомъ *Dig.* Рекомендовали также противъ этой болѣзни и *Lach.* Должно допустить, что эти средства дѣйствуютъ только противъ синюхи, зависящей отъ особеннаго органическаго порока сердца, потому что въ означенныхъ сочиненіяхъ не упомянуто, въ какомъ видѣ болѣзни эти средства оказались полезными.—При синей немочи, происходящей отъ порока перваго образованія, но *составляющей симптомъ другой болѣзни* (какъ напр. холеры), часто оказываются приличными: 1) *Acop.*, *Camph.*, *Caib.-v.*, *Supr.*, *Dig.*, *Lach.*, *Op.*, *Vegetr.*; 2) *Arn.*, *Arg.*, *Aug.*, *Bell.*, *Merc.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phos. Puls.*, *Rhus*, *Samb.*, *Sec.*, *Sil.*, *Spong.*

Выборъ здѣсь, какъ и вездѣ, будетъ зависеть отъ постороннихъ общихъ и частныхъ симптомовъ.

Сифилисъ, венеризмъ, Syphilis. § 1. Главное средство противъ сифилитической болѣзни есть *Merc.*.—Рѣдко однако удается вылечить первичный *ulcus syphiliticum* высокими разведеніями, которыя иногда даже усиливаютъ страданія, возвышаютъ раздражительность нервной системы, нисколько не исправляя состоянія язвы.

§ 2. Лучшій способъ леченія *первичной* сифилитической язвы въ остромъ ея состояніи, заключается въ томъ, что вскакій день, или черезъ день, дѣлать внутрь по одному приему ртути одною изъ первыхъ трехъ растираній до тѣхъ поръ, пока видъ язвы не исправится. Такимъ образомъ на 8-й или на 10-й день (опытамъ главъ можетъ это замѣтить уже на 3-й день) покажется на сальномъ днѣ язвы маленькая, красная точка хорошей грануляціи, которая со дня на день увеличивается; въ это же время язва начинаетъ источать кровь и края ея опадаютъ. Если язва отъ употребленія ртути не заживаетъ, то слѣдуетъ назначить *Синьбу*; если же она оказываетъ склонность къ усиленному разрастанію

мясная сосочка, то съ успѣхомъ можно назначить Nitr.-ас., въ приѣмѣ отъ 3 до 6 крупноекъ, растворенныхъ въ водѣ, по чайной ложкѣ утромъ и вечеромъ, не прежде однакожъ, пока отъ продолжительнаго употребленія ртути язва не теряетъ сифилитическаго характера, т. е. пока не исчезнетъ *самый* видъ ея дна. Точно такимъ же образомъ Nitr.-ас. вполне показана въ сифилитическихъ язвахъ, которыя долго и безъ всякой пользы были лечимы большими приѣмами ртути по способу старой школы. Но это средство вовсе непригодно въ случаяхъ, гдѣ шанкря *сами по себѣ*, безъ ртутнаго леченія, приняли видъ простой язвы.

§ 3. Всякая сифилитическая язва, ничѣмъ не лечимая, или дурно лечимая ртутью, по прошествіи 6—8 недѣль, переходитъ въ хроническое состояніе, причѣмъ исчезаетъ *сальный* видъ ея дна и возвышеніе краевъ. Она тогда представляетъ поверхность красную, отдѣляющую дурной, жидкій гной съ отвердѣвшею окружностію. Въ этомъ состояніи Nitr.-ас. дѣйствуетъ весьма вредно, потому что способствуетъ общему сифилитическому зараженію, которое въ это время обнаруживается подъ видомъ *Roseolae venereaе* на животѣ и эктимахъ на лбу и вокругъ рта. Единственное средство здѣсь Merc., 2 или 3 разведенія, по одному приѣму всякіе 48 часовъ, а послѣ четвертаго приѣма надо выжидать дѣйствія лекарства втеченіе нѣсколькихъ дней, не предпринимая никакихъ дальнѣйшихъ мѣръ. По истеченіи этого срока, рѣдко придется повторить приѣмъ ртути, потому что въ это время исчезаютъ не только первичное, но и вторичное сифилитическое пораженіе. Если же послѣ этого будутъ появляться отъ времени до времени припадки, о которыхъ нельзя съ точностію опредѣлить, происходить ли они изъ сифилитическаго зараженія, или отъ другой причины, то съ большимъ успѣхомъ назначаются: Aug., Carb.-v., Lach., Nitr.-ас., Phos.-ас., Thuja..

§ 4. Относительно формъ шанкра, можно замѣтить, что *Гунтеровскій* уступаетъ преимущественно Merc.-solub. или граес.-rub.;—*возвышенный*: Граес.-rub., Сиппаб.;—*быстро распространяющійся*: Nitr.-ас. низкаго разведенія;—*серпигинозный*: Merc.-corros., а при ухудшеніи — Sulph. высокаго (15) или Nitr.-ас. низкаго разведенія;—*застарѣлый* или *доло лечимый* *меркуріемъ* почти всегда уступаетъ Nitr.-ас..

§ 5. *Вторичная язва* въ горлѣ, которая происходитъ обыкновенно отъ удаленія первичныхъ посредствомъ меркуріальныхъ язвъ, требуютъ такого же леченія, какъ и хроническій шанкръ (2—3 приема Merc. 3-го разведенія), или нѣсколькихъ приемовъ Lys., Nitr.-ac., Phos.-ac., Thuj., если больной прежде принималъ много ртути. *Паховые желваки* (Vubo), которые развиваются иногда и первоначально, но обыкновенно вслѣдствіе удаленія первичнаго шанкра помощью ѣдкихъ средствъ, и подымаются даже въ то время, когда язва еще не успѣла покрыться рубцомъ, не требуютъ особеннаго леченія, но исчезаютъ вмѣстѣ съ первичною язвою отъ дѣйствія Merc.. Если же желвакъ развился послѣ того, какъ язва уже покрылась рубцомъ, или если больной уже употреблялъ много ртути, то главное средство противъ него Nitr.-ac.. Кромѣ Nitr.-ac., можно еще назначить Aug. или Carb.-veg..

§ 6. *Застарѣлая сифилитическая болѣзнь*, которая рѣдко существуетъ въ чистомъ видѣ, лечится также Merc., если только больной до этого не принималъ много ртути; въ противномъ же случаѣ отдается преимущество: Aug., Lach., Nitr.-ac., Sulph., Thuj., или Alum., Bell., Carb.-v., Clem., Dulc., Guaj., Her., Jod., Lys., Phos.-ac., Sassaп. и Starph. — *Вамп въ костяхъ сифилитическаго происхожденія* требуютъ преимущественно: Aug., Lach., Merc. — *Противъ пятенъ и лишаявъ*: Kal.-bi., Merc., Lach., Nitr.-ac., N. jugl. и Thuj. — *Противъ воспаленій мазы*: Merc. или Nitr.-ac..

Одно изъ важныхъ средствъ противъ всѣхъ почти формъ общаго сифилиса, особенно выражающагося пораженіемъ кожи и костей и предварительно лечимаго безуспѣшно меркуріемъ, представляетъ Kal.-hydr. въ самыхъ явскихъ разведеніяхъ, по три приема ежедневно.

Скарлатина, Febris scarlatina.

Главное средство: 1) Bell.. Иногда однако обстоятельства требуютъ: 2) Acon., Amm., Apis, Arg., Bar., Camph., Carb.-veg., Lach., Merc., Phosph., Sulph.; 3) Coff., Con., Ipec., Phos.-ac., Rhus.

§ 2. Противъ *предъстникова* лихорадки: Acon., если Bell. оказалась недостаточною. — Противъ *воспаленія горла* лучшия, послѣ Bell., средства: Bar. и Merc. — Противъ *воспаленія горла съ смертоульемъ*: 1) Acon., Arg., Carb.-veg.; 2) Lach., Sulph. — *Рвота*, если не прекращается отъ Bell., требуетъ: Acon. или Arg. — Противъ *натури на низъ и труднато мочеиспусканія*, назначается Con., а противъ *слизь легкиа*: Ipec., если въ обонхъ случаяхъ Bell. оказалась неудовлетворительною. — *Безсонница* часто требуетъ: Acon., или Coff.

§ 3. При *скрытій смик* Bry., Phosph., Phos.-ac. и Sulph. Если оказывается поражение мозга и спячка: Op. или Bell. — Противъ *воспаленія окологной железы*, часто появляющагося вслѣдствіе этой лихорадки: 1) Bell., Carb.-veg., Phosph., Rhus, Sil.; 2) Merc.

§ 4. Противъ *идроническихъ* страданій вслѣдствіе скарлатинной лихорадки: Arn., Arg., Bell., Dig., Hell., Phos.-ac., Seneg.; — Противъ *трудной водлики*: 1) Arg., Hell., Seneg.; 2) Arn., Dig.; — *водлики черепа*: Arn., Bell., Hell., Phos.-ac.; — *брюшной водлики*: Dig., Hell.; — *подкожной*: Arg., Hell., Bar.-m.

§ 5. Противъ *воспаленія уха и ушной точки* Bell., Ner., Puls., Colch., Lyc., Men., Merc., Nitr.-ac. — При *постатдѣ косточкаа слуховоа органа*: Aug., Calc., Natr.-m., Sil.

§ 6. Противъ *скарлатинной просовидной смик*: Acon., Coff., Sulph., Bell. Вслучаѣ осложненія скарлатинной лихорадки скарлатинною просовидною смикю, очень дѣйствительною оказалась Dulc.

§ 7. Соображаясь съ общностью принадлежовъ, назначаются:

Асонитум, когда есть: сильная колка и *ожеломая рвота*; сильная лихорадка и *сухой осаръ*; частый, полный и ускоренный пульсъ; *напоръ крови въ голову*; одутловое лицо, головокруженіе и отуманеніе, или бредъ; сонливость и внезапное вскакиваніе отъ сна; сухой, короткий, болѣзненный кашель; кровотеченіе изъ носу или кровохарканіе; воспаленіе глотки.

Велладонна — сильное *воспаленіе горла* и *миндалевиднато железа*, сопровождающіеся колючими болями и судорожными *стлмиваніемъ*; *невозможность проглотить самую малую количества осидкоствы*, которая при *лотаніи* иногда *попадаетъ въ носъ*; опасность *задушенія* при *ощущиваніи вѣда* или *коворачиваніи головы*; *силь-*

ная жажда съ водобоязнію или безъ нея; воспаленіе и болище глаза и свѣтобоязнъ; сильное давленіе по лбу, какъ-будто глаза выталкиваются вонъ, или терзаніе и колотье въ головѣ; головокруженіе и потемнѣніе зрѣнія; красный и сухой языкъ; *бессонница и возвышенная нервная раздражимость*; страшныя видѣнія при закрытіи глазъ; внезапное пробужденіе и вскакиваніе отъ сна.

MERCURIUS — воспаленіе и значительная припухлость миндалинъ, слюнотеченіе, язвы во рту, опухоль паховыхъ железъ.

RHOENORRHOEA — при сухости и твердости языка и губъ, покрытыхъ темноватыми корками, *потери рѣчи и слуха*, затрудненномъ глотаніи, невозможности удержать воду во рту; сильномъ выпаденіи волосъ.

RHUS — если сныъ принимаетъ видъ пузыристой рожи и сопровождается снѣжкою и внезапнымъ вскакиваніемъ отъ сна, безпокойствомъ, труднымъ мочеспусканіемъ и сильною жаждою.

SULPHUR — при пораженіи мозга, не устранимомъ посредствомъ Bell., сопровождающимся снѣжкою, внезапнымъ вскакиваніемъ отъ сна, закатываніемъ глазъ и постояннымъ бредомъ; если притомъ замѣчаются: одутловость и яркая краснота лица, залеганіе носа; языкъ сухой, растресканный и покрытый темнокрасною слизью; жажда и затрудненное глотаніе.

ZINCUM — при угрожающемъ параличѣ мозга.

§ 8. Кромѣ сказанныхъ, можно употребить:

ARGENTUM — когда замѣчаются: совершенный упадокъ силъ, быстрое исхуданіе; лихорадка по почкамъ и жгучій жаръ; горячее лицо; искаженные черты лица; холодныя руки и отсутствіе жажды; злокачественное воспаленіе горла; сильное безпокойство и бессонница; вонючія язвы. (Также приличенъ при различныхъ видахъ водянки вслѣдствіе скарлатинной лихорадки). — **SALSAVIA** настоящее *символическое* средство при страданіяхъ глотки, околушныхъ железъ и наружныхъ опухоляхъ шеи, особенно послѣ быстрого исчезанія сныи; пригодна также при страданіяхъ груди, даже при опасности паралича легкихъ. — **САМРОНА** приносятъ иногда пользу въ самыхъ опасныхъ случаяхъ, при скрившейся сныи, при хрипѣніи, холодномъ потѣ на лбу, холоднѣніи членомъ, горячемъ дыханіи и совершенномъ упадкѣ силъ.

САРВІСУМ— значительная краснота лица, сближающаяся блѣдностью; припухлыя и одутлыя губы; жгучіе пузырьки во рту и на языкѣ, слизистая слюна; *отслойка слизистой оболочки гортани*; болѣзненное глотаніе, чувство полноты и сдавливанія въ горлѣ; болѣзненное давленіе въ небѣ и небной занавѣскѣ при проглатываніи; чувство *стлыванія спазмовъ въ гортани*; щекотаніе и жестокость въ зѣвѣ; чиханіе, охриплость и отрывистый кашель; *накопленіе густой слизи въ носу и гортани*. — **МУВІАТІВ АСІДУМ**— при злокачественной скарлатинной лихорадкѣ съ краснотой щекъ, синевагою циѣтомъ гортани, красными и матовыми глазами; когда замѣчаются: неправильная, слабая снѣдь, переходящая въ темную красноту и перемежающаяся петехіями; възвышеніе миндалинъ и соедѣнныхъ частей; зловонное дыханіе; ѣдкое истеченіе изъ носу, отслойка и пузырьки вокругъ носа и губъ. — **СУЛФУРИВІВ АСІДУМ**— блѣдность лица; быстрый упадокъ силъ; частый ознобъ; колюція боли въ горлѣ и опухоль, простирающаяся до нижнечелюстныхъ железъ; синевагокрасныя пятна, покрытія кожицею, подъ которою содержится гной; недостаточная, темная снѣдь съ петехіями.

§ 9. По наблюденіямъ Гернига, когда за первоначальною рвотою слѣдуетъ *сонливость* пригодны: 1) Dulc., Sol.-vigr.; 2) Bry., Op., Sulph.;—при *постоянно усиливающейся краснотѣ лица*: Sulph., иногда попеременно съ Acon.; по облегченіи симптома, пригодны: Baryt., Calc., Puls.;—при *уменьшеніи силъ*: Seneg., а если затѣмъ слѣдуетъ пораженіе гортани, то Calc.. При *опухолѣ околоушныхъ железъ*: Calc. при пораженіи *правой* железы съ значительною раздражительностью больного по утрамъ; Kal.-carb. тоже при преобладающемъ пораженіи *правой* стороны, но безпокойство у больного является около 2—3 часовъ пополуночи.

(См. впрочемъ *Накожная бользни, Рожа, Пурпуровая и просяидная сыпь; Воспаленіе гортани*).

Скрытіе отдѣленій, истеченій и сыпей.

§ 1. Часто составляетъ источникъ безчисленнаго множества недуговъ, но съ другой стороны ему приписываютъ происхожденіе многихъ болѣзней, которыя имѣютъ совершенно другую причину. Во всякомъ случаѣ, нужно обратитъ надлежащее вниманіе на пред-

полагаемую причину болѣзни въ открытій отдѣленій, истеченій или сыней, и разсмотрѣть, какое именно средство, смотря по существующимъ страданіямъ, больше всѣхъ соответствуетъ общему состоянію больного. Средства, чаще всѣхъ попадающія подъ выборъ: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Chin., Lyc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Arg., Carb.-veg., Caust., Cham., Dulc., Graph., Kal., Lyc., Phosph., Phos.-ac., Serp., Sil., Stram.; 3) Amb., Amm., Ant., Arg., Aur., Baryt., Cin., Cocc., Cupr., Ferr., Her., Hyos., Ign., Ipec., Merc., Murg.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Ran., Seneg., Spong., Veratr., Zinc.

§ 2. Изъ этихъ средствъ, во многихъ случаяхъ найдутся различныя:

Послѣ скрывшихся *сыней и лишаевъ*: 1) Bell., Bry., Dulc., Graph., Her., Ipec., Phos.-ac., Puls., Sulph.; 2) Acon., Amb., Arg., Carb.-veg., Caust., Cham., Lach., Lyc., Merc., Natr.-m., Mosch., Rhus, Sassa., Serp., Sil., Staph., Thuj..—Послѣ скрывтій *примочкою кровотоечения изъ носу, или прекращенія примочкою кровопусканія*: 1) Acon., Bell., Chin., Ferr., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Arn., Aur., Bry., Calc., Carb.-veg., Graph., Hyos., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Ran., Rhus, Seneg., Serp., Sil., Spong., Stram..—Послѣ *скрывшихся изъ или нагноенія*: 1) Bell., Her., Lach., Sil., Sulph.; 2) Arg., Carb.-veg., Lyc., Merc., Natr.-m., Phos.-ac., Rhus, Serp., Staph..—Послѣ скрывшагося *замерзновеннаго кровотоеченія*: 1) Acon., Calc., Carb.-veg., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amb., Amm., Ant., Arg., Bell., Carb., Caust., Chin., Coloc., Graph., Ign., Kal., Lach., Murg.-ac., Nitr.-ac., Petr., Rhus, Serp., Sil..—Послѣ скрывшихся *послѣ родовыхъ остатковъ*: 1) Coloc., Hyos., N.-vom., Plat., Rhus, Veratr., Zinc.; 2) Bell., Bry., Con., Dulc., Puls., Serp., Sulph..—Послѣ скрывшагося *отдѣленія молока*: 1) Bell., Bry., Dulc., Puls.; 2) Acon., Calc., Cham., Coff., Merc., Rhus, Sulph..—Послѣ остановившагося *молочнаго очищенія*: 1) Acon., Bry., Con., Dulc., Graph., Kal., Lyc., Puls., Serp., Sil., Sulph.; 2) Amm., Arg., Baryt., Bell., Calc., Caust., Cham., Chin., Cocc., Cupr., Ferr., Jod., Merc., Natr.-m., N.-mosch., Op., Plat., Phosph., Rhod., Sabin., Staph., Stram., Val., Veratr., Zinc..—Послѣ скрывшагося насморка или другихъ слизетеченій: 1) Acon., Arg., Bell., Bry., Calc., Chin., Cin., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amb., Amm., Carb.-veg., Con., Dulc., Graph., Ipec., Kal., Lyc.,

Natr.-m., Nitr.-ac., N.-mosch., Phosph., Rhod., Samb., Sulph.—Послѣ *скрытаго носа*: 1) Bell., Bry., Cham., Chin., Dulc., Lach., Sil., Sulph.; 2) Acon., Ars., Calc., Graph., Lyc., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Puls., Rhus, Ser.—Послѣ *скрытаго носнаго носа*: 1) Cupr., Nitr.-ac., Puls., Ser., Sil.; 2) Cham., Merc., Natr., Rhus.

§ 3. Срав. также: *Сыпи, Геморрой, Кормленіе дѣтей грудью, Роженіе состояніе, Ртуль прекращеніе, Насморкъ, Простуда.*

Слизетеченіе изъ глазъ, Blepharhoea ocularum, Ophthalmoblenorrhoea.

По сдѣланнымъ опытамъ, дѣйствительнѣйшими средствами противъ *слизетеченія изъ глазъ* считаются: 1) Dig., Euphr., Graph., Puls., Ser.; 2) Alum., Amm., Calc., Caust., Chin., Euphr., Guaj., Herp., Lyc., Nitr.-ac., Sil., Spig., Sulph., Thuj.—Противъ *обильнаго слезотеченія*: 1) Acon., Bell., Calc., Euphr., Kreos., Puls., Ruta, Spig., Staph., Sulph.; 2) Alum., Ars., Bry., Dig., Graph., Herp., Ign., Kal., Lach., Lyc., Merc., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Spong., Staph., Thuj.—Такъ называемый *момоточимый глазъ* требуетъ: 1) Acon., Euphr., Merc., Puls.; 2) Rhus, Spig..

Слизистыхъ оболочекъ болѣзни Affectiões mucosarum.

§ 1. Средства, заслуживающія особеннаго вниманія во всѣхъ случаяхъ, гдѣ преобладаетъ раздраженіе *слизистыхъ оболочекъ* вообще: 1) Alum., Ars., Bell., Bry., Calc., Caps., Carb.-v., Caust., Chin., Dulc., Herp., Lyc., Merc., Mez., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Seneg., Stann., Sulph.; 2) Acon., Amm.-m., Ang., Borax, Carb.-an., Cham., Dig., Dros., Graph., Hyos., Ign., Kal., Magn.-c., Natr.-m., Nitr.-ac., Plumb., Ser., Sil., Spig., Spong., Staph., Sulph.-ac., Sulph.; 3) Canth., Cann., Cin., Cocc., Colch., Jod., Lach., Magn.-m., Natr., Petr., Thuj., Zinc..

§ 2. Изъ нихъ въ частности предпочитаются: При *ослаблениі* *слизистыхъ оболочекъ съ моточимымъ отдѣленіемъ*, или безъ него: 1) Acon., Ars., Bry., Cann., Canth., Merc., N.-vom., Phos., Sil., Spong.; 2) Borax, Cham., Dros., Hyos., Ign., Ipec., Kreos., Petr., Puls., Ser., Squill., Staph.—При *долговременныхъ слизистыхъ теченіяхъ* или вообще при *увѣличенномъ отдѣленіи слизи*: 1) Calc.,

Сарс., Chin., Dule., Euphr., Merc., Natr.-m., Phos., Puls., Seneg., Sep., Stann., Sulph.; 2) Alum., Ars., Borax, Canth., Carb.-an. Carb.-v., Caust., Cham., Dig., Dros., Graph., Hep., Hyos., Igu., Lyc., Magn.-с., Mez., Nitr.-ас., N.-vom., Petr., Rhus, Sil., Spig., Staph. Sulph.-ас. — При *измненіи существа слизистых оболочек* (разривленіи, утолщеніи): 1) Calc., Caust., Con., Dule., Merc., Mez., Natr.-m., Petr., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Alum., Ars., Bell., Carb.-v., Chin., Euphr., Graph., Lyc., Seneg., Sep., Stann., Staph. — При *изгладненіи ихъ*: 1) Arg., Asa., Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Merc., Nitr.-ас., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Aur., Canth., Chin., Con., Dros., Dule., Hep., Kreos., Lach., Lyc., Petr., Rhus, Staph., Thuj., Zinc.

§ 3. По *свойству отдѣленія*: При *кровянистомъ отдѣленіи* (съ кровяными струйками): 1) Acon., Ars., Bell., Chin., Ferr., Jod., Merc., N.-vom., Puls., Sep., Sil.; 2) Baryt., Canth., Carb.-v., Caust., Coss., Dros., Kreos., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ас., Phos., Sabin., Sulph., Sulph.-ас., Thuj., Zinc. — При *отдѣленіи тустой слизи*: 1) Alum., Amm.-m., Baryt., Calc., Carb.-v., Magn.-m., Natr., Natr.-m., Phosph., Puls., Sil., Stann., Staph., Sulph.; 3) Acon., Alum., Ars., Borax, Kreos., Ruta, Spong.; — *жидкой слизи* (водянистой): 1) Ars., Carb.-v., Cham., Graph., Lach., Magn.-m., Merc., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Amm., Amm.-m., Carb.-an., Chin., Magn.-arct., Mez., Mur.-ac., N.-vom., Sep., Sil., Squill.; — *тойной*: 1) Ars., Asa., Bell., Calc., Carb.-v., Caust., Merc., Nitr.-ас., Phosph., Puls., Sil., Sulph.; 2) Aur., Cann., Canth., Chin., Con., Dros., Dule., Hep., Kal., Kreos., Lach., Magn.-m., Natr., Phos.-ас., Rhus, Sep., Stann., Staph., Zinc. — *блуждающей слизи*: Amm.-m., Borax, Mez., Petr., Plat. — *студенистой, похожей на вареный крахмалъ*: Arg., Bell., Laur., Rhus, Sabin., Selen.; — *млековидной*: 1) Calc., Puls., Sil.; 2) Carb.-v., Con., Ferr., Lyc., Phos., Sabin., Sep., Sulph.-ас.; — *вязкой, липкой*: 1) Ars., Bell., Cann., Cham., Cist., Hep., Merc., Mez., Phos., Phosph.-ас., Samb., Seneg., Stann., Sulph. 2) Alum., Borax, Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Kal., Plat., Sep., Spong.; — *волокнутой*: Alum., Seneg. — въ видѣ *пусткозъ, охлоньзъ*: Agar., Amb., Kal., Kreos., Magn.-с., Merc., Phosph., Sabin., Sep., Sil., Sulph., Thuj.; — *отверднющей, въ видѣ твердыхъ кусковъ*: Bry., Con., Natr., Phosph., Sep., Sil., Sulph. — *острой, разядающей*: 1) Alum., Amm.-m., Arg., Borax, Merc.,

Natr.-m., Phosph., Puls., Ser., Sil., Sulph.; 2) Carb.-v., Cham., Ferr., Ign., Kreos., Mez., Nitr.-ac., Ruta, Sulph.-ac.

§ 4. Относительно *цетта* отдѣляемой слизи, нужно замѣтить: При *коричневатомъ*: Amm.-m., Arg., Bell., Borax, Carb.-v., Nitr.-ac., Sulph.—При *цеттъ* мяса: Alum., Coss., Kreos., Merc., Nitr.-ac., Sabin.—При *желтомъ*: 1) Ant., Bell., Bry., Calc., Carb.-v., Kreos., Lyc., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Sil., Stann., Sulph.; 2) Acon., Alum., Arg., Cann., Canth., Cham., Cic., Graph., Herp., Kal., Natr.-m., Sabin., Sel., Stann., Staph., Thuj.—*сыромъ*: 1) Amb., Arg., Ars., Lyc., Ser., Sil., Thuj; 2) Anac., Carb.-ac., Caust., Chin., Kreos., Lach., Magn.-m., Merc.;—*зеленомъ*: 1) Carb.-v., Dros., Led., Lyc., Magn.-m., Merc., Phosph., Puls., Stann., Sulph.; 2) Carb.-v., Con., Ferr., Lyc., Phosph., Ser., Thuj.;—*бѣловатомъ*: 1) Asar., Bell., Calc., Colch., Merc., Phosph., Puls., Sil.; 2) Carb.-v., Con., Ferr., Lyc., Ser., Sulph.-ac.

§ 5. Относительно *вкуса* или *запаха* отдѣляемой слизи, нужно замѣтить: при *дурномъ запахѣ* вообще: 1) Arg., Calc., Led., Merc., Natr., Puls., Ser., Stann., Sulph.; 2) Aug., Bell., Con., Dros., Ferr., Graph., Guaj., Herp., Ipec., Lach., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Sabin.;—*гнилостномъ запахѣ* или *вкусѣ*: 1) Aug., Calc., Herp., Merc., Natr., Puls., Sil., Stann., Sulph.; 2) Bell., Con., Curg., Ferr., Graph., Kreos., Mur.-ac., Nitr.-ac., Ser.;—*металлическомъ вкусѣ*: Calc., Curg., Ipec., N.-vom., Rhus;—*соленомъ*: 1) Arg., Baryt., Graph., Lyc., Natr., Petr., Phosph., Puls., Ser., Sil.; 2) Calc., Carb.-v., Chin., Dros., Graph., Rhus, Samb., Stann., Sulph., Zinc.;—*кисловатомъ* *вкусѣ* или *запахѣ*: 1) Calc., Chin., Graph., Herp., Kal., Magn.-m., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Plumb., Puls., Ser., Sulph.;—при *вкусѣ* или *запахѣ плесени*: Borax, Carb.-v.;—какъ при *хроническомъ насморкѣ*: Bell., Ign., N.-vom., Phosph., Puls., Sulph.;—при *сладковатомъ* *вкусѣ*: Asar., Calc., Dig., Kreos., Lach., Magn.-m., Merc., N.-vom., Phosph., Plumb., Puls., Samb., Stann., Sulph.

Сравн. *Кашель (мокроту), Бѣли, Наноеіе.*

Слуха раздражительность.

Главныя средства противъ возвышенной нервной раздражительности слуховаго органа: 1) Arg., Aug., Bell., Bry., Coff., Lach.,

Natr., Phos.-ас., Ser., Spig.; 2) Acon., Calc., Cham., Chin., Con., Graph., Merc., N.-vom., Petr., Phosph., Puls., Sulph.—При возмущенной чувствительности къ шуму вообще: 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Coff., Ign., Lyc., N.-vom.; 2) Ang., Arn., Borax, Calc., Colch., Con., Ipec., Natr., Phos.-ас., Plat., Puls., Ser., Spig.;—къ мужскому волосу: Baryt.;—къ чловеческому разговору вообще: Arg., Phosph.-ас., Vegetr.—Если музыка не переносится: 1) Bry., Natr., Phosph.-ас., Ser.; 2) Acon., Amb., Cham., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls. (Ср. *Возмущенная нервная раздражимность вообще и Слабость*).

Слюнотеченіе, Ptyalismus.

Средства употребляются смотря по обстоятельствамъ: 1) Bell., Cam., Canth., Colch., Dulc., Euphorb., Her., Jod., Lach., Merc., Nitr.-ас., Op., Sulph.; 2) Alum., Amb., Ant., Arg., Baryt., Bry., Caust., Cham., Chin., Dros., Graph., Hell., Hyos., Ign., Ipec., Lyc., Natr.-m., Puls., Seneg., Ser., Staph., Stram., Sulph.-ас., Vegetr.—Если главную причину слюнотеченія составляет злоупотребленіе ртути: Bell., Chin., Dulc., Her., Jod., Lach., Nitr.-ас., Op., Sulph.—См. также *Воспаленіе полости рта*.

Смоковидные наросты подбородка и волосистой части головы, Sycoma menti et capillici.

Ихъ не должно смѣшивать съ смоковидными венерическими наростами Гавеманна (Sycozis), и потому здѣсь лучше идти терминъ Sycoma, нежели Sycozis. Главныя средства: 1) Arg., Carb.-veg., Cic., Graph., Her., Sil.; 2) Con., Staph., Sulph., Thuj..

Смоковидные венерическіе наросты, Sycozis Hahnemannii.

Главныя средства: Nitr.-ас., Thuj.; кровь этихъ, съ успѣхомъ употребляли еще: Cin., Euphr., Lyc., Phos.-ас., Sabin., Staph., N.-vom., Sassa. — Впрочемъ смоковидные наросты молящіяся, розовидные и похожіе на пшеницй гробшоки требуютъ преимущественно Thuj.; съ кожей — Lyc.; плоскіе — Sassa., Sulph..

Смѣхъ судорожный, истерическій, Risus hystericus, spasmodicus.

Составляетъ симптомъ, указывающій преимущественно на: 1) Aur., Calc., Cop., Ign.; 2) Alum., Bell., Croc., Cupr., Hyoz., N. mosch., Phosph., Stram., Zinc.; 3) Acon., Anac., Aza., Cic., Natr.-m., Plat., Veratr. — Противъ *сардоническаго смѣха*, весьма важнаго и опаснаго припадка, указывающаго большею частію на страданія мозга, могутъ служить: Ran.-sc., Zinc.

Солнечный жаръ и жаръ вообще, Insolatio.

§ 1. Средства противъ послѣдствій отъ разгоряченія тѣла или отъ вліянія жара вообще: 1) Acon., Ant., Bell., Bry., Camph., Carb.-veg., Glorin., Sil.; 2) Op., Thuja., Zinc.

Изъ этихъ средствъ можно употребить преимущественно:

АСОНИТУМЪ — противъ послѣдствій отъ *солнечнаго жара* (insolatio) или слишкомъ сильнаго жара *печи* и вообще тогда, когда больной спалъ на солнцѣ, или у горячей печи.

АНТИМОНІУМЪ — когда больной не въ состояніи переносить лѣтнаго жара, или если самая *незначительная работа въ жару истощаетъ его* и вызываетъ ночные поты, постоянную охоту спать, *гастрическіе припадки* и вообще, когда Bry. противъ этого состоянія не приносятъ желаемаго успѣха.

ВЕЛЛАДОННА — когда Acon. противъ послѣдствій отъ сильнаго жара оказался мало полезнымъ, или когда замѣчаются: боль головы съ чувствомъ полноты и ощущеніемъ *какъ-будто все стремится выйти вонъ чрезъ лобъ*, усиленіе припадка при нагибаніи, при малѣйшемъ движеніи, душевномъ потрясеніи; большая тоска и безпокойство; бѣшенство, сильное возбужденіе, необыкновенная боязливость и пугливость, *страхъ передъ окружающими предметами*, слюнность къ плачу и крику.

ВРУОНІА — если вслѣдствіе работы или какого-либо напряженія тѣла въ жару замѣчаются: болѣзненное чувство полноты въ головѣ, недостатокъ аппетита, *тошнота, рвота* или *поносъ*; непереваримость молока; подвижность и трясеніе тѣла; чувство тяжести отъ платья вокругъ подреберій, сердитое расположеніе духа и *страхъ будущности*.

САМРНОВА — если Асов. или Bell. оказались недействительными противъ послѣдствій сильнаго жара.

САВВО-УВЕГСТАВІІІВ — если всякое разгоряченіе причиняетъ головную боль или вообще тяжесть, бьющія боли и давленіе надъ глазами; когда появляется боль въ глазахъ, какъ скоро больной старается смотреть на что-нибудь.

СІІІСОБА — если жаръ причиняетъ тошноту или другія гастрическія страданія, и если Ant. и Bry. оказались мало дѣйствительными противъ этого состоянія.

§ 3. Разслабленіе вслѣдствіе утомляющей *теплой погоды*: 1) Bry., Carb.-veg., N.-vom., Rhod., Sil.; 2) Caust., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phosph.

См. также: *Время года и состояніе погоды, Усталость, Слабость.*

СЛАЗИМЫ И БОЛИ ЖЕЛУДКА, Gastralgia.

Средства противъ этой болѣзни: 1) Arg., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Cham., Chin., Coss., Ign., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Bism., Carb.-an., Caust., Graph., Grat., Lys., Magn.-c., Nitr.-sp., Sil., Stann., Staph., Stront.; 3) Amm., Ant., Coff., Coloc., Natr., Natr.-m., N-mosch., Ser. — Противъ слазимовъ желудка вслѣдствіе *неумѣренной употребленія кофе*: Cham., Coss., Ign., N.-vom.; — *злоупотребленія ромашки*: 1) N.-vom., Puls.; 2) Bell., Ign.; — *душевныя потрясенія, какъ-то: гнѣва, огорченія*: Cham., Coloc., N.-vom., Staph.; — *слабости, потери соковъ, у женщинъ во время кормленія грудью, вслѣдствіе болѣзней, перенесенныхъ въ послѣродовомъ періодѣ, у особъ истощенныхъ отъ обильнаго пота, слабительныхъ и т. д.*: Carb.-veg., Chin., Coss., N.-vom.; — *разстройствъ желудка*: Bry., N.-vom., Puls., Ant., Carb.-veg., Chin.; — *у нынцы, или вслѣдствіе обескураженія*: Carb.-veg., N.-vom., а при хроническихъ страданіяхъ: Calc., Lach., Sulph. — *Послѣ физическихъ напряженій*: Bry.; — *послѣ паденія*: Lys.; — *простуды*: Bry., Coloc., N.-vom., Plumb.; — *продолжительнаго голода*: Ign.; — *скрившихся стѣн*: Arg., Caust., Sulph.

§ 3. Слазимы желудка, сопровождаемые *застоемъ крови въ стѣнѣ воротной вены*: Carb.-veg., N.-vom. — У истерическихъ или мазохническихъ субъектовъ: Calc., Coss., Graph., Ign., N.-vom.,

в Magn.-с., Stann.—У женщинъ во время регулъ: Cham., Coss., N.-
 gom., Puls.—Если регулы малочисленны: Coss., Puls.; если же
 жирнѣ обильны: Calc., Lys.—При спазмахъ желудка вслѣдствіе не-
 достаточнаго употребленія *новаренной соли*: Nitg.-вр., Carb.-veg.

§ 4. Относительно симптомовъ, нужно имѣть въ виду слѣ-
 дующее:

Велладона назначается вообще въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ
 было показаніе для Cham., но она оказалась неэффективною;
 чаще всего женщинамъ, или иѣжнымъ, чувствительнымъ субъек-
 тамъ, особенно, когда замѣчаются: гнѣзненіе, давленіе, или судорож-
 ное напряженіе, которое заставляетъ больного гнуться назадъ
 и задерживать дыханіе, чѣмъ онъ облегчаетъ боль; появленіе бо-
 лей во время стола, или такая жестокая боль, что больной те-
 рять самовнаніе, падаетъ въ обморокъ; кромѣ того, сильная
 жажда и усиленіе боли всякій разъ послѣ питья; медленное и
 грудное испраженіе на низъ; бессонница ночью и сонливость
 днемъ.

Вуонія—когда замѣчаются: давленіе, какъ-бы отъ кашли,
 подъ ложечкою, особенно во время стола или тотчасъ послѣ него,
 и чувство припухлости съ стороны желудка; стягивающая, щиплю-
 щая и рѣжущая боль, которая уменьшается отъ давленія на же-
 лудокъ, или послѣ частой отрыжки; усиленіе боли отъ движенія,
 ходьбы, и покалываніе около желудка, какъ скоро больной де-
 лаетъ шагъ; запоръ, давленіе, сжиманіе въ вискахъ, во лбу и за-
 тылкѣ, какъ-будто черепъ лопается, и облегченіе всякій разъ при
 наружномъ давленіи и сжиманіи головы.

Сальсавелла—при спазмахъ и боляхъ желудка преимущественно
 у полнокровныхъ, расположенныхъ къ кровотеченію изъ носу,
 или у женщинъ, имѣющихъ обильныя регулы, или гдѣ Bell, хотя
 дѣйствовала, но несовершенно; вообще, когда замѣчаются: давле-
 ніе или сжимающая судорожная боль съ желудка, какъ-будто отъ
 сжиманія комьями; тошнливость; усиленіе боли ночью или послѣ
 стола, иногда рвота приметою нищета; накопленіе кислоты; тошнота,
 бодрѣзненная чувствительность стороны желудка при давленіи на
 нее; запоръ и мелкорондалия страданія, или хроническій поносъ;
 сердцебиеніе.

Сальво-вегетавіліс—преимущественно, когда N.-vom. хо-

САМРОДА — если *Acon.* или *Bell.* оказались недействительными противъ послѣдствій сильнаго жара.

САВВО-УНСТАВИЛІВ — если всякое разгоряченіе причиняетъ головную боль или вообще тяжесть, бьющія боли и давленіе надъ глазами; когда появляется боль въ глазахъ, какъ скоро больной старается *смотреть на что-нибудь*.

СІЛІСКА — если жаръ причиняетъ тошноту или другія гастрическія страданія, и если *Ant.* и *Bry.* оказались мало дѣйствительными противъ этого состоянія.

§ 3. Разслабленіе вслѣдствіе утомляющей *теплой поноды*: 1) *Bry., Carb.-veg., N.-vom., Rhod., Sil.*; 2) *Caust., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phosph.*

См. также: *Времена года и состояніе поноды, Усталость, Слабость.*

СЛАЗИМЫ И БОЛИ ЖЕЛУДКА, *Gastralgia.*

Средства противъ этой болѣзни: 1) *Ars., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Cham., Chin., Coss., Ign., N.-vom., Puls., Sulph.*; 2) *Bism., Carb.-an., Caust., Graph., Grat., Lys., Magn.-c., Nitr.-sp., Sil., Stann., Staph., Stront.*; 3) *Amm., Ant., Coff., Coloc., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Ser.* — Противъ слазимовъ желудка вслѣдствіе *неумѣреннаго употребленія кофе*: *Cham., Coss., Ign., N.-vom.*; — *злоупотребленія ромашки*: 1) *N.-vom., Puls.*; 2) *Bell., Ign.*; — *душевные потрясенія*, какъ-то: гнѣва, огорченія: *Cham., Coloc., N.-vom., Staph.*; — *слабости, потери соковъ*, у женщинъ во время кормленія грудью, вслѣдствіе болѣзней, перенесенныхъ въ послѣродовомъ періодѣ, у особъ истощенныхъ *отъ обильнаго пота*, слабительныхъ и т. д.: *Carb.-veg., Chin., Coss., N.-vom.*; — *разстройствъ желудка*: *Bry., N.-vom., Puls., Ant., Carb.-veg., Chin.*; — у *нальницъ*, или вслѣдствіе *обожрства*: *Carb.-veg., N.-vom.*, а при *хроническихъ* страданіяхъ: *Calc., Lach., Sulph.* — *Послѣ физическихъ намужженій*: *Bry.*; — *послѣ паденій* *Lys.*; — *простуды*: *Bry., Coloc., N.-vom., Plumb.*; — *продолжительнаго голода*: *Ign.*; — *скривившихся сытей*: *Arg., Caust., Sulph.*

§ 3. Слазымы желудка, сопровождаемые *застоемъ крови въ стѣнѣ воротной вены*: *Carb.-veg., N.-vom.* — У *истерическихъ* или *энцефалическихъ* субъектовъ: *Calc., Coss., Graph., Ign., N.-vom.,*

Магн.-с., Стапн.—У женщинъ во время регулъ: Cham., Coss., N.-vom., Puls.—Если регулы малочисленны: Coss., Puls.; если же онѣ обильны: Calc., Lys.—При спазмахъ желудка вслѣдствіе неумѣреннаго употребленія жоваренной соли: Nitg.-sp., Carb.-veg.

§ 4. Относительно симптомовъ, нужно имѣть въ виду слѣдующее:

Велладониа назначается вообще въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ было показаніе для Cham., но она оказалась недействительною; чаще всего женщинамъ, или нѣжнымъ, чувствительнымъ субъектамъ, особенно, когда замѣчаются: гнѣзненіе, давленіе, или судорожное напряженіе, которое заставляетъ больного гнуться назадъ и задерживать дыханіе, чѣмъ онъ облегчаетъ боль; появленіе болей во время стола, или такая жестокая боль, что больной терять самовпаніе, падаетъ въ обморокъ; кромѣ того, сильная жажда и усиленіе боли всякій разъ послѣ питья; медленное и трудное испраженіе на нивъ; бессонница ночью и сонливость днемъ.

Вруониа—когда замѣчается: давленіе, какъ-бы отъ кашля, подъ ложечкою, особенно во время стола или тотчасъ послѣ него, и чувство припухлости съ стороны желудка; стягивающая, щиплющая и рѣжущая боль, которая уменьшается отъ давленія на желудокъ, или послѣ частой отрыжки; усиленіе боли отъ движенія, ходьбы, и покатываніе около желудка, какъ скоро больной делаетъ шагъ; запоръ, давленіе, сжиманіе въ вискахъ, во лбу и затылкѣ, какъ-будто черепъ лопается, и облегченіе всякій разъ при наружномъ давленіи и сжиманіи головы.

Салсавел—при спазмахъ и боляхъ желудка преимущественно у полнокровныхъ, расположенныхъ къ кровотеченію изъ носу, или у женщинъ, имѣющихъ обильныя регулы, или гдѣ Велл., хотя дѣйствовала, но несовершенно; вообще, когда замѣчаются: давленіе или сжимающая судорожная боль съ желудка, какъ-будто отъ сжиманія ногтями; тошнота; усиленіе боли ночью или послѣ стола, иногда рвота примитой пищей; накопленіе кислоты; тошнота, богѣзненная чувствительность стороны желудка при давленіи на нее; запоръ и мелорроидальныя страданія, или хроническій поносъ; сердцебіеніе.

Савво-vegetabilis—преимущественно, когда N.-vom. хо-

рошо дѣйствовала, но не произвела окончательнаго выздоровленія, или если замѣчаются: болѣзненное, *жмучее давленіе*, *тоска*, трясеніе членовъ и усиленіе боли отъ прикосновенія, ночью или послѣ *пищи*; *пученье живота*; судорожная, стягивающая боль, которая заставляетъ больного корчиться; одышка и усиленіе боли въ лежачемъ положеніи; изгága, тошнота; отвращеніе отъ пищи, даже при мысли о ней; *обильные оттры*; тоскливость въ груди и запоръ.

СНАКОМИЦА—когда замѣчаются: вздутость надчревной части и подреберій; давленіе, какъ-бы отъ кашля, или *какъ-будто сердце издавливается*; одышка и затрудненное дыханіе; усиленіе боли послѣ стола, или ночью; большая *тоска* и безпокойство; уменьшеніе боли всякій разъ, какъ-скоро больной сгибается; *минутное облегченіе отъ употребленія кофе*, особенно, если въ то же время вмѣются: бьющая боль въ макушкѣ головы, появляющаяся по ночамъ и заставляющая больного вставать съ постели. (Снам. особенно пригодна, когда употребляется вмѣстѣ съ Соф., если же она, несмотря на сходство симптомовъ, окажется неудовлетворительною, то ее замѣняетъ Bell.).

СНИНА—очень *дурное пищевареніе*, *вздутость* и *болѣзненное давленіе въ желудкѣ послѣ пищи или питья*; накопленіе кислотъ, изгága, слизистыя или желчныя нечистоты въ первыхъ путяхъ; ослизеніе желудка; склонность къ частой рвотѣ; усиленіе боли въ повоѣ, уменьшеніе ея при движеніи; потеря аппетита и отвращеніе отъ всякой пищи и питья; лѣнь, сонливость; *инокондрическое расположеніе духа и неспособность къ занятіямъ, особенно послѣ стола*; медленное испражненіе на низъ; желтый, землисто-поблеклый цвѣтъ лица; желтизна бѣлковъ глаза.

СОССУЛУС—если N.-vom., или Снам., хотя и принесли пользу, но не успѣли устранить возврата болѣзни, и когда вмѣются: давящая боль живота, которая уменьшается послѣ выхожденія вѣтровъ; колики послѣ стола, тошнота, накопленіе водянистой жидкости во рту и тоскливость въ груди; твердое, медленное испражненіе, *упрюмость* и *нетерпимость*.

ІОНАТІА—если Pulz. принесла неполное облегченіе, и когда вмѣются: *давящая боль, какъ-бы отъ камня*, которая обнаруживается послѣ стола и распространяется на устье желудка;

чувство слабости и пустоты подъ ложечкою и чувствительность при дотрогиваніи; жженіе въ желудкѣ; обратное восхожденіе принятой пищи; отвращеніе отъ пищи, питья и табаку; накопленіе слюны во рту.

Nux-vomica — при *стлывающихъ, давящихъ и судорожныхъ боляхъ* съ чувствомъ, какъ-будто *желудокъ сжатъ*, или *сжаты острыми когтями*; чувство тяжести отъ платья вокругъ подреберья; усиленіе боли *послѣ стола*, кофе, ночью, или по утрамъ; тоскливость въ груди; боли, простирающіяся въ спину и почки; появленіе тошноты, накопленіе слюны во рту и изсрга во время боли; рвота *принятою пищею*; кислый и гнилой вкусъ во рту; накопленіе вѣтровъ и вздутость живота; *запоръ*; *геморроидальная страданія*, *ипохондрическое, упрямое и сварливое расположеніе духа*; живой и *естымымый нравъ*; боль одной половины головы, или давящая боль во лбу и неспособность къ занятіямъ; бшеніе сердца и тоска (N.-vom., составляетъ также средство, которое большею частію прилично вначалѣ леченія и одинъ или два его приема иногда достаточны для того, чтобы произвести значительное облегченіе, а иногда и совершенное излеченіе; послѣ такого облегченія, Carb.-veg., усилѣваетъ устранить остающіяся страданія; но есть случаи, при которыхъ N.-vom., доставляетъ только минутное облегченіе, послѣ котораго припадки усиливаются; тогда должно употребить Puls., Cham. или Ign., если же, несмотря на сходство симптомовъ, N.-vom. вначалѣ осталась вовсе безъ дѣйствія, то ее замѣняютъ Cham. или Coccus.).

Pulsatilla — когда имѣются: *колючая боль*, усиливающаяся при хожденіи и *неловкомъ ступаніи*, или *головная боль на тощакѣ и послѣ стола* съ тошнотою, *наклонностію ко рвотѣ*; *настоящая рвота принятою пищею*; отсутствіе жажды въ то время, когда боль доходитъ до высочайшей степени; бшеніе въ надчревной части, напряженіе и сжманіе около желудка; *мягкія или жидкія испраженія*, усиленіе боли *по вечерамъ*; *озноба, усиливающийся съ болемъ*; кислый или горькій вкусъ во рту; печальное, плаксивое расположеніе духа; *кроткій и пріятный нравъ*.

Sulphur — когда замѣчаются: *давящая боль, какъ-бы отъ камня*, особенно послѣ стола; тошнота, истеченіе водянистой жид-

ности изо рта или рвота, особенно, если крохъ всего этого влѣются еще: *накопленіе кислотъ, ильза, отрыжка*; отвращеніе отъ жирной пищи, ржаваго хлѣба, кислыхъ и обсахаренныхъ веществъ; чувство сжиманія въ головѣ и неспособность размышлять; чувство неволи и давленія отъ платья вокругъ подреберій; напряженность и вздутость этихъ частей; расположеніе къ геморрою или слизистымъ страданіямъ пищеварительныхъ путей; меланхолическое, гипохондрическое расположеніе духа; склонность къ гнѣву или плаксивости.

§ 5. Изъ другихъ можно употребить еще слѣдующія:

ВІЗКУТІУМЪ — при упорныхъ спазмахъ желудка, давящей боли, чувствіи необыкновенной тяжести и какою-то неволи въ желудкѣ. — **САВВО-АНИМАЛІСЪ** — когда Carb.-veg., оказался неэффективнымъ и если замѣчаются: *острая давящая боль, накопленіе кислотъ, изгара и ослизненіе желудка*. — **ГНАРНИТЕСЪ** — противъ судорожной, стегивающей боли, или давленія при рвотѣ употребивъ пищу. — **САУТІСІУМЪ** — противъ *далекаго, судорожнаго стѣсненія и сжатія въ желудкѣ, какъ-будто котлами*; если, при усиленіи боли, волосы ѣжятся; при накопленіи кислотъ и слизи въ желудкѣ. — **ГВАТІОЛА** — противъ давящей боли живота, особенно послѣ стола; наклонности ко рвотѣ и тщетнаго позыва на отрыжку; запора и гипохондрическаго расположенія духа. — **ЛАСНИВІСЪ** — при давящей боли, уменьшающейся тотчасъ послѣ стола и усиливающейся нѣсколько часовъ спустя, особенно послѣ сядурномъ пищевареніи, вѣтрахъ въ животѣ и заборѣ. — **ЛУСОРОДІУМЪ** — при сжимающей боли (какъ-будто желудокъ сдавливается съ обѣихъ сторонъ), которая по вечерамъ уменьшается въ постели и повышается по утрамъ, особенно на воздухѣ, или послѣ полуденнаго сна. — **МАГНЕСІА** — при давящихъ и стегивающихъ боляхъ, и кислой отрыжкѣ. — **НИТРИВІВІТУСЪ** — если повышается *давящее стѣсненіе и полнота въ желудкѣ послѣ стола, вслѣдствіе умереннаго употребленія неваренной соли, и кислая слизистая рвота*; при потерѣ аппетита, изгара и накопленіи кислотъ. — **СИЛІСЕА** — противъ давящей боли желудка, особенно послѣ сна, или когда больной скоро пьетъ; ослизненія желудка и рвоты. — **СТАНІУМЪ** — при упорныхъ спазмахъ желудка, сопровождающихся горькою отрыжкой, чрезвычайнымъ голодомъ, поносомъ; тошно-

тою и болѣзненнымъ цвѣтомъ кожи.—**СТАРНУВАЕВІА**—противъ давящей и наирягающей боли живота, которая по временамъ уменьшается или увеличивается.—**СТВОНТИАНА**—противъ давящей боли желудка, особенно послѣ стола.

§ 6. Вообще при боляхъ живота должно имѣть въ виду, что при большой тоскѣ и давленіи въ сторону желудка: *Анас.*, *Арг.*, *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Cham.*, *Chin.*, *Graph.*, *Guaaj.*, *Laur.*, *Lyc.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Op.*, *Puls.*, *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*, *Stram.*, *Sulph.*, *Thuj.*, *Vegetr.*—Если *ощущеніе подъ ложечкою* причиняетъ боль: 1) *Арг.*, *Baryt.*, *Bry.*, *Calc.*, *Coloc.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Sil.*, *Spig.*, *Sulph.*, *Veratr.*; 2) *Camph.*, *Cann.*, *Colch.*, *Dig.*, *Ferr.*, *Kal.*, *Magn.-c.*, *Magn.-m.*, *Phos.-ac.*, *Plat.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Stann.*—При *сверлящей боли*: *Амм.*, *Арг.*, *Сарс.*, *Carb.-an.*, *Natr.*, *Nitr.*, *Sep.*—При *жгучихъ боляхъ*: 1) *Арг.*, *Camph.*, *Carb.-veg.*, *Cic.*, *Dig.*, *Lach.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sulph.*; 2) *Bry.*, *Coloc.*, *Dulc.*, *Hyos.*, *Magn.-c.*, *Merc.*, *Mez.*, *Mur.-ac.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *Zinc.*—При *давящихъ боляхъ*: *Ars.*, *Baryt.*, *Bell.*, *Bisun.*, *Bry.*, *Calc.*, *Carb.-an.*, *Carb.-veg.*, *Caust.*, *Cham.*, *Cic.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Ferr.*, *Graph.*, *Hep.*, *Lach.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *N.-mosch.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Rhus.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sulph.*—При *язвенной боли*: *Baryt.*, *Cann.*, *Carb.-veg.*, *Con.*, *Hell.*, *Magn.-c.*, *Magn.-m.*, *Merc.*, *Rhus.*, *Stann.*—При *припухлости около желудка*: *Амм.*, *Арг.*, *Bry.*, *Calc.*, *Coff.*, *Hep.*, *Ipec.*, *Lyc.*, *Natr.-m.*, *Petr.*, *Sulph.*—При *чувствѣ сжатия*, сгребанія, терзанія въ желудкѣ: 1) *Bell.*, *Calc.*, *Carb.-an.*, *Caust.*, *Magn.-arct.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Sil.*; 2) *Арг.*, *Chin.*, *Coccul.*, *Graph.*, *Lyc.*, *Natr.*, *Nitr.-ac.*, *Petr.*, *Stann.*, *Sulph.*, *Sulph.-ac.*—При *ощущеніи холода въ желудкѣ и подъ ложечкою*: *Аlum.*, *Амм.*, *Ars.*, *Baryt.*, *Сарс.*, *Chin.*, *Colch.*, *Con.*, *Laur.*, *Natr.-m.*, *Phosph.*, *Rhus.*, *Sulph.*, *Spong.*, *Zinc.*—При *бьющихъ боляхъ*: *Bell.*, *Carb.-veg.*, *Cin.*, *Dros.*, *Kal.*, *Graph.*, *Kreos.*, *Laur.*, *Lyc.*, *Magn.-m.*, *Merc.*, *Mosch.*, *Mur.-ac.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Puls.*, *Plat.*, *Sep.*, *Sulph.*, *Tart.*, *Thuj.*, *Zinc.*—При *судорожныхъ боляхъ* см. § 1.—При *сверлящихъ*: *Аlum.*, *Caust.*, *Colch.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Rhus.*—При *жгучихъ*: *Аlum.*, *Амм.-m.*, *Ars.*, *Baryt.*, *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Graph.*, *Hep.*, *Lach.*, *Lyc.*, *Natr.*, *Nitr.-ac.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Ruta.*, *Sil.*, *Sulph.*—При *терзающихъ*: *Аlum.*, *Амм.*, *Арг.*, *Baryt.*, *Carb.-an.*, *Сурр.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Merc.*, *N.-vom.*,

Puls., Ruta, Serp., Sulph.—При *колочимся*: 1) Ars., Bell., Bry., Caust., Colch., Dig., Lach., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Rhus, Serp.; 2) Alum., Amb., Amm., Baryt., Calc., Canth., Carb.-an., Chin., Con., Cupr., Graph., Ign., Magn.-c., Natr.-m., Phosph., Sulph.—При *чужестранности*: 1) Chin., Dig., Kal., Lach., Lyc., N.-mosch., N.-vom., Petr., Phosph.; 2) Acon. Arn., Asa., Calc., Merc., Mez., Staph.—При боли какъ-бы *отъ ссадины*: Alum., Baryt., Bry., Calc., Gim., Colch., Con., Hell., Ign., Kal., Lach., Magn.-c., Magn., Mosch., Nitr.-ac., N.-vom., Rap., Sabad., Serp.—При *сжимательныхъ*, стягивающихъ боляхъ: 1) Ars., Bry., Carb.-an., Carb.-veg., Coloc., Con., Graph., Magn.-c., Natr., Natr.-m., N.-vom., Sulph.; 2) Alum., Borax, Cha. Coccul., Dig., Gulj., Kal., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Plumb., Rhab., Rhus, Serp., Sulph.-ac.;—какъ отъ давленія *камнемъ*: Bism., Bry., Calc., Cham., Con., Ign., Sulph..

§ 7. При страданіяхъ, появляющихся въ особенности *вечеромъ*: 1) Calc., Puls.; 2) Carb.-v., Lyc., Phosph., Serp., Sulph.-ac., Thuj.;—при *давленіи* на желудокъ: 1) Ars., Bry., Lyc., N.-vom., Sil.; 2) Acon., Amm., Calc., Ign., Lach., Natr.-m., Puls., Sulph.;—при *остаткахъ съ мѣста*: 1) Bry.; 2) Anac., Bar., Hell., Puls., Magn.-m.;—при *детролизаніи* до стороны желудка: 1) Ars., Bar., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Sulph.; 2) Bry., Calc., Con., Cupr., Lach., Merc., Natr., Spig.;—при *движеніи*: Ang., Bry., Cupr.;—при *наибавіи*: Alum., Rhus;—во время *иды*: Ang., Arn., Cic., Con., Serp., Tart., Veratr.;—временно при *пролапываніи* пицы: Baryt., Nitr.-ac., Serp.;—послѣ *иды*: 1) Ars., Bell., Chin., Lach., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Baryt., Bry., Carb.-v., Cham., Cic., Coloc., Ferr., Kal.-bi., Petr., Phosph., Plat., Sil.;—при *облегченіи* послѣ *стола*: Graph., Phosph., Serp.;—послѣ *остути*: Bry., Puls., Rhus;—на *открытомъ* *воздухѣ*: Lyc., N.-vom.;—*утромъ*: 1) Ars., Bry., Calc., Natr.-m., N.-vom., Puls.; 2) Chin., Lyc., Phosph., Staph., Sulph.;—отъ *ходьбы*: 1) Calc., Phosph., Puls., Serp.; 2) Bell., Bry.;—послѣ *кофе*: Cham., N.-vom.;—при *улучшеніи* послѣ *кофе*: Cham.;—при *улучшеніи* отъ *холоднаго* *питья*: Phosph.;—при *улучшеніи* отъ *лежанія*: Bell., Bry., Calc., Cham., Caust., Chin., Graph., Stann.;—*ночью*: Arg.-n., Ars., Calc., Carb.-v., Cham., Graph., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls., Rhus, Sulph.;—при *улучшеніи* въ *покойномъ* *положеніи*: Bry., Cham.;—*ожесточеніе* отъ *испуга*: Carb.-v.;—въ *сидячемъ* *положеніи*: Serp., Puls., Sulph.;—

ожесточеніе болей отъ разговора: Caps., Natr., N.-vom.; — послѣ питья: 1) Ferr., N.-vom.; 2) Acon., Kal., Nitr.-ac., Rhod., Sil., Sulph.-ac.; при обмечени отъ теплоты постели: Graph., Lyc..

§ 8. Кромѣ того, если боли обмечаются при движеніи: Calc., Chin.; — при маибаніи: N.-vom.; — лежаніи: Bry., Calc., Cham.; — лежаніи на спинѣ: Bry.; — отъ прислоненія спиною: Bell.; — при персибаніи туловища: Arg.-p., Ars., Bell., Bry., Cham., N.-vom.; — при сидѣніи: Bry.; — послѣ рвоты: N.-vom.; — отъ дѣйствія внешней теплоты: Ars., Coloc., Graph., Lyc., Phosph.; — отъ нажима: Bry., Carb.-v..

§ 9. Равнымъ образомъ, если боли сопровождаются: головокруженіемъ: Lyc., N.-vom., Puls.; — головою болью: Bell., Bry., Lyc., N.-vom., Ser.; — краснотою лица: Bell., N.-vom.; — блѣдностію лица, Ars., Chin., Ser.; — жаждою: Ars., Bell., N.-vom.; — отсутствіемъ жажды: Puls.; — холодомъ: Chin., Ign., N.-vom.; — развитіемъ мисты: Bry., Cocc., N.-vom., Sil.; — кислотъ: Bry., Carb.-v., Chin., Cocc.: N.-vom., Phosph., Puls.; — отрыжкою: Ars., Bell., Bry., Calc., Cocc., Lyc., N.-vom., Puls., Ser., Sulph.; — иктою: Sec.; — тошнотою и позывомъ на рвоту: Ars., Bell., Bism., Cocc., Coloc., Croc., Lyc., Mez., N.-mosch., N.-vom., Ser.; — рвотою: Arg.-p., Ars., Bry., Calc., Carb.-v., Cocc., Coloc., Lyc., N.-vom., Plumb., Ser., Sulph.; — запоромъ на низъ: Arg., Bell., Bry., Calc., Coloc., Lyc., N.-vom., Ser., Sulph.; — носомъ: Ars., Calc., N.-vom., Puls.; — холоднымъ или мякотнымъ потомъ: Ars., Carb.-v., Cocc., Coloc., Ser.; — обморокомъ: Ars., Bell..

Сравни. Рвота, Пищеваренія слабость, Боли живота, Приступы болей, Обстоятельства, Причины.

Спазмы мочевого пузыря, Spasmi vesicae urinariae.

Средства для этого недуга: Aca., Caps., Clem., Phos.-ac., Puls., Sassa., Ser., Ter..

Спиртъ винный, Spiritus vini, отравленіе имъ.

Главные средства, по Герингу: 1) молоко; 2) слизистое питье; 3) водкѣ амміакъ, 1 каплю на стаканъ сахарной воды, давать по чайной ложкѣ; Coff. и N.-vom., въ гомеопатическихъ приемахъ.

Спиртныхъ напитковъ злоупотребленіе.

§ 1. Лучшія средства противъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ вообще: 1) Acon., Ant., Arg., Bell., Calc., Carb.-v., Chin., Coff., Hyos., Lach., Merc., Natr., N.-vom., Op., Puls., Stram., Sulph.; 2) Agar., Arn., Coccul., Dig., Ign., Led., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., Ran., Rhod., Rhus, Selen., Sil., Spig., Veratr., Zinc..

§ 2. Для *отрезвленія* преимущественно полезны: Acon., Bell., Coff., Op. — Противъ *похмѣлья* или *послѣдствій попойки*: 1) Ant., Carb.-v., Sulph., Coff., N.-vom.; 2) Bell., Bry., Calc., Chin., Duk., Nitr.-ac., Phos., Phos.-ac., Rhus. — Противъ *хроническихъ послѣдствій* пьянства вообще: Arg., Bell., Calc., Chin., Coff., Hell., Hyos., Lach., Merc., Natr., N.-vom., Puls., Sulph. — Противъ *мгорачки пьяныя* (Delirium tremens) въ особенноти: Arg., Calc., Lach., Merc., Sulph., Sulph.-ac..

§ 3. По принадлежкамъ можно руководствоваться слѣдующими:

А С О Н И Т У М показанъ, когда послѣ неумѣреннаго употребленія вина замѣчаются: *мгорачочный жаръ*, приливъ крови къ головѣ, краснота лица и глазъ, или потеря разсудка.

А Н Т И М О Н И У М — при *гастрическихъ страданіяхъ* вслѣдствіе слишкомъ обильнаго стола, при *отращеніи* отъ пищи, *тошнотѣ*, потерѣ аппетита, если притомъ Carb.-v. оказался бесполезнымъ.

А Р С Е Н И С У М — при *умопомѣшательствѣ у пьяныхъ*, сопровождаемомъ *тоскою*, которая мншаетъ *большою* всякаю *спокойствіа*; страхъ отъ воровъ, привидѣній и болзни уединенія; при трасеніи членовъ и желаніи спрятаться.

В Е Л Л А Д О Н Н А — съ *похмѣлья*, или когда замѣчаются у *пьяныхъ*: *потеря разсудка* съ бредомъ, *видѣніями* мышей и крысъ; притомъ краснота и припухлость лица; языкъ, обложенный слизью; *отращеніе отъ мясной пищи*; *бессонница*; затрудненная рѣчь съ постоянною улыбкою; ощущеніе сухости во рту и *затрудненное глотаніе*; сильная жажда; приступы *сильнаго мгорачочнаго жара*.

С А Л С А В Е А — при *давящихъ* или *бьющихъ* боляхъ головы, *облечающихся на воздухъ*; тошнота безъ наклонности во рвотъ; при *жидкихъ испражненіяхъ* на языкъ.

С А В В О В Е Г Е Т А В І Л І С — при *давящей* и *стучащей* головной

боли вслѣдствіе попойки; *улучшеніи на воздухѣ*; тошнотѣ без по-
зыма на рвоту; жидкомъ испражненіи нивомъ.

СНИНА—противъ припадковъ слабости у пьяницъ, преимуще-
ственно, когда замѣчаются въ то же время гидроическія стра-
данія.

СОФЕА—при раздраженномъ состояніи духа послѣ неумѣрен-
наго употребленія вина съ необыкновенною веселостью, *бессонни-
цою*, тошнотою, склонностью ко рвотѣ и настоящей рвотою; при
боляхъ головы послѣ похмѣлья, какъ-бы отъ присутствія гвоздя
въ мозгу, и если N.-vom. оказался противъ этого безуспѣшнымъ;
также противъ дрожанія рукъ у пьяницъ.

НУОСУАМУС—при эпилептическихъ подергиваніяхъ вслѣдствіе
жальства; бессонницѣ съ постояннымъ бѣганьемъ въ различныя
стороны; бредѣ съ дрожаніемъ членовъ, видѣніями, отъ которыхъ
больной старается уйти.

ЛАСИВІС—противъ слабости и дрожанія рукъ у сильно пре-
данныхъ пьянству.

МЯВСУВІУС—противъ слабости у особъ, которые при пьян-
ствѣ неумѣренно употребляли кофе, и вообще тогда, когда N.-vom.
или Sulph. не принесли никакой пользы.

НАТВУМ—противъ слабости и дурнаго пищеваженія у пья-
ницъ.

НУХ ВОМІСА—когда замѣчаются боли съ одной стороны головы
послѣ похмѣлья, съ чувствомъ присутствія гвоздя въ мозгу; боли,
которыя *усиливаются на воздухѣ*, при хожденіи, движеніи, разми-
шленіи и нагибаніи; тошнота съ склонностью и позывомъ ко
рвотѣ; притомъ запоръ съ натугами, или малоколичественныя сли-
зистыя испражненія; головокруженіе; краснота глазъ и накопле-
ніе гноя въ ушахъ, свѣтобоязнь; легкій, но частый кашель; рав-
нымъ образомъ приливъ крови къ головѣ у пожилыхъ пьяницъ,
съ потемнѣніемъ или потерей самосознанія; бредъ, страшныя ви-
дѣнія, отъ которыхъ больной старается уйти; тоскливость, не даю-
щая больному покоя и сопровождаемая часто холодомъ и влажно-
стію рукъ, ногъ и лица; накопленіе мокротъ въ желудкѣ, рвота
пищею или горькими веществами; бессонница, или неполный сонъ,
съ внезапными вскакиваніями отъ сна, испугомъ и тоскливыми
сновидѣніями; запоръ или жидкія малоколичественныя испражне-

нія; трясеніе членовъ, безсліе. Вообще N.-vom. прілична такимъ плянцамъ, которые въ то же время чрезмѣрно употребляютъ кофе.

ORIUМ—когда послѣ неумѣреннаго употребленія вина, или также у людей, привыкшихъ къ пьянству, замѣчаются: смѣха зрѣливая, или тягостный бредъ, съ видѣніями, представляющими мышей, скорпіоновъ и т. п.. Страхъ и желаніе убѣжать, или смѣшныя, во время которыхъ больной пробуждается, если съ нимъ говорить по имени; запоръ, трудное дыханіе, общій потъ; энцефалитическія подергиванія и судороги; трясеніе членовъ, сжатіе челюстей и подергиваніе мышцъ лица и рта; неподвижный взглядъ, темно-красный цвѣтъ лица.

RULVATILLA—противъ послѣдствій похмѣлья, сопровождаемаго неисправностію желудка, и вообще при отуманеніи головы съ тяжестью по лбу; при обмоченіи этого состоянія на воздухъ; притомъ тошнота послѣ принятія пищи или питья; при кислой отрыжкѣ, языкъ слизью обложенномъ, и преимущественно тогда, когда вино содержало въ себѣ сѣру.

STRAEMONIUМ—когда у людей привыкшихъ къ пьянству, замѣчаются: тоска, которая заставляетъ ихъ бѣгать въ разныя стороны; молчаливость, неопредѣленный взглядъ, страхъ и желаніе убѣжать; энцефалитическія подергиванія и бѣшенство; красное, горячее и вздутое лицо, разстроенное воображеніе и обманы чувствъ, напр. будто половина тѣла отрѣзана и т. д.

SULPHUR—противъ трясенія членовъ, гидротическихъ и другихъ страданій, слабости, а также при одновременномъ употребленіи кофе.

Спячка, дремота, сонливость днемъ, Somnolentia, Lethargia.

Всѣ эти степени соединены здѣсь вмѣстѣ для избѣжанія излишнихъ повтореній, и различаются между собою только по своимъ явленіямъ и признакамъ. Всѣ онѣ имѣютъ то общее, что означаютъ наклонность ко сну въ неестественное время. Средства противъ нихъ: 1) Ant., Bell., Bry., Calc., Carb.-veg., Con., Croc., Lach., N.-vom., Op., Phosph., Phos.-ac., Puls., Rhus, Sep., Sulph., Tart.; 2) Acon., Apac., Arn., Ars., Camph., Carb.-an., Caust., Chin.,

Cin., Coloc., Graph., Hell., Her., Kal., Laur., Magn.-arct., Merc., Mosch., Natr., Natr.-m., Sabad., Samb., Sec., Sil., Stram., Veratr..

§ 2. Изъ нихъ: при обыкновенной сонливости днѣмъ: 1) Bell., Calc., Carb.-veg., Chin., Cin., Graph., Her., Kal., Lach., Merc., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Sulph.; 2) Amm., Anac., Bry., Cann., Caust., Cham., Cin., Dig., Ferr., Magn.-arct., Magn.-m., Nitr.-ac., Puls., Sabad., Sep., Sil., Stram., Zinc.;—по утрамъ; тотчасъ по вставаніи съ постели, или передъ полуднемъ: 1) Ant., Calc., Graph., Her., Natr., Natr.-m., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Sulph.; 2) Caust., Con., Magn.-arct., Magn.-m., Merc., Puls., Rhus, Sil., Spig., Sulph.-ac., Tart., Zinc.;—днемъ послѣ обѣда или послѣ полудня: 1) Chin., Graph., Lach., N.-vom., Phosph., Rhus, Sulph.; 2) Acon., Agar., Amm., Anac., Baryt., Carb.-veg., Chin., Croc., Kal., Natr., Natr.-m., N.-mosch., Phos.-ac., Puls., Ruta, Sil., Staph.;—вечеромъ слишкомъ рано: 1) Ars., Bell., Calc., Con., Croc., Kal., Lach., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Sil., Sulph.; 2) Amm.-m., Anac., Arn., Cin., Cycl., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Rhus, Ruta, Sep., Thuj.,—при сонливости какъ-бы отъ опьяненія: Bell., Bry., Camph., Carb.-veg., Coff., Con., Croc., Magn.-arct., N.-mosch., Op., Phosph., Phos.-ac., Puls., Tart..

§ 3. При настоящей спячкѣ (Sopor) вообще: 1) Bell., Croc., Lach., N.-mosch., N.-vom., Op., Puls., Tart., Veratr.; 2) Ant., Arn., Ars., Baryt., Bry., Camph., Cham., Cocc., Con., Croc., Cupr., Hell., Her., Hyos., Laur., Led., Magn.-arct., Merc., Phosph., Phos.-ac., Plumb., Rhus, Samb., Sec., Sep., Stram..—Противъ спячки какъ-бы отъ одурманія (Coma somnolentum, Cataphora): 1) Bell., Led., N.-mosch., Op.; 2) Ant., Baryt., Camph., Carb.-veg., Cham., Con., Croc., Her., Laur., Magn.-arct., N.-vom., Phosph., Phos.-ac., Plumb., Puls., Sec., Stram., Tart., Veratr..—Противъ спячки съ бдѣніемъ (Coma vigilans, Argynnosoma, Typhomania): 1) Ars., Bell., Cham., Cocc., Her., Hyos., Lach., N.-vom., Op.; 2) Acon., Anac., Ant., Bry., Ign., Laur., Magn.-arct., Phosph., Spong., Sulph., Veratr..—Противъ непробудной спячки, летаріи (Letargia, Lethargus veteris) съ лихорадкою и бредомъ: 1) Bell., Lach., Op., Stram.; 2) Ant., Bry., Cham., Carb.-veg., Merc., Plumb., Puls., Tart..

§ 4. При спячечномъ, коматозномъ состояніи:

ВЛЛАДОННА—при глубокомъ или слишкомъ продолжитель-

ножъ *снѣ*, при которомъ замѣчаются: подергиваніе сухихъ жѣлъ, блѣдность и холодъ лица, холодъ рукъ, малый и скорый пульсъ, вздохи, *конвульсивная движенія и подергиванія членовъ*; голодъ и блѣдный взглядъ послѣ пробужденія. (Часто нужна послѣ или передъ *Lach.*, или послѣ *Op.*)

СНАЖОМІЦКА назначается преимущественно дѣтямъ, когда у нихъ замѣчаются: большое безпокойство, метаніе въ разныя стороны; внезапное вскакиваніе отъ сна; подергиваніе членовъ; короткое дыханіе; лихорадочный жаръ и краснота, *обнаруживающаяся то на одной, то на другой щекѣ*; крикъ, боль живота, зеленноватый поносъ.

ЛАСНЕВИЗ—при очень продолжительномъ снѣ, или когда спячка черезъ день смѣняется безсонницею, равно, когда глубокий сонъ сопровождается нечувствительностію, неподвижностію, скрежетаніемъ зубовъ, дрожащимъ, перемежающимся или совершенно нечувствующимъ пульсомъ.

НУХЪ ВОМІСА—при крѣпкомъ и глубокомъ снѣ, сопровождаемомъ внезапнымъ вскакиваніемъ, вздохами, крикомъ, крапѣніемъ слезящимися и тусклыми глазами, отвислостію нижней челюсти, слюнотеченіемъ.

ОРИШ — при *глубокомъ снѣ* съ открытыми и закатившимися подъ лобъ глазами, когда при этомъ замѣчаются: краснота и вздутость лица, *отвислость нижней челюсти*, потеря самосознанія, *тяжелое, медленное и перемежающееся дыханіе*, медленный пульсъ; конвульсивныя движенія членовъ, мышцъ лица и угловъ рта.

PULSATILLA—при *постоянной сонливости* съ потерей самосознанія, *бредомъ, жаромъ, безпокойствомъ и метаніемъ въ разныя стороны*; непроизвольномъ движеніи рта, рукъ и пальцевъ. (Часто прилична послѣ *Cham.* или *Tart.*).

Сравни. *Апоплексія, Переная горячка, Воспаленіе мозга.*

Судороги, спазмы, конвульсіи, Spasmi, Convulsiones.

§ 1. Подъ этимъ названіемъ мы разумѣемъ всѣ судорожныя болѣзни, какъ-то: каталепсію, пляску Св. Витта, истерическія конвульсіи, эклампсію, паучью болѣзнь, столбнякъ и т. д., и ставимъ ихъ здѣсь вмѣстѣ для того, что часто одно и то же средство

оказывается действительнымъ противъ различныхъ видовъ судорогъ, если только посторонніе симптомы допускаютъ его употребленіе. Совмѣстное нѣженіе всѣхъ этихъ болѣзненныхъ состояній имѣетъ еще и ту выгоду, что оно, представляя различную характеристику ихъ, облегчаетъ такимъ образомъ выборъ средствъ при различныхъ видахъ болѣзни.

§ 2. Средства при различныхъ судорожныхъ болѣзняхъ вообще: 1) Bell., Calc., Caust., Cham., Cupr., Hyos., Ign., Ipec., Lach., N.-vom., Op., Sil., Stram., Sulph.; 2) Acon., Ang., Arn., Ars., Camph., Cic., Citr., Cocc., Croc., Merc., Mosch., Plat., Rhus, Stann., Veratr., Zinc.; 2) Agar., Arg., Hell., Laur..

§ 3. Если болѣзнь не успѣла укорениться въ организмъ, если она еще сыпая: Acon., Ang., Arn., Bell., Camph., Cham., Cic., Citr., Cocc., Croc., Hyos., Ign., Ipec., Merc., Mosch., N.-vom., Op., Rhus, Stram., Veratr.. — Противъ хроническихъ страданій: 1) Ars., Calc., Caust., Cupr., Lach., Plat., Sil., Stann., Sulph., Zinc.; 2) Bell., Cocc., Croc., Hyos., Merc., N.-vom., Rhus, Stram., Veratr..

§ 4. При *катамепсис*: 1) Bell., Cham., Ipec., Natr.-m., Plat., Stram.; 2) Acon., Agar., Cic., Hyos., Mosch., Veratr.; 3) Asa., Camph., Coloc., Dros., Ign., Merc., Op., Petr.. — Противъ *пласки св. Витта* (Chorea St. Vitti): 1) Bell., Caust., Cin., Cocc., Croc., Cupr., Hyos., Ign., Natr.-m., N.-vom., Stram., Zinc.; 2) Asa., Ars., Chin., Cic., Coff., Dulc., Jod., Puls., Sabin., Sep., Sul; 3) Agar., Laur., Electr.. — Противъ *эклампсис*: 1) Bell., Caust., Cham., Cic., Cupr., Hyosc., Ign., Ipec., Kal., Mosch., N.-vom., Plat.; 2) Cin., Magn.-c., N.-mosh., Phosph., Stram.; 3) Arg., Cauth., Hell., Nitr.-ac., Sil., Sulph..

Противъ *падучей болѣзни* (Epilepsia): 1) Bell., Calc., Caust., Cupr., Hyosc., Ign., Lach., N.-vom., Op., Sil., Sulph.; 2) Agar., Arg.-n., Ars., Camph., Cic., Cin., Her., Natr.-m., Nitr.-ac., Plumb., Sec., Sep., Sil., Stann., Stram.; 3) Arg., Cham., Cocc., Dig., Dros., Merc., Petr., Puls., Tart., Valer., Veratr.. — *Недавніе* припадки падучей болѣзни требуютъ: Bell., Camph., Ign., N.-vom., Op.; *хроническіе*: 1) Sulph. и Calc., Caust., Cupr., Sil.; 2) Bell. и Lach., Her., Sil. — При *самомъ припадкѣ* нерѣдко Camph. (Tinct. fort., для иржаанія) приноситъ большую пользу. — При *обморочахъ* паду-

чей болѣзни съ потерей сознания показаны: 1) Cin., Stram.; 2) Camph., Canth., Magn.-c., N.-mosch., N.-vom., Plat.; 3) Ang., Ars., Bell., Hell., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Sulph.; 4) Calc., Caust., Hyosc., Lyc., Merc., Mur.-ac., Serp., Sil.

При леченіи хронической эпилепсін должно приступить къ выбору новаго средства не прежде окончательнаго дѣйствія перваго; это правило относится къ леченію всѣхъ почти болѣзней и къ леченію эпилепсін въ особенности.

Столбнякъ (Tetanus) собственно составляетъ симптомъ и встрѣчается только послѣ тяжелыхъ ранъ, отравленій и т. д. Средства: 1) Ang., Bell., Bry., Camph., Cham., Ipec., Mosch., Op., Plat., Sec., Stram.; 2) Acon., Arn., Cann., Canth., Cic., Cocc., Cin., Grat., Hyosc., Ign., Lach., Laur., N.-vom., Rhus, Stann..

§ 5. *Конвульси у дѣтей*: Acon., Caust., Cham., Cin., Coff., Curg., Ign., Ipec., Lach., Merc., N.-vom., Op., Stann., Sulph.. — Если онѣ происходятъ *вслѣдствіе трудногo прорыванія зубовъ*: Bell., Calc., Cham., Cin., Ign., Stann., Sulph. — *Вслѣдствіе истощенія*: Cic., Cin., Hyosc., Merc. и Sulph..—При судорогахъ у *истерическихъ женщинъ*: 1) Aur., Bell., Cocc., Ign., Ipec., Mosch., Stram., Veratr.; 2) Bry., Calc., Caust., Cham., Cocc., Con., Magn.-c., Magn.-m., Plat., Sec., Serp., Stann., Sulph. — Если судороги находятъ въ связи съ *мѣсячными очищеніями*: Coff., Cocc., Curg., Ign., Puls.—При судорогахъ у *роженнаго*: Bell., Cham., Cic., Hyosc.

§ 6. Относительно *отдаленныхъ причинъ*, отъ которыхъ развиваются судороги, нужно замѣтить, что если причину составляютъ *раны* или вообще *наруженія покрововъ*: 1) Arn., Ang.; 2) Puls., Rhus, Sulph.. — *Вслѣдствіе испуга, страха* или другаго какаго-либо душевнаго потрясенія: Cham., Curg., Hyosc., N.-vom., Op., Plat.. Въ одномъ случаѣ эпилепсін, происшедшей отъ испуга, съ большимъ успѣхомъ была употреблена Artem. — *Вслѣдствіе сильнѣйшаго раздраженія и ослабленія нервной системы*: 1) Calc., Lach., N.-vom., Sil., Sulph.; 2) Arn., Chin., Phos.-ac. — *Вслѣдствіе злоупотребленія наркотическихъ веществъ*, какъ напр. вина, овія, пива, дурману, *табаку* и т. д.: Bell., Curg., Cham., Coff., Hyosc., Ign., N.-vom., Op.; — *вслѣдствіе скрытыхся опухолей*: Calc., Caust., Ipec., Lach., N.-vom., Stram., Sulph.:—Если они появляются послѣ *протуды*, или *задержанной наковной испарины*: Acon., Bell., Cham.,

Chin., Cic., Lach., N.-vom., Sil.;— *вліянія ртутнихъ паровъ*: Bell., Stram.; — *мышцъ или мышьячмыцъ*: Camph., Merc., и Arg. противъ первыхъ, Curg. противъ вторыхъ.

§ 7. Относительно симптомовъ, опредѣляющихъ выборъ средствъ, нужно имѣть въ виду:

Велладонна — противъ столбняка, *сжатія челюстей, эмбрионизма, пляски св. Витта, коноульсий у малыхъ дѣтей, эмбрионизма* и т. д., и если при этомъ замѣчаются: *судороги, начинающіяся съ верхнихъ конечностей, съ чувствомъ свербенія и колючести въ нихъ; подергиваніе нѣкоторыхъ членовъ или частей, особливо плечъ; конвульсивныя движенія рта, мышцъ лица и глазъ; напоръ крови къ голову, сопровождающійся головокруженіемъ, темною краснотою, жаромъ и вздутостіемъ лица, или блѣдностію и холодомъ въ лицѣ и дрожью; свѣтобоязнь; закатившіеся или неподвижныя глаза, расширенныя зрачки; судороги съ мотаніемъ и торжанимъ, невозможность мотать и опасность задушенія; пѣна у рта; непроизвольное испражненіе на нивъ, или въ видѣ поноса, содержаща непереваренныя вещества; чувство сжманія въ груди и тоскливое дыханіе; возобновеніе припадковъ отъ легчайшаго дотроиванія или малѣйшаго противоречія; одурѣніе или совершенная потеря самосознанія; бессонница между припадками и метаніе съ разныхъ сторонъ, или *лубокій и коматозный сонъ*, во время котораго замѣчается сардоническая улыбка и искривленіе лица; *внезапное вскакиваніе отъ сна съ крикомъ; капризы, плачь, злость, желаніе кусать и рвать что-нибудь; большая тоска, страхъ и страшныя видѣнія.* (Сравн. Cham., Huoz., Ign., Op., Stram.).*

Клаустиумъ — противъ *эпилептическихъ коноульсий, пляски св. Витта* и т. д., сопровождающихся крикомъ, сильными движеніями членовъ, скрежетомъ зубовъ, смѣхомъ или плачемъ, непроизвольнымъ или обильнымъ испусканіемъ мочи, возобновеніемъ припадковъ отъ дѣйствія холодной воды.

Снамомілла — противъ судорогъ у *дѣтей и роженныя*, и вообще, когда замѣчаются: частая потягота у дѣтей, конвульсія конечностей, глазъ, вѣкъ и языка; конвульсивное вздрагиваніе во время сна; краснота, вздутость лица, или краснота одной щеки, съ блѣдностію другой; *сухой и жгучій жаръ кожи и жгучая жажда; юрччій потъ на лбу и подъ волосами; тоска, вздохи и рыданія*

ніе; тоскливое, скорое и хриплое дыханіе; сухой, хриплый, короткий кашель; колюка, вздутость живота и частыя зеленоватыя испраженія. (Срав. Bell., Ign.).

Суррум — противъ конвульсій у *дѣтей*, тоническихъ спазмовъ и пляски св. Вита, и вообще, когда замѣчаются: *судорожъ, появляющійся сначала въ пальцахъ руки или ноги, или въ плечахъ; притягиваніе большого пальца къ ладони; потеря самосознанія и рѣчи; пѣнистое истеченіе слюны; припадки задушенія* (преимущественно, если имъ предшествуетъ плачь); обильное отдѣленіе мочи; мутная моча; краснота лица и глазъ; плачь и тоска; шутовскіе фарсы и желаніе убѣжать или скрыться; правильнѣйшій ежемѣсячнѣй возвратъ припадковъ.

Нуовсѹамус — противъ клоническихъ судорогъ, пляски св. Вита, эпилепсїи и т. д., когда замѣчаются: *синеватый цвѣтъ и вздутость лица, язва у рта, выкатившїйся глазъ, конвульсивныя движенія нѣкоторыхъ членовъ или всего тѣла; сильное метаніе въ разныя стороны; притягиваніе большого пальца къ ладони; возобновленіе припадковъ всякій разъ при попыткѣ проглотить какую-либо жидкость; большая тоска, съ крикомъ и скрежетомъ зубовъ; потеря самосознанія, чувство сжиманія въ груди; непроизвольное испусканіе мочи; напоръ крови къ мозгу, глубокой коматознѣй, храпливый сонъ; чувство холода и гризеніи въ желудкѣ; сухой кашель ночью; охота смѣяться надъ всѣмъ; безпокойное бѣганіе въ разныя стороны; бредъ.* (Срав. Bell., Op.).

Іgnatia — противъ клоническихъ, тоническихъ и истерическихъ спазмовъ, конвульсій у *малыгъ дѣтей, эпилепсїи, пляски св. Витана* и пр.; вообще, когда замѣчаются: *конвульсивныя движенія членовъ, глазъ, языка, мимики лица и губъ; загибаніе языка назадъ; притягиваніе большого пальца къ ладони; синеватый или красный цвѣтъ лица, или краснота одной щеки съ блѣдностію другой, или попеременно блѣдность ихъ и краснота; истеченіе пѣнистой слюны; судороги глотки и гортани съ припадками задушенія и затрудненнѣмъ глотаніемъ; потеря самосознанія и непроизвольнѣй крикъ или смѣхъ; частая зѣвота или коматозное состояніе; большая тоска и глубокіе вздохи; ежедневнѣй возвратъ судорогъ; кроткїй, чувствительнѣй нравъ; перемежнѣчивое расположеніе духа; спокойное настроеніе ума.*

Иррасуанна — противъ клоническихъ и тоническихъ спазмовъ у дѣтей и истерическихъ женщинъ, когда при этомъ бываютъ: *закидываніе головы назадъ*; потеря самосознанія; крикъ; *блѣдность, вздутость лица*, искривленіе лицевыхъ мышцъ; полуоткрытые, выкатившіеся подъ лобъ глаза, или конвульсивныя движенія лицевыхъ мышцъ, губъ, вѣкъ и конечностей; *астматическія страданія*, сопровождающіяся *слизистымъ грипомъ, тошнотою, отращиваніемъ отъ языка, позывами на рвоту и настоящею рвотою или носоломъ.*

Ласнезис — противъ эпилептическихъ конвульсій и другихъ клоническихъ и тоническихъ судорогъ, когда при этомъ замѣчаются: судороги, сопровождающіеся крикомъ, паденіемъ больного съ потерю самосознанія, истеченіемъ пѣны изо рта, *холодомъ конечностей, отрыжкою, блѣдностію лица, головокруженіемъ, чувствомъ тяжести и боли въ головѣ, сердцебіеніемъ, вздутостью живота, спячечнымъ состояніемъ, тошнотою*, и преимущественно, если все это встрѣчается у дѣтей или молодыхъ людей.

Нух vomіса — противъ клоническихъ и тоническихъ судорогъ, эпилепсія, пляски св. Витта и когда при этомъ бываетъ: крикъ, *закидываніе головы назадъ*; трясеніе или конвульсивныя подергиванія членовъ или мышцъ; возобновленіе пароксизмовъ послѣ огорченія или досады; непроизвольное испусканіе мочи и кала; *чувство околѣтельности и онемѣнія въ членахъ*; рвота; обильный потъ; чувство сжиманія въ груди, запоръ, дурное расположеніе духа и раздражительность.

Ориум — противъ тоническихъ и клоническихъ судорогъ, эпилепсія и т. д., когда при этомъ замѣчаются: появленіе пароксизмовъ по вечерамъ и ночамъ; *закидываніе головы назадъ* или сильныя движенія членовъ, преимущественно плечъ; потеря самосознанія; нечувствительность, крикъ; притягиваніе всѣхъ пальцевъ къ ладони; *примадки задущенія; глубокой и коматозной сонъ.* (Сравн. Bell., Нув., Ign.).

Ствамоніом — противъ клоническихъ и тоническихъ спазмовъ, кампансіи, пляски св. Витта, истерическихъ судорогъ и т. д., когда бываетъ: *загибаніе головы назадъ*, или конвульсивныя движенія членовъ, преимущественно *верхней челюстью туловища; сардоническій смѣхъ*; заиканіе или потеря рѣчи; утомленіе, блѣд-

ность и глупое выраженіе лица; краснота и вздутость лица; потеря самосознанія и способности ощущать, что иногда сопровождается крикомъ и неистовыми тѣлодвиженіями, свѣхомъ, риданіемъ, плачемъ; желаніемъ убѣжать и т. д.; возобновленіе приступовъ отъ прикосновенія, или при взглядѣ на свѣтлые и блестящіе предметы. (Сравн. Bell.).

§ 8. Изъ прочихъ средствъ можно еще употребить:

Асонитумъ — противъ столбняка, спазма членовъ и другихъ тоническихъ спазмовъ, сопровождающихся попеременною блѣдностію и краснотою лица, крикомъ, скрежетомъ зубовъ и конвульсивною нотою; также противъ судорожныхъ припадковъ у молодыхъ полнокровныхъ людей (преимущественно у дѣвѣцъ), ведущихъ сидячій образъ жизни. — **Ангустула** — противъ тоническихъ судорогъ, при которыхъ голова загибается назадъ, челюсти сжимаются. — **Авниса** — противъ тоническихъ судорогъ, происшедшихъ *вследствіе пораненія* и сопровождающихся *сердечными* спазмами, спазмомъ челюстей, загибаніемъ головы назадъ. — **Аввигисумъ** — противъ эпилептическихъ припадковъ, при которыхъ бываетъ жеваніе въ желудкѣ, спячноту столбу и животу. — **Сальсарра** — противъ эпилепсій, пляски св. Витта и т. д., если припадки появляются ночью и если они уже сдѣлались хроническими (послѣ Sulph.). — **Самрнова** — противъ нѣкоторыхъ видовъ падушей болѣзни, сопровождающейся храпаніемъ, краснотою и вздутостію лица, слюноотделеніемъ состояніемъ. — **Сисута** — противъ *кломическихъ* и *тоническихъ* спазмовъ, эпилепсій, каталепсій, эклампсій, сопровождающихся блѣдностію или желтоватымъ цвѣтомъ лица, спазмомъ челюстей, искривленіемъ членовъ; крикомъ, истеченіемъ пѣнистой слюны, коликою, какъ-бы отъ присутствія глистовъ и т. д. — **Нитри-аcidъ** — противъ конвульсій, происшедшихъ отъ употребленія дурмана. — **Соссулюсъ** — противъ эпилептическихъ конвульсій, пляски св. Витта и другихъ судорогъ, встрѣчающихся преимущественно у женщинъ во время мѣсячнаго очищенія, или происходящихъ вслѣдствіе наружнаго поврежденія. — **Свобусъ** — противъ пляски св. Витта и другихъ конвульсій, сопровождающихся свѣхомъ, прыганіемъ, и если конвульсїи сдѣлаются коклюшнымъ кашлемъ. — **Глоноинумъ** — при судорогахъ съ напоромъ крови то въ голову, то въ сердце и когда притомъ лицо блѣд-

нѣтъ и краснѣтъ попережѣнно. — **MERCURIUS** — противъ эпилептическихъ припадковъ и другихъ спазмовъ, сопровождающихся крикомъ, ооченѣлостію всего тѣла, вздутостію живота, зудомъ въ носу, жаждою и починми паровсизмами. — **MOSCHUS** — противъ истерическихъ судорогъ, особенно, съ раздраженіемъ лежиза. — **PLATINA** — противъ приступовъ каталепсін, эклампсін, безъ потери самосознанія, но сопряженныхъ съ сжатіемъ челюстей, потерей рѣчи, конвульсивными движеніями глазъ, угловъ рта и вѣкъ, и если приступы появляются преимущественно подъ утро. — **RHUS** — противъ нѣкоторыхъ видовъ тоническихъ судорогъ и пляски Св. Витта. — **SILICIA** — противъ хронической надучей болѣзни (см. Calcaea). — **STANNUM** — противъ эпилептическихъ конвульсій, сопровождающихся метаніемъ членовъ въ разныя стороны, притягиваніемъ большаго пальца къ ладони, блѣдностію лица, загибаніемъ головы назадъ; потерей самосознанія, появленіемъ паровсизмовъ по вечерамъ. — **SULPHUR** — при хронической эпилепсін, сопровождающейся ощущеніемъ, какъ-будто мышъ пробѣгаетъ по мускуламъ, крикомъ, ооченѣлостію всего тѣла, или когда паровсизмы вызываются испугомъ или сильнымъ бѣгомъ. — **UREATRUM** — противъ клоническихъ и тоническихъ спазмовъ, сопровождающихся потерей чувствъ и конвульсивными движеніями глазъ; *тоскою*, упадкомъ духа и отчаяніемъ.

§ 9. Наконецъ при судорогахъ всякаго рода необходимо имѣть въ виду различныя *побочныя симптомы*: При сопровождаемыхъ *тоскою*: Bell., Caust., Cham., Cupr., Hyosc., Ign., Lyc., Veratr.; — *отрыжкою*: Kal., Lach., Lyc., Puls., Sass.; — *болію живота*: Bell., Caust., Cham., Cupr., Lach., Merc., Natr.-m., Plumb., Sep., Sulph.; — *потерю сознанія*: Ang., Bell., Camph., Cic., Con., Cupr., Hyosc., Ign., Ipec., Lach., N.-vom., Op., Plumb., Stram.; — *носомъ*: Alum., Chin., Hyosc., Kal., Led., Nitr.-ac., Sep.; — *жаждою*: Acon., Bell., Cham., Merc., N.-vom., Veratr.; — *рвотою*: Camph., Cupr., Ipec., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Puls., Sep.; — *звотою*: Ign., Her., Rhus.; — *блѣдностію лица*: Cic., Ipec., Sil., Sulph.; — *синевой лица*: 1) Camph., Veratr.; 2) Cin., Cupr., Hyosc., Ign., Op.; — *желтизною лица*: Cic.; — *краснотою лица*: Bell., Camph., Cin., Coss., Cupr., Ign., Ipec., Lyc., Stram.; — *болію членовъ*: Bell., Caust., Cham., Cin., Plumb., Sec.; — *мочечеченіемъ*: Caust., Cupr., Hyosc., Lach., Natr.-m.,

N.-vom.; — *трепетаніємъ сердца*: Glon., Lach., Merc.; — *кашлемъ*: Cham., Cin., Croc., Cupr., Dros., Veratr.; — *головною болью*: Arg., Bell., Calc., Caust., Cham., Cin., Con., Lach., Natr.-m., Ser., Veratr.; — *зудомъ въ членахъ*: Bell., Caust., Ign., Plumb., Rhus, Sec.; — *смѣхомъ*: 1) Aug., Calc., Con., Ign.; 2) Alum., Bell., Caust., Croc., Cupr., Ign., Phosph., Zinc.; — *параличѣмъ послѣ припадка*: 1) Caust., Lach.; 2) Arg.-n., Bell., Cic., Coss., Cupr., Hyosc., Laur., N.-vom., Plumb., Rhus, Sec.; — *перевѣтаніемъ какъ бы жемъ въ членахъ*: Bell., Nitr.-ac., Sil., Sulph.; — *болѣзнію желудка*: Arg., Con., Hyosc., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Plat., Plumb.; — *нападеніемъ рта кинкою*: Canth., Cham., Cin., Cupr., Hyosc., Ign., Lach., Laur., Lyc., Op., Plumb., Sil.; — *обморокомъ*: Acon., Camph., Carb.-v., Cham., Cupr., Ign., Lach., Mosch., N.-vom., Veratr.; — *болѣзнію съ стѣномъ*: Alum., Calc., Con., Kal., Lyc., Merc., Mosch., Natr.-m., Nitr.-ac.; — *сонливостію*: Bell., Camph., Cham., Dros., Hyosc., Ign., Lach., Merc., Nitr.-ac., Op., Sil.; — *кряканіемъ*: Bell., Calc., Caust., Cin., Hyosc., Lach., Lyc., Merc., N.-vom., Sulph.; — *слабостію*: Calc., Cic., Con., Kal., Merc., N.-vom., Plumb., Sec., Ser., Squil., Veratr.; — *появленіемъ пота*: Bell., Sec., Sil.; — *головокруженіемъ*: Arg., Bell., Calc., Lach., N.-vom., Op., Ser., Sil.; — *опьяненіемъ членомъ*: Acon., Bell., Bry., Camph., N.-vom., Oleand., Op., Puls., Rhus, Sec., Sulph.; — *поимотою*: Camph., Cupr., Ipec., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-vom., Puls.; — *умошлительствомъ*: Bell., Canth., Croc., Hyosc., Mosch., Sec., Stram.; — *слезами*: Alum., Aug., Bell., Caust., Cin., Cupr., Ign., Lach., Mosch., Plumb., Stram.; — *блѣнностью*: Bell., Canth., Croc., Hyosc., Stram.; — *скрежетаніемъ зубовъ*: Acon., Caust., Coff., Hyosc., Sulph. — Кромѣ того, при судорогахъ (или припадкахъ падучей болѣзни), сопровождаемыхъ паденіемъ наизнич: 1) Bell., Ign., Op., Rhus; 2) Aug., Camph., Canth., Chinin, Cic., Ipec., Kal., N.-vom., Spig., Stram.; — *на боку*: 1) Bell., Con., N.-vom., Sulph.; 2) Sil., Squil.; — *на правой*: Bell.; — *на левой*: Bell., Caust., Lach., Sabad.; — *на передѣ*: 1) Cic., Rhus; 2) Arg., Canth., Cupr., Fer., Sil., Sulph.

Если припадки появляются преимущественно *вечеромъ*: Alum., Calc., Caust., Laur., Op., Stram., Sulph.; — *послѣ усніи*: Alum., Kal., Natr.-m., Petr.; — *при всякомъ безпокойствѣ*: Aug., Bell.,

Сосс., Stram., Tart.; — на открытой воздуху: Carb.-v., N.-vom., Plat., Ser., Sulph.; — рано утромъ: Calc., Kal., N.-vom., Plat., Ser.; — послѣ каждаго душевнаго потрясенія: Acon., Bell., Coff., Hyosc., Ign., N.-vom., Puls.; — отъ всякаго шума: Ang., Arn., Ign.; — отъ холодной воды: Calc., Rhus; — отъ бѣлья: Sulph.; — отъ свѣтлѣ сѣтв, блестящихъ предметовъ и т. п.: Bell., Stram.; — ночью: Calc., Caust., Cic., Cin., Cupr., Hyosc., Kal., Lyc., Merc., Op., Sec., Sil., Sulph.; — въ новолуніе: Caust., Sil; — въ полнолуніе: Calc.; — во время рвоты: Сосс., Coff., Cupr., Ign., Puls.; — во снѣ: Kal., Sil.; — отъ малѣйшаго испуга: Hyosc., Ign., Lach., Op., Sec., Sil., Sulph., Veratr.; — послѣ питья: Bell., Calc., Hyosc., Stram.; — послѣ обмыванья: Sulph.; — послѣ плача: Arn., Cupr.; — на вступу: Plat., Ser., Sulph.; — при обмеченіи отъ холодной воды Caust..

Судороги нѣръ.

Они составляютъ большую частію симптомъ другой болѣзни, но иногда бывають самостоятельны и такъ мучительны, что обращаютъ на себя особенное вниманіе. Средства: 1) Cham., Cupr., Rhus, Sulph., Veratr.; 2) Calc., Camph., Caust., Coloc., Euphr., Lyc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Sec., Ser., Sil.

Судорожное сжатіе челюстей, Trismus.

Почти всегда составляетъ только симптомъ, который указываетъ на: 1) Camph., Hyos., Ign., Veratr.; 2) Lach., Merc., Plat., Sil.; 3) Acon., Ang., Camph., Hydros., Kal., Laur., Merc., Mosch., N.-vom., Plumb., Phosph..

Судорожное сжатіе вѣкъ, Blepharospasmus.

Средства: 1) Bell., Cham., Croc., Her., Hyos., Merc., Natr.-m., Staph., Stram., Sulph.; 2) Ars., Con., Rhus, Ruta, Ser., Sil., Viol.-od..

Съуженіе мочеиспускательнаго канала, Stricturea urethrae.

Средства: 1) Carb.-veg., Clem., Dig., Dulc., N.-vom., Petr., Puls., Rhus, Sulph.; 2) Bell., Camph., Canth., Chin., Cin., Coccul., Merc.,

Phosph., Spong.—Противъ спазмодической стиримтуры: 1) Canth., N.-vom., Puls.; 2) Bell., Camph., Cic., Coccu.—Противъ мозговыхъ, какія развиваются вслѣдствіе частыхъ переломовъ: 1) Clem., Dig., Dulc., Petr., Puls., Rhus; 2) Camph., Carb.-veg., Canth., Cic., Merc., Phosph..

Сухотка спиннаго мозга, Marasmus, s. Tabes dorsalis.

Мы еще не имѣемъ примѣхъ наблюденій надъ леченіемъ этой болѣзни, однакожъ можно полагать, что слѣдующія средства могутъ быть дѣйствительными, когда болѣзнь еще не достигла высокой степени: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Calc., Carb.-veg., Caust., Coccu., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac.; 3) Chin., Staph..

Я съ успѣхомъ употребилъ: 1) N.-vom. въ единственномъ приѣмѣ, оставленномъ для дѣйствія на 2—3 недѣли, и затѣмъ Sulph. съ 4—5 недѣльнымъ выжиданіемъ дѣйствія. Когда вслѣдствіе ранней страсти къ онанин, — главной причинѣ спинной сухотки, — развилась ипохондрія, доходящая до отчаянія и покушенія на собственную жизнь, слабость въ ногахъ и свойственное сухоткѣ ползаніе мурашекъ по спинѣ, я всегда начинаю леченіе сказанными средствами, если нѣтъ особеннаго показанія для другихъ. Если же остаются еще нѣкоторыя страданія, то назначаю Calc., Carb.-veg., Camph., Phos.-ac.. — Дѣйствіе Chin. и Staph. не всегда бываетъ успѣшно; но есть случаи, гдѣ они могутъ быть употреблены съ пользою. — Въ немногихъ случаяхъ сильно развитой *смынной сухотки* съ полнымъ параличемъ нижнихъ конечностей, очевидное излеченіе производили: N.-vom., Sulph., N.-vom., Caust., N.-vom., Carb.-veg., Cocc., Phosph., Rhus, даваемая въ этомъ порядкѣ въ единственныхъ приѣмахъ и въ продолжительныхъ промежуткахъ. Здѣсь, какъ во всѣхъ хроническихъ болѣзняхъ, ничего не выигрываемъ частыми приѣмами и перемѣнами средствъ.

См. также: *Астенія*.

Сухотка старческая, Marasmus senilis.

Средства: Barut., Con., Op., Phosph., Sec.—Противъ такъ называемой *purpura senilis*: 1) Con.; 2) Ars., Bry., Rhus, Sec., Sulph.-ac.

СЫПИ НАКОЖНЫЯ, Exanthemata. Мы ограничимся здѣсь только изложеніемъ общихъ показаній, которыя въ обыкновенныхъ случаяхъ будутъ достаточны для руководства къ выбору средствъ.

§ 1. Вообще какъ бы ни называлась сыпь, можно употребить:

При очень зудящей: Agar., Ant., Ars., Bry., Caust., Cham., Clem., Kal., Lach., Merc., Mez., Nitr.-ac., Oleand., Ran., Rhus, Ser., Staph., Veratr. — При ядвой: Amm.-m., Bry., Calc., Caust., Euphr., Lach., Led., Lyc., Mez., Natr.-m., Oléand., Phos.-ac., Puls. Ran., Ser., Sulph. — При жгучей: Amb., Ars., Bell., Bry., Caps., Carb.-veg., Caust., Con., Her., Kreos., Lyc., Merc., Mez., Ran., Rhus, Sil., Staph., Sulph., Viol.-tr. — При производящей комочий зудъ: Acon., Arg., Bell., Bry., Clem., Con., Dros., Her., Led., Merc., Nitr.-ac., Puls., Ran., Rhus, Ser., Sulph. — При сыпи, не причиняющей боли: Amb., Hell., Hyos., Lyc., Stram., Sulph. — При сыпи, причиняющей боль: Ant., Arg., Bell., Chin., Clem., Cupr., Dulc., Her., Lyc. Magn.-m., Phos.-ac., Puls., Ser., Sil., Veratr. — При сыпи, причиняющей терзающую боль: Calc., Lyc., Mez., Ser., Sil., Staph., Sulph. — При сыпи, сопровождающейся мажущающею болью: Arg., Bar., Caust., Con., Phos., Puls., Rhus, Sulph. — Если отъ сыпи замѣчается боль язвенная или боль какъ бы отъ раны: Alum., Amm., Arg., Aur., Bry., Calc., Caust., Cic., Colch., Dros., Graph., Her., Kal., Magn., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Petr., Phos., Phos.-ac., Puls., Rhus, Ser., Sil., Staph., Sulph., Veratr., Zinc. — При сыпи, имѣющей синий цвѣтъ: Arg., Bell., Con., Lach., Ran., Rhus; — прозрачной: Cin., Merc., Ran.; — желтоватой: Agar., Ars., Euphr., Kreos., Merc., Natr., Nitr.-ac., Ser.; — пурпурнаго цвѣта: Acon., Bell.; — розовокраснаго цвѣта: Alum., Natr., Phos., Sil.; — скарлатиннаго цвѣта: Amm., Ars., Bell., Croc., Sulph., Hyos., Merc., Phos.; — темноватаго цвѣта: Ars., Bell., Bry., Lach., Rhus, Sec., Sil.; — блѣватою: Agar., Arg., Bry., Ipec., Phosph., Sulph., Thuj., Val., Zinc.; — съ блѣватыми верхушками: Ant., Puls., Tart.; — легко кровотоchnой: Calc., Dulc., Merc., Sulph. — При сыпи, состоящей изъ кровянистыхъ пузырей: Arg., Bry., Natr.-m., Sec., Sulph. — При изнуряющей: Arg., Bell., Спaph., Carb.-veg., Lach., Mur.-ac., Ran., Sabin., Sec., Sil. — При молящейся Arg., Cic., Clem., Dulc., Her.,

Lyc., Magn.-m., Merc., Petr., Rhus., Sep., Staph., Tart., Zinc.—При
 мокнущей: Bov., Calc., Carb.-veg., Cic., Clem., Graph., Hep., Kal.,
 Kreos., Merc., Nitr.-ac., Petr., Rhus, Sel., Sep., Staph., Viol.-tr.—
 При разъедающей сохвдвиз части: Arg., Bor., Calc., Caust., Cham.,
 Clem., Con., Graph., Hep., Kal., Magn.-c, Merc., Natr., Nitr.-ac.,
 Petr., Rhus, Sep., Sil., Squill., Staph., Sulph., Viol.-tr.—При суру-
 нистой паршиной: Alum., Ant., Ars., Bar., Bell., Bov., Calc., Carb.-a.,
 Chel., Cic., Clem., Coloc., Con., Dulc., Graph., Hell., Hep., Kal.,
 Lyc., Merc., Natr.-m., Oleand., Puls., Ran., Rhus, Sassap., Sep.,
 Sil., Staph., Sulph., Viol.-tr.—При сухой: Bar., Bov., Calc., Carb.-v.,
 Cupr., Dulc., Led., Magn.-c., Merc., Mez., Petr., Phos., Sassap., Sep.,
 Sil., Staph., Veratr., Viol.-tr., Zinc.—При смывающейся: Acon.,
 Amm., Amm.-m., Bell., Clem., Cupr., Led., Merc., Mez., Phos., Sep.,
 Sil., Staph.—При чешуйчатой: Agar., Amm.-m., Aur., Cic., Clem.,
 Dulc., Led., Magn.-c., Merc., Oleand., Phos., Sulph.—При пролив-
 ной: Ant., Graph., Ran.—При сыпи съ трещинами: Acon., Calc.,
 Clem., Cycl., Hep., Lach., Merc., Petr., Puls., Rhus, Sassap., Sep.,
 Sulph.—При мелкозернистой: Bry., Carb.-v., Graph., Hep., Merc.,
 Phos.-ac., Sulph.—При песку подобной: Graph., Hep., Natr.-m.—
 При шишечковой: Agar., Ars., Led., Val.—При сгусткованной
 Agar., Calc., Ran., Rhus, Sil., Sulph.—При дугообразной: Ars.,
 Graph., Merc., Puls., Rhus, Sil., Sulph.—При вздообразной: Calc.,
 Rhus, Staph., Veratr.—При свисающейся: Agar., Cic., Hyos., Phos.-
 ac., Tart., Val.—При цепистой сыпи (въ видѣ цвѣтковъ, шишекъ):
 Acon., Ars., Ant., Bell., Bry., Caust., Cham., Dulc., Graph., Hell.,
 Hep., Kal., Merc., Nitr.-ac., Oleand., Phos., Phos.-ac., Puls., Rhus,
 Sassap., Sep., Spong., Staph., Sulph., Tart., Thuj.—При пузырь-
 кой: Amm.-m., Ant., Ars., Bell., Bry., Canth., Caust., Chin., Clem.,
 Graph., Hep., Kal., Lach., Phos., Ran., Ran.-b., Rhus, Sulph.—При
 сыпи, образующей ослезки: Alum., Ant., Calc., Caust., Dulc., Graph.,
 Hep., Lach., Lyc., Mez., Natr.-m., Puls., Rhus, Sep., Sil., Staph.,
 Veratr.—При пустулезной: Ant., Arn., Ars., Bell., Hyos., Merc.,
 Nitr.-ac., Puls., Rhus, Sil., Staph., Sulph., Tart.—При сыпи на ч-
 стляхъ, покрывающей волосы: Led., Thuj.—При сыпи на волосистыхъ
 частяхъ гѣла: Kal., Lyc., Merc., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus.

См. Кроветистые пузырьки, Оспа, Лишай, Прогонидная сыпь.

Сыпь лица, Пурпура на шлестъ, Корь, Молочные струнья, Росса, Скарлатина.

СЫПЬ ЛИЦА, ЛИШАИ, ПЯТНА И ЯЗВЫ НА ЛИЦѢ.

§ 1. Средства противъ этихъ явленій: 1) Ars., Aur., Baryt., Calc., Carb.-veg., Cic., Dulc., Graph., Hep., Led., Lyc., Magn.-m., Natr.-m., Nitr.-ac., Phos.-ac., Rhus, Sep., Sulph; 2) Amm., Ant., Bor., Bry., Caust., Con., Kreos., Lach., Sassaп., Sil., Staph., Veratr..

§ 2. Относительно различныхъ видовъ пятнистой сыпи, заслуживаютъ вниманія:

Противъ *веснушекъ* (Ephelides): Alum., Ant., Calc., Dulc., Graph., Lyc., Mur.-ac., Puls., Sep., Sulph.;—*угрей* (Acne): 1) Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Hep., Lach., Sulph.; 2) Aur., Cann., Canth., Carb.-an., Caust., Cic., Kreos., Led., Natr., Nitr.-ac., N.-vom., Phos.-ac., Puls., Rhus, Ruta, Sep., Veratr.;—*обыкновенныхъ угрей* (Acne simplex) у молодыхъ людей, преимущественно *преданныхъ диететическимъ излишествамъ*: 1) Bell., Hep., Led., N.-vom., Sulph.; 2) Ars., Calc., Carb.-veg., Lach., N.-vom., Phos.-ac., Puls.;—*такъ называемаго цвѣта* (Säuferblüthen): 1) Kreos., Led., N.-vom.; 2) Ars., Lach., Puls.;—*мелкую цвѣта угрей* (Acne rosacea): 1) Ars., Carb.-an., Kreos., Rhus, Ruta, Veratr.; 2) Aur., Calc., Cann., Canth., Carb.-veg., Caust., Cic., Led., Lach., Sep.;—*черныхъ точечныхъ угрей* (Acne punctata): 1) Graph., Natr., Nitr.-ac., Sulph.; 2) Bell., Bry., Calc., Dig., Dros., Hep., Natr.-m., Sabin..

§ 3. Относительно *настоящей лишаевой сыпи* лица, нужно замѣтить:

Противъ *влаготочивыхъ струньевъ* (Impetigo facialis): 1) Calc., Graph., Sulph.; 2) Ars., Cic., Lyc., Rhus, Sep.;—*мелкихъ струньевъ* (Crusta lactea): 1) Rhus; 2) Calc., Sulph.; 3) Ars., Baryt., Cic., Graph., Lyc., Merc., Sassaп., Viol.-tr.;—*зубной сыпи у дѣтей* (Strofulus): 1) Merc., Sulph.; 2) Calc., Graph., Rhus, Sep.;—*мучнистыхъ лишаевъ* (Herpes furfuraceus): 1) Ars., Bry., Cic., Sulph.; 2) Anac., Merc., Thuj.;—*разъѣдающихъ* (Lupus s. Impetigo rodens s. Herpes exedens scrofulosus): 1) Ars., Bell., Hep., Merc., Sep., Sil., Staph., Sulph.; 2) Cic., Graph., Natr.-m., Nitr.-ac.;—*разъѣдающую лишаевую мочу* (Lupus nasi, v. Herpes exedens idiopathicus): Staph.;—*чесуцъ*

чатой сыни лица (Psoriasis facialis): 1) Calc., Graph., Lyc., Sep., Sulph.;—*струпьевъ на губахъ, язвннхъ, покрывающихъ углы рта:* 1) Amm., Bell., Calc., Caust., Graph., Her., Ign., Kreos., Merc., Natr.-m., Sil.; 2) Ant., Arn., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sulph., Veratr.;—*сыни на подбородкѣ (Mentagra):* 1) Ant., Cic., Graph., Sulph.; 2) Carb.-veg., Clem., Dulc., Kreos., Merc., Sassa., Sep.;—*ползучихъ струпьевъ (Crusta serpiginea):*—видоизмѣненія млечныхъ струпьевъ: 1) Ars., Cin., Graph., Merc., Sassa.; 2) Calc., Baryt., Lyc., Rhus.

§ 4. При язвахъ на лицѣ и губахъ надобно замѣтить, что *рекоидныя* язвы (на лицѣ или губахъ) требуютъ: 1) Ars., Bell., Sil., Sulph.; 2) Clem., Con., Her., Merc.;—*золотушная:* 1) Bell., Her., Merc., Sep., Sil., Staph., Sulph.; 2) Cic., Graph., Natr.-m., Nitr.-ac., Sulph.-ac.

§ 5. Наконецъ во всѣхъ случаяхъ можно употреблять:

При сыни *на лбу:* Ant., Bell., Her., Caust., Kreos., Led., Natr.-m., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sep., Sil., Staph., Sulph.;—*на вискахъ:* Alum., Ant., Bell., Carb.-veg., Caust., Lyc., Mur.-ac., Natr.-m., Sulph., Thu.;—*вокругъ глаза:* Ars., Con., Her., Merc., Staph., Sulph.;—*бровяхъ:* Caust., Kal., Natr.-m., Selen., Staph.;—*щекахъ:* Ant., Bell., Calc., Caust., Kreos., Lach., Natr., Natr.-m., Phosph., Rhus, Sep., Sil., Staph., Veratr.;—*носу:* Alum., Aur., Carb.-an., Carb.-veg., Caust., Graph., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Sep., Sil., Sulph.;—*вокругъ носа:* Ant., Caust., Natr., Rhus, Sep., Sil., Sulph.;—*вокругъ рта или на губахъ:* Ars., Bry., Calc., Caust., Kreos., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Sep., Sil., Staph., Sulph.;—*у уловъ рта:* Ant., Amm., Arn., Bell., Calc., Caust., Graph., Her., Ign., Kreos., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Sep., Sulph., Veratr.—*На подбородкѣ:* Ant., Bell., Caust., Con., Graph., Her., Kal., Kreos., Lyc., Merc., Natr.-m., Rhus, Sep., Sil., Sulph., Veratr.

О другихъ показаніяхъ и вѣрнѣйшемъ опредѣленіи выбора средствъ см. *Сыни вообще, Лишай, Пятна, Язва.*

Сыпь лишайная на ушахъ.

§ 1. Лишай и парша, поражающія преимущественно уши или кожу позади ушей, требуютъ: 1) Graph., Her., Merc., Оссанд.,

Petr., Sulph.; 2) Ant., Baryt., Calc., Cic., Kal., Lach., Lyc., Mez., Phosph., Puls., Ser., Sil., Staph..

§ 2. Изъ нихъ заслуживаютъ вниманія:

При сыпи *около ушей* или *на самомъ ушахъ*: 1) Baryt., Calc., Cic., Sulph.; 2) Ant., Kal., Petr., Phosph., Puls., Ser., Sil.—При *парши* позади ушей: Baryt., Calc., Graph., Нер., Lyc., Mez., Oleand., Puls., Ser., Staph.. — При сыпи *струпистой, похожей на паршу*: Graph., Нер., Lach., Lyc., Puls., Staph..—При *ссадинахъ и отслоѣннѣ* кожи: Graph., Kal., Lach., Merc., Petr., Sulph..—При *влазоточивости и отрубности* нѣкоторыхъ мѣстъ: Calc., Graph., Lyc., Oleand., Petr..—При *изъязвленной, мноеточивой сыпи*: 1) Amm., Carb.-veg., Merc., Puls., Ruta, Spong.; 2) Alum., Kal., Stann.. — При *сильномъ зудѣ* на нѣкоторыхъ мѣстахъ: Amm., Anac., Baryt., Lyc., Puls., Sulph..—При *припухлости уха* отъ сыпи: Anac., Calc., Kal..—Если замѣчается *зловоніе изъ ушей*: Aug., Carb.-v., Graph., Нер., Oleand..

Сравни: *Сыпи вообще, Лишай, Парша на голову, Воспаленіе ушей.*

СЫПИ ОСТРЫЕ И ЛИХОРАДОЧНЫЯ, Exanthemata febrilia.

§ 1. Главныя средства противъ острыхъ сыпей, *оспы, кори красузы, scarlatinны, пурпурной, просовидной сыпи*: 1) Acon., Bell., Bry., Calc., Merc., Phosph., Puls., Sulph.; 2) Arg., Amm., Baryt., Chin., Lach., Hell., Rhus, Stram..

§ 2. Противъ *воспалительной лихорадки* передъ высыпаніемъ во всѣхъ случаяхъ, какая бы послѣ ни развилась сыпь, главныя средства: 1) Acon.; 2) Bell., Bry., Coff.. Сюда относятся также все то, что сказано при *воспалительной лихорадкѣ*, которая здѣсь можетъ быть простою или сложною.

§ 3. Если сыпь развилась до того, что можно опредѣлять, къ какому классу она принадлежитъ, то употребляются средства, исчисленныя при всякомъ видѣ сыпи въ отдѣльности. Если же сыпь еще не опредѣлима и не принадлежитъ ни къ одной изъ извѣстныхъ категорій, то нужно обратить вниманіе на слѣдующіе признаки:

При *ялкнматной сыпи*: Acon., Amm., Bell., Bry., Phosph., Puls..—При *сыпи, похожей на просовидную*: Acon., Ipec., Rhus, Val..—При

катаральной: 1) Arg., Carb.-v.; 2) Bell., Hyos., Lach., Rhus, Sec., Sil. — При *молящейся*: 1) Bell., Merc., Rhus; 2) Ant., Arg., Puls., Sulph., Tart.; 3) Hyos. — При *рожевидной*: 1) Bell., Rhus; 2) Amm., Euphorb., Phosph.; 3) Camph., Carb.-veg., Graph.

§ 4. Если сны *скрылась* вследствие простуды или другой какой-либо причины: 1) Arg., Bry., Phosph., Puls., Stram., Sulph.; 2) Bell., Caust., Hell, Phos.-ac., Op. — Если вследствие скрытия сны производят *переносъ на мозгъ*: 1) Bell., Hell., Stram; 2) Arg., Arn., Phos.-ac., Puls. — При *страданияхъ труды* или затрудненномъ дыханіи послѣ скрытія сны: Bry., Phosph., Sulph.

§ 5. Если послѣ естественнаго исчезанія сны остаются последовательныя болѣзни, то при *катаральныхъ страданіяхъ* будутъ весьма приличны: Bry., Carb.-veg., Drov., Dulc., Hyos., Igu., N.-vom., Ser.; — при *страданіяхъ уха*: Bell., Carb.-veg., Colch., Herp., Lys., Men., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Puls., Sulph.; — противъ *поноса*: Chin., Merc., Puls., Sulph., Veratr.; — *идротическихъ страданій*: 1) Arg., Bell., Dig.; 2) Arn., Bell., Phosph.-ac., Seneg., Sulph. См. сны въ частности: *Оспа, Корь, Скарлатина.*

Сыпь поояная, Zona, Zoster.

Средства противъ этой болѣзни, которая поражаетъ только туловище и не должна быть смѣшиваема съ обыкновенною пузырстою рожею: 1) Rhus; 2) Graph. Мнѣ удалось много разъ тѣмъ или другимъ средствомъ совершенно излечить эту болѣзнь. Но если сыпь скрылась, или была прежде дурно лечима, то Rhus и Graph. не помогали и я долженъ былъ обращаться къ другимъ средствамъ, между коими полезнѣе всѣхъ оказались: Arg., Merc., Puls. — Дальнѣйшимъ опытомъ предоставляются: Bry., Cham., Natr., Selen., Sil., Sulph.

Сыпь просовидная, Miliaria.

Главныя средства: Acon., Arg., Bell., Bry., Cham., Ipec., Puls., Sulph. Если высыпаніе сопровождается сильною *тоскою*: Arg. — При сны у *роженца*: Bry., Ipec., а у *дѣтей*: Acon., Bell., Bry., Cham., Ipec. — Въ случаѣ внезапнаго скрытія сны, или очень медленнаго высыпанія ея, съ астматическими страданіями, гастри-

ческие симптомы и обморочными припадками: Ipec.— При белой просовидной: 1) Arg., Bry.; 2) Bell., Val.

Сыпь просовидная пурпурная, *Miliaria purpurea*.

Средства: 1) Acon., Coff.; 2) Bell., Sulph. Если болезнь осложняется scarlatinною: Dulc.

О точнѣйшемъ опредѣленіи средствъ см. *Воспалительная лихорадка, Острая лихорадочная сыпь, также Оспа, Просовидная сыпь, Корь, Скарлатина.*

Сыпь пузырьчатая-воспалительная, *Pemphigus*.

Средства противъ острой и хронической формъ этой сыпи: 1) Bell., Dulc., Rhus, Ser.; 2) Canth., Her., Ran..

См. *Пузырчатую розу* въ статьѣ *Роза*, потому что она похожа во многихъ отношеніяхъ на *Pemphigus* и леченіе ихъ сходно.

На счетъ *Pemphigus solitarius Pempholix* еще вѣтъ вѣрныхъ наблюденій; но можно предполагать, что противъ этой сыпи оказались бы полезными средства, предложенныя противъ *Bullae rhagadaenicae*, хотя послѣднія скорѣе составляютъ видъ *Esthymae rhoëminentis* (Bateman), нежели *Pempholix*.

Сыпь пятнистая, *Ephelides, Purpura*.

§ 1. Средства отъ этого рода сыпей: 1) Bry., Lyc., Natr., Phosph., Ipec., Sulph.; 2) Alum., Ant., Ars., Calc., Carb.-veg., Cop., Graph., Huov., Lach., Merc., N.-vom., Nitr.-ac., Oleand., Sabad., Sfarph., Sulph.-ac..

§ 2. *Веснушки*: 1) Lyc., Phosph., Sulph., Veratr.; 2) Amm., Ant., Calc., Dulc., Graph., Natr., Nitr.-ac., Puls.— *Печеночная пятна* (*Ephelides hepaticae*): 1) Lyc., Merc., Nitr.-ac., Ser., Sulph.; 2) Ant., Carb.-veg., Cop., Dulc., Huov., Lach., Natr., N.-vom., Phosph.— При *пятнахъ*, похожихъ на *струбы* (*Pityriasis*): 1) Arg., Alum., Bry., Lyc., Phosph. и Ser., а при развивающихся на головѣ или волосистой части сл: 1) Arg., Alum.; 2) Calc., Graph., Oleand., Starph.;— *пятна* у беременныхъ часто исчезаютъ отъ Ser. или Cop.— *Родимки* часто излечиваются: 1) Carb.-veg., Sulph.; 2) Calc., Graph., Sulph.-ac..

§ 3. Кроме того, нужно имѣть въ виду, что: при *смѣскахъ пятенъ*: Bell., Phosph.— При *пятнахъ кроваваго цвѣта*: 1) Arg., Bry., Rhus; 2) Hyos., Led., Phosph., Sec., Sulph.-ac. (Сравн. *Кровавая пятна*).— При *кофейнокрасныхъ*: 1) Nitr.-ac., Phosph.; 2) Cal.— При *зеленыхъ*: Arg., Ferr., Petr., Phosph., Sulph.— При *зеленоватыхъ*: Arg., Cop., Ser.— При *пятнахъ меднаго цвѣта*: Arg., Carb.-ac., Kreos., Mez., Rhus, Ruta, Vegetr.— При *красныхъ*: 1) Carb.-veg., Lys., Merc., Nitr.-ac., Phosph., Ser.; 2) Arg., Cop., Kal., Sulph., Sulph.-ac.; а если они на холодѣ дѣлаются блѣдными: Sabad.— При *пятнахъ, какъ-бы отъ ушиба, давленія или толчка*: 1) Cop.; 2) Arg., Sulph.-ac. (Сравн. *Кровавая пятна*).— Если они имѣютъ *алый цвѣтъ*: 1) Amm., Bell., Merc., Phosph.; 2) Croc., Euphorb., Hyos., Sulph.— При *бѣлосыихъ*: Phosph., Vegetr.— При *черныхъ*: Arg., Lach., Rhus, Sec.— При *винокрасныхъ*: Coccul., Ser.— При *бѣлыхъ* см. § 4.

§ 4. Кроме того: при *пятнахъ, похожихъ на проказу, если она бѣлая*: 1) Arg., Sil.; 2) Alum., Phosph., Ser., Sulph.— Если же она *розовокрасная*, то: Natr., Phosph., Sil.— При *сифилитическихъ* (кѣновокрасныхъ, фиолетовыхъ) Merc., Nitr.-ac..

См. также отдѣльныя статьи: *Кровавая пятна, Подтеки крови, Пурпурная пятна*.

Сѣра, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія ея.— Средства противъ *хроническихъ дурныхъ послѣдствій* отъ злоупотребленія сѣры: 1) Merc., Puls., Sil.; 2) Chin., N.-vom., Ser.— Противъ *послѣдствій* отъ вдыханія сѣрныхъ паровъ: Puls.— Противъ *послѣдствій* отъ употребленія *сына, поджиганнаго сѣрой*: 1) Merc., Puls.; 2) Arg., Chin., Ser..

Сѣрная печень, вредныя послѣдствія отъ отравленія ея.— При *полномъ отравленіи* большими приемами: 1) *уксусъ*, разведенный водою; 2) *лимонная кислота*; 3) *слизистое питье или слизистые клизмы*.— Противъ *послѣдствій* отъ отравленія или злоупотребленія сѣрной печени, даваемой въ видѣ *врачебнаго средства*: 1) Bell.; 2) Cham., Sil.; 3) Alum., Ign. Graph.,

Т.

Табакъ, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія. — § 1. Вѣрнѣйшія средства: Acon., Bry., Cham., Chin., Coss., Cupr., Merc., N.-vom., Puls., Staph., Veratr..

§ 2. Противъ *непосредственныхъ послѣдствій*: Acon., Cham., Coss., Cupr., N.-vom., Puls., Staph., Veratr.—*Хроническія послѣдствія* требуютъ: Coss., Merc., N.-vom., Staph.—*Для жующихъ табака*: Cham., Con., Cupr., N.-vom., Puls.—*Для рабочихъ на табачныхъ фабрикахъ*: Ars., Coloc., Cupr..

§ 3. Изъ сказанныхъ средствъ: **А С О Н И Т У М**—противъ сильной головной боли и тошноты. **С И А М О М И Л Л А**—противъ головокруженія, одурѣнія, припадковъ обморока, желчной рвоты, поноса. **С О С С У Л У С**—противъ дурнаго пищеваренія и слишкомъ большой чувствительности нервной системы. **С У П Р У М**—преимущественно противъ конвульсій. **Н У Х В О М И С А**—противъ дурнаго пищеваренія, тошноты, возвышенной нервной раздражительности и упорнаго запора. **Р У Л С А Т И Л Л А**—при тошнотѣ, потерѣ аппетита, истеченіи густой слюны изо рта, поноса съ рвѣемъ въ животъ. **С Т А Р Н У В А Г В И А**—при тоскливомъ безпокойствѣ, тошнотѣ, упорномъ запорѣ. **В К В А Т Р У М**—противъ слабости и приступовъ обморока, поноса, ледянаго холода членовъ и всего тѣла.

§ 4. Противъ *зубной боли* вслѣдствіе употребленія табаку: Bry., Chin.—*Противъ тошноты*: Ign.—*Отъ запора*: Merc..

Течь изъ ушей, Otorrhoea.

§ 1. Средства 1) Merc., Puls., Sulph.; 2) Calc., Carb.-v., Caust., Con., Lach., Lyc., Nitr.-ac., Petr., Sil.; 3) Alum., Anac., Asa., Carb.-an., Cham., Cist., Colch., Guaj., Kal., Lyc., Men., Natr.-m., Phosph..

§ 2. При *истеченіи ушной слюны*: 1) Con., Merc.; 2) Kal., Lyc., Natr.-m., Nitr.-ac., Puls.; 3) Amm.-m., Anac., Phosph.—*При ка-*

тарральной или слизистой течи из ушей: Merc., Puls., Sulph.—
Вообще при истечении крови из ушей (*Haemorrhagia auricularis*): 1) Merc., Puls.; 2) Bell., Calc., Cop., Graph., Lach. Lys., Nitr.-ac., Rhus, Ser., Sil., Sulph.—Противъ *мокрой течи*: 1) Bell., Нер., Merc., Puls., Sil.; 2) Asa., Calc., Caust., Lach., Nitr.-ac., Petr.; 3) Amm., Aug., Borax, Carb.-v., Cist., Kal., Lys., Natr.-m.—Противъ *золотушной течи* (съ изъязвленіемъ ушной раковины): Нер., Lys., Merc., Puls., Sulph..

§ 3. Упорная ушная течь послѣ *остраго воспаления уха* требуетъ: Merc., Puls., Sulph.—Отъ ушной течи вследствие *острой сыпи*, какъ напр. скарлатины, кори и оспы: Bell., Colch., Нер., Lys., Merc., Меп., или также Carb.-veg.—Вслѣдствіе *злоупотребленія ртутію*: Aug., Asa., Нер., Nitr.-ac., Sil., Sulph., а при *костной кисте* слухового органа: Aug., Nitr.-ac., Sil.;—отъ *злоупотребленія стрьмъ*: Puls. или Merc..

§ 4. Противъ послѣдствій отъ *скрытія или дурнаго леченія ушной течи*: 1) Bell., Merc., Puls.; 2) Bry., Dulc., N.-vom.—Если послѣ этого появляется *притупленность шейныхъ или околовидныхъ железъ*: Bell., Merc., Puls.—При *боли зубов или мигорадкѣ*: Bell., или Bry., а если течь скрылась *вслѣдствіе простуды*: Dulc. или Merc.;—*воспаленіи лицевъ*: Aug., Merc., N.-vom., Puls., Zinc.

§ 5. При *болѣзненной ушной стрьмѣ*: Amm.-m., Calc., Cop., Lach., Merc., Selen., Ser., Sil., Thuj.;—если *ушная стрьма красна*: Cop.—Если она похожа на *кисель*: Lach..

Сравн. Пороки слуха, Воспаленіе уха, Боль ушная.

Тифъ, тифозная лихорадка, нервная горячка
Typhus, Febris nervosa.

§ 1. Подъ этимъ названіемъ мы разумѣемъ лихорадки *нервные древнихъ врачей и тифозныя новѣйшихъ*, а также и различныя ихъ виды, какъ-то: *нервно-гастрическія, нервно-слизистыя, нервную воспалительную, нервную эретическую и адинамическую лихорадки, госпитальную, мильную, астеническую нервную лихорадку*, потому что онѣ всё составляютъ только различныя формы тифа, болѣзни sui generis. Даже и тѣ изъ *катарральныхъ, проститъ воспалительныхъ, обмененныхъ гастрическихъ и слизистыхъ ли-*

хорадоу, которыя послѣ переходятъ въ тифъ, ничто иное, какъ первоначальныя формы его. Такъ называемое *тифозное воспаленіе* легкихъ есть тотъ же тифъ, только съ преобладающимъ поражениемъ легкихъ. Должно еще отличать тѣ лихорадки, которыя, не имѣя ничего общаго съ тифомъ ни по сущности его, состоящей въ разложеніи крови, ни по строго обозначенному его теченію, маскируются *нервными и схожими съ тифозными симптомами*, какъ напр. *пизмія, тяжкія болѣзни послѣ сильной потери крови*. Эти послѣдствія слѣдовало бы совершенно исключать изъ числа нервныхъ болѣзней, или по-крайней-мѣрѣ прибавлять къ нему слово «*тифозный*» для того, чтобы не ввести читателя въ сомнѣніе,—говорится ли напр. при *тифѣ легкихъ* о воспаленіи легкихъ, привявшемъ тифу подобныя нервныя симптомы вслѣдствіе анеміи, или о пизміи, или о воспаленіи легкихъ тифозномъ, мiasmатическаго происхожденія. Тоже нужно сказать и о *всѣхъ гастрическо-желчныхъ воспалительныхъ лихорадкахъ*.

Но какое бы ни было названіе болѣзни, мы должны руководствоваться, при выборѣ средствъ, *всєю картиною болѣзни* и потому во всѣхъ видахъ и отгѣнкахъ *настоящаго тифа*, будетъ ли это *Febris nervosa versatilis*, или рѣзко выраженная *иниальная юспитальная*, или *нетехіальная* лихорадка, всегда должно употребить одно изъ, слѣдующихъ средствъ, по мѣрѣ его соответствія симптомамъ
1) Bell., Bry., Calc., Hyosc., Lach., Merc., N.-vom., Phosph.-ac., Rhus, Stram., Sulph.; 2) Acon., Arn., Ars., Camph., Carb.-v., Cham., Chin., Cocc., Lyc., Mur.-ac., Natr.-m., Nitr.-ac., Nitr.-sp., N.-mosch., Op., Puls.; 3) Cupr., Phosph., Veratr., Zinc..

§ 2 При ложно-тифозныхъ нервныхъ лихорадкахъ: Acon., Arn., Ars., Bell., Bry., Chin., Cocc., Hyos., Lach., Lyc., Merc., Mur.-ac., Natr.-m., Phos.-ac., Rhus, Stram., Sulph., смотря по нижевложеннымъ обстоятельствамъ.—Настоящія *нервные лихорадки* или виды *тифа* требуютъ: 1) Bry., Rhus, а если они окажутся неудовлетворительными: Ars., Lach., Merc., Mur.-ac., Phos.-ac., Sulph.-ac..

§ 3. Кроме того, можно имѣть въ виду:

При *нервной лихорадкѣ* съ характеромъ *эретическимъ* (Febris nervosa versatilis): Acon., Bell., Bry., Cham., Hyos., Lyc., Mur.-ac., Natr.-m., N.-vom., Rhus, Stram.—При лихорадкахъ съ *притупленіемъ дѣятельности мозга* (Febris nervosa stupida): Arn., Ars., Bell.,

Bry., Chin., Coss., Hyos., Lach., Nitr.-sp., N.-vom., Op., Rhus, Stram., Veratr. — При лихорадкахъ съ преобладающимъ поражениемъ мозга (Typhus cereбрalis): 1) Bry.; 2) Acon., Bell., Hyos., Lach., Lyc., N.-vom., Op., Phos.-ac., Rhus, Stram. — При преобладающемъ поражении легкихъ (Typhus pulmonalis): 1) Bry., Rhus; 2) Ars., Bell., Chin., Hyos., Sulph. — При преобладающемъ поражении живота (Typhus abdominalis, Febris nervosa putrida, гнилая горячка): 1) Bry., Rhus; 2) Ars., Chin., Merc.; 3) Arn., Carb.-veg., N.-mosch., Puls., Sulph.; 4) Canth., Mosch.

§ 4. Относительно различныхъ периодовъ первой лихорадки, нужно замѣтить, что въ периодѣ предвѣстниковъ, при самомъ началѣ, мы достигаемъ цѣли посредствомъ Bry. или Rhus, и если больной оказывается съ первыми признаками первой лихорадки, то можно совершенно прервать болѣзнь, или уменьшить силу ея тѣмъ или другимъ изъ связанныхъ средствъ.

Периодъ воспаления требуетъ: 1) Bry.; 2) Acon., Bell., Cham., Hyos., Lyc., N.-vom., Rhus, Stram. — Периодъ слабости: 1) Rhus, 2) Ars., Carb.-veg., Chin., Merc. и Mur.-ac.; 3) Arn., Lach., N.-mosch., Phos.-ac., Sulph. — Carb.-veg. составляетъ также средство, которымъ въ крайнихъ случаяхъ часто удается вызвать угасающую жизнь больного и привести его въ благоприятное состояніе. — Въ периодѣ выздоровленія, когда остается еще большая слабость: 1) Coss., Chin., Veratr.; 2) N.-vom., Sulph.

§ 5. Относительно симптомовъ, характеризующихъ картину болѣзни въ данномъ случаѣ, должно обратить вниманіе на слѣдующее:

Велладонна — когда замѣчаются: ознобъ, сивляющійся жаромъ, или внутренній и наружный жаръ, краснота и жгучій жгучекъ или всего лица, красные, сверкающіе глаза; расширенныя зрачки, сетчаточныя; жужжаніе въ ушахъ и тугодъ слуха; неистовый или бѣшеный взглядъ; вздутость лица; жгучая жажда и отращиваніе отъ пищи, или жажда съ невозможностію глотать; безпокойный сонъ или бессонница; подергиванія или вскакиваніе отъ сна; потеря самознанія, бормотаніе и хватаніе, или неистовый бредъ съ страшными видѣніями, страхъ и желаніе убійства; сильная головная боль, особенно во лбу; головокруженіе при выпрямленіи туловища; сухость губъ, изъязвленіе угловъ рта; сухой, красный, или нечистый, желтою корою покрытый языкъ; горькій вкусъ во рту, потеря аппетита; отращиваніе отъ пищи и тошнота, тягостное

давленіе подъ ложечкою; запоръ; свѣтложелтая или малоколичественная красная моча; скорое дыханіе; учащенный пульсъ; очень скорая, или слабая и неясная рѣчь; холодный потъ на лицѣ, особенно на лбу, подъ глазами и вокругъ носа; значительный упадокъ силъ; боль во всѣхъ членахъ; кашель съ болью въ груди. (Ср. Нюос.)

В у о н і а — когда замѣчаются: ознобъ съ слѣдующимъ затѣмъ постояннымъ жаромъ во всемъ тѣлѣ, преимущественно въ головѣ; красный языкъ и обильный потъ, или же кожа сухая и растресканная, или влажная и клейкая на ощупь; зубы и языкъ сухіе, темноватые и вздутые; сильная жажда; отвращеніе отъ всякой пищи, съ тошнотою и позывомъ на рвоту, или настоящею слизистою или желчною рвотою; сильная боль подъ ложечкою при дотрогиваніи; запоръ или частыя желтоватая испраженія; темнокрасная или свѣтложелтая моча съ желтоватымъ осадкомъ; давящая, одуряющая боль головою, или боль какъ-будто мозгъ разрывается или разбивается; неясность зрѣнія, какъ-бы огъ покрывала предѣ глазами; залеганіе въ ушахъ и тупость слуха; обильное накопленіе густой и вязкой слизи въ носовыхъ полостяхъ и зѣвѣ; большое расслабленіе съ трясеніемъ членовъ, съ головокруженіемъ при вставаніи; бредъ днемъ и ночью съ страшными видѣніями и желаніемъ убѣжать съ кровати; бессонница, летучій жаръ и безпокойное метаніе въ разныя стороны; или постоянное желаніе спать и даже спячечное состояніе съ внезапнымъ вскакиваніемъ и страшными сновидѣніями; хватаніе руками въ воздухъ; скорый и частый пульсъ, или неправильный, малый и перемежающийся; короткое, сжатое дыханіе; боль и онѣмѣлость во всѣхъ членахъ; покалыванія въ груди и бокахъ; раздражительное, сердитое расположеніе духа, потеря надежды на выздоровленіе и страхъ смерти; пролежни. (Ср. Рhus).

Н ю о с у а м у с — неистовый бредъ и различнаго рода видѣнія; сильная нервная раздражительность съ бессонницею и безпокойствомъ, или спячечное состояніе, прерываемое то тихимъ, то неистовымъ бредомъ; равнодушіе; большая слабость, особенно въ рукахъ, при движеніи ими; подергиванія мышцъ, хватаніе руками, желаніе бѣжать съ постели; блѣдное, или красное и горячее лицо и синеватый цвѣтъ одной щеки; мутные, неподвижные глаза съ синевою вокругъ нихъ, или красные, сверкающіе глаза съ врачами,

то расширенными, то суженными; глухота со звономъ и жужжаніемъ въ ушахъ; языкъ сухой, обложенный темноватою корою. (Сравни. Bell.).

L а с н и з и с— когда представляются: *головокруженіе всякій разъ, когда больной выпрямляется*; параличъ вѣкъ; горечь во рту; боль въ груди, сухой кашель, спячка и лежаніе на спинѣ; тусклое лицо; *отвислость нижней челюсти*; *бредъ и бормотаніе*; глуши, какъ бы сонный взглядъ; языкъ гладкій и сухой, покрытый бѣловатою слизью, растресканный, желтоватокрасный и тяжелый, такъ что больному трудно высунуть его; затрудненная рѣчь; жажда съ отвращеніемъ отъ питья; темнокрасная, обильная моча.

Л у с о р о д і у м — когда замѣчаются: большая слабость и упадокъ силъ, отвислость нижней челюсти; какъ-бы деленою затянутае и полузакрытые глаза; медленное дыханіе съ открытыи ртомъ, или ознобъ, смѣняющійся жаромъ; *ограниченная краснота щекъ*; ослабляющій потъ, красный языкъ; запоръ; кроткій, слезкоинный нравъ, или крикъ и сердитое расположеніе, особенно во время пробужденія отъ сна.

М е р с у р і у с— когда представляются: головокруженіе, одурѣніе, ощущеніе полноты въ головѣ; тупость и неспособность размышлять; давящая боль головы, особенно во лбу и макушкѣ; жужжаніе въ ушахъ; обложенный густою слизью, нечистожелтый или же частый языкъ; неприятный, гнилой вкусъ во рту; кровоточивость десенъ; тошнота и позывъ на рвоту, или настоящаи рвота слезистыми и горькими веществами; *большая чувствительность и болъядь ложечкою, около желудка, вокруг пупка*, особенно по ночамъ; безпокойство, тоска и безпокойное метаніе въ разныи стороны; запоръ; зеленыи, или желтыи испраженія въ видѣ поноса; моча темнаго коричневаго цвѣта; жгучая и сухая кожа, или обильный, ослабляющій, клейкій потъ; большая слабость, *совершенная бессонница*; отсутствіе бреда, или едва замѣтный бредъ.

Н и х т о м і с а— при сильной чувствительности всѣхъ органовъ, преобладаніи гастрическихъ и желчныхъ симптомовъ; сонливости, какъ бы отъ ошьяненія и потерѣ самосознанія; большой слабости и упадкѣ силъ; краснотѣ и жженіи въ щекахъ и ладоняхъ; бѣломъ или черномъ *сухомъ* языкѣ съ красными и растресканными краями, при сухости губъ; жаждѣ съ отвращеніемъ отъ питья; отвра-

щеніи отъ пищи; терзающей или давящей головной боли и головокруженіи; колики, сердцебиеніи и тоскѣ; болѣзненною давленіемъ и напряженіемъ около желудка и въ подреберьяхъ; чувствѣ разбитости въ членахъ; сердитомъ, нетерпѣливомъ и угрюмомъ расположеніи духа.

РНОРНОЕ АСІДУМ — когда замѣчаются: *совершенное равнодушіе*, одурѣніе и тупоуміе; большая слабость и упадокъ силъ *неохота и страхъ говорить; неподвижный, глупый взглядъ и глаза какъ-бы стеклянные или опалы*; бессонница ночью; тоска и безпокойное метаніе въ разныя стороны; *неодолимая спячка и сонъ, полный видѣніями, или бредъ съ бормотаньемъ и хватаніемъ*; умопомѣшательство и отуманеніе, причиняющее боль головы, особенно при пробужденіи; *сильное жуужжаніе въ ушахъ и музота*; въ сильной степени исхуданіе; сухая, жгучая и жесткая кожа; жаръ, особенно къ вечеру; *испражненія въ видѣ поноса, или запоръ съ чувствомъ тяжести и давленія въ животѣ*; темнокрасная моча съ красноватымъ осадкомъ; холодный потъ на лицѣ, подъ ложечкою и на рукахъ; тоска. (Часто пригодна передъ или послѣ Ор.).

РНУВ — при значительной слабости и упадкѣ силъ, такъ что *болной съ трудомъ въ состояніи подняться или перевернуться*; притомъ бессонница и частыя ввезанныя вскакиванія, или спячка съ бормотаньемъ, храпѣніемъ и хватаніемъ; сухой жаръ съ тоскою; беспорядокъ мыслей, или совершенная потеря самосознанія; *болтливый бредъ и желаніе убійства, смѣняющіяся спокойствіемъ*; одуряющая головная боль, *головокруженіе при вставаніи и переворачиваніи въ постели*; *жженіе, краснота лица или щекъ; красные и жгучіе или неподвижные и тусклые глаза*; залеганіе въ ушахъ и глухота; сухость во рту и зѣвъ; *языкъ и зубы сухіе, вздутые; коричневатый, темноватый, или же дрожащій и красный языкъ*; сильная жажда; потеря аппетита и отвращеніе отъ пищи; твердость и вздутость живота съ *слабыми болями около желудка, особенно при дотриваніи*; запоръ съ *тщетнымъ позывомъ на низъ; испражненія, окрашенныя кровью, въ видѣ поноса*; моча сперва свѣтлая, потомъ мутнѣющая, или горячая, *темною цвѣта*; сухой жаръ и тоска; *влейкій потъ; пролежни*. (Сравни. Вгуопіа).

СТВАМОНІУМ — при бьющей головной боли, особенно въ ма-

лушкѣ, съ приступами обморока, потемнѣніемъ зрѣнія и шумомъ; при этомъ бредъ съ метаніемъ въ разные стороны, страшныя видѣніями, обманами зрѣнія и слуха, пѣніемъ, свистомъ, проношеніемъ словъ на многостороннихъ языкахъ, желаніемъ бѣжать съ постели и т. д.; потеря самосознанія, такъ что больной не узнаетъ своихъ домашнихъ; расширенныя, нечувствительныя зрачки; прѣ остановленное отдѣленіе мочи и кала; спячечное состояніе, сопровождающееся хратніемъ.

ZINCUM—при преобладаніи мозговыхъ припадковъ съ судорогами, дрожаніемъ рукъ, холодомъ конечностей; при потерѣ самосознанія, черной корѣ около носа, спалзываніи съ подушекъ и отвисломъ положеніи нижней челюсти.

§ 6. Изъ остальныхъ упомянутыхъ средствъ, показаны: АРНИКА—при спячкѣ съ бредомъ и хватаніемъ; храпѣніи и непроизвольномъ отдѣленіи мочи и кала. АРСЕНИСІУМ—при пролежняхъ спячкѣ съ бредомъ, ловленіемъ мухъ, внезапнымъ вскакиваніемъ и вздохами; большой слабости, потерѣ силъ; отвислости нижней челюсти; открытомъ ртѣ; тусклыхъ глазахъ. САМРНОВА—при сильномъ бредѣ, чувствѣ сжиганія и жарѣ головы; клейкой и холодной кожей; большой слабости; ослабляющемъ и липкомъ потѣ; наклонности къ поносу (часто прилична послѣ Rhus). САВВОГЕТАВІЛІС—когда замѣчаются: спячечное состояніе съ хратніемъ и импекратическимъ лицомъ; нечувствительность зрачковъ; слабый, угасающій пульсъ; холодный потъ на рукахъ, ногахъ и лицѣ; непроизвольное испражненіе на низъ, съ запахомъ падали; темнокрасная моча, на которой по срединѣ плаваютъ облака. СНАКОМІЛЛА—при судорожныхъ страданіяхъ, спазмахъ желудка или спазмодической воликѣ и поносѣ, сопровождающемъ прочіе симптомы тифа. СНИЛА—при потерѣ аппетита и землястомъ вкусѣ во всякой пищѣ; сухомъ, вздутымъ языкѣ и губахъ; поносѣ днемъ и ночью; испражненіяхъ водянистыхъ, желтоватыхъ и содержащихъ непереваренныя вещества; постоянной спячкѣ, или смѣ, нисколько не освѣжающемъ. СОССУЛУС—при большой слабости, боли головы, съ головокруженіемъ, припадками обморока, спазмами желудка, параличомъ членовъ (часто пригоденъ послѣ Rhus, или Samph.). МУВІАТІС АСІДУМ—при большой слабости, такъ что больной не въ состояніи двигаться; боль головы съ чувствомъ,

какъ-будто мозгъ раздавленъ; симптомахъ гнилостнаго состоянія, или страданія въ богу. NATRUM MURIATICUM—при потерѣ самосознанія, *неутолимой жаждѣ, сухости языка, большой слабости.* NITRI SPIRITUS—при большой слабости, *совершенномъ равнодушіи, тупости чувствъ съ неподвижностью и дикимъ выраженіемъ глазъ; глухотою, коричневатыми, сухими губами, сномъ съ бредомъ и бормотаніемъ.* NUX MOSCATA — при гнилостномъ или изнурительномъ поносѣ, спячечномъ состояніи, бредѣ, притупленіи чувствъ. OPIUM—при сонливости или спячечномъ состояніи съ храпѣніемъ, причеиъ ротъ открытъ, замѣчаются бредъ, бормотаніе (послѣ Op. часто нужна Phos.-ac.). POLYATILLA—при потерѣ самосознанія съ сильнымъ бредомъ, *плачемъ, жаобами, которыя большой выражаетъ тѣлодвиженіями, исполненными отчаяніа.* SULPHUR — при постоянномъ жарѣ,^o особенно по вечерамъ, блѣдности лица, полномъ и ускоренномъ пульсѣ; сильной жаждѣ; сухомъ, коричневатомъ языкѣ; скудной, темнокрасной мочѣ, которая скоро мутится; *бессонницѣ, бредѣ съ открытыми глазами; ловленіи мухъ; запорѣ на нязъ.*

§ 7. Кроме того, нужно имѣть въ виду слѣдующія обстоятельства. При значительной *сварливости и упрямости:* Bell., Bry., Lys.;—*упадкѣ духа:* Bell., Puls.;—*отращеніи отъ разговора:* Phos.-ac.;—*бредѣ и видннхъ:* Bell., Bry., Hyosc., Rhus;—*полной апатіи ко всему окружающему:* Apis., Arg., Carb.-v., Coss., Hyosc., Op., Phosph.-ac., Stram.;—*спячкѣ:* Apis., Arg., Carb.-v., Coss., Lach., Op.;—*тоскѣ и безпокойствѣ:* Arg., Bell., Bry., Hyosc., Merc., Stram.;—*буйномъ бредѣ:* Bell., Op., Stram.;—*скашиваніи глазъ:* Hyosc.;—*слабости зрѣніа:* Hyosc., Stram., Zinc.;—*опалыиъ, тусклымъ глазами:* Arg., Veratr.;—*дикомъ блескѣ глазъ:* Bell., Op.;—*краснотѣ лица:* Bell., N.-vom., Op., Rhus;—*блѣдности спаденіи лица:* Arg., Phosph.-ac., Veratr., Zinc.;—*чернотѣ или коричневымъ цвѣтѣ зубовъ:* Arg., Lach., Phosph.-ac., Zinc.;—*отщислой нижней челюсти (опасность паралича мозга):* Arg., Carb.-v., Op., Zinc.;—*тулости слуха:* Bry., Carb.-v., Phosph.-ac., Rhus;—*усиленной чуткости:* Bry.;—*носовомъ кровотеченіи:* Bry., Carb.-v., Phosph.-ac.;—*чернотѣ носдрей:* Hyosc., Zinc.;—*параличѣ языка:* Hyosc., Muc.-ac.;—*сухости, жесткости языка:* Arg., Rhus, Muc.-ac.;—*толстою обложеніи языка:* Bry., Carb.-v., Rhus;—*почти чистомъ языкѣ:* Coss.;—*сыии около рта:*

Mur.-ac., Sulph.;—*желудочная страданія*, тошнота, рвота: Arg., Bry., Hyosc., Veratr.;—*большинности под ложечкою*: Arg., Bry., Rhus, Veratr.;—*пораженіи печени*: Merc.;—*напитіи селезенки*: Arg., Coss., Phosph.-ac., Rhus;—*запоръ на низу*: Apis, Bry., Coss.;—*нось*: Apis, Arg., Carb.-v., Nitr.-ac., Phosph., Phosph.-ac., Rhus;—*непроизвольномъ носъ*: Apis, Arg., Arg., Carb.-v., Phosph.-ac., Rhus, Zinc.;—*кровляма*: Mur.-ac., Phosph., Nitr.-ac., Rhus;—*знобамъ*: Apis, Arg., Carb.-v., Nitr.-ac., Phosph., Rhus;—*инюстмома*: Arg., Arg., Carb.-v., Phosph.;—*моча былочной*: Phosph.-ac., Rhus;—*темно-красной*: Bry., Veratr.;—*воднистой*: Bry., Mur.-ac.,—*непроизвольной*: Apis, Arg., Arg.,—*При страданіи лежки*: Apis, Arg., Bry., Carb.-v., Ipec., Lach., Mosch., Nitr.-ac., Phosph., Rhus, Seneg.;—*оксчепніи*: Lach., Nitr.-ac., Phosph., Rhus;—*значительномъ кашлѣ съ изверженіемъ мокроты*: Arg., Lach., Phosph., Rhus, Seneg.;—*кровоавой мокроты*: Lach., Phosph., Rhus;—*отежъ лежки*: Carb.-v., Tart.;—*опасности паралича лежки*: Carb.-v., Mosch., Tart.;—*При боляхъ конечностей*: Camph., Rhus;—*отъмыніи ихъ*: Coss., Rhus;—*судорожнахъ движеніяхъ*: Bell., Hyosc., Ign., Mosch., Zinc.;—*частой перемѣнѣ положенія*: Bry.;—*беспокойствѣ и раскидываніи*: Bry., Stram., Rhus;—*сталываніи слюны*: Apis, Mur.-ac., Zinc.;—*чрезвычайной слабости*: Apis, Arg., Bry., Phosph., Phosph.-ac., Rhus.—*При желаніи сна*: Bry., Calc., Lyc.;—*красной*: Phosph.-ac., Rhus, Stram.;—*блѣдной*: Apis, Bry., Mur.-ac., Sulph., Valer.;—*кислотическихъ леміяхъ*: Carb.-v., Veratr.;—*кровляма подтекахъ*: Arg., Bry., Carb.-v., Phosph.-ac., Zinc.;—*пролежняхъ*: Arg., Phosph.-ac., Zinc..

Тоска, приступы тоски.

Обыкновенно составляетъ только симптомъ другихъ душевныхъ болѣзней, но иногда, какъ душевный недугъ, она бываетъ до того сильна и самостоятельна, что требуетъ сама по себѣ извѣстныхъ средствъ, изъ которыхъ пригодны слѣдующія: 1) Acon., Arg., Arg., Bell., Cham., Digit., Merc., N.-vom., Puls., Veratr.; 2) Alum., Anac., Baryt., Carb.-an., Carb.-veg., Coccul., Cupr., Graph., Hyos., Ignat., Lycor., Nitr., Nitr.-ac., Phosph., Rhus, Sepia, Spigel., Spong., Sulph.

Тоска по родинѣ, Nostalgia.

Средства вообще: 1) Caps., Merc., Phos.-ac.; 2) Aug., Carb.-ad. † Ign..

CAPRICUM — при краснотѣ щекъ, частомъ плачѣ и безсонницѣ. MERCURIUS — при сильной тоскѣ, съ трясеніемъ и безпокойствомъ, особенно ночью; безсонницею; чувствѣ досады и желаніи убѣжать. RHODORHIZI ACIDUM — при молчаливости, тупости чувствъ, изнурительной лихорадкѣ, съ желаніемъ постоянно спать и обильнымъ потокомъ по утрамъ.

Трещины кожи, Rhagades. — § 1. Средства вообще:

1) Alum., Caps., Her., Lyc., Merc., Petr., Puls., Rhus, Ser., Sulph.;
2) Arg., Aug., Cham., Cycl., Lach., Magn., Natr.-m., Nitr.-ac., Sassar., Sil., Zinc.

§ 2. Трещины въ кожѣ на рукахъ у людей, работающихъ на водѣ, требуютъ преимущественно: 1) Calc., Her., Ser., Sulph.;
2) Alum., Ant., Cham., Merc., Rhus, Sassar..

§ 3. Геморроидальныя трещины въ заднемъ проходѣ: 1) Agn., Arg., Cham., Graph.; 2) Her., Rhus, Sassar., Sulph. — Трещины на губахъ: Agn., Arg., Caps., Cham., Ign., Merc., Natr.-m., Puls., Sulph. — При трещинахъ у уловъ носа: Merc., Sil. — На крайней плоти: Agn., Merc., Ser., Sil., Sulph., Thuj.

§ 4. При глубокихъ, кровоточивыхъ трещинахъ: Merc., Petr., Sassar., Sil., Sulph. — При изъязвленныхъ трещинахъ: 1) Cham., Merc., Sil.; 2) Calc., Graph., Lach., Nitr.-ac., Petr., Staph..

При сифилитическихъ трещинахъ на рукахъ и между пальцами ногъ, Merc. всегда составляетъ главное средство; если же больной много употребляетъ ртути, то: Aug., Carb.-veg., Lach., Nitr.-ac., Sassar., Ser., Sulph., а для совершеннаго излеченія приходится наконецъ обратиться опять къ Merc., если трещины не носятъ на себѣ ни признаковъ сифилитическихъ, ни свойства трещинъ, происходящихъ вслѣдствіе злоупотребленія ртути.

Ср. Язон, Намосіе и Кожи болѣзненность.

Тѣлосложеніе, возрастъ, полъ, температура.

§ 1. Какъ ни неполны могутъ показаться слѣдующія указанія, опытный врачъ всегда извлечетъ изъ нихъ извѣстную пользу. Выводы изъ слѣдующей таблицы могутъ только подтвердить уже сдѣланный выборъ средствъ въ данномъ случаѣ, и изъ 2 или 3 равно приличныхъ они покажутъ лучшее.

§ 2. Относительно пола и возраста преимущественно пригодны:

Для мужскаго: 1) Acon., Alum., Aur., Bry., Canth., Carb.-veg., Chin., Clem., Coff., Coloc., Dig., Euphorb., Graph., Ign., Kal., Magn.-arct., Magn.-m., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Phosph., Rhus, Sil., Staph., Sulph., Zinc.; 2) Agar., Alum., Anac., Ant., Ars., Baryt., Caps., Carb.-an., Caust., Coloc., Con., Hep., Lach., Lyc., Mosch., Mur.-ac., Par., Petr., Phos.-ac., Plumb., Puls., Seneg., Stann., Sulph.-ac., Thuj., Veratr.—*Для женскаго:* 1) Acon., Amb., Amm.-m., Asa., Bell., Cham., Chin., Cin., Con., Croc., Hyos., Ign., Magn.-c., Magn.-m., Mosch., N.-mosch., Plat., Puls., Rhus, Sabin., Sep., Stann., Val.; 2) Alum., Amm.; Arn., Borax, Calc., Caust., Cocc., Ferr., Graph., Hell., Hep., Kal., Lyc., Merc., N.-vom., Phosph., Ruta, Sabad., Sec., Spig., Stram., Sulph., Thuj., Veratr., Zinc.—*Для дѣтей:* 1) Acon., Bell., Bry., Cham., Coff., Hep., Ign., Ipec., Lyc., Merc., N.-mosch., Rhab., Sil., Sulph.; 2) Amb., Ars., Aur., Baryt., Borax, Bry., Canth., Chin., Cin., Dros., Hep., Magn.-c., N.-vom., Puls., Rhus, Ruta, Spig., Stann., Staph., Sulph.-ac., Veratr., Viol.-tr.—*Для молодыхъ людей:* Acon., Bell., Bry., Lach.—*Для стариковъ:* Amb., Aur., Baryt., Con., Op., Sec..

§ 3. Относительно тѣлосложенія

Для блондиновъ: Bell., Calc., Caps., Cham., Clem., Con., Coccul., Dig., Graph., Hyos., Lach., Lyc., Merc., Rhus, Sil., Sulph.;—*брюнетовъ:* Acon., Anac., Arn., Ars., Bry., Kal., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Plat., Puls., Sep., Staph., Sulph.;—*железную тѣлосложенію:* 1) Acon., Bry., Cham., Chin., Coccul., Merc., N.-vom., Puls.; 2) Ant., Ars., Asa., Asar., Cann., Coloc., Daphn., Dig., Ign., Ipec., Lach., Sec., Staph., Sulph., Tart.;—*нервную особь:* 1) Acon., Baryt., Bell., Chin., Coff., Con., Cupr., Ign., Magn.-arct., Merc., Natr., N.-vom., Phosph., Plat., Puls., Sil., Sulph., Val., Viol.-od.; 2) Alum., Ars., Carb.-veg., Cham., Dig., Graph., Hep., Hyos., Laur., Lyc., Natr.-m.,

N.-mosch., *Phos.-ac.*, *Rhus*, *Sabin.*, *Sec.*, *Stram.*, *Teucr.*; — *явно-кровоизливающихъ*, *полносочныхъ*, см. *Полнокровіе*; — *лимфатическія*: 1) *Bell.*, *Calc.*, *Carb.-veg.*, *Chin.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Natr.-m.*, *Nitr.-ac.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Ser.*, *Sil.*, *Sulph.*; 2) *Amm.*, *Ars.*, *Arg.*, *Baryt.*, *Dulc.*, *Ferr.*, *Graph.*, *Kal.*, *Petr.*, *Rhus*, *Thu.*; — *зубчатыхъ*, *одутыхъ*: *Amm.*, *Ant.*, *Ars.*, *Asa.*, *Bell.*, *Calc.*, *Caps.*, *Cupr.*, *Ferr.*, *Hell.*, *Kal.*, *Lach.*, *Merc.*, *Puls.*, *Rhus*, *Seneg.*, *Spig.*, *Sulph.*; — *худощавыхъ*: 1) *Amb.*, *Ars.*, *Bry.*, *Chin.*, *Graph.*, *Lach.*, *Merc.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Stann.*, *Sulph.*; 2) *Ant.*, *Baryt.*, *Cham.*, *Clem.*, *Cupr.*, *Ferr.*, *Ign.*, *Ipec.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Nitr.-ac.*, *Phosph.*, *Plumb.*, *Puls.*, *Sec.*, *Sil.*, *Staph.*, *Veratr.*; — *тучныхъ*, *жирныхъ*: *Ant.*, *Bell.*, *Calc.*, *Caps.*, *Ferr.*, *Graph.*, *Lyc.*, *Puls.*, *Sulph.*; — *слабыхъ*, *кажектическихъ*, *истощенныхъ*: 1) *Arg.*, *Calc.*, *Chin.*, *Natr.-m.*, *N.-vom.*, *Phos.-ac.*, *Sulph.*, *Veratr.*; 2) *Ars.*, *Carb.-veg.*, *Lach.*, *Merc.*, *Phosph.*, *Sec.*, *Ser.*.

§ 4. Относительно темпераментовъ:

Для людей холерическаго темперамента, *вспыльчиваго*: *Acop.*, *Ars.*, *Arg.*, *Bry.*, *Carb.-veg.*, *Caust.*, *Her.*, *Kal.*, *Lyc.*, *Magn.-aust.*, *Natr.-m.*, *Nitr.-ac.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Ser.*, *Sulph.*; — *кроткихъ*, *добродушныхъ*: *Amb.*, *Bell.*, *Calad.*, *Cic.*, *Coccul.*, *Ign.*, *Lyc.*, *Magn.-arct.*, *Puls.*, *Sil.*, *Sulph.*; — *флегматическія*, *вялыхъ*: *Bell.*, *Caps.*, *Chin.*, *Lach.*, *Merc.*, *Natr.-m.*, *Mex.*, *Puls.*, *Seneg.*; — *живаго темперамента*: *Acop.*, *Ars.*, *Cham.*, *Nitr.-ac.*, *N.-vom.*; — *меланхолическія*: *Acop.*, *Arg.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calc.*, *Chin.*, *Graph.*, *Ign.*, *Lyc.*, *Natr.-m.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rhus*, *Stram.*, *Sulph.*, *Veratr.*; — *чувствительныхъ*: *Arg.*, *Ant.*, *Calc.*, *Canth.*, *Coff.*, *Con.*, *Cupr.*, *Ign.*, *Lach.*, *Lyc.*, *N.-vom.*, *Phosph.*, *Plat.*, *Sabad.*.

У.

Угри, *Аспе*. — *Наилучшими средствами служатъ вообще*:

1) *Sulph.*; 2) *Bell.*, *Carb.-veg.*, *Her.*, *Led.*, *N.-jugl.*; 3) *Ars.*, *Baryt.*, *Calc.*, *Graph.*, *Kal.*, *Lach.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *Nitr.-ac.*, *Phosph.-ac.*, *Puls.*, *Sabin.*, *Selen.*, *Silic.*; 4) *Agar.*, *Ant.*, *Arg.*, *Bry.*, *Chin.*, *Digit.*, *Dros.*, *Merc.*, *Plumb.*, *Sabad.*, *Spong.*. — *Въ частности показанія видоизмѣняются слѣдующимъ образомъ*:

При простых угрях у молодых людей (*acne disseminata*): Bell., Carb.-v., Нер., Sulph.; 2) Ars., Calc., Lach., Led., N.-vom., Phos.-ac., Puls..—При *отверднлых* угрях (*acne indurata*): 1) Carb.-veg., Led., Sulph.; 2) Ars., Bell., Нер., N.-vom., Puls..—При *совсданных* угрях у молодых, хлоротичныхъ дѣвушекъ (*acne miliaris*): 1) Calc., Sulph.; 2) Graph., Нер., Kal., Natr., Natr.-m., Sabin., Selen..—При такъ называемыхъ *черныхъ порахъ* на лицѣ (*acne punctata*): 1) Sulph.; 2) Natr., Nitr.-ac.; 3) Dros., Graph., Sabin.; 4) Aur., Bryon., Calc., Dig., Natr.-m., Plumb., Selen..—При *розовыхъ угряхъ* (*acne rosacea*): 1) Carb.-an.; 2) Ars., Kreon., Mez., Rhus, Ruta, Veratr.; 3) Calc., Cann., Carb.-v., Cic., Kal., Led., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sil., Thuj.; 4) Alum., Aur.-m., Canth., Caps., Caust., Clem., Lach., N.-jugl., Petr., Plumb., Sep., Sulph., Sulph.-ac..—При такъ называемой *щетинкѣ* (*acne veriformis*): 1) Selen., Sulph.; 2) Graph., Natr., Nitr.-ac.; 3) Bry., Calc., Dros., Natr.-m., Sabin.; 4) Aur., Dig., Plumb., Sabad..—Кромѣ того, нужно различать угри: У *молодыхъ, полнокровныхъ* людей: 1) Bell., Carb.-v.; 2) Нер., Sulph..—У *предающихся пьянству*: 1) Led., N.-vom., Sulph.; 2) Ars., Lach., Puls..—*Послѣ половыхъ излишествъ*: Calc., Phos.-ac., Sulph..

Удушье, Asthma thymicum.

1) Acon., Bell., Con., Нер., Ирес., Merc., Sen., Spong., Tart., Veratr.; 2) Amm., Lach., Phos., Zinc.; 3) Amb., Asa., Aur., Berb., Curg., Ignat., Ferr..—Противъ *предѣстниковаго* этой болѣзни въ частности: Acon., Нер., Ирес., Sen., Spong., Tart..—Противъ *кашля*: Bell., Con., Нер., Merc., Veratr..

О симптомахъ, служащихъ показаніемъ для каждаго изъ вѣчисленныхъ средствъ, см. *Удушье спазмодическое*.

Удушье Миллара и Виганда, Asthma Millari et Viggandi.

Противъ перваго, въ большей части случаевъ, специфическое средство составляетъ Samb.. Если же это средство будетъ недостаточно, то: Acon., Ars., Ирес., Lach., Mosch..—Противъ *скрытаго* удушья Миллара, или такъ называемаго *Вигандоваго удушья*:

1) Acon., Bell., Ipec., Samb.; 2) Ars., Baryt., Cham., Chin., Coff., Cupr., Lach., N.-vom., Op.

О симптомахъ, составляющихъ показаніе для каждаго изъ этихъ средствъ, см. *Удушье спазмодическое*.

Удушье спазмодическое, періодическое, судорожное и астматическіе припадки вообще, Asthma spasmodicum s. periodicum.

§ 1. Средства вообще: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Camph., Cupr., Ferr., Ipec., N.-vom., Phos., Puls., Samb., Sulph.; 2) Amb., Aur., Calc., Carb.-v., Cham., Chin., Cocc., Dulc., Lach., Mosch., Op., Tart., Veratr., Zinc.; 3) Ant., Caust., Hyos., Coff., Ign., Kal., Lyc., Merc., Nitr.-ac., N.-mosch., Sep., Sil., Stann., Stram.; 4) Aloë, Ars., Benz., Сера, Millef.

§ 2. Для прерванія астматическаго припадка: 1) Lach.; 2) Acon., Ars., Cham., Mosch., Op., Samb., Tart.; 3) Bell., Bry., Chin., N.-mosch., N.-vom., Puls.—Для устраненія *расположенія* къ возврату этихъ припадковъ: 1) Ant., Ars., Calc., N.-vom., Sulph.; 2) Amm., Carb.-v., Caust., Cupr., Ferr., Graph., Kal., Lach., Lyc., Nitr.-ac., Phos., Sep., Sil., Stann., Zinc.

§ 3. Относительно случайныхъ причинъ удушья, нужно замѣтить: если оно произошло *отъ прилива крови къ груди*: 1) Acon., Aur., Bell., Merc., N.-vom., Phos., Spong., Sulph.; 2) Amm., Calc., Carb.-v., Cupr., Ferr., Puls.—Если оно развилось *отъ накопленія и задержанія створокъ въ асцитѣ*: 1) Carb.-v., Cham., Chin., N.-vom., Op., Phos., Sulph., Zinc.; 2) Ars., Сера., Нер., Natr., Veratr.—Если же оно находится въ связи съ *беспорядками менструаціи очищенія*: 1) Bell., Coccul., Cupr., Merc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Acon., Phos., Sep.—При накопленія *слизи въ бронхіяхъ или легкихъ* (слизистое удушье, Asthma humidum s. pituitosum): 1) Ars., Bry., Calc., Chin., Cupr., Dulc., Ferr., Graph., Lach., Phos., Puls., Sep., Sep., Stann., Sulph.; 2) Bar., Bell., Camph., Соп., Нер., Ipec., Merc., N.-vom., Sil., Tart., Zinc.—При настоящихъ *спазмахъ легкихъ* (судорожномъ удушьи, Asthma spasmodicum въ собственномъ смыслѣ слова, грудныхъ спазмахъ): 1) Bell., Cocc., Cupr., Hyos.,

Lach., Mosch., N.-vom., Samb., Stram., Sulph., Tart., Zinc.; 2) Ant., Arg., Bry., Caust., Ferr., Kal., Lyc., Op., Sep., Stann..

§ 4. Если удушье происходитъ отъ вдыханія явля. особенно каменной, какъ это встрѣчается у рѣзчиковъ на камняхъ, камен-тесовъ и пр.: 1) Calc., Нер., Sil., Sulph.; 2) Arg., Bell., Chin., Ipec., N.-vom., Phos.—Если причану удушья составляли пары серы Pula;—*мелкие или мельчайшие* пары: 1) Merc., Нер., Ipec.; 2) Arg., Cham., Chin..—Если оно произошло вслѣдствіе *душевною* *компрессія*: Acon., Cham., Coff., Ign., N.-vom., Puls., Veratr.;—*вслѣдствіе* *сжиманія* *катарра*: 1) Arg., Ipec., N.-vom.; 2) Camph., Carb.-v. Chin., Lach., Puls., Samb., Tart..

§ 5. При астматическихъ припадкахъ у *дѣтей*: 1) Acon., Arg., Bell., Cham., Coff., Ipec., Mosch., N.-vom., Op., Samb., Tart.; 2) Camph., Chin., Cupr., Нер., Ign., Lach., Lyc., Phos., Puls., Stram., Sulph..—*Истерическимъ* *женщинамъ*: 1) Acon., Bell., Cham., Coff., Ign., Mosch., Puls., Stram.; 2) Asa., Aur., Caust., Con., Cupr., Ipec., Lach., Phos., Stann., Sulph..—*Пожилымъ* *особамъ*: 1) Aur., Bar., Con., Lach., Op.; 2) Ant., Camph., Carb.-v., Caust., Chin., Sulph..

§ 6. Относительно *совокупности* *симптомовъ*, назначаютъ:

АСОНИТУМЪ—1) для людей чувствительныхъ и молодыхъ полнокровныхъ дѣвицъ, ведущихъ сидячій образъ жизни, и если припадки начинаются послѣ наибѣйшаго напряженія. 2) При одышкѣ, сопровождающейся невозможностію вздохнуть, съ безпокойствомъ, жаромъ и потомъ. 3) Для дѣтей, когда ночью замѣчается *удушлимый* кашель съ хриплымъ голосомъ, похожимъ на лай собаки; судорожнымъ стягиваніемъ гортани и груди; при тоскливомъ, короткомъ и затрудненномъ дыханіи, съ открытымъ ртомъ, или также 4) если *удушье у взрослыхъ* сопровождается полнымъ и частымъ пульсомъ, напоромъ крови къ головѣ, головокруженіемъ, кашлемъ и кровавою мокротою.

АВЕНІСУМЪ—въ большей части видовъ остраго или хроническаго удушья, сопровождающагося *затрудненнымъ* *дыханіемъ*, кашлемъ и накопленіемъ густой слизи; при *короткомъ* *дыханіи*, преимущественно послѣ стола; *чувствъ* *сжиманія въ груди* и *недостатка воздуха при скорой ходьбѣ*, *восхожденіи на высоту*, при *всякомъ движеніи*, даже при смѣхѣ; *стягиваніи груди и гортани* и болѣзненномъ давленіи на легкія и подъ лопаткою; *тоскѣ*, при-

падкахъ задушенія, которые усиливаются отъ комнатной теплоты; при приступахъ удушья преимущественно ночью или вечеромъ въ постели, прерывистомъ и свистащемъ дыханіи съ открытымъ ртомъ, съ сильною тоскою, какъ-бы *передъ смертию; холоднымъ потомъ; ослабленіи приступовъ всякій разъ, какъ скоро начинается кашель съ слизистою мокротою, или отдѣленіе вязкой, клейкой слюны въ видѣ мелкихъ пузырьковъ; возобновленіи приступовъ во время суровой погоды, на открытомъ и холодномъ воздухѣ, а также отъ перемены погоды, отъ теплаго и узкаго платья; при слабости, присоединяющейся къ приступамъ, или при появляющихся по временамъ боляхъ и жженіи въ груди отъ приступа остраго удушья (Агв. особенно хорошъ послѣ Ирес., если онъ съ самаго начала не былъ употребленъ).*

Веллдонна—преимущественно для дѣтей и женщинъ раздражительнаго сложенія и съ расположеніемъ къ судорогамъ; когда онѣ чувствуютъ сжиманіе при дыханіи, или же когда *дыханіе останавливается, при тождественномъ напряженіи въ животѣ и покалываніи подѣ грудною;* приступъ сухаго кашля ночью съ катарромъ, или мокраго кашля съ изверженіемъ мокроты послѣ стола; *при тоскливомъ, вздохахъ сопровождаемомъ, то глубокимъ, то короткомъ и скоромъ дыханіи, съ открытымъ ртомъ и большимъ напряженіемъ груди; стлываніи гортани и опасностію задушенія при ощущиваніи гортани и поворачиванія шеи; безпокойствѣ и біеніи въ груди съ сердцебіеніемъ; астматическихъ приступахъ съ потерю самосознанія, расслабленіи всѣхъ мышцъ и непроизвольномъ испражненіи мочи и кала.*

Ветоніа — преимущественно при *трудномъ и останавливаемомъ* дыханіи ночью или подѣ утро и сопровождаемомъ коликою, понужденіемъ на нязъ, невозможностію лежать на правомъ боку, давленіемъ и напряженіемъ по всей груди и чувствомъ стягиванія на холодномъ воздухѣ; частомъ кашлѣ съ болью въ подреберьяхъ, щекотаніи въ гортани, рвотѣ и мокротѣ, которая сначала бываетъ пѣнистая, потомъ густая и клейкая; *затрудняющемся* дыханіи отъ разговора и всякаго движенія; облегченія, послѣдующемъ при вставаніи съ мѣста, или послѣ изверженія мокроты; частомъ сердцебіеніи съ тоскою и біеніемъ въ вискахъ; трудномъ дыханіи, сопровождаемомъ тоскою, вздохами, напряженіемъ мышцъ брюш-

нхъ, при дыханіи медленномъ и глубокомъ во время всякаго напряженія тѣла; частыхъ похлываній въ груди, преимущественно во время дыханія и кашля, также во время всякаго движенія. (Вгу. полезна послѣ Ірес. при остромъ удушѣ).

Сурвум—преимущественно для дѣтей, или истерическихъ женщинъ, въ особенности послѣ испуга, огорченія, простуды, или передъ наступленіемъ регулъ; при удушьи съ судорожнымъ стискиваніемъ въ груди, нѣкою, трудностію дышать и говорить, дышаніи скорошъ, крапивошъ, сопровождаемомъ вздохами и конвульсивнымъ напряженіемъ брюшинныхъ мышцъ; чувствомъ узкости въ груди, преимущественно при ходьбѣ, восхожденіи на высоту, и необходимость глубоко вздохнуть; при кашлѣ короткомъ и судорожномъ, съ чувствомъ узкости въ груди; принадлежъ задушенія и самостоятельнаго дыханія при попыткѣ вздохнуть глубоко; хрипъ въ груди, какъ-бы отъ присутствія слизи; изверженія бѣлой и водянистой слизи, чувствъ пустоты и невозможенія подѣ ложечкою; болѣзненной чувствительности при дотрогиваніи въ подгрудной ямкѣ; волненія кромъ съ біеніемъ сердца; красномъ лицѣ, покрытомъ теплымъ потомъ; ухудшенія состоянія при наступленіи регулъ.

Феврум—при возбужденномъ состояніи кровяной системы, чувствъ стискиванія въ груди и почти незамѣтномъ движеніи грудной кѣтки при вдыханіи; очень расширенныхъ ноздряхъ при вдыханіи; чувствѣ узкости въ груди, преимущественно ночью, или вечеромъ въ кровати, когда больной лежитъ на спинѣ съ наклонною внизъ головою, или когда чѣмъ-нибудь покроетъ грудь; облегченіе при раскрываніи и поднятій верхней части живота, а также отъ всякаго тѣлеснаго или умственнаго напряженія; принадлежъ жѣдженія вечеромъ въ кровати, сопровождающіеся теплотою въ шею и верхней части живота, съ тождевременнымъ холодомъ въ чашкахъ; судорожное стискиваніе груди, усиливающееся отъ движенія и ходьбы; принадлежъ судорожнаго кашля съ вязкою и прозрачною слизистою мокротою; кровавая мокрота.

Ірвасуанна—если замѣчаются у дѣтей или у взрослыхъ остановка въ дыханіи, ночные принадлежъ задушенія, судорожное стискиваніе горла, хрипъ въ груди отъ накопленія слизи; сухой и короткій кашель; сильная тоска и страхъ смерти, крикъ и безпокойное метаніе въ разныхъ стороны; лицо попеременно красное и го-

рычее, или блѣдное, холодное и влажное; черты лица, выражающія тоску; тошнота и холодный потъ на лбу; дыханіе тоскливое, слабое, сопровождаемое вздохами, или короткое и какъ-бы затрудненное попавшею пылью; тетаническая ооченѣлость гѣла и синеватая краснота въ лицѣ. (Вообще Ірес. должна быть прежде всѣхъ употреблена при острыхъ, астматическихъ приступахъ. Когда дѣйствіе ея кончалось, тогда часто приличны: Агв., Вгу. или N.-vom.)

NUX VOMICA — когда замѣчаются: короткое или медленное, свистащее дыханіе; тоскливое чувство сжиманія въ груди, особенно ночью, по утрамъ и послѣ стола; судорожное стягиваніе, особенно нижней части груди, и прерывистое дыханіе при ходьбѣ, разговорѣ, на холодномъ воздухѣ и при всякомъ движеніи; ночные приступы задушенія по большей части послѣ полноты, которыми предшествуютъ тягостныя сновидѣнія; короткій кашель и трудное отдѣленіе мокроты; кровавистая мокрота; *намоккость оныхъ платель окружъ груди и подреберій*; вздутость, тоска и давящая боль подъ сердцемъ и въ подреберьяхъ; напряженіе и давленіе съ груди; напоръ крови къ груди съ волненіемъ крови, теплотою, жаромъ и сердцебиеніемъ; сильная тоска и мучительное чувство во всемъ животѣ; облегченіе астматическаго состоянія при лежаніи на спинѣ, или на другомъ боку, а также и при вставаніи, или при лежаніи.

RIORNOXUS — при прерывистомъ дыханіи и шумящей одышкѣ, затрудненномъ дыханіи и чувствѣ сжиманія съ груди, особенно по вечерамъ или по утрамъ, при движеніи или въ сидячемъ положеніи; чувствѣ сильной тоски въ груди, свистащемъ дыханіи вечеромъ, при засыпаніи; ночныхъ приступахъ задушенія какъ-бы вслѣдствіе паралича легкыхъ; судорожномъ стягиваніи груди, короткомъ кашлѣ съ мокротою то соленою, то сладковатою, которая иногда смѣшана съ кровью; *колотель или давленіи, намоккости, полноты и напряженіи груди*; напоръ крови къ груди съ жаромъ, восходящимъ къ горлу и сердцебиеніи; расположеніи къ чахоткѣ.

PULSATILLA — преимущественно для дѣтей, послѣ скрывшейся просовидной сыпи, а также для истерическихъ женщинъ, послѣ превращенія регулъ или вслѣдствіе простуды, когда приступы замѣчаются: сворое, короткое, поверхностное, хрипящее ды-

ханіе; *задержка дыханія, какъ-бы отъ одыжанія стурмаго вора*; чувство сжиманія въ груди; остановка въ дыханіи и припадки задушенія; смертельная тоска; *сердцебиеніе и судорожное стлмиваніе юртами и груди, особенно ночью или вечеромъ, въ горизонтальномъ положеніи*; усиленіе астматическихъ припадковъ отъ движенія, а также при поднятїи на высоту и ходьбѣ на открытомъ воздухѣ; короткомъ, прерывистомъ дыханіи и чувствѣ узкости въ груди, или обильной слизистой или смѣшанной съ кровавыми струйками мокротѣ, *судорожномъ напряженіи, чувствѣ полноты и давленія въ груди, внутреннеѣ жарѣ и волненіи крови; помыванія въ груди и бокахъ.*

Sambucus — преимущественно для дѣтей и особенно когда замѣчаются: *суетливое и скорое дыханіе*; чувство сжиманія въ груди, давленія въ животѣ и тошнота; давленіе на грудь, какъ-будто отъ лежащей на ней тяжести; тоска и *опасность задушенія*; чувство узкости въ груди въ лежащемъ положеніи; ночные *припадки задушенія съ судорожнымъ стлмиваніемъ* груди; внезапное вскакиваніе отъ сна и крикъ; большая тоска; трясеніе во всемъ тѣлѣ; припухлыя, синеватыя руки и ноги; жаръ во всемъ тѣлѣ; слизистый хрипъ въ груди и невозможность произносить слова громко; болѣзненный сонъ съ полуоткрытыми глазами и ртомъ; припадки удушливаго кашля съ крикомъ.

Sulphur — преимущественно противъ хроническихъ, астматическихъ страданій съ одышкой и безъ болѣзненного чувства сжиманія въ груди; частаго ощущенія узкости въ груди даже, даже во время разговора; короткаго дыханія на ходьбѣ и открытомъ воздухѣ; свиста, слизистаго хрипа, *хрипѣнія въ груди; слизистаю дыханія и припадки задушенія, особенно ночью; полнота и чувство утолщенія въ груди*; давленіе въ груди, какъ-бы отъ тяжести послѣ принатія даже малѣйшаго количества пищи; жженіе въ груди съ напоромъ крови и сердцебиеніемъ; удушливый кашель съ судорожнымъ стлмиваніемъ груди и позывомъ на рвоту; бѣлая или желтая и легва или трудно отдѣляющаяся слизистая мокрота; окрашенная кровью слюна; *смазны груди съ давленіемъ и болью въ груди*; синеватая краснота лица, короткое дыханіе и невозможность говорить.

§ 6. Изъ прочихъ средствъ, можно еще употребить:

Амвнл — преимущественно для дѣтей и золотушныхъ субъектовъ, страдающихъ короткимъ и сжатымъ дыханіемъ, припадками судорожнаго кашля съ мокротою, свистомъ въ воздухоносныхъ путяхъ, давленіемъ въ груди. **Аммоніум** — противъ хроническихъ астматическихъ страданій, особенно если онѣ сопрягаются съ расположеніемъ къ грудной водянкѣ, короткимъ дыханіемъ при восхожденіи на высоту, *сжатымъ дыханіемъ* и сердцебіеніемъ послѣ малѣйшаго напряженія тѣла, приливомъ крови къ груди и чувствомъ тяжести въ груди. **Аурум** — при напорѣ крови къ груди, сильной сжатости дыханія и необходимости вздохнуть глубоко, особенно ночью и при ходьбѣ на воздухѣ; *припадкахъ задушенія съ судорожнымъ сжиманіемъ* груди, сильнымъ сердцебіеніемъ, синевато-краснымъ лицомъ и обмороками. **Салсавл** — преимущественно противъ хроническихъ астматическихъ страданій съ *сжатымъ* дыханіемъ и напряженіемъ въ груди, какъ-бы отъ напора крови, и облегченія при поднятіи вверхъ плечь; необходимости вздохнуть глубоко, и ощущеніи, какъ-будто дыханіе сосредоточено между лопатками; когда больной задыхается уже при нагибаніи и страдаетъ *сузлымъ кашлемъ*, который появляется преимущественно ночью. **Савовет**. — противъ судорожнаго удушья, происходящаго отъ накопленія вѣтровъ въ животѣ; при хроническихъ астматическихъ страданіяхъ вслѣдствіе расположенія въ *грудной водянкѣ*, съ стѣсненіемъ и сжатіемъ дыханія; чувствѣ полноты, ослизненія, тоскливаго сжиманія груди; при тяжеломъ и короткомъ дыханіи, особенно на ходьбѣ; давленіи и чувствѣ утомленія въ груди; частыхъ припадкахъ судорожнаго кашля. **Снамомілла** — для дѣтей, или при *припадкахъ задушенія* съ короткимъ и тоскливымъ дыханіемъ, *сузлымъ* подъ ложечкою и въ *подреберьяхъ* съ безпокойствомъ, крикомъ, сведеніемъ бедеръ; при припадкахъ удушья послѣ гнѣва или простуды. **Сніна** — *противъ одышки*, сжиманія въ груди и невозможности дышать при низкомъ положеніи головы; когда замѣчаются: свистъ въ груди при вдыханіи; *судорожный* кашель и ночные припадки задушенія, какъ-бы отъ накопленія слезы въ гортани, съ трудно отдѣляющеюся свѣтлою, густою и слизистою мокротою; *давленіе въ груди* какъ-бы отъ напора къ ней крови и сильное сердцебіеніе; скорая потеря силъ; кровавистая мокрота. **Соссулус** — для истерическихъ женщинъ, или при напорѣ крови

въ груди, съ одышкою, какъ-бы *отъ сжати́я гортани*; испляющемъ кашль съ чувствомъ сжиманія въ груди, особенно ночью, судорожномъ стягиваніи груди, ощущаемомъ только на одной сторонѣ; давленіи въ груди и волненіи крови съ тоскою и сердцебіеніемъ; чувствѣ немощности и пустоты въ груди. *Dulcama* — при *слизистомъ удушьи*, острыхъ ревматическихъ припадкахъ вслѣдствіе простуды. *Lacryvis* — для людей, страдающихъ грудною водялкою, или для людей тучныхъ съ тѣлослабіемъ *одушлимъ*, *зубчатымъ*; когда замѣчаются: *короткое дышаніе носомъ стола*, при ходьбѣ и сильномъ движеніи руками; спастое дыханіе, одышка, сжиманіе въ груди, *удушлие носомъ стола*, *припадкы задушенія съ лежачемъ положеніи* и при ощущеніи горж; судорожное стягиваніе груди, которое заставляетъ встать съ постели и ходить нагнувшись впередъ; медленное и свистящее дыханіе; необходимость глубоко вдохнуть, особенно въ сидячемъ положеніи. *Morsicus* — для истерическихъ женщинъ и дѣтей *ли сжиманіи съ груди* и припадкахъ задушенія, какъ-бы отъ вдыханія сѣрныхъ паровъ; задушенія, начинающагося позывомъ на ишель и усиливающагося до того, что больной приходитъ въ отчаяніе; при судорожномъ стягиваніи гортани и груди, особенно на холодѣ. *Orium* — при напорѣ крови къ груди, или легочнымъ спазмамъ, сопровождающихся *глубокимъ*, *зраннымъ дыханіемъ*; *сжатостію дыханія* и чувствѣ сжиманія въ груди съ сильною тоскою; напряженіи и судорожномъ стягиваніи въ груди; припадкахъ *задушенія во время сна*; чувствѣ давленія во снѣ; *удушлие носомъ камнемъ* съ синеватою краснотою лица. *Spongia* — при давленіи въ гортани, какъ-бы отъ пробки; свистящемъ или медленномъ и глубокомъ дыханіи, какъ-бы отъ слабости; *слизистомъ хрипѣ*; *остановкѣ дыханія* и припадкахъ задушенія послѣ всякаго движенія, съ утомленіемъ, приливомъ крови къ груди и голодѣ, тоскою и жаромъ въ лицѣ; при *астматическомъ страданіи съ остіею зоба*. *Stannum* — при *чувствѣ узкости и сжиманія въ груди*, особенно вечеромъ или ночью, лежа въ кровати, а также и днемъ при всякомъ движеніи, часто сопровождаемомъ тоскою и потребностію развязать платье; чувствѣ сжиманія и *слизистомъ хрипѣ* въ груди; кашль съ клейкою мокротою, въ видѣ *кусковъ*, или свѣтлой и водянистой, или желтоватою и соленою, или *сливѣ*

особенно, *аммонію*. ТАНТАЛУС — для старикъ людей, также и для дѣтей, или при чувствѣ *тоскою* сжиманія, одышко и короткомъ дыханіи, съ потребностію сидѣть прямо; чувствѣ сжиманія и принадлегахъ задушенія, особенно по вечерамъ или по утрамъ въ постели; *накопленіи слизи* и хрипѣ въ груди; удушливомъ кашлѣ или приливѣ крови къ груди и сердцоболеніи. ВЕВАТРИУМ — часто послѣ окончившагося дѣйствія Chin., Arg., Ipec., когда замѣчаются: признаки задушенія даже при выпрямленіи тѣла и боли въ боку при движеніи; пустой кашель, холодный потъ, или холодъ въ лицѣ и членахъ. ZINCUM — противъ *сжатости дыханія* и чувства давящаго сжиманія въ груди, особенно по вечерамъ; короткаго дыханія послѣ стола, вслѣдствіе накопленія вѣтровъ; усиленія астматическихъ принадлеговъ, какъ скоро мокрота перестаетъ отдѣляться; облегченіе при противоположныхъ условіяхъ.

§ 7. Кромѣ того, можно имѣть въ виду и слѣдующія обстоятельства: При удушьи, сопровождаемомъ *тоскою*: 1) Acon., Bell., Bry., Kreos.; 2) Arg., Her., Ipec., Phosph., Plat., Puls., Spong., Squil., Stann.; — *мысльнѣма*: 1) Arn., Bry., Calad., Ipec., Nitr.-ac., Phosph., Sil., Stram.; 2) Bell., Carb.-a., Cham., Cin., Cupr., Veratr.. — При короткомъ дыханіи: 1) Acon., Arn., Arg., Bell., Bry., Carb.-v., Ipec., Ser.; 2) Calc., Chin., Con., Cupr., Lach., Plat., Puls., Sil.. — При медленномъ: 1) Bell., Bry., Laur., Op.; 2) Camph., Caps., Con., Cupr., Her., Ign., Ipec., N.-vom., Spong.. — При зрѣломъ, шумномъ: 1) Cham., Chin., Cin., Cocc., Phosph., Samb., Spon., Squil.; 2) Acon., Arn., Calc., Her., Hyosc., Ign., Kal., Natr.-m., Nux.-v., Stram., Sulph.. — При сомнамбулѣ: 1) Cupr., Her., Lach., Samb., Spong.; 2) Ambr., Arg., Cham., Kal., Phosph.. — При дребезжаніи: 1) Bell., Chin., Cupr., Her., Lyc., Op., Puls., Sulph., Tart.; 2) Anac., Arg., Cham., Cin., Hyosc., Ipec., Lach., Laur., N.-vom., Petr., Stann., Stram.. — При сопровождаемомъ *икотою*: Arn., Asa., Calc., Led., Op., Sec.. — При *гранливомъ*: 1) Arn., Lach., Op.; 2) Cham., Her., Laur., Natr.-m.. — При ускоренномъ: 1) Acon., Bell., Bry., Carb.-v., Cin., Cupr., Her., Lyc., N.-vom., Phosph., Puls., Ser., Sulph.; 2) Arg., Cham., Ipec., Natr., Natr.-m., Rhus, Samb., Seneg., Sil., Spong., Stann., Veratr.. — При слабомъ, шумномъ: 1) Bell., Olean., Phosph.; 2) Her., Laur., Veratr.. — При сопровождаемомъ *задоханіи*: 1) Bry., Ipec.; 2) Acon., Cocc., Ign., Op., Sec., Sil., Stram.; —

стонами: 1) Acon., Bell., Lach.; 2) Ars., Cupr., Mur.-ac., Squil.—
 При *глубокомъ*: 1) Bry., Ipec., Op.; 2) Ant., Aur., Caps., Cera.,
 Lach., Sil., Stram.. — При *неправильномъ*: 1) Acon., Bell., Cupr.,
 Op.; 2) Cham., Cin., Ign., Jod., Laur., Led., Puls.. — Различн
 образомъ: при *стисненіи груди*: 1) Arn., Ars., Bell., Cham. Con.,
 Crotal., Dulc., Graph., Kreos., Lach., Lyc., Natr.-m., N.-mosch., N.-
 vom., Oleand., Rhus, Sep., Staph., Sulph.; 2) Acon., Asar., Chin.,
 Cupr., Ign., Ipec., Phosph., Plat., Puls., Samb., Sang., Seneg.,
 Thuj. — Въ *приступахъ задыханія*: 1) Acon., Ars., Carb.-v., Chin.,
 Her., Ipec., Lach., Op., Puls., Samb., Spig., Spong., Sulph., Tart.;
 2) Aur., Baryt., Camph., Graph., Lact., N.-vom., Phosph., Sec.,
 Veratr.. — При *короткости, прерывающаго дыханія*: 1) Acon., Amm.,
 Arn., Ars., Bry., Carb.-v., Caust., Ipec., Lach., Merc., Natr.-m.,
 Nitr.-ac., Sep., Sulph.; 2) Ambr., Bell., Chin., Con., Lyc., Natr., N.-
 mosch., Phosph.-ac., Plat., Puls., Sabad., Sil., Spig., Zinc.. — При
трудности дыханія: 1) Ars., Bell., Jod., Kreos., Lach., Phosph.,
 Sulph.; 2) Alum., Camph., Carb.-v., Hyosc., Kal., Natr.. — При *не-
 рвительномъ* дыханіи: 1) Ars., Bry., Calc., Puls., Sil., Stann., Sulph.;
 2) Anac., Arn., Caust., Chin., Cocc., Guaj., Led., Lyc., N.-mosch.,
 N.-vom., Op., Phosph., Plat., Plumb., Ruta, Samb., Sass., Stram.,
 Veratr.. — Далѣе: при *дыханіи юрччмъ*: 1) Acon., Cham.; 2) Ant.,
 Calc., Natr.-m., Rhus, Sabad., Squil., Sulph., Zinc.; — *заподиетъ*:
 1) Carb.-v., Veratr.; 2) Chin., Mur.-ac., Rhus; — *кислотозвучитъ*:
 Cham., N.-vom.; — *воточемъ*: 1) Aur., Carb.-v., Ipec., N.-vom.,
 Sulph.; 2) Acon., Arn., Bry., Cham., Chin., Coff., Dulc., Merc.,
 Natr.-m., Nitr.-ac., Puls., Sep., Stram..

§ 8. Наконецъ, если удушье появляется преимущественно *в
 черомъ*: 1) Ars., Graph., Stann., Sulph.; 2) Bell., Carb.-a., Carb.-v.,
 Chin., Con., Ferr., Lach., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sep., Verb.—
 После *напряженія тѣла*: Amm., Ars., Bor.. — После *винокъ*: 1) Ign.,
 Staph.; 2) Ars., Ran.. — При *подниманіи руки*: 1) Spig; 2) Ant.,
 Cupr., Led., Sulph.. — При *движеніи руки*: Arn., Camph., Led.,
 Spig.. — Въ *постели*: 1) Carb.-a., Con., Graph.; Tart.; 2) Ars., Bell.,
 Carb.-v., Chin., Ferr., Lach., Merc., Natr.-m., N.-vom., Sep., Spig.,
 Sulph., Verb.. — При *движеніи*: 1) Ars., Phosph., Stann.; 2) Arn.,
 Bry., Calc., Cann., Caps., Con., Ferr., Graph., Ipec., Led., Lyc.,
 N.-vom., Puls., Rhus, Sep., Spig., Veratr.. — При *наибавіи*: Amm.,

Amm., Calc., Sil.—Во время *нды*: 1) Con., Dig., Laur., Sil., Stann.; 2) Ars., Carb.-v., Ferr., Led., Rhus.—Послѣ *нды*: 1) Puls., Sulph.; 2) Ars., Carb.-a., Chin., Lach., N.-vom., Phosph., Zinc.—На *открытомъ воздухѣ*: Ars., Aur., Graph., Lyc., N.-vom., Puls., Sulph.—*Рано утромъ*: 1) Carb.-a., Con., Phosph., Tart.; 2) Bell., Dig., Kal., N.-vom., Seneg., Squil., Sulph.—Послѣ *душевныхъ потрясеній*: 1) Cham., Ign., N.-vom.; 2) Acon., Ars., Coff., Puls., Veratr.—Отъ *прикосновенія къ шевъ*: 1) Bell., Spong.; 2) Her., Lach.—*Вытѣиванія шевъ*: 1) Bell., Spong.; 2) Her.—Послѣ *пьянства кофе*: Bell.—Отъ *холода и холоднаго воздуха*: Ars., Bry., Carb.-v., Petr., Puls.—Отъ *холоднаго питья*: Thuj.—Отъ *давленія платьемъ*: 1) Bry., Calc., Her., Lyc., N.-vom., Spig., Sulph.; 2) Amm., Carb.-v., Caust., Coff., Kreos., Lach., Sass., Spong.—Послѣ *оскорбленія*: 1) Ign., Staph.; 2) Ars., Ran.—При *смѣтѣ*: Ars., Cupr., Lyc., Plumb.—Во время или послѣ *блѣанья или скорой ходьбы*: 1) Caust., Sil.; 2) Agn., Aur., Bor., Ign., Puls.—При *лежаніи*: 1) Dig., Nitr., Phosph.; 2) Ars., Asa., Calc., Her., Lach., N.-vom., Puls., Samb., Ser., Sulph., Tart.—При *лежаніи на спинѣ*: Phosph., Sil.—При *лежаніи на боку*: Carb.-a., Plat., Puls., Sabad., Sulph.;—на *большомъ боку*: Bor., Calc., Lyc., Sulph.;—на *маломъ*: Spig.;—на *здоровьѣ*: Stann.—При *лежаніи спиной головою*: Chin., Her., Puls.—*Ночью*: 1) Ars., Carb.-v., N.-vom., Puls.; 2) Calc., Ferr., Graph.; 3) Alum., Amm., Dig., Merc., Sulph.—Во время или послѣ *чиханія*: Dros., Merc., Sil., Sulph.—При *верховой пѣдѣ* или послѣ *нея*: Graph.—Въ *покоѣ*: Ferr., Rhus, Sil.—Во *спѣ*: Lach., Samb., Sulph.—При *лотаніи*: Bell.—Въ *приступѣхъ боли*: 1) Puls.; 2) Ars., Sil.—Отъ *пьянства*: Amm., Sulph.—Въ *сидячемъ положеніи*: Alum., Dig., Dros., Lach., Phosph., Samb., Staph., Veratr.—Отъ *разговора*: Dros., Sulph.—При *стоячемъ положеніи*: Ser.—При *вхожденіи на мѣстницу*: Merc., N.-vom.—При *испражненіи низомъ*: Rhus.—Во время или послѣ *пьянства*: Agn., Bell., N.-vom., Thuj., Veratr.—Послѣ *насады*: Rhus.—Въ *теплой комнатѣ* или отъ *теплаго платья*: Ars.

Сравн. *Напоръ крови къ груди, Катарръ бронхиальной, Легочная чахотка.*

Ужаленіе насѣкомыми, Mogniones insectum.

Показаны: Асоп., Агп., Bell., Мерс.—Если будетъ ужалено очень чувствительное мѣсто и если затѣмъ послѣдуетъ воспаление съ лихорадкою, то можно дать нюхать камфору и послѣ употребить Асоп., если камфора не принесла пользы. При ужаленіи пчелами можно тотчасъ назначить Асоп. и если окажется нужнымъ, то по прошествіи получаса дать Агп., а если не будетъ облегченія то по прошествіи двухъ, трехъ часовъ дать Bell. Если Bell. окажется неудовлетворительною, то нужно дать Мерс. по прошествіи 2—3-хъ часовъ. При ужаленіи глаза, преимущественно назначаются Асоп. и Агп. попеременно, оставляя одинъ приемъ Агп. на дѣйствіе на 3—4 часа.

Узлы венозные, Varices.

Лучшія средства противъ нихъ суть: 1) Агп., Агс., Calc., Carb.-т., Caust., Lyc., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Ambr., Ant., Coloc., Ferr., Graph., Kreos., Lachen., Lyc., Magn.-aus., Natr.-m., Silic., Spig.-Sulph.-ac., Zinc..

Укоусъ, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія.

Средства: Асоп., Агс., Авар., Ign., N.-vom., Puls., Сер..

Умопомѣшательство, сумасшествіе, бѣшенство, неистовство, ярость, Alienatio mentis, Mania.

§ 1. Средства, дѣйствующія при различныхъ видахъ сумасшествія: 1) Асоп., Bell., Calc., Hyos., Lach., N.-vom., Op., Plat., Stram., Veratr.; 2) Anac., Arn., Ars., Canth., Cupr., Lyc., Puls., Sil., Sulph.; 3) Agar., Ant., Cann., Caust., Cic., Coccul., Con., Coloc., Croc., Dig., Dulc., Ign., Merc., Natr., N.-mosch., Oleand., Par., Phosph., Plumb., Rhus., Sec., Ser., Zinc..

§ 2. Если помѣшательство ума есть слѣдствіе *уметаненія души потрясеній, трусги, умиасенія, озорченія, досады, зависти и т. п.*: 1) Ign., Phos.-ac., Staph.; 2) N.-vom., Bell., Hyos., Plat. (См. *Двѣтрясенія души*). —Если оно развилось вслѣдствіе *неумѣренности*

умственикъ замѣтъ: 1) Lach., Plat., Stram.; 2) N.-vom., Op., Sulph.; 3) Bell., Hyos. и Veratr. (Сравн. Утомленіе умственное). — Если оно находится въ связи съ *религіозными идеями:* 1) Bell., Hyos., Lach., Puls., Stram., Sulph., Veratr.; 2) Ars., Aug., Croc., Lys., Selen. — Помѣшательство ума *у пьяницъ* (Delirium tremens): 1) N.-vom., Op.; 2) Arg., Hell.; 3) Bell., Calc., Hyos., Lach., Stram., или наконецъ Merc., Puls., Sulph. — Противъ помѣшательства ума *у женщины*, если оно зависитъ отъ *безпорядковъ въ половомъ отъ правленіи:* 1) Acon., Bell., Plat., Puls., Stram., Veratr.; 2) Cupr., Lach., Merc., Sulph. (Сравн. *Неправильное мысленное опіищеніе, Бользненное половое побужденіе*).

§ 3. По принадлежкамъ, назначаются:

АСОНИТУМ—*противъ страха и предчувствія близкой смерти;* желанія убѣжать изъ дому или съ кровати; угрюмаго, мрачнаго, молчаливаго расположенія духа; приступовъ тоски и конвульсій; *голодную нота;* напора крови къ груди или головѣ; *сердцебиенія и тоскливости;* бреда, при которомъ больной то смѣется, то плачетъ.

ВЕЛЛАДОННА—когда замѣчаются: *большая тоска, безпокойство и заботливость;* потеря самосознанія до того, что больной только посредствомъ слуха узнаетъ своихъ; *страшныя видѣнія, представляющія призраковъ, нечистыхъ духовъ, солдатъ, войну, быковъ;* желаніе *убѣжать или скрыться;* *недовѣрчивый, пугливый или сварливый нравъ, или желаніе постоянно плевать, бить, кусать, разрывать все, или вырывать у себя зубы;* крикъ, ревъ и т. д.; разговоръ съ мертвыми, страхъ смерти, любовь къ уединенію, неохота къ бесѣдамъ и скудость на слова; дурное расположеніе духа, раздражительность; склонность къ гнѣву и пасмурный видъ, или же вздохъ, жалобы, *глупые фарсы, дикость мазъ и неподвижный, блѣдный взглядъ;* *одутловое лицо;* большая склонность *смотреть на огонь или солнце;* истеченіе слезъ или *пѣны изо рта;* *закливая рѣчь;* *жгучая жажда или отвращеніе отъ пищи и затрудненное глотаніе;* подергиваніе и везадное вскакиваніе; *трясеніе членовъ, въ особенности рукъ;* *бессонница и безпокойство.*

САЛСАВЕА — когда больной бредитъ объ убійствѣ, пожарѣ, *мышяхъ и крысахъ, или когда замѣчаются: большая злость, своерра-*

віе, дурное расположеніе духа и неохота къ бесѣдамъ; дрожаніе членовъ.

HYOSCYAMUS — преимущественно при пристунахъ неистовства, склоняющихся эпилептическими припадками; бессонницѣ, постоянномъ бредѣ и болтливости; большой тоскѣ и страхи, особенно ночью, и страхъ передъ измѣною и отравленіемъ; желаніи убійать; видѣніяхъ, представляющихъ мертвецовъ; резности, бѣшенства и желаніи бить или убивать; шутковскызъ и смыханъ фарсахъ; бредѣ о своихъ дѣлахъ; дрожаніи членовъ.

LACONIS — при необыкновенной болтливости возвышенныи слогомъ, отборными словами и мыслямъ, быстро переходящихъ от одного предмета къ другому; состояніи восторга, доходящаго до слезъ; недовѣрчивости, подозрѣнія и страхъ; предчувствіи смерти; неустойности въ религіозныхъ помятіяхъ, сомнѣніи въ спасеніи души.

NUX VOMICA — когда замѣчаются: большая тоска, безтолкостя и желаніе оставить свое жилище; потеря самосознанія; бредъ; страшныя видѣнія; нелѣпыя отвѣты и поступки; блѣдное и одутловое, или красное и горячее лицо и напоръ крови къ голове; заплевыва рѣчь; трясеніе членовъ; чувство сжиманія и тяжести головы; ощущение полноты и тяжести тѣла, давленіе, жнетіе, тяжесть подложечкою, въ сторону желудка и подреберьяхъ; склонность во рвотѣ, или настоящая рвота непереваренной пищею, желчными веществами; запоръ или водянистыя испраженія; бессонница и внезапное вскакиваніе отъ сна.

OPUM — когда замѣчаются: дремотное одурѣніе и потеря самосознанія; бѣшенство и странныя или постоянныя идеи; страшныя видѣнія, представляющія мышей, скорпионовъ и т. п.; конвульсивныя движенія и трясеніе членовъ; тоска, бѣшенство, невозможность заснуть, несмотря на сильное желаніе; запоръ и значительная вздутость живота; развитіе въ немъ газовъ, напоръ крови къ головѣ и краснота лица.

PLATINA — при бредѣ о дѣлахъ минувшихъ, совмѣстномъ съ пѣніемъ, смѣхомъ, плачемъ, танцами, гримасами и различными тѣлодвиженіями; своераніи или раздражительности, сварливомъ расположеніи духа и страсти выставлять ошибки или пороки другихъ; презрѣніе къ другимъ и смыхое высокое помятіе о себѣ самомъ; слишкомъ возбужденная половая похоть; запоръ на нязъ и ведѣ-

тельность кишечнаго канала; при большой тоскѣ, сердцебиеніи и сильномъ страхѣ смерти; страшныхъ видѣнійхъ, безотчетномъ страхѣ, и страшныхъ видѣнійхъ, причѣмъ больной во всѣхъ окружающихъ видитъ нечестныхъ духовъ.

СТРАМОНІУМЪ—при одурѣвіи, сопровождаемомъ большою тоскою, безпокойствомъ, или *потерею самосознанія*, такъ что больной не узнаетъ своихъ; постоянныхъ идеяхъ, *бредъ и ужасная видѣнійхъ*, страхъ и желаніи убивать, или же при моленьи, набожномъ видѣ лица и другихъ религіозныхъ тѣлодвиженіяхъ; также при необыкновенной *болтливости*, сладострастныхъ мысляхъ, ловкихъ тѣлодвиженіяхъ, важномъ видѣ лица, бесѣдѣ съ духами, танцахъ, смѣхѣ и желаніи бить; при глухихъ фарсахъ, смѣзлыхъ тѣлодвиженіями, которыми выражаютъ грусть и меланхолю; или при *неукротимой ярости*, желаніи кусать, плевать, рубить и убивать; *особенномъ желаніи стыта и общества*; ухудшеніи состоянія въ уединеніи и темнотѣ, также во время равноденствія; *красномъ и одуловомъ лицѣ*; глупомъ, во ласковомъ выраженіи лица.

УЕВАТІУМЪ—при *необыкновенной тоскѣ и безпокойствѣ*, *страхѣ и тупливости*; упадкѣ духа и отчаяніи; *необыкновенной молчаливости*, или божѣ при всякомъ случаѣ; страсти выставлять другимъ ихъ пороки; потерѣ самосвѣденія, ивнѣи, свистѣ, смѣхѣ, сладострастныхъ мысляхъ, охотѣ бродить внѣ дома; превратныхъ, гордыхъ идеяхъ; склонности больного всегда говорить о своей воображаемой болѣзни; бредѣ о религіозныхъ предметахъ.

§ 4. Изъ прочихъ средствъ, еще достойны вниманія:

АНАСАРДУМЪ—когда замѣчаются: *страсть смѣяться надъ серьезнымъ предметомъ и представлять себя серьезнымъ при смѣшномъ дѣлѣ*; постоянное противорѣчіе самому себѣ; *потеря всякаго моральнаго и религіознаго чувства и страсть къ злословію и проклятію*; постоянная идея больного, что онъ одержимъ бѣсомъ.

АВНІСА—при дурацкой веселости, необыкновенномъ легкомысліи, похотливости и злости; сварливомъ, безпокойномъ расположеніи духа и своеравіи.

АВВЕНІСУМЪ—при необыкновенной тоскѣ, безпокойствѣ и нерѣшительности; *страхѣ предъ привидѣніями, ворами и уединеніемъ*; желаніе скрыться; *неохота къ бесѣдамъ и необыкновенная страсть злословить*.

САЯТНАВІВЪ—при бѣ-

шенствѣ, выражающемся крикомъ, желаніемъ бить и ревомъ; возобновеніи приступовъ при взглядѣ на воду, или если она попала въ горло; *сильномъ возбужденіи половой похоти* и половых органовъ; необыкновенной жадѣ, отвращеніи отъ питья и затрудненномъ глотаніи. Сурѣумъ — при потерѣ силъ нравственныхъ; постоянныхъ идеяхъ о воображаемыхъ занятіяхъ, веселомъ нѣніи, злости и угрюмости; *дежкихъ, красныхъ и воспаленныхъ глазахъ*; плачѣ и тоскѣ, или дурацкихъ фарсахъ и желаніи скрытис; *потъ послѣ приступа*. Лусородіумъ — если приступы бѣшености сопровождаются наклонностью порицать другихъ, хвастаться и поступать надменно и повелительно. Пулсатилла — если больной остается спокойнымъ, складываетъ руки, вздыхаетъ и утверждаетъ, что онъ чувствуетъ себя хорошо, но находится при этомъ въ состояніи одурѣнія, бредитъ ночью, видитъ ужасныя видѣнія и хочетъ гдѣ-нибудь спрятаться. Силиса — преимущественно при постоянныхъ идеяхъ о мелочахъ, такъ что больной занимается только булавками, которыя онъ постоянно считаетъ и ищетъ всадѣ; когда больной при этомъ молчаливъ, скупъ на слова, равнодушенъ, чувствуетъ тоску и отвращеніе отъ работы; *уздшеніе состоянія при наростаніи луны*. Сульфуръ — при постоянной страсти имѣть роскошныя обновки и всего вдоволь; смѣшеніи понятій, такъ что одна вещь принимается за другую, напримеръ шляпа за шапку, старое платье за нарядное платье.

§ 5. Кромѣ того, надо имѣть въ виду:

При помѣшательствѣ ума, сопровождающемся тоскою, страхомъ, ужасными мыслями и видѣніями: 1) Bell., Hyos., Op., Stram.; 2) Ars., Calc., Cupr., Lyc., N.-vom., Op., Sulph., Veratr. — При *бѣнокойствѣ*, заставляющемъ больного *бѣжати* изъ дому или съ кровати: 1) Bell., Hyos., N.-vom., Op., Stram., Veratr.; 2) Acon., Arg., Bry., Canth., Coloc., Cupr. — При помѣшательствѣ ума, сопровождающемся *просьбами, молениями, жалобами и плачемъ*: 1) Ars., Bell., Merc., Puls., Stram.; 2) Acon., Ign., Mosch., Natr.-s. Sulph. — При *колѣнопреклоненіи* и другихъ благоговѣйныхъ тѣлодвиженіяхъ, рѣчахъ и поступкахъ: 1) Bell., Hyos., Lach., Puls., Stram., Sulph., Veratr.; 2) Ars., Aur., Croc., Lyc., Selen. — При *проклятійхъ, ругательствахъ, ссорѣ, злословіи* и другихъ *амыхъ наклонностяхъ*: 1) Apac., Bell., Hyos., Lyc., Stram., Veratr.; 2) Acon.,

Arg., Cupr., Natr.-m., N.-vom.—При *неистовство, насильство, бешенство*, желаніи кусать, плевать, разрывать вещи и бить: 1) Bell., Canth., Hyos., Lyc., Stram., Veratr.; 2) Agar., Arg., Camph., Cann., Coss., Croc., Cupr., Lach., Merc., Plumb., Sec.—При *неистовомъ бшиснствѣ*, какъ-будто больной одержимъ бѣсомъ: Apac., Hyos.—При *обманатъ фантазіи*, видѣніяхъ духовъ и призраковъ: 1) Bell., Stram.; 2) Apac., Lach., Natr.-m., Op., Puls., Sil., Sulph.—При *маміахъ*, постоянныхъ идеяхъ: 1) Bell., Coccul., Ign., Phos-ac., Sabad. Stram., Sulph.; 2) Acon., Amb., Cic., Hell., Hyos., Lyc., Merc., N.-vom., Op., Phosph., Plat., Puls., Rhus, Sec., Sil., Val., Veratr.—Если больной представляеть у себя *несуществующія болѣзни*: Bell., Veratr.—При *нецтовой радости* и веселости, пѣніи, свистѣ, танцахъ, мурлыканьи: 1) Bell., Coff., Croc., Natr., Op., Stram., Veratr.; 2) Aur., Cann., Cic., Hyos., Phosph., Phos-ac., Plat.—При *мутныхъ тѣлодвиженіяхъ*: 1) Bell., Hyos., Merc., Stram.; 2) Cic., Cupr., N.-mosch.—При *безпрестанныхъ оестимуляцияхъ*: 1) Bell., Hyos., Mosch., Stram.; 2) Arg., Cic., N.-mosch., Puls., Ser., Veratr.—При *суетливости*: 1) Bell., Merc., Stram.; 2) Camph., Cupr., Op., Sec., Sulph., Veratr.—При *необыкновенной болтливости*: 1) Bell., Hyos., Stram.; 2) Acon., Arg., Camph., N.-vom., N.-mosch., Lach.—При *непристойныхъ рѣчахъ и поступкахъ*: 1) Hyos., Phosph., Stram., Veratr.; 2) Bell., N.-mosch.—При бѣшенствѣ отъ *любви*: 1) Ant., Hyos., Veratr.; 2) Aur., Ign., Phos-ac.—При попыткахъ *кусаться*: Arg., Plat..

См. *Болѣзни душевныя*.

Утомленіе отъ умотвенныхъ занятій.

Средства: 1) N.-vom., Sulph.; 2) Aur., Calc., Lach., Mosch., Natr., Natr.-m., Puls., Sil.; 3) Amb., Amm., Bell., Cham., Cic., Dig., Jod., Laur., Led., Nitr., N.-mosch., Phosph., Ser., Spong., Sulph-ac., Val., Zinc..

О прочемъ см. *Утомленіе, Слабость памяти и мышленія и Душевныя болѣзни вообще*.

Утомленіе отъ напряженія тѣла и души.

§ 1. Средства противъ вредныхъ послѣдствій отъ всякаго усн-

ленного труда: Acon., Arn., Bry., Calc., Chin., Cocc., Coff., Mm., Millef., N.-vom., Puls., Rhus, Silic., Veratr..

§ 2. Противъ утомленія вследствие напряженія тела преимущественно: Acon., Arn., Arg., Bry., Calc., Chin., Coccul., Coff., Merc., Rhus, Silic., Veratr..— Противъ послѣдствій отъ продолжительныхъ ночныхъ *заматій*: Carb.-v., Coccul., N.-vom., Puls.;— чрезвычайныхъ *умственныхъ заматій*: Bell., Calc., Lach., N.-vom., Pul., Sulph.;— продолжительной *сидячей жизни*: N.-vom. Sulph.;— усиленного *разговора*: 1) Stann., Sulph.; 2) Arn., Arg., Cocc., Iga, N.-vom.; 3) Apac., Bell., Calc., Carb.-v., Natr.-m., Phosph., Phosph.-ac., Rhus, Sil..

§ 3. Изъ этихъ средствъ можно употребить преимущественно

Асонитум — при полномъ, ускоренномъ пульсѣ вследствие *разоряющей работы*, при прерывистомъ, короткомъ *дыханіи*, кашлѣ, *колотьи въ бокахъ* и боли въ членахъ.

Авниса — если послѣ употребленія Acon. не прекращается *колотье въ боку* вследствие *утомительнаго труда*, или если послѣ *чрезмѣрно утомительнаго движенія* появляются боли съ чувствомъ какъ-бы разбитости или разлома въ членахъ, особенно въ *мускулахъ*; опухоль и боль въ *ногахъ*.

Велладонна — противъ головной боли и недуговъ *кожи*, причиненныхъ усиленными *умственными занятіями*.

Вруонид — если Acon. недостаточно для излеченія послѣдствій отъ *разгоряченія* или *скараго бѣганія*, и если *колотье въ боку* не прекращается отъ употребленія *арника*.

Салсавел — если *малѣйшее движеніе*, даже обыкновенный *разговоръ* очень утомляетъ, и если отъ этого не помогаютъ ни Coccul., ни Veratr., равно когда *малѣйшее движеніе* *причиняетъ головную боль*.

Савво вегетавіліс — противъ *разслабленія* послѣ *ночныхъ кутежей* и именно при *давящей или бьющей головной боли*, которая *уменьшается на открытомъ воздухѣ*; при *тошнотѣ* безъ особенныхъ *страданій*; мочѣ *жидкой и блѣдной*.

Спина — послѣ *напряженія тѣла*, когда замѣчается обильное *отдѣленіе пота*, преимущественно у *людей*, истощенныхъ отъ *обычнаго пота* и другихъ *ослабляющихъ причинъ*.

Соссулюс — противъ послѣдствій отъ *усиленной работы* или

продолжительныхъ ночныхъ бдѣній; вообще при большой слабости и скоромъ утомленіи отъ малѣйшей работы или отъ того, что больной немного не доспитъ; при трясеніи членовъ и чувствѣ пустоты въ головѣ; летучемъ жарѣ въ лицѣ, синевѣ вокругъ глазъ, сухости во рту, отвращеніи отъ пищи; припадкахъ тошноты и слабости до обморока, чувствѣ полноты въ желудкѣ; чувствѣ сжимающаго въ груди; усиленія припадковъ на воздухѣ, отъ разговора и отъ употребленія кофе; большой грусти, внезапномъ вскакиваніи отъ сна и тягостныхъ видѣній.

СОРРЕА—противъ утомленія вслѣдствіе напряженія тѣла при недостаткѣ надлежащей пищи.

ІРВАСУАНА—противъ головной боли вслѣдствіе продолжительныхъ ночныхъ бдѣній, при отвращеніи отъ пищи и позывѣ на рвоту, именно, если больной принужденъ еще проводить бессонныя ночи.

МЕВСУРИУС—противъ волненія послѣ малѣйшаго напряженія, напорѣ крови къ головѣ, груди или лицу.

МИЛЬФОЛІУМ—при появленіи сильныхъ кровотеченій.

НУХУОМІСА — противъ послѣдствій *отъ продолжительныхъ ночныхъ бдѣній, усиленныхъ умственныхъ занятій и сидячно образа жизни; вообще для людей, которые для оживленія силъ прибѣгаютъ къ кофе, вину или спиртнымъ напиткамъ; при головной боли и приливѣ крови къ головѣ, отуманеніи, тяжести во лбу при движеніи глазъ и болѣзненномъ сотрясеніи мозга на всякомъ шагу; при этомъ: блѣдность и впалость лица или землисто-поблеклый цвѣтъ его; гастрическія страданія; склонность ко рвотѣ и вялость брюшныхъ внутренностей; кашель и нервная зубная боль; усиленіе страданій на воздухѣ; неохота къ движенію и прогулкамъ; возвышенная воспримчивость всей нервной системы; дрожь, усталость, апохондрія и дурное расположеніе духа; живой и холерическій темпераментъ.*

ПУЛЬСАТИЛЛА — противъ утомленія *отъ усиленныхъ умственныхъ занятій или продолжительныхъ ночныхъ бдѣній; для женщинъ, въ особенности, если онѣ могутъ заснуть только подъ утро, или когда замѣчается отуманеніе головы какъ-бы отъ пьянства, или чувство какъ-будто въ мозгу пусто и голова кажется очень легкой, или чувство тяжести въ головѣ и свѣтобоязнь; если стра-*

*данія уменьшаются на воздухъ; соответствуетъ кроткому и при-
вному нраву.*

RHIV — если послѣ попенія большой тяжести, равно послѣ всякой другой усиленной работы, появятся боль во всѣхъ членахъ, преимущественно вычальгъ движенія или во время отдыха.

SILISIA — при короткомъ дыханіи, появляющемся послѣ *сорока бьанія* и ухудшенія на ходьбѣ, или при восхожденіи на высоту; при кашлѣ съ мокротою.

SULPHUR — если вслѣдствіе сидячаго образа жизни, усиленныхъ умственныхъ занятій, или продолжительныхъ ночныхъ бдѣній появляются: большое утомленіе головы, *ипохондрическое расстройство* духа, гастрическія страданія, дурное пищевареніе, запоръ, и если Nux-vomica оказалась недостаточною для излеченія этого состоянія.

VEVATEUM — при большой слабости *ослѣдствіе непривычнаго* труда, когда малѣйшая работа утомляетъ до обморока.

УШНЫЯ БОЛИ, Otagia.

§ 1. Средства вообще: 1) Bell., Merc., N.-vom., Puls.; 2) *Bo-
гах, Bry., Calc., Magn.-с.* — Противъ *ревматической*: 1) Bell., Merc., Puls.; 2) *Arn., Chin., Ner., N.-vom.* — Противъ *воспалительной* *ушной боли*: 1) Bell., Merc., N.-vom., Puls.; 2) *Boгах, Bry., Calc., Magn.-с.* — Противъ ушной боли вслѣдствіе *простуды* или *вызванной задержанной испарины*: Cham., Chin..

§ 2. Во всякомъ случаѣ, можно имѣть въ виду:

VELLADONNA назначается, когда есть колотье въ ушахъ и позади ихъ, бурлящія, сверлящія боли, терзаніе и колотье, *простирающіяся въ горло* и сопровождающіяся звономъ, шумомъ въ ушахъ; необыкновенная чувствительность къ малѣйшему шуму; болѣзненное утомленіе головы и глазъ, и свѣтобоязнь; краснота и жаръ въ лицѣ; напоръ крови къ головѣ.

SNAMOMILLA — противъ колотья, какъ-бы ножами, или *н-
прсгающихъ и ноющихъ* болей въ ушахъ; сухости, или какъ-бы *налеганія* въ нихъ; большой чувствительности къ малѣйшему шуму, особенно къ музыкѣ; необыкновенной чувствительности, вслѣдствіе которой боли становятся невыносимыми; при *недовѣрчивомъ, дурномъ* расположеніи духа.

MERCURIUS — при колющихъ, глубокихъ боляхъ, или терзающихъ, простирающихся въ щеки или зубы съ чувствомъ холода въ ушахъ; усиленіе болей въ теплой постели; противъ судорожныхъ болей, при которыхъ замѣчается воспалительная краснота ушей; противъ истеченія ушной сѣры, и сильнаго пота, не приносящаго облегченія.

PULSATILLA — при подергивающихъ, терзающихъ боляхъ, какъ-будто что-нибудь стремится выйти вонъ черезъ уши; при этомъ: красная опухоль и жаръ въ наружномъ ухѣ, или колющія и терзающія боли, поражающія всю большую часть головы и столь невыносимыя, что больной почти сходитъ съ ума. Назначается также субъектамъ флегматическимъ, расположеннымъ къ плачу и женщинамъ въ особенности.

SULPHUR — при потягивающихъ, терзающихъ или колющихъ боляхъ, простирающихся въ голову и горло; притомъ жгучій жаръ, какъ-бы выходящій чрезъ уши; необыкновенная чувствительность слуха къ малѣйшему шуму, такъ что больному дѣлается дурно при самыхъ тихихъ музыкальныхъ звукахъ; назначается преимущественно людямъ, расположеннымъ къ насморку, или напору крови къ головѣ.

§. 3. Изъ прочихъ вышесказанныхъ средствъ можно еще имѣть въ виду:

ARINICA — для людей нервныхъ, раздражительныхъ, если у нихъ недугъ возвращается отъ малѣйшей причины, и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаются: давленіе и колотье въ ушахъ и позади нихъ; терзаніе, внутренній жаръ и большая чувствительность къ шуму. — **CHINA** — если терзающія боли ощущаются преимущественно снаружи и *усиливаются при дотроиваніи*; краснота уха; колотье и шумъ внутри его. — **DULCAMARA** — если боли усиливаются въ покоѣ, особенно ночью, и сопровождаются тошнотою. — **NERVAL** — часто послѣ Bell., если она оказалась недостаточною и больной жалуется на колотье въ ушахъ, біеніе, удары и шумъ при скорканіи. — **NUXOMICA** — для людей живаго, холерическаго темперамента и если замѣчаются: *терзающія, колющія боли*, заставляющія больнаго кричать, распространяющіяся въ лобъ и сопровождающіяся терзаніемъ въ костяхъ лица, равно если недугъ усиливается по утрамъ, или вечеромъ въ кровати. —

ПЛАТИНА — при сильной боли, толчках, грохотѣ и грохѣ в ушахъ, которые между тѣмъ кажутся холодными и какъ-бы пертвыми; при оглушеніи съ свербѣніемъ, простирающимся въ лицо. —
СПИГІЯ — противъ мучительной, давящей боли, какъ-будто въ ухѣ сидятъ большой гвоздь; давящей и терзающей боли въ устахъ лица.

§ 4. Вообще:

При *бьющихся* ушныхъ боляхъ, пульсаци в ухѣ: 1) Acon., Calc., Magn.-m., Natr., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sil.; 2) Acon., Bell., Caust., Cham., Chin., Graph., Kal., Puls., Rhus, Sulph.; — *терзающихся*: 1) Bell., Cham., Colch., Con., Merc., N.-vom., Puls., Zinc.; 2) Acon., Alum., Amb., Arn., Caps., Kal., Lyc., Spig., Sulph.; — *разрывающихся*: Bell., Merc., Puls.; — *колющихся*: 1) Bell., Calc., Cham., Con., Dros., Kal., Merc., Nitr.-ac., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Alum., Baryt., Canth., Caust., Chin., Ign., Magn.-m., Merc., Natr., Natr.-m., Nitr., Phos.-ac., Plumb., Rop., Sassa., Sil., Spig., Staph., Zinc.; — *выражающихся какъ-бы выкалываніемъ* чрезъ ухо: 1) Con., Kal., Sil., Spong.; 2) Alum., Amm.-m., Mang., Natr.; — *щемлящихся*, жмущихъ боляхъ: 1) Bell., Cham., Dros., N.-vom., Puls., Sulph.; 2) Amb., Arn., Dulc., Mur.-ac., N.-mosch., Phosph., Plat., Sabad., Spig., Spong., Stann., Thuj.

Сравни.: *Боли лица, головы, Приступы болей, Обстоятельства, Причины, Зубная боль.*

УШНЫЕ ПОЛИПЫ, Polypi aurium.

Здѣсь можно преимущественно употребить: Calc. и Staph.
 См. *Полипы вообще.*

Ф.

Фагаденническая сыпь Ганеманна, Bullae phagadenicae Hanemannii, Pompholyx benignus.

Это родъ пузырьковъ, изъязвляющихъ и разѣдающихъ слизистыя части; они встрѣчаются на щекахъ, ногахъ, пяткахъ, пальцахъ рукъ и ногъ и всегда являются какъ самостоятельный недугъ, отли-

чаясь отъ *Pompholyx* тѣмъ, что не сопровождаются посторонними болѣзненными явленіями въ слизистой оболочкѣ желудка, кишекъ, или другими безпорядками въ отравленіяхъ, свойственными послѣднему. Средства, дознанныя опытомъ самаго Ганеманна и его учениковъ: 1) *Cham.*, *Graph.*, *Petr.*, *Sil.*; 2) *Arg.*, *Borax*, *Calc.*, *Caust.*, *Clem.*, *Hep.*, *Kal.*, *Magn.-c.*, *Merc.*, *Natr.*, *Nitr.-ac.*, *Rhus*, *Sep.*, *Squill.*, *Sulph.*.

Фосфоръ, вредныя отъ него послѣдствія:

При полномъ отравленіи ямъ: 1) произведеніе скорой рвоты щекотаніемъ зѣва или посредствомъ табаку или горчицы; 2) черный кофе въ большомъ количествѣ, какъ питье; 3) магнезія съ водою. — Масло и жирныя вещества, также, и молоко противопоказаны. Противъ остающихся недуговъ служатъ преимущественно: 1) *N.-vom.*; 2) *Alum.*, *Bell.*, *Sulph.*.

Х.

Хина, вредныя послѣдствія отъ ея злоупотребленія.

§ 1. Лучшія средства вообще: 1) *Arg.*, *Arg.*, *Bell.*, *Calc.*, *Ferr.*, *Ires.*, *Lach.*, *Merc.*, *Puls.*, *Vegetr.*; 2) *Carb.*, *Carb.-v.*, *Cin.*, *Natr.*, *Natr.-m.*, *Sep.*, *Sulph.*.

АВЕНІСА — если появляются ревматическія боли, тяжесть, ослабленіе и чувство разбитости въ костяхъ; потягиваніе во всѣхъ членахъ; необыкновенная воспримчивость всѣхъ органовъ: усиленіе болей отъ движенія, разговора и шума. **АВЕНІСИСМ** — при извахъ на костяхъ; гидроническихъ страданіяхъ или отежѣ ногъ, короткомъ кашлѣ и дыханіи. **ВЕЛЛАДОННА** — при приливѣ крови къ головѣ, сопровождающемся жаромъ въ лицѣ и болями головы, лица и зубовъ, или когда появилась желтуха и *Merc.* противъ этого оказался неудовлетворительнымъ. **САЛСАВЕА** — при боли головной, ушной и въ членахъ, особенно, если эти страданія появлялись вслѣдствіе *перемежающейся лихорадки*, *скрывающейся* отъ злоупотребленія хины, и *Puls.* оказалась неудовлетворительною. **ФЕВУМ** — при отежной опухоли ногъ. *Ires.* са-

СУАННА въ *большой части случаев* *отначало* леченія, устраним недугъ. LACINERIS — во многихъ лихорадкахъ хроническихъ, противъ которыхъ было употреблено много хины, особенно послѣ PULS. MERCURIUS — при появившейся желтухѣ или другомъ какомъ-либо желчномъ недугѣ. PULSATILLA — при боли ушной, лобной, зубной и въ членахъ, особенно если эти страданія являются вслѣдствіе перемежающейся лихорадки, скрывшейся отъ злоупотребленія хины. VERATRUM — при холодѣ въ туловищѣ или членахъ, причѣмъ также замѣчаются холодный потъ, задержка мочи или поносъ.

§ 2. Если произошло злоупотребленіе хины съ цѣлію устранимъ перемежающуюся лихорадку, то лучшими средствами считаются слѣдующія:

Если лихорадка была действительно устранима: Arg., Ars., Bell., Calc., Carb.-v., Cin., Ferr., Ipec., Lach., Merc., Puls., Sulph. — Если лихорадка еще продолжается: 1) Ipec.; 2) Arg., Carb.-v., Lach., Puls.; 3) Arg., Cin., Veratr.; 4) Bell., Calc., Merc., Sulph.

См. *Перемежающіяся лихорадки, Воспаленіе печени, селезенки и другіе недуги, могущіе произойти отъ злоупотребленія хины.*

Холера и холерина, Cholera et Cholerina.

§ 1. Средства противъ различныхъ видовъ холеры: 1) Ars., Camph., Cupr., Ipec., Sec., Veratr.; 2) Bell., Canth., Carb.-v., Cham., Chin., Cic., Coloc., Dulc., Hyos., Lach., Laur., N.-vom., Op., Phos.-ac., Sulph.

§ 2. Противъ *спорадической холеры*, которая обыкновенно появляется во время лѣтнихъ жаровъ, употребляются преимущественно: Arg., Cham., Chin., Coloc., Dulc., Ipec., Merc., Veratr. — Противъ *азиатской* или *эпидемической*: Arg., Camph., Carb.-v., Cupr., Ipec., Sec., Veratr.; 2) Bell., Canth., Cham., Cic., Laur., Merc., N.-vom., Phos., Phos.-ac. — Противъ *холерина*, или поноса во время эпидеміи: Phos., Phos.-ac., и Sec. — Видъ холеры, происходящей отъ *отроченія и мѣла*: 1) Cham.; 2) Coloc., особенно тогда, когда кромѣ гнѣва большой испытываетъ досаду.

§ 3. При холерѣ *асфигтической* (съ прекращеніемъ пульса): 1) Arg., Camph., Veratr.; 2) Carb.-v., Kal.-hydros.; 3) Acon. —

При *цианотической* (сопровождаемой синевой покрововъ): 1) Camph., Veratr.; 2) Carb.-v., Kal.-hydroc., Sec.; 3) Arg., Ipec., Laur., Op.—
 При преобладанія *поноса*: 1) Arg., Veratr.; 2) Cupr., Ipec., Jatr., Phosph., Phos.-ac., Sec.; 3) Carb.-v., Cham., Dulc., Ferr., Merc., Sulph.; — *рвоты*: 1) Ipec., Veratr.; 2) Arg., Jatr., N.-vom.; — *судорогъ*: 1) Camph.; 2) Cupr., Ipec., Ser., Veratr.; 3) Cham., Coloc., Laur., Op..

§ 4. При отдѣльно выстоящихъ принадлегахъ, въ случаяхъ не настоящей холеры (Cholerae). При *трудности дыханія* и *стѣсненіи груди*: 1) Carb.-v.; 2) Acon., Chin., N.-vom., Sulph.; 3) Bell., Bry., Rhus.—При *судорогахъ живота*: 1) Cham., Veratr.; 2) Camph., Coloc.; 3) Arg., Cupr., N.-vom., Op.. — При *поносѣ*: 1) Veratr.; 2) Ipec.; 3) Arg., Phosph., Phosph.-ac., Sec.; 4) Carb.-v., Cham., Coloc., Cupr., Ferr., Merc., Sulph.. — При *рвотѣ*: 1) Ipec., Veratr.; 2) Arg., Carb.-v., N.-vom.—При *лихорадочномъ приступѣ*: 1) Acon.; 2) Bell.. — Противъ *страха и тоски*: 1) Arg., Veratr.; 2) Acon., Calc., Ign.; 3) Carb.-v., Ipec., Lach., Op.. — При *гастрическихъ страданіяхъ*, потерѣ аппетита, тошнотѣ и пр.: 1) Ipec., Veratr.; 2) Ign., Merc., N.-vom., Puls.; 3) Bell., Bry., Carb.-v., Rhus, Sulph.; 4) Bell., Bry., Carb.-v., Rhus, Sulph..—При *желудочной боли*: 1) Camph.; 2) Bell., Veratr.; 3) Bry., Hyosc., Ign., N.-vom.. — При *утомленіи и слабости*: 1) Chin.; 2) Arg., Carb.-v., Ferr., Veratr.; 3) Ign., Ipec., N.-vom.—При *головокруженіи*: 1) Camph.; 2) Bell.; 3) Hyosc., Lach., N.-vom., Op.. — При *судорогахъ шрѣ*: 1) Cupr.; 2) Camph., Veratr.; 3) Coloc..

§ 5. Противъ послѣдствій холеры вообще употребляли слѣдующія средства: Acon., Bell., Bry., Canth., Carb.-v., Chin., Hyosc., Op., Phos.-ac., Rhus, Stram., Sulph.. — Противъ пораженія *мозговой системы* въ особенности: Bell., Lach., Op., Acon., Hyosc., Stram.; — *воспалительныхъ болѣзней*: Acon.; — *гастризма* или страданій живота: Bell., Bry., Carb.-v., Merc., Rhus, Sulph.; — *тошноты* въ особенности: Carb.-v., N.-vom.; — *общей слабости*: Chin.; — *грудиныхъ страданій*: Acon., Bell., Bry., Carb.-veg., Rhus, Sulph.; — *слабости кишечнаго канала*: Phosph., Sulph.; — *тифозныхъ страданій*: Bell., Bry., Carb.-veg., Coss., Hyosc., Op., Phos.-ac., Rhus, Stram..

§ 6. Относительно показаній, опредѣляемыхъ симптомами, нужно замѣтить преимущественно:

АДВЕНИСІУМ — если вначалѣ появляются опасные симптомы, и особенно когда замѣчаются: сильныя боли живота, *большая жажда и жжение въ надчревіи, какъ-будто отъ раскаленныхъ углей*; гичая и неутолимая жажда, которая заставляетъ больного пить что-то, но понемногу постоянная тошнота, *поносъ, смѣлая рвотъ веществами желчными, или слизистыми, зеленоватыми, тенистыми и коричневатыми*; рвота, появляющаяся тотчасъ послѣ еды самаго малаго количества жидкости; сухость губъ и языка и грещивы на нихъ; *безпокойный сонъ; метаніе въ разныя стороны, желобы, рыданія, тоска и страхъ смерти*; быстрый упадокъ силъ и совершенную *изнеможенія*; *инкротическое лицо, впалыя щеки, и острый носъ, впалые и тусклые глаза*; *малый, слабый, перемжающийся или дрожащій пульсъ*; тоническія судороги въ пальцахъ рукъ и ногъ; *ледяной холодъ кожи и клейкій потъ.*

САМРОВА — преимущественно вначалѣ болѣзни, и когда и обнаруживается ни *жажды*, ни *рвоты*, ни *поноса* и замѣчается быстрый упадокъ силъ, такъ что больной не въ состояніи вращ держаться; *блуждающій взоръ и впалые глаза; синеватый цветъ и ледяной холодъ лица и рукъ, совмѣстный съ теплотою во всемъ тѣлѣ*; *безутышная тоска и страхъ задохнуться*; больной, полурдуренный и нечувствительный, хриплымъ голосомъ *вздаетъ крики и вздохи, ни на что опредѣленное однакожъ не жауется*; если его спросать, то онъ жауется на *жгучую боль въ желудкѣ и горлѣ, судороги въ икрахъ и другихъ мускулахъ* и сильно кричитъ при ощупываніи *подъ ложечкою*; если же появились поносъ и рвота съ жаждою, то *камфора рѣдко бываетъ прилична*, но она всегда имѣетъ мѣсто, когда замѣчаются: *блѣдный цвѣтъ и ледяной холодъ въ членахъ, въ лицѣ и языкѣ*; тоническія и болѣзненные судороги въ членахъ и икрахъ, *притупленіе чувствъ, вздоги и стоны, столбнякъ и сжатіе челюстей.*

СУРБУМ — когда кромѣ рвоты и поноса замѣчаются: *конвульсивное движеніе членовъ, особенно пальцевъ рукъ и ногъ*, иногда сопровождаемое *движеніемъ глазнаго яблока*; большое *безпокойствіе и холодъ въ выпуклыхъ частяхъ лица*; *давящая боль подъ ложечкою, усиливающаяся при дотрогиваніи*; *судорожная колика безъ рвоты*, или же рвота съ *предшествующимъ ей судорожнымъ стѣгиваніемъ груди, которое захватываетъ дыханіе*; или рвота, со-

провожаемая сильною болью въ надчревной части; слышимое во время питья опусканіе жидкости по пищепріемному горлу.

Ірвасуанна—въ менѣе опасныхъ случаяхъ и болѣею частью вначалѣ, когда замѣчаются: *чувство мягкости въ желудкѣ, ознобъ, идущій отъ желудка или внутренностей брюшныхъ, или холодъ въ лицѣ и членахъ; когда рвота преобладаетъ, или если она смѣняется водянистымъ поносомъ, сопровождающимся болью живота; при желтоватомъ поносѣ безъ рвоты, но съ судорогами въ икрахъ, пальцахъ рукъ и ногъ; вообще Ірес. имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ рвота или поносъ появляются въ самомъ началѣ болѣзни, или если они еще продолжаютъ даже, когда поправилось общее состояніе больного. Ірес. вовсе неумѣстна, если болѣзнь является во всей своей силѣ.*

Свсале совнutum—если рвота появилась, но испражненія всетаки не окрашиваются, и все указываетъ еще на недостатокъ желчи въ кишкахъ; при боли въ конечностяхъ, испражненіяхъ въ видѣ поноса, коричневатыхъ съ охlopьями и безцвѣтныхъ, сопровождаемыхъ быстрымъ истощеніемъ силъ, ледянымъ холодомъ конечностей, языкомъ чистымъ или мало обложеннымъ бѣлою слизью, и если испражненіямъ на низъ предшествуютъ головокруженіе, тоска, судороги въ икрахъ, перекачиваніе въ животѣ и тошнота.

Веватрум—главное средство во всѣхъ случаяхъ холеры, *выражающейся обильными испражненіями, рвотою и поносомъ, ледянымъ холодомъ конечностей, болшаю слабостію и судорогами въ икрахъ; если кромѣ этого имѣются: рвота, повторяющаяся въ видѣ толчковъ; испражненія низомъ внезапныя, обильныя, водянистыя, безъ запаха, и смѣшанныя съ бѣлыми охlopьями; блѣдность и безцвѣтность лица; синеза вокругъ глазъ; черты лица, выражающія смертельную тоску; холодныя дыханіе и языкъ; сильная тоскливость въ груди сильнѣйшая колѣна, особенно вокругъ пупка, какъ-будто животъ разрывается; чувствительность живота при движеніи; потягиваніе и судороги въ пальцахъ; морщинистая кожа на ладонной поверхности рукъ; задержанное отдѣленіе мочи.*

§ 7. Изъ прочихъ сказанныхъ средствъ:

Видларонна—при тифовныхъ симптомахъ, слизечномъ со-

стойки съ полуоткрытыми и полуплывающими глазами; скрижетъ зубовъ и искривленіи чертъ лица, или при большомъ безпокойствѣ, попыткахъ убѣжать, покалываніяхъ въ боку или жгучей боли въ животѣ; при этомъ: жгучій жаръ съ краснотой въ лицѣ и жажда на холодное питье; ускоренный и болѣе или менѣе полный, но не твердый пульсъ. **САНТНАВІС** — если поражаются преимущественно мочевые пути и замѣчается сильное жженіе въ надчревной части, ворчаніе и перекатываніе въ животѣ, кровавистое испраженіе съ натугами, жаръ въ животѣ и большое безпокойство вмѣстѣ съ церебральными припадками. **САВВОУЕГТАВИЛІС** — при параличѣ, совершенно исчезнувшій пульсъ, или когда, по превращеніи рвоты или поноса и судорогъ, появляются приливы крови къ груди, спячка, липкій потъ и краснота щекъ. **СНАМОМІЛЛА** — вначалѣ болѣзнь, или въ періодѣ предвѣстниковъ, и особенно, когда замѣчаются: языкъ, обложенный желтоватою слизью, колика около пупка, давленіе около желудка, простирающееся до сердца, необыкновенная тоска, судороги въ глазахъ, водянистый поносъ и кислая рвота. **СНИНА** — противъ *ліэнтерімъ и рвоты прихватою пищею*; при болѣзненномъ давленіи въ животѣ послѣ самаго умѣренного стола, съ тоскливостію въ груди и отрыжкою, приносящею нѣкоторое облегченіе; потерѣ аппетита какъ-бы отъ сытости и япократическомъ лициі истощеніи до обморока. **СІСУТА** — если поносъ незначителенъ, рвота же сопровождается сильными, тоническими судорогами грудныхъ мышцъ, причемъ больной намѣняется въ лицѣ и закатываетъ глаза вверхъ; при спячкѣ съ открытыми глазами, грусти, приливѣ крови къ головѣ и груди; рвотѣ или поносѣ. **СОЛОСІТНІС** — при постоянной рвотѣ, сначала принятою пищею, потомъ зеленоватыми веществами; сильной коликѣ, задержанномъ отдѣленіи мочи, судорогахъ въ глазахъ и обильныхъ испраженіяхъ въ видѣ поноса, которыя всякій разъ становятся водянистыѣ и безцвѣтныѣ. **ДУЛСАМАВА** — противъ вида холеры, происшедшей отъ холоднаго питья и сопровождающейся рвотою принятымъ питьемъ и желчными, зеленоватыми или желтоватыми и слизистыми веществами, или же обильными зеленоватыми испраженіями; чувствительности живота; кженіи и втягиваніи желудка; большой слабости; совершенно почти угнетенномъ пульсѣ; холодѣ конечностей; жгу-

чей жаждѣ; необыкновенномъ разслабленіи. НУОВОСТАМУС — если по прекращеніи рвоты, поноса и ледяного холода, появляются тифозные симптомы: притушеніе чувствъ, блуждающій взглядъ, краснота и жаръ въ лицѣ, и если Bell. противъ этого состоянія оказалась неудовлетворительною. КАЛІ НУДРОСТАНИСІУМ — въ особенности при асфиктической и кивнотической холерѣ, когда Veget. и Arg., а также и Camph., оказались безуспѣшными. ЛА СНЕВИС — если Bell., Нуов. или Ор. оказались неудовлетворительными противъ состоянія одурѣлости и тифозныхъ симптомовъ послѣ холеры. ЛА ДУОСЕВАСІУС — при ревматическихъ боляхъ въ конечностяхъ и туности слуха; искривленія чертъ лица и чувствъ стягиванія горла при глотаніи. НУХ ВОМІСА — когда испраженія необильны, и если вмѣсто ихъ замѣчается *только частое помужденіе на низъ съ незначительнымъ испраженіемъ, или же тиетный позывъ*; при спазмахъ желудка, большой слабости, тоскливости подъ ложечкою, давящей боли въ затылкѣ и ознобѣ болѣе внутреннемъ, нежели наружномъ. ОРІУМ — если по превращеніи собственныхъ, первоначальныхъ холерныхъ симптомовъ наступаетъ состояніе одурѣлости или спячка, и если противъ всего этого Bell. и Нуов. оказались неудовлетворительными. РНОСРНОУС — противъ поноса, появляющагося во время эпидемической холеры и если эта холерина сопровождается сильною жаждою, ворчаніемъ и перекачиваніемъ въ животѣ и большою слабостію. РНОСРНОВІ АСІДУМ — противъ сказаннаго поноса, сопровождающагося безцвѣтностію, блѣдностію лица, чувствомъ сжиманія въ головѣ и *липкостью языка, такъ что приложенный палецъ пристаётъ къ нему*; при перекачиваніи и ворчаніи въ животѣ, испраженіяхъ зеленоватыхъ, водянистыхъ и слизистыхъ и прекратившемся отдѣленіи мочи.

Ц.

Цынга, скорбутъ, Scorbutus.

Главными средствами противъ различныхъ цынготныхъ страданій, во сдѣланныхъ опытахъ и наблюденіяхъ, считаются: 1) Асп.,

Amn.-m., Merc., Mur.-ac., N.-vom., Staph., Sulph.; 2) Arg., Canth., Carb.-an., Caust., Cist., Herp., Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Ser., Sulph.-ac..

О прочемъ см. *Болезни десенъ и Язы.*

Ч

Чай, вредныя послѣдствія отъ злоупотребленія его.

Предпочтительныя средства: 1) Ferr., Selen., Thuja.; 2) Chin., Coff., Lach., Veratr..

Чахотка дыхательныхъ вѣтвей, Phthisis bronchialis et trachealis.

Средства: 1) Arg., Calc., Carb.-veg., Caust., Cist., Phosph.; 2) Dros., Herp., Kreos., Led., Mang., Nitr.-ac..

О прочемъ см. *Озриплость, Кашель, Катарръ, Воспаленіе горла.*

Чахотка легочная, Phthisis pulmonum.

§ 1. Средства вообще: 1) Calc., Herp., Kal., Lyc., Phosph., Pulv., Stann., Sulph.; 2) Arg., Chin., Dros., Ferr., Jod., Lach., Nitr., Nitr.-ac., Ser., Sil.; 3) Bry., Carb.-veg., Con., Dulc., Herp., Kreos., Laur., Led., Merc., Natr.-m., Phosph.-ac., Samb..

§ 2. При *скоротечной чахоткѣ* (Phthisis florida), которая иногда развивается вслѣдствіе *слишкомъ и дурнолечимаго оосталенія легка*, или вслѣдствіе *сильнаго кровотеченія изъ вѣтъ*: 1) Lyc.; 2) Ferr., Herp., Lach., Merc., Sulph.; 3) Dros., Dulc., Laur., Led., Puls..—*Нагноеніе легка* вслѣдствіе *злоупотребленія ртути*: 1) Carb.-veg., Guaj., Herp., Lach., Nitr.-ac., Sulph..—*Чахотка каменотеса* требуетъ: Calc., Herp., Lyc., Sil..

§ 3. Противъ *бугорчатки*, или *летучей чахотки съ туберкулами*, средства вообще: 1) Herp., попеременно съ Spong.; 2) Calc., Kal., Lyc., Phosph., Puls., Stann., Sulph.; 3) Arg., Brom., Carb.-veg., Jod., Kreos., Lach., Merc., Nitr.-ac., Samb., Sil.. При *явленияхъ перваго періода*, когда бугорки еще въ сыромъ состояніи, или

когда они начинают воспаляться и размягчаться: 1) Нер., Phosph., Speng., Sulph.; 2) Amm., Calc., Carb.-veg., Lyc., Nitr.-ac.; 3) Acon., Arn., Ars., Bell., Dulc., Ferr., Hyos., Kal., Merc., Nitr., Stann., Sulph.-ac.—Во второмъ периодѣ, при изверженіи *мокрой мокроты*: 1) Calc., Нер., Kal., Sil, Speng; 2) Bry., Lyc., Phosph., Pula., Ser., Sulph.; 3) Carb.-v., Chin., Con., Dros., Ferr., Lach., Merc., Nitr.-ac., Phos.-ac., Stann.—При такъ называемой *слизистой чахоткѣ*, т. е. обильномъ изверженіи туберкулезной слизи (Phthisis mucosa, а. Bledorrhoea pulmonum): 1) Dulc., Нер., Lach., Merc., Seneg., Ser., Stann., Sulph.; 2) Ars., Calc, Carb.-veg., Chin., Croc., Dig., Lyc., Phosph., Puls., Sil., Zinc..

§ 4. Относительно показаній для выбора изъ вычисленныхъ средствъ, нужно имѣть въ виду:

АСОНИТУМЪ назначается вначалѣ леченія возникающей чахотки, именно при частомъ напорѣ крови къ груди, сопровождающемся короткимъ кашлемъ, кровохарканіемъ и склонностію къ воспаленію легкихъ.

АММОНИУМЪ — если мокрота слизистая и кровянистая, и если при этомъ замѣчаются сильная тоскливость въ груди и короткое дыханіе.

ВЕЛЛАДОННА — для золотушныхъ дѣтей, страдающихъ кашлемъ по ночамъ, короткимъ дыханіемъ, слизистымъ хрипомъ, или для молодыхъ дѣвицъ въ періодѣ формировація (послѣ Bell., Нер., Lach., Phosph., Sil.).

ВРУОНІА въ очень многихъ случаяхъ втораго періода, попеременно съ Puls.

САЛСАФИА — составляетъ одно изъ главныхъ средствъ въ періодѣ отдѣленія гнойной мокроты, особенно если Sulph. или Nitr.-ac. совершили уже свое дѣйствіе, или также въ *первомъ періодѣ*, преимущественно для молодыхъ полнокровныхъ людей, часто страдающихъ приливами крови, кровотеченіемъ изъ носу, а также для молодыхъ дѣвицъ, у которыхъ регулы слишкомъ обильны и слишкомъ часто появляются. (Послѣ Calc. часто умѣстны Lyc., Sil., Nitr.-ac.).

САВВО ВЕГЕТАВІЛІВЪ — когда кашель бываетъ сильный, судорожный, то сухой и болѣзненный, то гнойный, слизистый и смѣшанный съ бугорковатымъ веществомъ.

СНИНА—если больной страдалъ частыми, сильными кровотечениями изъ легкихъ, или былъ ослабленъ кровопусканіями. (Послѣ Chin. въ этомъ случаѣ часто умѣстно Ferr.).

ДВОСВѢА, при очень сильномъ кашлѣ у молодыхъ людей, съ изверженіемъ кровавистой гнойной мокроты и сильными болями въ груди.

ДУЛСАМАВА—при большой склонности къ простудѣ, или если частая простуда способствовала скорѣйшему развитію болѣзни.

ГВВУМ—если болѣзнь развилась вслѣдствіе воспаления легкихъ или дурно лечимаго катарра, и вообще тамъ, гдѣ кромѣ симптомовъ чахотки замѣчаются еще одышка и рвота принятой пищею или лиентерія. (Въ этомъ случаѣ Chin. также очень полезна).

НИРАВ—для дѣтей или молодыхъ золотушныхъ субъектовъ въ первомъ періодѣ болѣзни (часто послѣ Bell. также попеременно съ Merc., или Sil.).

ЮДИУМ,—особенно у золотушныхъ, во многихъ случаяхъ попеременно съ Нер., Arg., или Sulph..

КАЛІ САВВОНІСІУМ—средство важное не менѣе Calc., какъ противъ начинающейся, такъ и развивающейся чахотки, особенно послѣ дѣйствія Nitr.-ac. или Sil., или если у больного замѣчается припухлость вадъ глазами или между бровями.

ЛАСНЕСІВ—въ особенности послѣ Bell., Нер., Sil., или попеременно съ этими средствами.

ЛУСОРОДИУМ составляетъ одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ, если развилась инурительная лихорадка съ кашлемъ и гнойною мокротою вслѣдствіе сильного или дурнолечимаго воспаления легкихъ, или противъ начинающейся, даже развившейся бурчатой чахотки съ кровавистою или гнойною мокротою. (Часто прилично послѣ Calc., Sil., Phosph., или попеременно съ ними).

НИТРИ АСІДУМ—преимущественно вначалѣ болѣзни, передъ употребленіемъ Kal, особенно для людей съ темными волосами и нѣсколько желтоватымъ цвѣтомъ лица и склонныхъ къ поносу.

РНОСРНОВУВ—средство столько же важное, сколько и Calc., Kal., Sil. какъ отъ начинающейся, такъ и отъ развившейся чахотки, особенно для людей кудощавыхъ, бѣлокурыхъ, высокорослыхъ, очень похотливыхъ, а также для дѣтей и молодыхъ дѣвицъ

нѣжнаго рѣдсложенія, у которыхъ замѣчаются сухой, короткий кашель, короткое дыханіе, необыкновенная худоба тѣла, *отсыпь подъ глазами*, расположеніе къ поносу или поту. (Приличенъ въ особенности послѣ Bell. или попеременно съ Lys. или Sil.)

Pulsatilla мало наслѣдована, однакожь хорошо дѣйствуетъ въ гнойномъ періодѣ болѣзни, у молодыхъ, хлоротичныхъ дѣвушекъ.

Samucus—если болѣзнь сопровождается сильнымъ изнурительнымъ потомъ, или припадками удушья. (Часто приличенъ послѣ Arg. или попеременно съ нимъ),.

Silicea — почти при такихъ же условіяхъ, какъ и Phosph., и въ большей части случаевъ начинающейся и развившейся чахотки, особенно послѣ Lys., Phosph., Ner., или Calc..

Stannum — если мокрота совершенно гнойная, то рѣдко это средство умѣстно; но оно предпочитается всѣмъ другимъ, если въ первомъ періодѣ чахотки извергается обильная, слизистая мокрота, равно если дурно лечимый катарръ угрожаетъ переходомъ въ чахотку.

Sulphur — не только во всѣхъ случаяхъ *нагноенія легкихъ*, слѣдовавшаго послѣ сильнаго воспаления ихъ, но даже противъ бугорчатки въ періодѣ отдѣленія гнойной мокроты, и противъ начинающейся чахотки, съ тѣмъ условіемъ, чтобы сильные припадки воспаления легкихъ были устранены другими средствами (Acon., Bry., Phosph.) и чтобы давать ее въ единственномъ приемѣ, котораго дѣйствія слѣдуетъ выжидать нѣсколько недѣль.

При леченіи бугорчатой чахотки, должно строго выбирать средства, потому что здѣсь неумѣстныя производятъ сильное раздраженіе, вслѣдствіе котораго скрытые туберкулы воспаляются и причиняютъ весьма неблагоприятныя припадки. Поэтому здѣсь нужно: 1) чтобы избранное средство дѣйствительно было самое приличное и даваемо въ единственномъ приемѣ, котораго дѣйствія слѣдуетъ выжидать по нѣсколькимъ дней или недѣль; 2) не прежде приступать къ повторенію приема, пока не найдемъ рѣшительное для этого показаніе.

О другихъ указаніяхъ на приличные средства или показаніяхъ

для нихъ см. *Удушье, Приемъ крови къ груди, Камарръ, Кашель, Воспаленіе легкихъ.*

Чесотка, Scabies.

§ 1. Средства: 1) Merc., Sulph.; 2) Carb.-veg., Caust., Clem., Ner., Lach., Lys., Rhus, Ser., Veratr..

§ 2. При *сухой* чесоткѣ вначалѣ назначаютъ попеременно Merc. и Sulph., давая всякія 4, 6, 8 дней по одному приему того или другаго средства до-тѣхъ-порѣ, пока не наступитъ улучшение, или не измѣнятся симптомы. Вслучаѣ улучшения ничего не предпринимать, а если оно прекратится, или симптомы примутъ другой видъ, то большею частію назначаютъ Carb.-veg. или Ner., когда чесотка сохранила *сухую, просовидную* форму, или Caust., когда къ ней присоединяются *пустулы*; страданія, остающіяся послѣ Carb.-veg., или Ner., часто удаляются посредствомъ Ser., или Veratr..

§ 3. При *желтоочивой или пустулезной* чесоткѣ, вначалѣ леченія, назначаютъ попеременно Sulph. и Lys.. Если же ни то, ни другое не произведетъ перемѣны впродолженіе 15 или 20 дней, или пустулы будутъ очень толсты, то предпочитается Caust., который принимается по 2, 3, 4 приема, смотря по обстоятельствамъ, но такъ, что 2-й приемъ дается чрезъ 12 часовъ послѣ 1-го, 3-й чрезъ 24 часа послѣ 2-го, а 4-й чрезъ 48 часовъ послѣ 3-го. Если къ концу 3-го дня, послѣ 4-го приема, еще не обнаружится излеченія, то окажутъ большую пользу нѣсколько приемовъ Merc., по одному всякіе 48 часовъ. Если при этомъ видѣ чесотки образуются *язвочки*, то предпочитаютъ Clem. и Rhus.—Если пустулы переходятъ въ большіе *желтоватые или синеватые пузырьки*, то лучшее средство Lach..

§ 4. Чесотка, переродившаяся вслѣдствіе злоупотребленія ма-

вей, требуютъ: 1) Merc., Caust.; 2) Calc., Dulc., Nitr.-ac., Puls., Selen., Ser., если при леченіи ея было употреблено много сурь; а если въ то же время было употреблено много ртути, то назначается Chin. попеременно съ Caust. и послѣ нихъ сейчасъ вычисленные средства.—Чесоточная сыпь, известная подъ именемъ *чесотки лямбликовъ*, обыкновенно требуетъ: 1) Sulph., Lyc.; 2) Calc., Dulc., Rhus, Graph..

§ 5. Впрочемъ, на практикѣ распознаваніе чесотки чаще всего бываетъ ошибочно. Врачи обыкновенно принимаютъ за чесотку всякую сыпь, сопровождающуюся ночнымъ зудомъ и жгучимъ свербеженіемъ, импетигнозную или экзематозную, если она занимаетъ мѣста, свойственныя чесоткѣ, не безпокоясь о томъ, находится ли въ данномъ случаѣ вѣрнѣйшій діагностическій признакъ чесотки,—клевъ чесоточный (*Acarus scabiei*), или нѣтъ. Мнѣ самому случилось видѣть, что даже хорошіе практикы, не вѣрившіе въ существованіе клева, принимали за чесотку сыпь, развившуюся между пальцами, въ крыльцовой впадинѣ и складкахъ живота, вслѣдствіе укушенія насѣкомыми или отъ неопрятности, и имѣвшую всѣ качества чесотки, кромѣ клева; они основывали свое распознаваніе только на томъ, что сыпь эта никого изъ членовъ семейства не заразила, несмотря на продолжительное ея существованіе. При настоящей чесоткѣ (*Scabies vera, s. asarosa*), всегда Sulph. составляетъ необходимое средство, обнаружится ли она подъ видомъ просовидной, или пустулезной сыпи, и желательнее, чтобы авторы въ своихъ исторіяхъ болѣзней всегда сообщали, съ какою именно чесоткою они имѣли дѣло, съ настоящею, или другою какою-либо. Правда, что, какъ по опытамъ оказалось, одна только сѣра въ состояніи убивать чесоточный клевъ, но всетаки можно допустить, что наприм. Caust., Merc. и другіе могутъ придать испаринѣ такое качество, которое убивало бы это животное, составляющее причину, а не слѣдствіе болѣзни. Между прочимъ я знаю одинъ случай, гдѣ у одного молодого человѣка, вслѣдствіе того, что онъ спалъ въ дорогѣ на неопрятной постели, развилась сыпь, которая была признана за настоящую чесотку, но была излечена безъ всякихъ послѣдствій частыми омовеніями, смѣсью изъ табачнаго соку и укуса.

Допустимъ, что изложенный здѣсь взглядъ на чесотку спра-

ведявъ, мы нѣсколько не имѣли Ганеманновой теоріи о чесотѣ, и въ такомъ случаѣ все, что было сказано о дурно распознанной, настоящей чесоткѣ слѣдовало бы исключительно отнести къ такъ называемой Scabies frontanea или къ цѣлому ряду чесотообразныхъ экземъ и импетигинозныхъ сыпей. Впрочемъ немало такихъ примѣровъ, гдѣ сыпи, признанныя за чесотку, излечивались однимъ наружнымъ употребленіемъ средствъ безъ дальнѣйшихъ дурныхъ послѣдствій. Вредныя послѣдствія такого леченія происходили отъ злоупотребленія сѣры или ртути, такъ что нельзя въ самомъ дѣлѣ отвергнуть возможности излеченія чесоточныхъ сыпей чисто наружнымъ способомъ. Остается рѣшить, какой именно видъ чесотки допускаетъ такое леченіе, и если мы примемъ, что это сыпь съ клещемъ, то нельзя сказать того же о другихъ видахъ сыпей, но кожахъ своими явленіями на первую, какъ на примѣръ о чесотообразныхъ импетигинозахъ и экземмахъ, принимаемыхъ до открытія клеща за чесотку, и очень легко можетъ быть, что дурныя послѣдствія, замѣченныя отъ наружнаго употребленія средствъ, могутъ относиться къ этимъ сыпямъ. Мы самому встрѣтались такихъ два примѣра, гдѣ послѣ экземы impetiginoides, которая была лечима однимъ наружнымъ средствомъ, остались значительныя припадки удушья и хроническое воспаленіе глазъ. Они отъ гомеопатическаго способа леченія исчезли, какъ скоро сыпь вновь открылась на рукахъ и между пальцами. Всегда, когда говорится о чесоткѣ, надобно прибавить прилагательное: импетигинозная, экзематозная или съ клещемъ; изъ этого произойдетъ та выгода для гомеопата, что противъ всякаго опредѣленнаго вида этихъ сыпей можно будетъ употребить приличное и вѣрное средство.

Итакъ, не разбирая природы чесотки съ клещемъ, примемъ слово: чесотка въ общемъ значеніи и скажемъ, что здѣсь всегда можно найти приличное средство, если только обращено вниманіе на посторонніе симптомы и отличительныя признаки сыпей. Поэтому при *чесотообразныхъ сыпяхъ* (характеризующихся свойственнымъ имъ зудомъ и развитіемъ въ складкахъ сочлененій на рукахъ, преимущественно между пальцами) приличнѣйшія средства: 1) Sulph.; 2) Carb.-v., Caust., Merc., Selen., Sep., Sulph.; 3) Ant., Ars., Lach., Veratr.—При сыпи, *легко крошечной*: 1) Merc. 2) Calc., Dulc., Sulph.—При сыпи *сухой и просовидной*:

Carb.-v., Merc., Ser., Sil.—При *ламоточивой* мокрой: 1) Carb.-v., Graph., Lyc., Sulph.; 2) Caust., Clem., Kreos., Ser., Staph.— При *пустулезной* сыпи (такъ называемой *жирной* чесоткѣ): 1) Caust., Kreos., Merc., Ser., Sulph.; 2) Ant., Squill..

О прочемъ см. *Сыпи вообще и Лихам.*

Чиханіе оудорожное, Sternutatio spasmodica.—Главными средствами служить: 1) Carb.-v., Cin., Cop., Kal.; 2) Arg., Calc., Lach., Natr.-m., Rhuz, Sil., Staph., Sulph., Tart.— При *болезненномъ* чиханіи, сопровождающемся болѣзми въ различныхъ частяхъ тѣла: Arg., Arg., Bell., Bry., Carb.-v., Lyc., Merc., N.-vom., Puls., Rhuz, Sabad.;—при *быстро появляющемся и сильномъ* Асеп., Carb.-v., Caust., Natr.-m., Nitr.-ac., Sil..

Членовъ дрожаніе, Tremor artuum.

Здѣсь пригодны: 1) Calc., Dros., Ser., Sil., Sulph.; 2) Carb.-an., Coff., Cop., Huos., Lyc., Natr., Natr.-m., Petr.—Противъ *трясенія* рукъ у *неллихъ* преимущественно: Arg., Lach., N.-vom., Sulph..

Чума восточная, Pestis orientalis.—Наилучшими средствами противъ этой болѣзни, повидѣмому, служить: 1) Arg., Bell., Carb.-v., Chin., Rhuz; 2) Асеп., Bry., Her., Lach., Sil., Sulph..

III.

Шафранъ, вредныя отъ него послѣдствія.

При полныхъ отравленіяхъ *якъ*, по Герингу, лучшее средство: *черный кофе* въ видѣ питья въ обильномъ количествѣ, до наступленія рвоты, а отъ послѣдовательныхъ страданій: Ор.—Кромѣ того, противъ хроническихъ или укоренныхъ страданій, вслѣдствіе злоупотребленія шафрана: Асеп., Bell., Plat., Puls..

Испанскія мушки, отравленіе ими.

Главное средство при отравленіи большими пріемами составляетъ *камфорный спиртъ*, всякія 10—15 минутъ по 1 чайн., на сахарѣ. Притомъ *слизистое* питье и втираніе *камфоры*, если она

жестя нужнымъ. Противъ страданій, происходящихъ отъ злоупотребленія шпанскихъ мушекъ въ видѣ наривнаго пластыря: Acon., Puls..

Э.

Экцема, Екзема.

Средства противъ этой сыпи: 1) Acon., Bell., Dulc., Merc., Phosph.; 2) Arg., Aug., Carb.-v., Clem., Con., Rhus, Sulph.; 3) Aug., Carb.-a., Con., Her., N.-jugl., Petr., Zinc.; 4) Bry., Camph., Canth., Kal.-bi., Nitr., Oleand., Ran.-sc., Ser., Staph., Thuj.— При *микродочной* экцемѣ: (*E. acutum, febrile*): 1) Acon., Bell., Dulc.; 2) Merc., Petr., Phosph.— При *хронической* (*E. chronica*): Clem., Dulc., Merc., Phosph., Sulph.;— при *простой* (*E. simplex*): Clem., Dulc., Merc., Phosph., Sulph.— При *желтой*, развивающейся обыкновенно у стариковъ (*E. sicridum, s. senile*): Aug., Phosph., Staph., Sulph.— При *меркуриальной* (послѣ злоупотребленія ртутью): 1) Chin., Her., Sulph.; 2) Acon., Bell., Dig.— При экцемѣ отъ *солнечнаго жара* (*E. solare*): 1) Acon., Bell., Camph.; 2) Clem., Hyos.— Противъ *интимозной формы*: (*E. impetiginoides*): 1) Carb.-v., Con., Rhus, Zinc.; 2) Aug., Caust., Clem., Sulph., Sil.; 3) Bell., Con., Merc., Rhus.— При *дитячской* (*E. infantile*): Acon., Bell., Dulc., Phosph., Sulph.— Противъ *красной* (*E. rubrum*): 1) Arg., Aug., Dulc., Merc., Sulph.; 2) Acon., Chin.

Впрочемъ см. *Сыпь острая, микродочная и Лишай*.

Я.

Ядъ рыбій, ядовитыя рыбы и раковины.

При отравленіи ракоемнами, первое средство, по Герингу, *мелко столченный древесный уголь, смѣшанный съ сиропомъ или сахаромъ*; послѣ можно дать нюхать *камфору* и пить *черный кофе*.— При отравленіи *ядовитой рыбою*, дается *столченный древесный уголь, смѣшанный съ водою*; если же это средство окажется неудовлетворительнымъ, или если *черный кофе* не приноситъ облегченія,

то дають въ большомъ количествѣ сахаръ или очень сладкую сахарную воду; если и это не помогаетъ, то часто уксусъ, смѣшанный по-ровну съ водою, оказываетъ много пользы.—Если послѣ отравленія ядовитою рыбою или раковинами, появляется сыпь, или краснота на козѣ, какъ при скарлатинѣ, съ опухолью на лицѣ, болью горла и т. д., то большую пользу приносятъ Bell.

Ядъ сапной, дурныя отъ него послѣдствія.

Лучшія средства по Герингу: 1) Arg., Phos.-ac.; 2) Calc., Sulph.

Язвы, Ulcera.

§ 1. Всѣ язвы, какъ извѣстно, находятся въ тѣсной связи съ различными дискразіями и общимъ болѣзненнымъ состояніемъ организма, поэтому при леченіи ихъ выборъ средствъ долженъ зависѣть отъ степени болѣзненныхъ явленій и нарушенныхъ отравленій въ цѣломъ организмѣ. Не менѣе того нужно обращать вниманіе на строеніе, видъ и другія качества язвъ. Въ этой статьѣ мы изложимъ показанія для выбора средствъ, выводимыя изъ свойства самихъ язвъ. Средства противъ различныхъ ихъ видовъ, дознанныя опытомъ и частыми наблюденіями вообще: 1) Arg., Aza., Ner., Lach., Lys., Merc., Puls., Sil., Sulph.; 2) Arg., Bell., Bry., Calc., Canth., Carb.-v., Cham., Chel., Con., Cupr., Graph., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Rhus, Sep., Staph., Thuja.

§ 2. Относительно дискразій, которыми язвы обуславливаются, нужно имѣть въ виду: при атоническихъ язвахъ, которыя встрѣчаются у людей кахектическихъ и на голени преимущественно (ulcera atonica pedum): 1) Arg., Lach., Sil., Sulph.; 2) Calc., Carb.-v., Graph., Ipec., Lys., Mur.-ac., Natr., Phos.-ac., Puls., Ruta. — При артритическихъ (ulcera arthritica): 1) Bry., Chin., Lys., Sulph.; 2) Calc., Graph., Rhus, Staph. и другія, изложенныя при ломотѣ. При импайныхъ, находящихся въ связи съ этими или другими сыпями (ulcera impetiginosa): 1) Calc., Clem., Graph., Lys., Merc., Rhus, Sep., Sil., Sulph., Zinc. и другія, изложенныя въ статьѣ: Лишай. — При цыготныхъ (ulcera scorbutica): 1) Arg., Carb.-an., Carb.-v., Lach., Merc., Mur.-ac., Staph., Sulph.; 2) Ашм., Амм.-т., Аза., Clem., Con., Нер., Phosph., Sep., Sil., Thuja. — При золо-

туловища (ulcera scrophulosa): 1) Ars., Bell., Calc., Carb.-v., Lyc., Mur.-ac., Sil., Sulph.; 2) Aur., Cist., Graph., Hep., Lach., Phosph.—
 При *сифилистическихъ* (ulcera syphilitica): 1) Merc.; 2) Aur., Carb.-v., Lach., Nitr.-ac., Thuj.. — При *меркуриальныхъ*: Asa., Aur., Bell., Carb.-v., Hep., Lach., Lyc., Nitr.-ac., Phos.-ac., Sassa., Ser., Sil., Sulph..

§ 8. Относительно строения и вида язвъ, надобно замѣтить:

При *свищевыхъ* (U. fistulosa, v. sinuosa): 1) Ant., Calc., Lyc., Phosph., Sil., Sulph.; 2) Asa., Bell., Carb.-v., Caust., Con., Nitr.-ac., Puls., Ruta;—*плоскихъ, поверхностныхъ*: 1) Lach., Merc., Nitr.-ac., Thuj.; 2) Ars., Asa., Bell., Lyc., Phos.-ac., Puls., Ser., Sil.;—*твердыхъ, съ краями твердыми, мозолистыхъ* (U. callosa): Ars., Asa., Carb.-v., Calc., Hep., Lac., Lyc., Merc., Petr., Ser., Sil., Sulph.;—*кариозныхъ, происходящихъ отъ дотождн* (U. cariоза): 1) Asa., Lyc., Merc., Sil.; 2) Aur., Calc., Hep., Phos.-ac., Ruta, Sabin., Sulph.;—*клеточныхъ только форму рака, но не его свойства*: 1) Ars., Con., Lach., Merc., Sil., Sulph.; 2) Aur., Bell., Calc., Clem., Hep., Nitr.-ac., Ser., Sil., Squill., Staph.;—*зубчатыхъ, фунговныхъ, съ нарощеніями* (U. fungosa): 1) Ars., Carb.-v., Lach., Merc., Petr., Ser., Sil., Sulph.; 2) Carb.-v., Cham., Clem., Phosph., Staph., Thuj.;—*съ сазыми дномъ*: 1) Ars., Hep., Merc., Sabin.; 2) Cupr., Kreos., Nitr.-ac., Sulph., Thuj.;—*зубчатыхъ*: 1) Lach., Merc., Nitr.-ac.; 2) Bell., Calc., Con., Lyc., Ser., Sil., Sulph.;—*черешчатыхъ*: 1) Merc., Sil.; 2) Ars., Calc., Sabad.;—*зубчатыхъ*: 1) Merc., Phos.-ac.; 2) Hep., Lach., Sil., Staph., Sulph.;—*бородячатыхъ*: 1) Ars. 2) Petr., Sil..

§ 4. Относительно вида и цвета язвъ, нужно замѣтить.

При *синеваыхъ*: 1) Asa., Aur., Con., Hep., Lach.; 2) Ars., Sil.;—*пятнистыхъ*: Ars., Con., Hep., Lach., Sulph.-ac.;—*зеленыхъ*: Calc., Carb.-veg., Puls., Sil.;—*сѣрыхъ*: Ars., Canth., Merc., Sil.;—*зеленоватыхъ*: Asa., Aur., Caust., Merc., Puls., Rhus, Sil.;—*мечетныхъ*: Lach., Merc., Nitr.-ac., Sabin., Thuj.;—*съ красною окружностію*: Ars., Asa., Calc., Cham., Hep., Lach., Lyc., Merc., Puls., Rhus, Sil., Staph., Sulph.;—*черноточныхъ*: Ars., Asa., Carb.-v., Ipec., Lach., Sec., Sil., Sulph.;—*бѣловатыхъ, бѣлопестистыхъ*: Ars., Lach., Merc., Sil..

§ 5. Относительно патологической деятельности язва, нужно замѣтить:

При легко кровоточивыхъ: 1) Ars., Carb.-veg., Нер., Kal., Lach., Lyc., Nitr.-ас., Phosph., Phos.-ас., Puls.; 2) Con., Sil., Sulph.; — *запиренныхъ*: 1) Ars., Bell., Chin., Lach., Sil.; 2) Con., Rhus, Sec., Squill.; — *сильно молящихся*: 1) Ars., Нер., Merc., Puls., Sil., Sulph.; 2) Aca., Chin., Con., Lach., Phos.-ас.; — *воспаленныхъ*: 1) Ars., Cham., Нер., Lyc., Merc., Phosph., Staph.; 2) Acon., Bell., Bry., Nitr.-ас., Puls., Rhus, Ruta, Sulph.; — *индолентныхъ*: 1) Ars., Carb.-veg.; Нер., Merc., Mur.-ас., Puls., Sil., Sulph.; 2) Amm., Amm.-т., Aca., Bell., Calc., Chin., Phos.-ас., Rhus; — *разъедающихъ смежные части* (*U. phagedaenica*): 1) Ars., Нер., Merc., Mez., Sil., Sulph.; 2) Carb.-v., Caust., Cham., Clem., Con., Graph., Nitr.-ас., Petr., Ran., Rhus, Ser.; — *язвы нечувствительныхъ*: 1) Carb.-veg., Con., Lyc., Phos.-ас., Ser., Sulph.; 2) Carb.-an., Cupr., Op., Sil. — При открывающихся рубцахъ: 1) Ars.; 2) Lach., Ser.; 3) Coloc., Crota.

§ 6. Наконецъ относительно болей и ощущеній, обнаруживающихся въ язвахъ, нужно замѣтить:

При очень чувствительныхъ вообще: 1) Ars., Carb.-veg., Graph., Нер., Sil.; 2) Arg., Aca., Bell., Lyc., Merc., Nitr.-ас., Phos.-ас., Puls.; — *большею частью*: Carb.-veg., Lach., Phos.-ас., Ser., Sulph.; — *зудящихъ или кусающихъ*: 1) Ars., Нер., Lyc., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; 2) Ant., Caust., Chin., Graph., Nitr.-ас., Phos.-ас.; — *сверлящихъ*: Arg., Bell., Natr.-т., Sil., Sulph.; — *жгучихъ*: Ars., Carb.-v., Merc., Mez., Puls., Rhus, Sil., Sulph.; — *чувствъ давления и напирания*: Caust., Con., Graph., Merc., Phosph., Puls., Rhus, Sil., Spong., Sulph.; — *чувствъ биенія или пульсаціи*: Aca., Calc., Clem., Kal., Lyc., Merc., Sil., Sulph.; — *свербежи и жжения въ язве*: Arg., Cham., Clem., Con., Dros., Lach., Lyc., Merc., Phosph., Rhus, Ser., Staph., Sulph.; — *жизаніи или потливаниіи*: Ars., Calc., Lyc., Ser., Sil., Sulph.; — *колотыи или рывка*: Bell., Calc., Graph., Lyc., Merc., Natr.-т., Nitr.-ас., Puls., Ser., Sil., Staph., Sulph.; — *боли, какъ отъ ссадинъ*: Graph., Нер., Puls., Rhus, Sil.; — *подергивающихъ болей*: Aca., Calc., Caust., Puls., Rhus, Sil.

См. Сыпи, Лишай, Ломота, Цыста, Залотуха, Сибирский, Мер-

курчавная страданія, Костей болѣзни, Рака, Варикозные узлы и статьи о различныхъ органахъ, на которыхъ встрѣчаются язва.

ЯЗЫКА, БОЛѢВЕННЫЯ СОСТОЯНІЯ.

§ 1. Большая часть этихъ страданій, начиная отъ простаго обложенія языка до его воспаления, нагноенія и омертвѣнія, составляетъ только симптомы другихъ безпорядковъ въ организмѣ, какъ напр. при *болѣзняхъ желудка и кишечнаго канала, трудныхъ лихорадкахъ, отравленіяхъ ядовитыми веществами, или при различныхъ дискразіяхъ, напр. сифилитической.*

§ 2. При *обложеніи языка*: 1) Ant., Bell., Bry., Cham., Chin., Dig., Ign., Ipec., Merc., Phosph., Plumb., Puls., Rhus, Sabad., Sep., Sil., Sulph.; 2) Acon., Amb., Ars., Carb.-veg., Cin., Dig., Dulc., Hep., Hyos., Jod., Lach., Natr., Natr.-m., Nitr., Nitr.-ac., N.-vom., Petr., Sabin., Sec., Seneg., Sulph., Tart., Thuj., Veratr., Verb..

Изъ этихъ средствъ, *при обложеніи слюною зеленою цвѣта*: Bell., Carb.-veg., Hyos., N.-vom., Sabin., Sil., Sulph., Verb.;—*при плотной коркѣ на языкѣ*: Baryt., Bell., Bry., Cham., Chin., Lach., Merc., Phosph., Sec., Sabad., Sabin., Selen.;—*желтоватой*: Bell., Bry., Carb.-veg., Cham., Chin., Coloc., Ipec., Lach., Mez., N.-vom., Plumb., Puls., Sabad., Sabin., Seneg., Veratr., Zinc.;—*сырой*: Amb., Puls., Tart.;—*зеленоватой*: Magn.-c., Magn.-m., Plumb., Rhod.;—*слизистой*: Bell., Chin., Cupr., Dig., Dulc., Lach., Magn.-arct., Natr., N.-mosch., N.-vom., Phosph., Puls., Seneg., Sep., Sil., Stann., Stront., Sulph.;—*блѣдой*: Arn., Ars., Bell., Calc., Carb.-veg., Cham., Chin., Croc., Dig., Ign., Ipec., Merc., N.-mosch., N.-vom., Oleand., Petr., Phosph., Puls., Staph., Thuj.—*Синій или синеватый цвѣтъ языка*: Ars., Dig., Mur.-ac.;—*кофейный*: Ars., Lach., N.-vom., Plumb., Rhus, Sec., Sulph.;—*бѣдный*: Agar., Lach., Merc., Natr.;—*красный*: Ars., Bell., Cham., Hyos., Rhus, Stann., Sulph., Veratr.;—*черный*: Ars., Chin., Lach., N.-vom., Op., Sec., Rhus, Veratr.;—*бѣлый*: Ars., Bell., Bry., Coloc., Graph., Hell., Lach., Nitr.-ac., N.-vom., Op., Petr., Puls., Sep., Sulph.—*При большой сухости языка и рта*: 1) Acon., Ars., Bell., Bry., Carb.-veg., Cham., Cist., Dulc., Hyos., Phosph., Rhus; 2) Arn., Calc., Caps., Hell., Kal., Merc., Natr.,

Natr.-m., Nitr.-ac., Plumb., Puls., Staph., Stram., Sulph., Sulph.-ac., Veratr.—При одномъ только *чувствѣ сухости* языка, съ очевидною влажностію его: Acon., Ars., Bell., Camph., Caps., Chin., Coff., N.-mosch., Phosph., Rhab., Rhus, Stront., Sulph.-ac.

§ 3. При *воспаленіи* языка: Canth., Plumb., Ran.-sc.—Если на языкѣ замѣчаются *пузыри*, или *пузырьки*: Amm., Ant., Calc., Canth., Carb.-an., Caust., Cham., Graph., Hell., Merc., Mez., Mur.-ac., Natr., Natr.-m., Nitr.-ac., N.-vom., Sabad., Ser., Spig., Squill., Thuj., Zinc.—При *язвахъ*: Borax, Cic., Dig., Graph., Lyc., Merc., Mur.-ac., Natr. m., Op.—При *молочницѣ*: Agar., Borax, Cham., Hell., Merc., Mur.-ac., N.-vom., Sassa., Sulph., Sulph.-ac., Thuj.—При *ссадинахъ*:

Agar., Carb.-veg., Dig., Kal., Lach., Lyc., Merc., Mez., Mur.-ac. Natr.-m., Nitr.-ac., Phosph., Phos.-ac., Sabad., Sil.—При *опухомъ* языка: 1) Ars., Bell., Hell., Lach., Merc.; 2) Calc., Con., Dig., Dros., Dulc., Kal., Lyc., Natr.-m., Phos.-ac., Sec., Sil., Stram., Thuj.—При *нагноеніи*: Canth., Merc.—При *омертвѣніи*: 1) Ars., Sulph.-ac.; 2) Chin., Chinin., Lach., Rhus, Sec., Veratr.—При *ражѣ*: 1) Sil., Sulph.; 2) Bell., Clem.; 3) Ars., Aur., Con., Graph., Kreos., Lach., Merc..

§ 4. Наконецъ, противъ *паралича* языка: Acon., Ars., Bell., Caust., Dulc., Graph., Hyos., Lach., N.-mosch., Op., Stram.—При *нелѣбности* языка: Borax, Colch., Euphr., Lach., Natr.-m.—Если онъ вообще *трудно движется*: Anac., Bell., Calc., Con., Lyc.—Если *кажется тяжельмъ*: Anac., Bell., Carb.-veg., Colch., Lyc., Mur.-ac., Natr.-m., Plumb.—При частомъ *укушеніи* языка: Lach. Agar., Cham., Nitr.-ac., Sec.;—*холодъ*: Bell., Laur., Veratr.;—*дрожаніи*: Bell., Ars., Caps., Merc..

§ 5. О прочихъ показаніяхъ срав.: *Воспаленіе рта, Пороки рта, Воспаленіе гортани*.

Яичекъ атрофія, Atrophia testicularum.—Наилучшими оказались: 1) Con., Jod., Nitr.-ac.; 2) Amm., Calc., Chin., Her. Natr.-m., Phosph.-ac., Rhod., Sulph., Sulph.-ac., Zinc..

Яичниковъ болѣзани, Morbi ovariorum.

По сходству принадлежовъ, производимыхъ лекарствами, противъ этихъ болѣзней можно употреблять: 1) Bell., Lach., Merc.; 2) Chin.,

Con., Dulc., Plat., Sabin.; 3) Acon., Arg., Amb., Aug., Sassa.
Staph..

Одну женщину, у которой къ затвердѣнію яичниковъ присоединилось острое воспаленіе ихъ, и которая была уже осуждена на смерть чрезъ 24 часа, я снялъ небольшоимъ приемомъ Con., ($\frac{2}{10}$ на стаканъ воды, каждыя три часа по чайной ложкѣ); черезъ недѣлю она встала съ постели и могла приступить къ обычнымъ своимъ занятіямъ. Однакоже въ настоящее время, по прошествіи 7 лѣтъ, затвердѣніе осталось невылеченнымъ. — Въ другомъ случаѣ, гдѣ было *затвердѣніе и нагноеніе* яичника, Герингъ видѣлъ значительный успѣхъ отъ Lach., послѣ котораго онъ назначилъ Plat..

Вообще при *остромъ воспаленіи яичника* (Ovaritis) главныя средства: Bry. и Apis. — При *водянкѣ* (Hydrops ovarii) главное средство: Apis, затѣмъ Dulc. и Sabin.. — При *хроническомъ воспаленіи* и болѣзненности яичника, кромѣ Bry. и Apis, заслуживаетъ особаго вниманія также Coloc..

Ячмень на вѣкѣ, Hordeolum.

Средства, преимущественно употребляемыя: 1) Puls., Staph.; 2) Amm.-с., Bry., Calc., Con., Ferr., Graph., Lys., Phosph., Phos-ас., Rhus, Ser. и Stann..

См. *Воспаленіе глаза*.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛЕКАРСТВЪ, БОЛЕЗНЕЙ И СИМПТОМОВЪ.

| | стр. | | стр. |
|---------------------------------|------|--|------|
| Аконитъ | 4 | Боли вообще | 106 |
| Амбра сѣрая | 4 | Болей приступы | 436 |
| Амкіанъ (отрава) | 91 | Болитоголовъ | 29 |
| Амкіанъ солянокислый | 7 | Бородавки | 158 |
| — углекислый | 5 | Боярышникъ | 66 |
| Анггардъ | 7 | Бредъ | 159 |
| Анаварка | 91 | Бромъ | 17 |
| Англійская болѣзнь | — | Брюшныя воспаленіе | 176 |
| Ангустира | 8 | Бугорки вообще | 159 |
| Ановерими | 92 | Бузина | 69 |
| Анонія | — | Бура | 16 |
| Апетитъ | 95 | Бѣлена | 37 |
| Апетита крикотливость | 96 | Бѣлы | 160 |
| Авокиксія | 92 | Бѣльмо | 161 |
| Аскариды | 97 | | |
| Астенія | 98 | В. | |
| Асфиксія | 374 | Валеріана | 88 |
| Атрофія | 99 | — (злоупотребленіе) | 162 |
| | | Вариолонды | — |
| Б. | | Вахта трилистная | 49 |
| Бакаутъ | 35 | Веревка | 162 |
| Бараникъ | 10 | Вкуса измѣненія | 168 |
| Баритъ углекислый | 14 | — потеря | 164 |
| Безплодіе у женщинъ | 421 | Взвѣсія механическія | 883 |
| Бессонница | 102 | Водобоязнь (собачье бѣшенство) | 165 |
| Беременность | 105 | Водобоязнь (чувствительность къ | |
| Близорукость | — | водѣ) | — |
| Блѣдная похоть | — | Водянка вообще | — |
| | | — брюшная | 167 |

| | стр. | | стр. |
|--|------|--|------|
| Водянка грудная | 168 | Графитъ | 24 |
| — водяниая | — | Гречій орѣхъ | 24 |
| — сочлененій | — | Грибъ кровавой | 24 |
| — черешная | — | Грибы ядовитые (отравленіе) | 24 |
| Воздухъ и вѣтеръ (измѣненіе) | 881 | Грибовидный наростъ | — |
| Возрастъ | 582 | Грипы | 27 |
| Возвѣній душевныхъ послѣдствія | 170 | Грудница, воспаленіе грудей | 19 |
| Взлосъ выпаденіе | 174 | Грудная боли | 19 |
| Волчанка | 30 | Грудобронной преграды воспаленіе | 19 |
| Волчье лыко | 60 | Грыжи | 20 |
| Воспаленіе вообще | 176 | Губка жемчуга | 7 |
| Впечатлѣнія на душу | 387 | | |
| Времена года (измѣненіе) | 381 | Ж. | |
| Время дня (измѣненіе) | 879 | Дальнозоркость | 20 |
| Винность | 221 | Движеніе (вредъ отъ него) | 20 |
| Видѣнья | 218 | Движенія потрясающія | 20 |
| Вѣкъ воспаленіе | 176 | Десень болѣзни | 20 |
| — судорожное смѣтіе | 544 | Дурманъ | 7 |
| Вѣтрянца | 64 | — (отравленіе) | 24 |
| | | Душевныя болѣзни | 19 |
| Ж. | | Дыхательнаго горла воспаленіе | 19 |
| Газы вредныя | 222 | Дѣтскія болѣзни | 24 |
| Геморрой | — | | |
| Глаза воспаленіе | 179 | З. | |
| — невралгій | 225 | Жаба | 19 |
| — ракъ | 454 | — грудная | 20 |
| — роговныя болѣзни | 468 | — дифтерическая | — |
| — слезотеченіе | 485 | — перепончатая | — |
| Глиновыя | 8 | Жабникъ | 6 |
| Глисты круглыя | 97 | Жара солнечнаго послѣдствія | 20 |
| Глистонъ | 88 | Железь болѣзни | 20 |
| Глотаніе затрудненное | 227 | Железы околушней воспаленіе | 20 |
| Глотки воспаленіе | 187 | — предстательной — | 21 |
| Глухота | 227 | Желтуха | 20 |
| Голова дѣтская увеличенная | 94 | Желудка боли и спазмы | 20 |
| Головокруженіе | 232 | — воспаленіе | 20 |
| Головы боли | 115 | — размягченіе | 20 |
| Голодь болѣзненный | 235 | — разстройство | — |
| Голоса потеря | 236 | — ракъ и сипръ | 20 |
| Говоренія | — | — страданія вообще | 20 |
| Гортани воспаленіе и чихота | 187 | Желѣзо | 21 |
| Горьчка черная | 522 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| | <i>стр.</i> |
| Желѣзо (злоупотребленіе) | 259 |
| Живота боли | 139 |
| — задутіе | 259 |

З.

| | |
|--------------------------------|-----|
| Закананіе | 261 |
| Заноса | 418 |
| Запоръ на языкъ | 262 |
| Зеленая-вода | 162 |
| Зобъ | 264 |
| Золото листовое | 13 |
| Золотуха | 264 |
| Зрѣніа слабость | 268 |
| Зубовъ боли | 137 |
| — ломкость | 146 |
| Зудъ задняго прохода | 275 |
| — наложный | 276 |
| Зѣва воспаленіе | 191 |
| Зѣвота судорожная | 276 |
| Зябкость | 277 |

И, X.

| | |
|---|-----|
| Иглиця | 38 |
| Имѣсть углекислая | 48 |
| Имѣга (низкога) | 278 |
| Икота | 279 |
| Икръ ножныхъ судороги | 511 |
| Иподохдрія | 280 |
| Искривленія позвоночнаго столба | 91 |
| — грудчатыхъ костей | — |
| Истерика | 282 |
| Искуданіе | 283 |
| Иодъ | 89 |
| — (злоупотребленіе) | 283 |

Ис.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Кали двухромовое | 42 |
| Кальмія широкостная | — |
| Камедь виноградная | 13 |
| Камни почечные | 284 |
| Камфора | 19 |
| — (злоупотребленіе) | 284 |

| | |
|--|-------------|
| | <i>стр.</i> |
| Каолинъ | 43 |
| Карагана | 72 |
| Карбункулъ | 284 |
| Каталенсія | 285 |
| Катарръ бронхіальный | — |
| — удушливый | 294 |
| Каустикъ | 22 |
| Кашель | 295 |
| Каски (отравленіе) | 299 |
| Кислота азотная | 55 |
| — кремневая | 33 |
| — росномладанная | 15 |
| — синильная (отравленіе) | 477 |
| — соляная | 51 |
| — сѣрная | 81 |
| — фосфорная | 63 |
| — щавелевая (отравленіе) | 60 |
| Кашокъ воспаленіе | 199 |
| — заворотъ | 300 |
| Кожа болѣзненность | — |
| — моволистость | — |
| — ошрѣлости | 889 |
| — сухость | 300 |
| — трещины | 581 |
| Коклюшъ | 800 |
| Коклюшъ | 27 |
| Колодентъ | 28 |
| Колтуль | 304 |
| Колѣннаго сустава воспаленіе | 199 |
| Копонилъ | 19 |
| Копитель европейскій | 13 |
| Кормленіе грудью | 304 |
| Коръ | 306 |
| Косоглазіе | 308 |
| Костей болѣзнь | — |
| — грудчатыхъ искривленіе | 91 |
| — черепа болѣзнь | 311 |
| Кофе | 28 |
| — (злоупотребленіе) | 311 |
| Краснуха | 812 |
| Кремнеземъ | 74 |
| Креозотъ | 48 |
| Крестца боли | 149 |

| | стр. | | ст. |
|---|------|--|-----|
| Кроваки изъ канадскій | 70 | | |
| Крови волненіе | 845 | ЪМ. | |
| Кровотеченія вообще | — | Магнезіа (злоупотребленіе) | 281 |
| — изъ глаза | 316 | Магнезіа углекислая | 8 |
| — — заднего прохода | — | — хлористая | — |
| — — легкиѣ | — | Майоранъ | 8 |
| — — матки | 320 | Малокровіе | 11 |
| — — мочеиспускатель- | — | Марганецъ | 8 |
| наго канала | 318 | Матки воспаленіе | 200 |
| — — носу | — | — и рукава выхожденіе | 338 |
| — — полости рта | 834 | — ракъ и отвердѣніе | 43 |
| Кровяные подтеки и пятна | — | — страданія вообще | 338 |
| Крыловидная плева на глазу | 325 | Малакколій | 28 |
| Курьяная слѣзота | — | Миндальнѣ воспаленіе | 204 |
| Ж. | | | |
| Лавровая вишня | 45 | Можжевеловыиъ канадскій | 8 |
| Ладанникъ | 26 | Молочайникъ | 33 |
| Легкиѣ воспаленіе | 200 | Мозга головного воспаленіе | 204 |
| — параличъ | 404 | — — сотрясеніе | 260 |
| Лихорадка воспалительная | 825 | Мозоли | — |
| — гастрическая | 319 | Молочница | 261 |
| — энурительная | 333 | Морская болѣзнь | — |
| — перемежающаяся | 336 | Мочевого пузыря воспаленіе | 205 |
| — востудная | 846 | — — катарръ | 204 |
| — родильная | 847 | — — параличъ | 464 |
| Лица боки | 149 | — — полипы | 449 |
| — сыни | 515 | — — (и канала) свищъ | 475 |
| — цѣтъ и вѣдь | 849 | — — судороги | 487 |
| Липай жаркій | 351 | Мочеиспускательнаго канала суже- | 511 |
| — мокрый | 352 | ніе | 511 |
| — сухой | 358 | Мочевывуреніе | 261 |
| — половыхъ частей | — | Мочеотдѣленіе болѣзненное | — |
| — пузырчатый | 364 | Мочи задержаніе | 264 |
| — стружковидный | — | Мускатный орѣхъ | 28 |
| — чешуйчатый | — | Мускусъ | 51 |
| Ломовость | 27 | Мухоморъ | 3 |
| Ломота | 355 | Мушка иванская | 20 |
| Лужь морской | 77 | Мышь | 11 |
| — рѣпчатый | 28 | — (отравленіе) | 264 |
| Лѣзость | 857 | Мышь судороги | 28 |
| Любовь несчастная (послѣдствія) | — | Мѣхъ | 28 |
| | | Мѣшка слезнаго свищъ | 473 |

| | стр. |
|--|------|
| Ж | |
| Навалъ | 865 |
| Нагноеніе | 866 |
| Наверстаніа, навесточная трава | 81 |
| Направленіе умственныхъ способностей | 445 |
| — тѣла | — |
| Наркотизмъ | 867 |
| Наруши наружные и внутренніе | — |
| Насморкъ | 868 |
| Натръ хлористый | 53 |
| Неба воспаленіе | 208 |
| Незрѣлыя | 486 |
| Негнѣучка | 82 |
| Нервовъ слабость, раздражительность | 873 |
| Нефть | 60 |
| Ноготѣда | 878 |
| Носа воспаленіе | 209 |
| — полипы | 420 |
| — ракъ | 452 |

О

| | |
|--|----------|
| Обмираліе | 374 |
| Обморокъ | 375 |
| Обильнѣя потери | 377 |
| — раздражительность и обильнѣя | — |
| Обстоятельства улучшающія | — |
| — ухудшающія | 379 |
| Одуръ сонная | 14 |
| Ожирѣніе | 388 |
| Озога | — |
| Озвобленіе | — |
| Олеандеръ | 58 |
| Олово | 77 |
| — (отравленіе) | 388 |
| Омега | 28 |
| Омертѣніе | 388 |
| Онакизмъ | 421, 446 |
| Онѣмѣніе вслѣдствіе апоплексій | 92 |

| | стр. |
|-----------------------------|------|
| Опій | 59 |
| — (отравленіе) | 389 |
| Опухоли | — |
| — кѣшотчатныя | 365 |
| — губъ | 392 |
| — щекъ | — |
| Осенники | 28 |
| Осиа | 392 |
| — ложная | 393 |
| Отвердѣніе | 394 |
| Отдѣленій скратіе | 488 |
| Оттекъ носа | 394 |
| Отравленія | — |
| Отрижка | 278 |
| Охриплость | 400 |
| Очанка | 32 |

К

| | |
|--|----------|
| Падучая болѣзнь | 401, 503 |
| Память слабость | 402 |
| Паразиты | 403 |
| Парша на головѣ | 405 |
| Парша лишайная | — |
| Пасленъ сладкогорькій | 31 |
| Паховникъ | 406 |
| Перелой | — |
| — ложный | 408 |
| Переломъ вслѣдствія и осложненія | — |
| Переступень | 17 |
| Перецъ стручковый | 20 |
| Печени воспаленіе | 210 |
| Пища (вліаніе) | 880 |
| Пищеваренія расстройство | 408 |
| Платина | 63 |
| Плауны | 45 |
| Плачь судорожный | 416 |
| Плевры воспаленіе | 212 |
| Поврежденія механическія | 416 |
| Подагра | 419 |
| Позвоночнаго столба искривленіе | 91 |
| Ползаніе мурашекъ (ощущеніе) | 419 |
| Полипы | — |

| | стр. | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--|
| Ц | | Щ | |
| Цинк | 85 | Щетинка | |
| Цинга | 563 | | |
| Ч | | Э | |
| Чай (злоупотребленіе) | 564 | Экзема | |
| Чихотка горловая | — | | |
| — легочная | — | Я | |
| Члостей судорожное сжатіе | 511 | Ядъ гремучаго змея | |
| Чемерица | 85 | — пчелиный | |
| — бѣлая | 84 | — жабій (отравленіе) | |
| Чесотка | 568 | — жировой или колбасный | |
| Чизбуха | 57 | — рыбій | |
| Чистотѣль | 24 | — сальной | |
| Чиханіе судорожное | 571 | Язы | |
| Членокъ дрожаніе | — | Языка болѣзненныя состоянія | |
| Чума восточная | — | — ожога | |
| Ш | | Ячмень атрофія | |
| Шафранъ | 29 | — воспаленіе и опухоль | |
| — (злоупотребленіе) | 571 | Ячичковъ болѣзнь | |
| Швабскія мушки (отравленіе) | — | Ячмень на зѣлкѣ | |